



Math. 107.

Math 107

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT



00000144434

ex Bibliotheca Publica Urbis Sordruenae,
cujus aucto habita fuit Die 6 Sept. 1768

HEVELII

SELENOGRA-
PHIA.

S JOHANNIS HEVELII SELENOGRAPHIA:

SIVE,

Lunæ Descriptio;

ATQUE

ACCURATA, TAM MACULARUM
EJUS, QUAM MOTUUM DIVERSORUM,
ALIARUMQUE OMNIUM VICISSITUDINUM,
PHASIVMQUE, TELESCOPII OPE DEPREHEN-
SARUM, DELINEATIO.

In quâ simul cæterorum omnium Pla-
netarum nativa facies, variæque observationes,
præsertim autem Macularum Solarium, atque Jovialium, Tubospicillo
acquisitæ, figuris accuratissimè æri incisus, sub aspectum ponuntur: nec
non quamplurimæ Astronomicæ, Opticæ, Physicæque quæstio-
nes proponuntur atque resolvuntur.

*ADDITA EST, LENTES EXPOLIENDI NOVA RA-
TIO; UT ET TELESCOPIA DIVERSA CONSTRUENDI, ET EX-
PERIENDI, horumq; adminiculo, varias observationes Cælestes, imprimis quidem Ecli-
psium, cum Solarium, tum Lunarium, exquisitè insinuendi, itemq; diametros stellarum veras, viâ
infallibilis, determinandi methodus: eoque, quicquid præterea circa ejusmodi
observationes animadverti debet, perspicuè
explicatur.*

CUM GRATIA ET PRIVILEGIO S. R. M.

GEDANI

edita,

ANNO ÆRÆ CHRISTIANÆ, 1647.

Autoris sumtibus, Typis Hünfeldianis.



[The main body of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]



IOHANNIS HEVELII,
SELENOGRAPHIA.
esse.
LUNAE DESCRIPTIO;
tam macularum,
quam motuum diversorum,
altitudinis omnium vicissitudinum
phaenomeni, Lunarium,
quaevisque opus,
deprehensionem,
delineationemque accuratam,
atque locopleti,
rerum Coelestium,
aetherei exornatae
prodit.
GĒDANI.
Anno à Christo nato, 1647.
Autoris sumptibus,
Typis Hünfeldianis.

ALHASEN
RATIO.

GALILEI
SENS.

IN
DEI O. M.
Rerum omnium Parentis,
GLORIAM,
Cœlesti affulgente ope,
elucubratas has operas,
SELENOGRAPHICAS,
REGIÆ URBI,
GEDANO,
Charitates omnes comple-
ctenti
PATRIÆ,
cum majorum semper-in-
crementorum voto, honoris
& amoris debiti causâ,
D. D. D.
Johannes Hevelius.

NO. 10



Contempland Virum, qui cæli sidera primus
 Que vidit, oculisq; mentis manibus valens.
 Hevelius ut nomen: quod Solariorum, ASTRONOMUS,
 Si in vivis ætate; tu CASAREE quæquid.
 Exprescit cæcis, Fulci celeberrime dextra,
 ACCESSIONE, patriæ nobile sidus Luni.

Hevelius à Swedens genit.

Johannes Hevelius. J. Gron. Scult. sculpsit.

Ad Lectorem.

CUM INCOMPARABILI PACE, quam DEI Optimi Maximi nobis largitus est favor singularis, & SERENISSIMI AC POTENTISSIMI PRINCIPIS ULADISLAI IV. DOMINI AC REGIS nostri longè CLEMENTISSIMI, immortali laude dignissimum erga subditorum suorum felicitatem studium conservavit, hoc loco fruamur; utique ad nos omnes hoc quàm maximè spectare sum arbitratus semper, ut Numini supremo eapropter & infinitas agamus gratias, & simus submississimè supplices, quò, cum S. REGIAE nostræ MAJESTATIS perpetuaturâ famâ prosperrimâ, nobis liceat diu esse sic beatis. Quemadmodum item, sine dubio, partium eò est nostrarum, quiete istâ otioq; coelitus concessò ita uti, ne ignobili torpore tempus ad omnia commodum transigamus; verùm ad pacis potiùs, pariter utilissimos, pariter laudatissimos fructus, ut quimus, universi ac singuli incumbamus promovendos: quò publicè constet, nos tantum Coeli beneficium, quo regiones pleræque Christianæ, hæctenus multos annos, miserabiliter caruerunt, agnoscere, & eo, quo par est, animo colere. Quod quanquam intimis meis medullis hæreret infixum; non ausus sum tamen mihi (meo me, quod æquum esse novi, mentienti modulo) pervadere, quò eum in finem

possem plus aliquid efficere, quàm è grege paterfamilias quidam, & civis frugi, aut vix paulò magis quàm privatus. Cæterùm, in coelestis fornicis contemplatione asiduo (ad quod studii genus semper valde propensum esse animum meum sensi, à teneris eò, cum impetu divino abreptum, tum corporis animique parentum, optimâ recordatione semper mihi prosequendorum, bene consultâ, fidelique operâ inclinatum) & observationes jam pridem coeptas accumulanti, in mentem ejus rei venit, bono, ut planè nullus dubito, inspirante genio, vix vulgarem fore operam, Uranoscopis certè & valde utilem & haud ingratham, si Planetarum nondum satis cognitâs figuras, visu meo, quàm possem maximè, venarer, & oculis menteque paulò accuratiùs perceptas in chartâ spectandas orbi sifterem; quò etiam omnes ad corporum coelestium adspectum, hortatu, ne dicam imperio, impulsu divino, magis magisque asvesciant. Lunam verò vel cum primis attendendam esse duxi, quòd ea minùs videretur observata, quàm oportuit; &, quòd ejus, quæ hactenus quidem credita est incerta, varietate rectè compertâ, futurum esse pro certo statuerim, ut inde mille sint mesuri utilitates Astronomi, Geographi, Hydrographi, Nautæ, homines omnes: si videlicet vera Macularum Lunarium, cum magnitudo, tum distantia atque proportio, ut & corporis totius Lunaris gresus fixi, ac ejusdem in vultu vicisitu-

tudines examusim notentur, & notata, quasi in tabulâ, sint in promptu. Quam cogitationem meam, quibusdam proditam, stimulare præsertim rerum Mathematicarum peritiores, vel sanè cupidores aliqui; quorum singularis virtus & mutuus amor meritisimò fertur à me in oculis. Ut autem sic animos mihi esse additos sum expertus, ardore id conandi nimium quantum in pectore intus crescente: ita parùm abfuit, quin accinctus operi (quod cum die intelligebam multò maximam molestiam afferre) cessissem oneri. Tuborum aliquis, quo carere hîc non licet, primò quærebatur, atque is non in foro obvius & rerum promercialium tabernis, sed exquisitus, quem corpora coelestia admitterent, & non eluderent. Hunc verò ubi & unde nancisci deberem, non inveniebam. Animadvertēbam deinde, hoc laboris aggresso suscipiendam esse fabulâ decantati Endymionis personam, & ferè dormiendum esse diu, noctu autem maximam partem vigilandum; quod citra virium corporis haud exiguam attenuationem fieri posset, nec citra rerum multarum dispendium. Hinc autem multò etiam major oriebatur formido, quòd tale quid somniare non liceret, fore, ut laborum socium essem reperturus, quò visa chartæ traderentur; sed uni soliquè mihi & per noctem contemplandicuram & diurnam annotandi esse perferendam, hoc est, oculos de nocte & manus de die in perpetuis

occupationibus detinenda. Quanquam hæc omnia nihil erant ad id, cùm se menti offerebat, quanta sit futura difficultas tam rari, imò inausi operis, ad aliquem, si ve mihi tantùm, si ve aliis, placiturum exitum perducendi. Verùm enim vero tandem me obfirmavi, non tam illud animo volvens: tentanda est via, quâ me quoquẽ possum tollere humo; quàm hoc, quid non faciendum ad DEI gloriam, quicum facere, si velit, possumus omnia? Ipsius igitur suppliciter imploratâ ope, rem aggressus sum alacriter. De Tubospicillis verò primò omnium acquirendis prima fuit cura. Sed quæ ære non poterant comparari, parabantur manibus nostris & sudore. Ita opificem me agere priùs oportuit, quàm Coelispicem. Absquẽ his enim scalis, domos in superas scandere negatum fuisset. Quas cùm effabricassem ex voto, imò supra votum, vel exspectationem (nam quĩ ego mihi hoc polliceri potuissem, me rem, quod dicitur, acu hĩc tacturum?) in eo totus fui, ut Cœlo oculos applicarem bene armatos, & in Planetarum omnium, ac potissimùm Lunæ, regiones intimiùs cognoscendas, quasi explorator aliquis, penetrarem. Fata & facta viam invenẽre. Saturnus ille ab omni tempore admodum latens, est observatus: animadversi Jovis stipatores & quasi circumcelliones, ipsiusquẽ Jovis maculosus vultus: Mars, cum genuinâ suâ formâ, &, quâ lucem incrementis decrementisque annotatus: Solis Regia
ut

ut luce foecundi parentis, ita & maculis & faculis variis, lustrata: Veneris Mercuriique phases conspectae: & deprehensae stellae aliquot fixae, haecenus inuisae & inexploratae. In Lunae autem consideratione, cui potissimum vacare in animum induxeram, hoc operis pretium ratus, morabar & perseverabam omni studio. Sic ejus diversa Plenilunia Quadraturasque & quadraginta ejusdem facies oculo & mente comprehendi, comprehensas, caelo in manus nostras sumpto, delineavi, & hoc quasi Coelum, quod nunc prodit, chartaceum adornavi. Quem laborem suo pretio aestimabunt vel paululum attententi; animum vero multo magis, opinor, omnes. Neque sic vero omni defunctus eram sollicitudine, sed nomenclatoris mihi quoque sumere partes debui, maculisque Lunaribus tam diversis, distinctionis & hac directi melioris intellectus gratia, indere nomina certa: quo opere illud magis arduum erat, ut motus Lunaris centri libratorius cuspidumque, cum terminis inclinationibusque Pleniluniorum, Quadraturarum, Trigonorum, Phasiumque reliquarum omnium; & hujus generis alia admirabiliter secundo successu percepta; ad fixas naturaeque consentaneas leges adstringerentur, usu omnium commonstrato. Quae cum peracta essent omnia, & cum amicis, meo more, communicata etiam acrius sum instigatus, ut publico gratificarer, & Selenographiam aliquam, qua meas observationes
omnes

omnes complecterer, ederem in lucem, partim gloriam DEI cum Coelis sic enarraturus, partim Terræ Incolis omnibus omnium gentium Selenographiam istam lecturis, vel saltem spectaturis, talia suggesturus, quæ crescant in maximam utilitatem communem; Mathematicis autem calcar additurus, quò observationes cœlestes accuratiùs, quàm unquam, suscipiant, iisque facem prælaturus, quâ radiante, tabulæ perpetuæ motuum cœlestium perfectiores reddantur, & via inveniatur locorum scrutandi dexteriùs longitudines; ut ut alia in censum non veniant: Dictum, factum. Ac præsertim quasi monitus à stellis & luminibus Cœli toties adspectis, quæ non sibi, sed aliis, sive lucent, sive profunt, lampadem in manum sumsi. Atque hoc insuper etiam attento, quò hæcenus nulla prodierit Selenographia inter tot nescio quas graphias. Sic, calamo arrepto, quam trado, Selenographiam, pro virili exaravi. In quâ conficiendâ non longè & anxie quæsitus ordo, sed is placuit, qui circa institutas operas sponte suâ principiò se obtulit, & rei ipsius agitatione occupatum semper ambiit. Quapropter illico in ipso Prolegomenon limine, primò de diversi generis lentibus, earumque politurâ; ut & Telescopiorum constructione, eorumque potestatem explorandi modo, atque aliis huc pertinentibus rebus, ut breviter, at perspicuè tamen, sicut nostra quidem fert opinio, quædam præmisimus: quippe

pe

pe quòd contemplationes cœlestes (quemadmodum constat) absquẽ Tuborum optidorum adminiculo nullâ ratione peragi queant. Deinceps verò etiam manuuctionem quandam tradidimus, quo pacto Telescopiaritè ad Astra oculis usurpanda applicare oporteat; addito, sive quid ab aliis hactenus, sive à memet ipso, Perspicillorum talium rectè ad motorum beneficio, fuerit indagatum. Sed, inter cœtera, proditum ivimus fideliter, quænam in observatione Fixarum, Planetarumquẽ imprimis, animadvertere licuerit: horum accuratè delineatâ effigie, quam simul exhibemus; & subjunctis enodatisquẽ, eò que maximè spectare videbantur, quæstionibus omnis generis. Quâ item occasione pariter de Jovialium motu, & affectionibus, ut & Maculis Faculisquẽ Solaribus, dilucidè, quoad fieri potuit, edisseruimus. Ut taceam, quæ, suo loco, circa stellarum fixarum observationes, præcipuè autem de stellis ULADISLAVIANIS, quas, Antonio Mariæ de Rheitâ stellas URBAN-OCTAVIANAS appellare placuit, fusè proponentur, non occultato quali quali iudicio nostro super iisdem stellis, num in ordinem Erronum, vel Fixarum, referendæ: quibus accedunt aliarum multò plurium nec injucundarum, nec inutilium rerum & sententiarum ventilationes & discussiones. Quæ sic breviter perstricta Prolegomena exhibent ampliter. Jam in ipsâ verò Selenographiâ, initiò, tam Veterum,

rum,

rum,quàmRecentiorumPhilosophorumomniva-
rias opiniones,de Lunâ,ejusquëMaculis,modoq;,
quo lucem accipit & reddit, in theatrum produxi-
mus:erroneas quidem leviter explofimus,veras au-
tem magis magisque applaufu nostro ivimus com-
mendatum. Egimus adhæc,de diverfis Lunæ moti-
bus,quà hætenus compertis,quà nunc primùm a-
nimadverfis;quosin pleniori planiorique luce col-
locavimus, ut phafes faciesque Lunares ordine in
ipfo volumine exhibitæ tantò meliùs perfpiceren-
tur.. Denique tandem autem ipfas phafes,cum ne-
cessariâ quâdam explicatione & annotationibus ac
quæftionibus,ad Mathematicum, ut & Phyfices O-
pticesque fundum pertinentibus,tanquam cum a-
liquo apparatu aut appariturâ, omnium subjek-
tus oculis. Atque sic postremò omnium hujus no-
stre Selenographiæ ufum Astrophilis commonstra-
vimus,indicato preprimis,quâ nimirum novâ infal-
libilique methodo,cùm Eclipses atque stellarum
occultationes,tum longitudines locorum observa-
re (ad quem scopum, fateor, opus nostrum unice
tendit)facile detur omnibus: id quod etiam exem-
plis nonnullis,nec sanè vulgaribus,nec obscuris,il-
lustravimus: sic viâ scilicet ad omnes cœlestes con-
templationes utili, utpote quæ verè regia egregie-
que tuta est,complanatâ. Atque ita accepisti, mi Le-
ctor, operis nostri ideam, paucis admodum lineis
adumbratam: cujus si integri adspiciendi cupidita-
te flagras, age, sis, omnes ejus pagellas sive pervolu-
tabis,

tabis, five pervolitabis; ut, quæ maximè cognitione tuâ digna judicaveris, expendas diligentius & animo complectaris firmitus: Non nostrę glorię utique hîc sevimus, & ideo ejus metendæ desiderio nihil flagramus; fatis erit, si, quod maximè volumus, rerum omnium Parentis ac Conditoris admirabilis potentia, & magnificentia & bonitas hinc tibi elucescat. Quod si eveniat, gratias age DEO, nostrum utriquę quòd ista revelare dignatus fuerit, mihi quidem talia cum negotioso labore scrutanti, tibi autem citra illum otiosę his fruenti. Et verò, si nobis etiam bene cupis, DEUM mecum implorabis, ut quem mihi dedit animum hæc sua Cœli volumine comprehensa mysteria avidè rimari, & cupidè propalare, servet atquę augeat propitius, & corporis, quę eò quoquę necessaria est, incolumitatem benignè impertiens. Nam sic & instructi viribus, & equitate ac bonâ voluntate lectorum, si percepta fuerit, adjuti, multò profectò alacrius ad pergendam hanc viam, & vitam publico impendendam surgemus, postquam paulisper tantum conquieverimus. Si tamen alicui suppetant, five hujus, five melioris notæ quædam, illa ne recondita habeat, sed in lucem proferat, rogamus, ut ut nostra talibus obscurarentur. Alius est splendor Solis, alius splendor Lunæ, alius splendor stellarum. Stella enim stellę præstat splendore: rectè annotante D. Paul. in Ep. I. ad Cor. C. 15. v. 41. & attestante experientiâ, sicut & hoc præsentem nostro exiguo opusculo.

Scribentem Dantisci, Anno à nato Christo

1647. pridie Nonarum Maij.

* * *

Hono-

HONORATISSIMORUM AMICORUM
SPONTE EXHIBITA
CARMINA.



IN OPUS INCOMPARABILE

Amplissimi Viri

JOHANNIS HEVELII.

Ingentes animæ, quas indefessus & acer
Agit inquietas cuncta noscendi labor.
Præclarum Hevelii, post omnia, discite librum;
Opus stupendi & ardui conaminis.
Hic, post exhaustas feliciter hæctenus Artes,
Scientiarum cernitis fontes novos.
Scilicet audaci speculo scrutatus Olympum,
Et pervagatus astra sublimi gradu,
Hæctenus invisos, oculis nunc subjicit Orbes,
Vastæ Universi proferens pomæria
Hevelius, Gedani nova gloria. Quisquis ubiq;
Inusitatis nunc farves conatibus,
Ingenium ætherei mecum venerare Columbi,
Virumq; Patriæ, & Patriam dignam Viro.

Vincentius Fabricius.

In Auctoris Ingeniosissimi Laborio-
sissimum OPUS.

Sate Syracusij miratus Jupiter Orbes:
Hoc Gedanum cuncti Dij magis Artis Opus!
Saturnus, Titan, Mars, Mercuriusq;, Venusq;
Cernitur ut doctâ Cymbia sculpta manu!
Jupiter & Tuscis, maculosus redditus, astris;
Laude nihil cedit Prussia, nunc Latio.
Num superare novis valeat, modo queritur, ausis?
Hæc lis Judicium, postulat Apollo tuum.

Veteri Amico L. M. faciebat

Benjamin Engelke.

De

De Utilitate hujus Selenographiæ
LAURENTII EICHSTADII D.
P. & P. G. G. Carmen officioso affectu &
applausu fufum.

Non res est facilis conscendere culmen Olympi,
Stellarum varios motus & noscere situs,
Ac rectè numerare gradus & tempora Cæli:
Mortales sanè pauci, quos æquus amavit
Jupiter, aut ardens evexit ad æthera virtus,
Hoc præstare queunt, & vertice tangere Lunam.
HEVELI temet dulces ante omnia Musæ
Accepere, vias Cæli, astrorumq; meatus
Et numeros rectè docuere, & corpora quanta,
Monstraruntq; simul lucis discrimen & umbra,
Uranicque tibi Cæli inspiravit amorem.

Hac pollens virtute subis sublimibus ausis
Sedulus illustris sinuosa volumina cæli,
Nec non perlustras subtilibus instrumentis
Diversas Lunæ facies, maculasque recenset,
Quidq; novum semper producat menstrua Luna:
Quis vultus, quenam mutatio, quanta subinde
Sit Lunæ; ut variet faciem, varietq; figuram.
Falcatam ut nova præsentet, mox dimidiatam,
Gibbosam dein, & pleni quoq; luminis orbem.
At maculas omnes Terræ hujus nomine signas,
Metirisq; barum montes ratione sagaci.
Astronomis non illa fuit via cognita prisca:
Detexit nostro sæculo hanc Tubus Opticus arte
Solerti factus, ceu ritè Dioptrica tradit.
Ecce labore tuo nunc observare labores,
HEVELI, Uranis cultor, Phæbiq; sacerdos,
Rectius incipimus Lunæ, Eclipsesque frequentes.
Nunc quoq; Terrarum melius loca disita longè
In certis gradibus constabunt, quàm velut ante.
Mox & hydrographicas tabulas gaudebit habere
E meliore luto formatas nautica praxis:
Namq; SELENOGRAPHIÆ est ingens fructus & usus.
Omnia quæ tu oculis pulchrè spectanda dedisti
In præsentè libro, veluti sub imagine virvâ:
Addis enim miris ornata emblemata formis,
Quæ certè magno sunt exantlata labore,
Et vigili studio noctis, studioq; dici.

Insuper & reliquos sublimior ire per ignes,
HEVELI, pergis solerter & ordine dextro:
Hinc etenim è Cælis æternæ incendia lucis
Detrahis, exiguâ Solem ostendisq; Tabellâ,
Quasque trahat secum maculas, faculasq; sequaces.

*** 3

Axem

Axem quæ circum Solis gyrauntur ab ortu
 Occasum versus, monstras indagine mirâ.
 Sic & defectus Solis magnâ caligine mersi
 In parvâ tabulâ hic rectè observare docemur.
 Quin etiam stellæ Veneris falcatum, Mercurii que
 Tu representas vultum, formamque fidelem;
 Qualis sit semper rutilus Mavortis & ignis:
 Quenam sint comites Jovis, & numero quoque quot sint;
 Quâ ratione has à reliquis discernere stellis
 Fas, quæ etiam circumstant interdum Jovis astrum.
 Saturni quenam facies sit, & ansula duplex,
 Quâ triplicem stellam representare videtur.
 Innumerabilium Fixarum lumina parva
 Congeriemque addis, quam detegit apta dioptra:
 Præmittisque etiam præclara Dioptrica sanè,
 Quæ non Alhacen, quæ non Vitellio novit.
 Hæc tibi nunc docti referent accepta Magistro;
 Posteritasque tuos agnoscat grata labores,
 Hinc interque Mathematicos hoc tempore claros
 Decretura tibi excelsas non invida sedes,
 Dicetque haud dubie, ingenuoque fatebitur ore:
 Multa tulit, fecitque hic Vir, sudavit, & alfit,
 Ante tuas maculas Phœbe quàm prenderis omnes.
 Ergo Galilæus ne tantæ præmia laudis
 Prima ferat, nec Scheinerus sibi proxima poscat
 Efficit; unus habet & prima, & deinde secunda.
 Hinc opus est dignum fame sacra in æde locari,
 Quod stabit donec fulgebit Cynthia Cælis.
 Quare alias hominum curas contemne profanas,
 Nec vel judicia attendas temeraria vulgi,
 Nec tetricas etiam voces magni æstima incertum,
 Qui rident studia hæc, & cœlica tangere nolunt.
 Hos etenim vexat lucrum, ignorantia, luxus,
 Ambitiosus honor, & opes, & sæda voluptas,
 Quæ Cæli retrahunt ausis, & ad infima trudent.
 O HEVELI, igitur, non degener incola Mundi,
 Macte labore tuo, divinâque indole macte,
 Perge, ut cœpisti, stellarum expandere normas:
 Te fame & virtutis amor popularibus auris
 Altius erectum extollet pernicibus alis,
 Auxilium simul & promptum Copernicus ingens
 Sentiet, astrorum cultus crescetque perennis,
 Ac sparges latè ingenii & sapientiæ amorem,
 Dum per te JOVÆ miracula summa patefcunt,
 Dum Cæli species omnes redeuntibus Astris
 In proprias sedes remeant mirâ arte repostæ.
 Adspira cæptis magni Moderator Olympi.

IN SELENOGRAPHIAM
Viri Celeberrimi
Dn. JOHANNIS HEVELII

Scabini apud Dantiscanos Honoratissimi.



*Axima Siderii Miracula discere Mundi
Discipis? evolvat quasq; subinde vices?
Lumina vis radiis nitidis rutilantia Solis
Cernere, quæis atris sint maculosa notis?
Instabilis varias Luna vis nosse figuras?
Exhibeat pleno tum quid in Orbe suo?
Multaque præteritis occulta, indiætaque seclis,
Hic quæ præclaris sunt patefacta modis?
Nunc jurvat in superas attollere lumina Sedes,
Quisnam opifex Terris conderet ista potens?
Aspice stelligeri Tentoria lucida Cæli,
Et mirare DEI Facta stupenda Tui.
In Lunâ vastos Regionum cerneret tractus;
Quis Maris ingentes crederet esse Sinus?
In nitido maculas quis Solis lumine nigras
Quereret? aut Terram diceret ire vagam?
Crescere quis stellam Veneris; minuique putaret?
Sidus ut & refugum, Plejade Nate, tuum?
Ast hæc astriferi miranda toreumata Mundi,
HEVELII Clari Nobile pandit opus.
Ingenio HEVELIUS promit nunc Dædalus acri,
Quæ prius eximii non potuere viri.
Centum oculis Argus partes spectavit in omnes;
Uno ast HEVELIUS plus videt Ille tubo.
Hoc magis attentâ signavit mente labores
Delic nemo tuos, Cynthia sive tuos.
Pervigil innumeros depræditque Ætheris ignes,
Astraque quæ nunquam visa fuere prius.
Admovitque oculis distantia Sidera nostris,
Artis ab Inventi dexteritate novi.
Atlas, JANE, gravem Cælinon pertulit axem,
Imposuitque humeris pondera tanta tuis.
Hinc tua perpetuis clarescet Gloria seclis,
Cum Phæbo, & Phæbe, Sidera doucc erunt.*

Merrid amicitias posuit

Gerbrandus Hajo. Med. D.
Dantiscanus.

In Selenographiam
HEVELIO - GEDANENSEM,

Ad Autorem Clar. & Ingeniosissimum

EPIGRAMMA.



HEVELI: Lis est, tua palma sit, anné COLUMBI;

Utrius ingenium plusq̄ vigoris alat?

Aëra tu penetras, hic Aëquora sulcat: Olympum

Tu peragras, Mundi circuit iste polos.

Tu Cali facies, Terræ notat ille figuras,

Hactenus ignotas; hic rate, tuq̄ tubo.

Tu Maculas, Faculas, Montes, & flumina monstras,

Pluraq̄ Lunarîs schemata mira Facis.

Hic Portus Terrasq̄ novas, Fluviosq̄ retexit,

Amplaq̄ Terreni Climata multa Globi.

Tu, quibus Indigenis habitatur fulgida Phæbe,

Detegis; hic Indos Cannibalesq̄ feros.

Summa: Novos orbes manifestavistis utraq̄,

Antè parium notos, utilitate pari.

Hinc ergo lis est, tua palma sit, anné COLU MBI;

Utrius ingenium plusq̄ vigoris alat?

Quis litem dirimet? Dicam, quod sentio. Palma

(Namq̄ pares studiis estis) utrumq̄ decet.

Dadalus ille fuit, fuit & (sic scimus) Apelles,

Euclidesq̄ sagax Tu quoq̄ talis ovas.

Machina seu fuerit fabricanda, stylovè metallum

Calandum, pictis resvè notanda notis;

Sive Mathematicis ea demonstranda figuris:

Unus in his cunctis mente manuq̄ vales.

Quin & Chalcographi primas tibi cedere vîsi:

Dum Tabulas nequeunt ære referre tuas.

Quodq̄ rei caput est; Inventis fructus utriusq̄

Centuplus, his uti qui modo nôrit, erit.

Orbe COLUMBINO mala plurima vexit abusus:

HEVELII metuo nil ego tale Globis.

Cætera quid memorem? Tu par, HEVELE, COLUMBO;

Hic tibi: nam meritis surgitis ambo pares.

Digni, quæis statuas Musarum Turba novemplex,

Talia Posteritas & monumenta locet.

„Aufibus Hevelii par palma sit, atque Columbi:

„Neutrius ingenium namque vigore caret!

Rei literaria nova incrementa,
Auctori sagacissimo fama augmenta
gratulans scribebam Elbingæ

CYPRIANUS KINNERUS. D.
Consiliarius Lygius.

DE BORUSSIA:
ejusque indigenis tribus,
NICOLAO COPERNICO, PETRO CRÜGERO,
JOHANNE HEVELIO;

Mathematicis, ad unum, omnibus excellentissimis.

U*rbes tres, Regis cum monte, Borussia nostra
Præcipuas numerat. Senio venerabilis illa,
Thorunium, prima est: tum culta Elbinga, secunda:
Tertia Dantiscum, plus terque quaterque beata.
Urbes non uno florentes nomine cunctæ:
Quarum nil opus est omnes nunc dicere dotes.
Sufficiat tetigisse: quod ille, quod ista, quod hæcæ,
Jure suo, ob cives quosdam, caput efferat altè,
Non virtute minus, quam cognitione, valentes:
Quos inter fausto sanè sunt fidere nati:
Quorum nocturnas stupuerunt sidera curas,
Dum cæli rimantur iterque plagasque remotas.
Orbi Thorunium Te, magne Copernice, promisit:
Te, Crügere, dedit præstans mons-Regius Orbi:
Dantiscum patria est multum solertis Heveli.
Eja fer Astrofophum quoque nostra Elbinga, Poëtae,
Zamelio, similem, sublimi carmine claro.
Et sic omnigenâ mea cresce Borussia laude:
Quæ nunc pace viges, in longum pace fruaris!*

Johannes Mochingerus.



Desi.

Desine fata tui, Gedanum, lugere Krügeri,
 Artis & Ingenii qui mirá dexteritate
 Cælestes rimando domos, Astrúmꝫ recessus,
 Dum super astra suum vexit, totumꝫ per orbem
 Diffudit, nullo moriturum tempore, Nomen,
 Non minus ipse tuum peregrinis obtulit oris,
 Mansurum, quàm scripta diu mansura Krügeri.
 Desine præteriti, Gedanum, meminisse doloris,
 Officii cessans parit hunc tibi functio tantum,
 Laudis & ipsa viri poscit sibi Patria partem.
 Nunc letare magis; Tibi splendidiora parantur
 Nominis æterni monumenta; Quis antè polorum
 Devia tam vigili penetravit acumine visus,
 Et Lunæ maculas adeo cognovit, ut apto
 Nomine quamꝫ suo donare sit hæcenus ausus.
 Quam tuus Indigena hic? Quem morum blanda venustas
 Civibus ut speculum vitæ proponit honestæ;
 Cui Candor Probitasque locum, censente Senatu,
 Inter honoratos Themidis meruere dynastas;
 Et quem cælestis doctrina, Novusque videndi
 Cominus admiranda poli Tubus inter acutos
 Collocat Astrologos, excultoresꝫ Mathesis.
 Ipse sibi meritò gratatur Olympus, agitꝫ
 Jure tibi grates pro tanti munere Civis,
 Qui sua tecta diu mortalibus abdita mundo
 Nunc aperit, monstratque viam, quâ Gloria Cæli
 Terrigenis fiat magè cognita, Miraque dignis
 Facta Creatoris decorentur honoribus Almi.

G. Mañte vir ingenii felicitis dotibus! En his
 Assiduoque labore tibi modò contigit uni
 Tanta lucis opus nostro producere seculo,
 Præteritis quod non visum, palmamque futuris
 Præripit, ingenii prohibens huc tendere nervos.
 Cedite nunc Arabes, Chaldæi cedite vates
 Egypti, nebulas dispellit HEVELIUS omnes
 Luce novâ, ducens oculum ad penetrabilia Cæli.
 Æthera longa tibi decernant stamina vitæ,
 Addere quo captis valeas majora, Tibiꝫ
 Contemplando voluptatem geminare, perenne
 Nomen apud Gentes scribendo relinquere, donec
 Suprà non subter cælestia lumina Lumen
 Luminis Auctoris sine Vitro & sine videbis.

Michael Borck Secret.

Clarissimus

HEVELIUS Germaniæ EV-HELIUS.

UT queat erectos ad SIDERA tollere vultus,
Atque CREATORIS concelebrare Decus
Pulvis - Homo; Lumen mediis accendit in Umbris,
Luxque fit in Mundo εὐ-ἀλ... HEVELIUS.
Eja! age! perge vias SOLIS, LUNÆq; recessus,
HEVELI, doctâ detenebrare Manu.
HELIA Dædaios sic demirabitur ausus,
Et canet Ichnographum TerraSELENA suum.

ANNO, QUO

HEVELIVS natVS *GeDaneIs* PRIMVS In-orIs,
Arte & IchnographVS, IVre paraVIt opVS.

Congratulante

Abrahamo de Frankenberg.

In Selenographiam

admirandum admirandi ingenii opus,

Nobilissimi, Amplissimiq; VIRI

Dn. JOHANNIS HOEVELII, augustæ

Reip. Ged. Scabini prudentissimi.

JOHANNES HOEVELIUS,

anagramma,

En Sol, unio ævi es.

DUm Phæben Phæbi dignaris honore Sororem,
HEVELI, illius pingis & ingenium
Ingenio radiog; tuo: fert nuncia Fama
Divinæ in Pindi culmina mentis opus.
Concilio Aonidum & facto, quâ laude vebendus,
Atq; Autor quo sit dignus honore, rogat.
Protinus unanimi conclamant voce Sorores:
Est ævo dignus, dignus honore cædri est.
Hinc ad se accitum Te sic compellat Apollo:
Sol ævi, HOEVELI, ac unio es egregius.
Teq; tuumq; vebet monumentum Fama superstes
Orbis ad Eoas Hesperiasq; domos.
Dixit; & æternæ prolato codice Famae,
Vixit & inscripsit Te, tuum opusq; cædro.

Johannes - Georgius Mœresius,

Scholæ Petro-Paulinæ Ged. Rector.

IN.

INDEX CAPITUM, ATQUE SERIES totius operis.

PROLEGOMENA.

- C**aput I. De diversis vitris, quæ ad tubos opticos adhiberi solent; de notis bonæ vitiosæque lentis, nec non de verâ ratione parandi optimas, breviter expositâ. pag. 1
- Caput II. De varietate, differentiis, fabricâ, usuque Tuborum Opticorum, & quomodo boni à vitiosis sint discernendi. pag. 11.
- Caput III. De observationibus corporum Cœlestium in genere, tam ab Antiquis, quàm Recentioribus Astronomis habitis, præsertim de observationibus fixarum stellarum, adminiculo Telescopii, singulari usu & modo eas instituendi. pag. 31.
- Caput IV. De observationibus Planetarum, præcipuè Saturni, Jovis, Martis, Veneris, Mercurii & Stellarum Jovialium, cum propriis, tum alienis primariorum aliquot Astronomorum: ubi & breviter demonstratur, quinque illas novas stellas nuper à P. Antonio Mar. de Rheitâ animadversas, quas Urban-octavianas appellat, & circumjoviales esse contendit, revera non fuisse joviales, sed maximam partem novas, incognitas fixas. pag. 41.
- Caput V. De magno & admirando Lumine Solis, ejus Maculis ac Faculis, de naturâ earum, & quomodo illæ diverso, novo faciliq; modo queant observari; nec non de illis, quæ circa observationem istarum sint consideranda. pag. 76.

SELENOGRAPHIA.

- Caput VI. De Lunâ in genere, ejusdem Maculis, lumine, modo illuminandi, aliisque huc spectantibus scitu dignissimis rebus; tum quid veterum Philosophorum cohors de his rebus omnibus senserit, tum quid Astronomi ac Philo-Mathematici recentiores, ex certis infallibilibusque argumentis, inque naturâ fundatis, statuunt, brevis disertatio. pag. 109.
- Caput VII. De motu Lunæ, Parallaxibus, Refractionibus, distantia, magnitudine & diametro apparente. Quò verò hæc omnia eò evidentius explicari possint, simul de toto Mundano corpore, figurâ ejus, quantitate & motu, ut & diversis Astronomorum hypothesebus, quamvis breviter, perspicuè tamen, pro instituti ratione, discribitur. pag. 152.
- Caput

Caput VIII. De phasium Lunę observationibus: de Maculis in specie, & ularum nominibus: motu Lunę librationis Disci, ejusq; centri, hactenus incognito, & quam plurimis aliis scitu dignissimis.	pag. 204.
Caput IX. De Lunę primę ac novissimę Phasi, nec non aliis nonnullis, quę circa hanc observationem, notatu digna occurrunt.	pag. 273.
Caput X. De Lunę Corniculatę crescentis phasi.	pag. 281.
Caput XI. De Lunę Falcatę crescentis phasi.	pag. 284.
Caput XII. De Lunę Cornigenę crescentis phasi.	pag. 288.
Caput XIII. De Lunę Curvatę crescentis phasi.	pag. 304.
Caput XIV. De Lunę Lunatę crescentis phasi.	pag. 309.
Caput XV. De Lunę plusquam Lunatę phasi.	pag. 312.
Caput XVI. De Lunę Adolescentis phasi.	pag. 316.
Caput XVII. De Lunę Juvenis phasi.	pag. 319.
Caput XVIII. De Quadraturis in genere, ut & in specie de hisce tribus delineationibus Lunę Bifectę.	pag. 322.
Caput XIX. De Lunę plusquam Bifidę phasi.	pag. 342.
Caput XX. De Lunę Gibberosę crescentis phasi.	pag. 344.
Caput XXI. De Lunę in orbem insinuatę phasi.	pag. 346.
Caput XXII. De Lunę incurvatę crescentis phasi.	pag. 348.
Caput XXIII. De Lunę Gibberosę crescentis phasi.	pag. 351.
Caput XXIV. De Lunę adultę phasi.	pag. 355.
Caput XXV. De Lunę ad oppositionem vergentis phasi.	pag. 356.
Caput XXVI. De Pleniluniis, aliisq; rebus scitu dignissimis.	pag. 358.
Caput XXVII. De Lunę ab oppositione recentis phasi.	pag. 374.
Caput XXVIII. De Lunę decrefcentis phasi.	pag. 376.
Caput XXIX. De Lunę gibberosę decrefcentis phasi.	pag. 378.
Caput XXX. De Lunę incurvatę decrefcentis phasi.	pag. 380.
Caput XXXI. De Lunę in orbem insinuatę decrefcentis phasi.	p. 381.
Caput XXXII. De Lunę Gibbosę decrefcentis phasi.	pag. 383.
Caput XXXIII. De Lunę Gibbę decrefcentis phasi.	pag. 385.
Caput XXXIV. De Lunę ad Quadraturam properantis phasi.	p. 387.
Caput XXXV. De Quadraturis Ultimis.	pag. 388.
Caput XXXVI. De Lunę à Quadraturâ Recentis phasi.	pag. 395.
Caput XXXVII. De Lunę plusquam Lunatę phasi.	pag. 396.
Caput XXXVIII. De Lunę Lunatę decrefcentis phasi.	pag. 398.
Caput XXXIX. De Lunę cornutę decrefcentis phasi.	pag. 400.
Caput XL. De Lunę cornigenę decrefcentis phasi.	pag. 402.

Ca

- Caput XLI. De Lunæ Falcatae decreſcentis phaſi. pag. 403.
 Caput XLII. De Lunæ Corniculatae decreſcentis phaſi. pag. 405.
 Caput XLIII. De Ultimâ in conjunctionem propendente ph. p. 407.
 Caput XLIV. De Utilitate ex Figurâ primariâ Phaſium & Lunationum redundante; deq; obſervationis modo Sectionum diurnarum; & deniq; quomodo viâ haud vulgari, ex ejuſmodi continuatis Lunationû obſervationib. motus Librationis Diſci inveſtigari poſſit. p. 409.
 Caput XLV. De Lunatione Lunæ creſcentis I. pag. 415.
 Caput XLVI. De Lunatione Lunæ creſcentis II. pag. 417.
 Caput XLVII. De Lunatione Lunæ creſcentis III. pag. 420.
 Caput XLVIII. De Lunatione Lunæ decreſcentis I. pag. 422.
 Caput XLIX. De Lunatione Lunæ creſcentis IV. pag. 424.
 Caput L. De Lunatione Lunæ decreſcentis II. pag. 425.
 Caput LI. De Lunatione Lunæ creſcentis V. pag. 428.
 Caput LII. De Lunatione Lunæ creſcentis VI. pag. 429.
 Caput LIII. De Lunatione Lunæ creſcentis VII. pag. 430.
 Caput LIV. De Lunatione Lunæ creſcentis VIII. pag. 432.
 Caput LV. Ex phaſium nudo aſpectu, locum Lunæ circiter verum, diſtantiam Luminarium, Lunæque ætatem explorare: nec non adminiculo Figure phaſium primarię genuinam quantitatem, atq; proportionem diametrorum ſtellarum, novâ quâdam ratione inveſtigare. pag. 439.
 Caput LVI. Obſervationes Eclipſium Lunarium, atq; ſtellarum occultationes, correctè ut fieri quàm maximè poteſt, iſtituere; cùm verò in primis initia, fines, phaſesque reliquas, tum veram phaſium quantitatem, radiumque umbræ terrenæ nova methodo, viâque planè inſallibili determinare: nec non longitudines, hæctenus planè incomperato modo inveſtigare, Globumque Lunarem artificioſè conſtruere. pag. 451.

APPENDIX SELENOGRAPHIÆ.

- Animadverſiones ſuper I. Macularum Solarium periodo. pag. 500.
 Animadverſiones ſuper II. Macularum Solarium periodo. pag. 501.
 Animadverſiones ſuper III. Macularum Solarium periodo. pag. 502.
 Animadverſiones ſuper IV. Macularum Solarium periodo. pag. 502.
 Animadverſiones ſuper V. Macularum Solarium periodo. pag. 504.
 Animadverſiones ſuper VI. Macularum Solarium periodo. pag. 505.
 Animadverſiones ſuper VII. Macularum Solarium periodo. pag. 506.
 Ani-

Animadversiones super VIII. Macularum Solarium periodo. pag. 507.
 Animadversiones super IX. Macularum Solarium periodo. pag. 508.
 Animadversiones super X. Macularum Solarium periodo. pag. 509.
 Animadversiones super XI. Macularum Solarium periodo. pag. 510.
 Animadversiones super XII. Macularum Solarium periodo. pag. 511.
 Animadversiones super XIII. Macularum Solarium periodo. pag. 512.
 Animadversiones super XIV. Macularum Solarium periodo. pag. 513.
 Animadversiones super XV. Macularum Solarium periodo. pag. 513.
 Animadversiones super XVI. Macularum Solarium periodo. pag. 515.
 Animadversiones super XVII. Macularum Solarium periodo. pag. 515.
 Animadversiones super XVIII. Macularum Solarium periodo. p. 517.
 Animadversiones super XIX. Macularum Solarium periodo. pag. 518.
 Animadversiones super XX. Macularum Solarium periodo. pag. 519.
 Animadversiones super XXI. Macularum Solarium periodo. pag. 520.
 Animadversiones super XXII. Macularum Solarium periodo. pag. 521.
 Animadversiones super XXIII. Macularum Solarium periodo. pag. 522.
 Animadversiones super XXIV. Macularum Solarium periodo. p. 523.
 Animadversiones super XXV. Macularum Solarium periodo. pag. 523.
 Animadversiones super XXVI. Macularum Solarium periodo. p. 524.
 Observationes quædam Circulatorum Jovis, quæ eorundem, cum circumcurfitiones, tum mutationes, & ad se invicem, tum ad Jovem consideratorum, accuratè exhibent; institutæ Anno Salutis 1642. 1643. 1644. GEDANI.

INDEX ET ORDO FIGURARUM ubi singulæ sunt inferendæ.

E Ffigies Autoris ante præfationem
 ad Lectorem.

Figura A inter pag. 6 & 7.
 Figura B inter pag. 26 & 27.
 Figura C inter pag. 28 & 29.
 Figura D & E inter pag. 34 & 35.
 Figura F inter pag. 40 & 41.
 Figura G inter pag. 42 & 43.
 Figura H inter pag. 50 & 51.
 Figura I inter pag. 64 & 65.
 Figura K inter pag. 70 & 71.
 Figura L inter pag. 98 & 99.
 Figura L₁ inter pag. 102 & 103.
 Figura M inter pag. 106 & 107.

Figura N inter pag. 180 & 181.
 Figura O inter pag. 220 & 221.
 Figura P inter pag. 222 & 223.
 Figura Q inter pag. 226 & 227.
 Figura R inter pag. 262 & 263.
 Phafis 1. inter pag. 276 & 277.
 Phafis 2. inter pag. 282 & 283.
 Phafis 3. inter pag. 286 & 287.
 Phafis 4. inter pag. 298 & 299.
 Phafis 5. inter pag. 306 & 307.
 Phafis 6. inter pag. 310. & 311.
 Phafis 7. inter pag. 314. & 315.
 Phafis 8. inter pag. 316. & 317.
 Phafis 9. inter pag. 320. & 321.

Pha-

Phafis 10 inter pag. 322 & 323.
 Phafis 11 inter pag. 336 & 337.
 Phafis 12 inter pag. 340 & 341.
 Phafis 13 inter pag. 342 & 343.
 Phafis 14 inter pag. 344 & 345.
 Phafis 15 inter pag. 346 & 347.
 Phafis 16 inter pag. 348 & 349.
 Phafis 17 inter pag. 352 & 353.
 Phafis 18 inter pag. 354 & 355.
 Phafis 19 inter pag. 356 & 357.
 Phafis 20 inter pag. 358 & 359.
 Figura S inter pag. 360 & 361.
 Phafis 21 inter pag. 364 & 365.
 Phafis 22 inter pag. 374 & 375.
 Phafis 23 inter pag. 376 & 377.
 Phafis 24 inter pag. 378 & 379.
 Phafis 25 inter pag. 380 & 381.
 Phafis 26 inter pag. 382 & 383.
 Phafis 27 inter pag. 384 & 385.
 Phafis 28 & 29 inter pag. 386 & 387.
 Phafis 30 inter pag. 388 & 389.
 Phafis 31 inter pag. 390 & 391.
 Phafis 32 inter pag. 392 & 393.
 Phafis 33 inter pag. 394 & 395.
 Phafis 34 inter pag. 396 & 397.
 Phafis 35 inter pag. 398 & 399.
 Phafis 36 inter pag. 400 & 401.
 Phafis 37 inter pag. 402 & 403.
 Phafis 38 inter pag. 404 & 405.
 Phafis 39 inter pag. 406 & 407.
 Phafis 40 inter pag. 408 & 409.
 Figura T & Tt inter pag. 410 & 411.

Figura V & W inter pag. 416 & 417.
 Figura X & Y inter pag. 420 & 421.
 Figura Z & AA inter pag. 424 & 425.
 Figura BB & CC inter pag. 428 & 429.
 Figura DD & EE inter pag. 432 & 433.
 Figura FF inter pag. 462 & 463.
 Figura FFF, inter pag. 466 & 467.
 Figura GG inter pag. 472 & 473.
 Figura GGg, inter pag. 476 & 477.
 Figura HH & Hl. inter pag. 500 & 501.
 Figura KK & LL inter pag. 502 & 503.
 Figura MM & NN inter pag. 504 & 505.
 Figura OO & PP inter pag. 506 & 507.
 Figura Q Q & RR inter pag. 508 & 509.
 Figura SS & TT inter pag. 510 & 511.
 Figura VV & WW inter pag. 512 & 513.
 Figura XX & YY inter pag. 514 & 515.
 Figura ZZ & AAA inter pag. 516 & 517.
 Figura BBB & CCC inter pag. 518 & 519.
 Figura DDD & EEE inter pag. 520 & 521.
 Figura FFF & GGG inter pag. 522 & 523.
 Figura HHH & III inter pag. 524 & 525.
 Figura KKK inter pag. 526 & 527.
 Figura LLL inter pag. 530 & 531.
 Figura MMM inter pag. 534 & 535.
 Figura NNN inter pag. 536 & 537.
 Figura OOO inter pag. 538 & 539.
 Figura PPP inter pag. 542 & 543.
 Figura QQQ inter pag. 546 & 547.
 Figura T* } circa finem rerum Indicis affi-
 Figura Tt** } gendæ.

Ad Bibliopegum.

ECce tibi, tum quo ordine, tum quo loco, omnes & fingulæ figuræ, tabulis æreis expressæ, inferi debeant; id quod ut studiose observes, admonemus: inprimis verò, ut duæ illæ ultimæ figuræ T* scilicet & figura Tt**, circa finem nostri operis, leviter tantum agglutinentur, ne non Uraniæ cultoribus, quando ita visum fuerit, nullo negotio, illas iterum eximere, & ad observationes cœlestes, omni tempore, adhibere liceat. Vale.

PRO.

SELENOGRAPHIÆ

CAPUT I.

DE diversis vitris, quæ ad tubos opticos adhiberi solent; de notis bonæ vitiosæq; lentis, nec non de verâ ratione parandi optimas, breviter expositâ.



SI aliquo unquam tempore, Scientiæ & Facultates excultæ fuere, atq; de die in diem creverunt; id omninò de præfenti affirmare licet, in quo non solum variæ disciplinæ, sed & artes mechanicæ solidis incrementis auctæ, & novis accessionibus, præclarissimisque, inventionibus, quæ non tantùm magnam admirationem ac voluptatem in animis hominum sciendi cupidorum excitant, verùm etiam insignem adferunt utilitatem, ab ingeniosissimis solertissimisque viris, sunt locupletatæ.

*Nostrâ atate
disciplina &
Artes mechanica
maximè creverunt.*

Namq; ne rem altiùs repetam, de vili solum & abjectâ illâ materiâ, quæ ex arenâ atq; ex cineribus conflatur, in præfens loquar. Quotusquisq; quidem ex rudi & imperitâ plebe, qui artificium hoc nunquam antehac conspexit, adduci poterit, ut credat, ex arenâ vel lapillis arenosis & cineribus, terrâve saliformi, adeò subtilem, puram, compactam, duram, durabilemque & nihilominus claram ac pellucidam confieri materiam, quam vitrum vocitare solemus, quamq; in tantâ copiâ prostare scimus, ut magna frustra exiguo pretio comparari queant.

Equidem sic planè statuo, si hâc nostrâ tempestate tam copiosum non reperiretur, neq; tam facili artificio, à plebeis hominibus, pararetur, sed, ob defectû ejus, ex remotissimis terris peteretur, multò carius fore, & plurimis aliis pretiosis rebus iri prælatum vitrum; non tam eâ de causâ, quòd idem ad necessarias utilesq; res domesticas, nimirum ad specula, pocula,

A

cucurbi-

*Vitrum ad in-
quærendas res
varias in na-
turâ abstru-
sas perquam
utile.*

cucurbitas destillatorias, fenestras & consimiles res expetatur, sed quod imprimis ad inquirendas abstrusas res Mathematicas, per quas indefessi naturæ indagatores in cognitionem causarum naturalium à sensibus nostris remotiorum ducuntur, deserviat.

*Alhasen &
Vitellio non
postremi, qui
doctrinam de
refractionibus
demonstrarunt.*

Multum verò imprimis debemus peritissimis perspicacissimisque Mathematicis & Opticis, ex eorum numero nominatim Arabi Alhasen & Vitellioni, quorum ille lib. septimo hic libro decimo præclaram illam de refractionibus doctrinam literis tradidère, & ad posteritatem transmissere, non sufficienter minus, quàm luculentè ostendentes, quòd radii, vel in rarius, vel in densius objectum diaphanum projecti, sive à perpendiculo, sive ad perpendiculum refringantur; cujusmodi refractione angulus visionis vel contrahitur vel dilatatur, speciesque visibiles, vel remotiores vel propinquiores, vel etiam minores majoresque conspiciuntur, sicuti detoto hoc negotio à nobis quoque pluribus postea dicitur.

*Lentes con-
vexa & Con-
cava ex do-
ctrinâ de re-
fractionibus
suam duxerunt
originem.*

Quæ quidem doctrina primâ fronte id non præ se ferre videtur, quod postmodum in recessu præstat. Ut faciliè concedam ante nuncupatos antiquos eximios Opticos non prævidisse, quòd ex demonstratione istâ tantum utilitatis sit manaturum, quantum infallibilis experientia postea comprobavit, postquam progressu temporis, à sagacioribus ingeniis multis ictibus hæc quercus fuit concussa & jugi mentis in eam rem intentæ instinctu, diversoque facto periculo, per certum circuli segmentum, vitra vel concava vel convexa affabrè sunt elaborata, quæ nobili mirabilique membro humani corporis, oculo scilicet, multis modis usui sunt, cujus non tantum roborant & conservant vigorem, sed & aciem adeò perficiunt, ut adminiculo talium vitrorum, ea fiant conspicua, quæ antea nudo, nec armato, visu apprehendi non potuerunt.

*Lentes multi-
tis modis ocu-
lu inferviunt.*

*Oculum mem-
brum princi-
pale corporis.*

Est igitur istud admodum sanè præclarum & ingeniosum inventum; usum & actiones oculorum humanorum, quos inter maximè principalia corporis nostri membra meritissimò numeraveris, admirabiliter promovent & amplificant. Oculis ad considerationem admirandorum DEI operum utimur:

mur : ijque nostrarum quoque actionum penè omnium sunt duces : in quorum laudem hæc Chrystostomus homiliâ 55. in Iohannem rectissime protulit : *Quod Sol Mundo, hoc oculus corpori: extincto Sole omnia perduntur & perturbantur; ita amissis oculis pedes inutiles sunt & manus. Quare, ut in regio quodam loco, altiori corporis parte, sedem sortitus est, & cæteris præfertur sensibus. Oculus lucerna omnium membrorum, ornat totum Corpus.*

Itaque aliter etiam esse non potest, quàm (quod modò dicebamus) vitrorum ad dioptras fabricandas aptorum insignem esse operam, quæ oculis tantoperè conferunt, citra controversiam præstantissimis nostri corporis partibus. Ex quo factum, ut multis ex viris eruditis exemplo & opere sellulariis conspiciolorum opificibus præire non piguerit.

Elaborate lentes insigni est opera.

Forma verò lentium est varia : Primum enim quædam lentes sunt æquabiliter planæ & tersæ. 2. Deinde aliæ sunt altero latere planæ, altero vel convexæ vel concavæ. 3. Adhæc, nonnullæ sunt utrinque convexæ & concavæ. 4. In super, quædam sunt mixtæ, uno latere concavæ, altero convexæ. Atque hæc rursus in triplici sunt differentiâ; nimirum vel sunt Sphæricæ, vel Ellipticæ, vel Hyperbolicæ. 5. Præterea hæ lentes possunt etiam uno latere ex alio segmento, altero iterum ex alio, tam quoad convexam, quàm concavam formam, præparari : proportionibus autem segmentorum, secundum quas jam dictæ lentes formari queunt, non tantum sunt innumerabiles, sed etiam ferè infinitæ; sicut quilibet, qui ex Geometria varietatem segmentorum circuli didicit, faciliè intelligit.

Variæ lenti- um forma.

Quod Conicas, Ellipticas & Hyperbolicas attinet lentes, de illis hoc tantum in genere & breviter monebo. Quamvis ejusmodi lentes in Opticâ exquisitè sint demonstratæ: tamen, quia nondum, quantum ego scio, in conspectum & usum venerunt, ideò, hiscæ præteritis, sphæricarum duntaxat lentium mentionem faciam, & illarum usum & præparandi modum ostendam.

Lentium differentiâ.

Conicæ lentes sufficienter quædam demonstratæ, sed nondum perfectè elaboratæ.

Primum lentium genus, quod utrinque æquabiliter planum est, iuvenibus, qui bonitate visus adhuc præditi sunt, illamque conservare & corroborare volunt, conspiciolorum potest unice præbere. Reliquæ lentes, tam concavæ, quam convexæ,

Variarum lentium usu.

non tantum senioribus acie oculorum destitutis & lusciosis inferviunt ad paranda inde conspilla; verum etiam idoneæ sunt, ad distincta tuborum Opticorum genera, ad specilla comburentia, visum intendentia, ad vitra, quæ foramini obscuratæ cameræ adhibentur, ut objecta foris aspectabilia, intus in tabulâ albâ clarè & perspicuè representent, non tantum inverso ordine, ut communiter fieri solet, sed & rursus erecto, per easdem lentes; & ad complures alios usus, de quibus postea dicendi erit locus.

Magna differentia lentium convexarum.

Inprimis autem convexarum lentium non exiguum occurrit discrimen: primum namque quò minus sunt convexæ & quò majora obtinent segmenta, ex quibus elaborantur, eò minus angulum visionis ampliant, si perspicilia ex illis parari debeant, & ita oculariis specillis ætati minorum, quibus nondum hebes visus est, sunt accommodatæ. Quò magis autem sunt convexa specilla, quoque majori gaudent segmento elaborato, eò magis visum acuunt, & senioribus imbecillitate videndi laborantibus potissimum convenient,

Convexa, in telescopiis & cameris obscuris, longè alium forisuntur effectum.

Verumenimverò longè alia ratio est illarum lentium, quæ ad telescopia adhibentur: quò enim lentes convexæ magis angulum visionis dilatare & species visibiles ampliare debent, eò minus elevatæ & ex majori segmento sint fabricatæ, necesse est. Præterea sciendum, quò specilla plano-convexa duplo majus angulum visionis ampliant, quàm utrinque convexæ, quodque duplo longiorem tubum præbeant. Eadem quoque est ratio lentium convexarum, quæ in conclavibus obscuratis ad præsentandas foris objectas species adhibentur; siquidem, quò depressior est convexitas, eò majores reddunt figuras, & in majori exhibent distantiam: contra, quò convexitas est eminentior, eò minores efficiunt imagines & in minori distantiam exhibent. Similiter, quod vitra incendientia & comburentia spectat, quæ communiter utrinque convexa parantur, quò minus adsurgunt, eò longiori intervallo res objectas urunt, eoque magis literas è longinquo ampliant: è contrario verò, quò magis adsurgunt, eò propius comburunt, eoque propius specillum literis inspiciendis admovendum est. Namque, quod res hoc pacto,

Vitrorum comburentium differentia.

nec

nec aliter, sese habeat, quilibet hanc rem indagandi studiosus fidis experimentis ipse cognoscet.

Animadvertendum etiam hîc est, quòd specillum planoconvexum, & ex segmento sphaerico, cujus diameter duodecim pedes æquat, elaboratum debitoque modo lavigatum, objecta foris aspectabilia in camerâ obscuratâ ad distantiam 12. circiter pedum à foramine distinctè clareque præsentet, modò foramen non sit nimis amplum, neq; angustum nimis. Quippe, si foramen est justo majus, tunc imagines incidunt nimis obtusæ, propter lumen valdè circumfusum: sin verò foramen est justo minus, tunc idola in chartiferâ tabulâ, vel linteo probè dealbato, minusq; pervio, obscurius repræsentantur. Et hæc omnia distinctius majorique perspicuitate oculis objiciuntur, si loco tabulæ chartaceæ, in quâ figuræ exhibentur, speculum concavum, vel sphaericum, vel parabolicum usurpaveris; vel, in defectu hujus, vitrum magnum utrinq; alterove latere convexum, alteroque planum, à convexo latere, folio obductum, ne species penetrare possint. Etenim hujusmodi vitrum, si rectè fuerit præparatum, idem ferè præstabit, quod speculum concavum sphaericum. Quod si enim tali vitro species visibiles excipiuntur, tunc deprehendes, eodem modo & inverso ordine eas præsentari, quo sit in tabulâ, vel linteo, vel pariete; non minùs, quomodo foramen fenestræ in hoc speculo reflectitur, tunc id tam diu citra ultraque movendum erit, usquequò per foramen speculi & fenestræ apparuerint figuræ foris exhibitæ: id quod ad votum fiet, si angulus incidentiæ angulo reflexionis responderit. Hac ratione species visibiles foris incidentes non solum erectâ facie & figurâ se se sistunt; sed insuper etiam adeò perspicuæ distinctæque apparebunt, ac si optimo telioscopio è camerâ prospexisses & objecta intuitus fuisses, quod magnâ cum voluptate fiet, visuq; mirabile erit. Sic & ope hujus speculi imagines in pariete cameræ possunt exhiberi, quacunq; in parte placuerit. Deficiente verò ejusmodi speculo, figuræ quoque erectæ per vitrum comburens utrinque convexum in tabulam incident, si id ab oculis remotum versus tabulam extendatur: vel, si per geminum incendens specillum & sibi mu-

Admirabile certi speculi species foris visibiles in camerâ obscurâ distinctè depinguntur.

Ratio adhuc clarius distinctiusq; repræsentandi speciei.

Species visibiles inversæ, erectas sistere variè modò.

tuo conforme, in debitâ distantia ordinatum, species visibiles excipiantur : non minùs quoq; objecta aspectabilia sistuntur erecta, per duo vitra convexa ex parvo segmento tornata, qualia senioribus competunt & parvo tubo applicantur : si enim hæc vitra tubo includuntur, & inter se convenienter aptantur, prout proportio eorum requirit: tunc & species visibiles in tabulâ erectâ conspiciuntur.

Optimum modum representandi & erigendi objecta, per vitrum nimirum hyperbolicum.


Veruntamen, hisce jam dictis modis representandi figuras in formâ erectâ facile carere possemus; si vitrum ex hyperbolico segmento parare liceret: quandoquidem illud foramini admotum omnia objecta aspectabilia in genuinâ & erectâ positionis differentiâ longè clariùs & distinctiùs, quàm spherales lentes, exhiberet; sicut hoc Doctissimi Optici Renuus de Cartes, Marius Bettinus in Apiario Mathematico, aliisque satis abundè demonstrarunt.

Convexarum & concavarum lentium fabrica.

Cæterum, quod fabricam convexarum lentium attinet, solent illa in cuprèâ lance, ex certo aliquo spherico segmento, quàm diligentissimè elaborari & perpoliri : at concavæ lentes non minori diligentia & industria in globo exactè tornato, sive is constet ex ferro, sive ære, sive orichalco, parantur, sicut illi sciunt, qui non nihil manus huic operi admoverunt.

Quod si rudes & imperiti componendi hujusmodi vitra pleniorè aliquam informationem desiderant, illi Hieronymum Syrturum, qui hac de re & omni necessario apparatu huc spectante plenè scripsit, consulant. Ratio verò tractandi vitra in memoratâ lance ac globo distinctis modis suscipi potest. Communis ratio, quam Syrturus & reliqui ferè ad unum omnes Artifices adhibent, sit liberâ manu. Alia quoque ratio parandi hæc specilla in scamno & machinamento tornatili inquitur, in quo lentes concavæ tantùm tornantur & poliuntur. Vitrum verò convexa specilla quoque in scamno tornatili sint elaborata, nec ne, me latet. Quamobrem in gratiam amatorum hujus artificii non contemnendam, ut judico inventionem peculiaris scamni tornatilis, in quo non solum alia multa, ut communiter fieri solet, tornari, sed imprimis ejusmodi specilla tam convexa, quàm cava, aliisque vitra, viâ planè compendiariâ & artifi-

Descriptio singularium machinamenti tornatili ad fabricam lentium.



artificiose, elaborari & expoliri possunt. Motus in hoc scamno est perpetuo continuus directus & circularis in orbem actus, nec unquam retroagitur, ut in aliis plerumque fit, ut ut tantum pedibus calcetur & regatur. Præterea, huic tornatili scamno, non una duntaxat lanx & lamina, vel unus globulus, sed quotquot lubet, sine magno opere & labore, queunt applicari; sicut modus in sequente diagrammate & ejus descriptione satis abundè exprimitur.

Delineatum scamnum quinque pedes vel circiter æquet longitudine: retinacula verò scamni a x, ut & b oportet esse satis robusta, ut scamnum A eò melius firmari possit: in scamno postea oblongum foramen B excavetur ut lignum b, & genu e, quod matrix i ambit, moveri & cuneari possit: fusus in matrice i in orbem agitur, cui discus f firmiter adhæret, ferreis quatuor clavis munitus, cujus beneficio omnes lances & globuli, disco imponi & immobiles statui possunt. Lances autem, quas hic s notat, necesse est ut prius peculiaribus ligneis discis imponantur, in quibus infernè quatuor foramina, admodum quatuor clavorum, terebrata conspiciuntur, ut iis patellæ commodè imponi & rursus adimi possint: similiter quoque mediam partem globulorum excavatum lignum figuræ quadratæ ambit r, quod itidem in infernà parte quatuor foraminibus pervium est. Hic fusus, unà cum disco, eique impositâ lance, vel globulo, trahitur à fune ductario, qui primùm superiori fusti tereti & oblongo arcè illigatus, postea per fuculam g, in scamno A munitam & per fuculam h retinaculo a affixam, & inferiùs quoque ad limen L alligatam trajicitur. Hoc instrumento & machinamento, pede moto, fusus in matrice obvolvitur sursum tendens, sicut ex figurâ apparet. Ne verò discus retroagatur; requiritur, ut cuticula vel cingulum fusum circundet, ex duabus distinctis partibus coagmentatum, quod o & p repræsentant. Prior particula cinguli o ita sit comparata, ut fuso queat aptari, cui chalybeus calamus q sit affixus: deinde posterior portio p cingulo o convenienter etiam applicanda est, quæ ferreo & dentato orbiculo firmetur: ope hujus cinguli & orbiculi, ut & calami (si hæ partes aptè cohæreant & clavo connectantur) re-

trocessus

processus impeditur, quando hæc pars retroagitur. Et, sic semper hoc machinamentum motu directo gyratur, adeoque fit versatile, ut non animadverti possit, num motus impediatur, vel retrocedat. Vtrumque lignum d & e, quod a & b ingreditur, laxo modo inhærent, ut vel profundius intrudi, vel versus initium magis promoveri possint: asser autem F hisce lignis cum in finem imponitur, ut brachium in eo requiescat, & ei tenaciter cohærentia specilla firmiter retineantur, ut ita in patellâ motu contrario rotari possint: hic asser ligneis clavis affigi potest supra dictis partibus c & d, quæ rursus extrinsecus retinaculis a & b ligneis trochleis arcuè cohæreant, ne aliquid vacillet, vel paululum moveatur. Insuper hæc duo minora machinamenti tornatilis retinacula n & m, duobus ligneis clavis sunt perforata, quibus scamnum apponi potest, si fortè ei insidere lubet. Et hæc breviter de adornando hoc machinamento tornatili dicta sunt, quod autem non satis sufficienter hic explicatum videtur, id ex adjuncto diagrammate plenius intelligi datur.

Lentes globulis necesse ut sint exacta rotunditatis figura.

Quod autem ipsum artificium expoliendi vitra attinet, ante omnia dispiciendum est, num primùm lances, laminæ, globulique ad exactam rotunditatis figuram accedant, & exquisito consentent spheræ segmento: aliàs enim, si ab hæc præcisâ perfectionis ratione aberrant, nec integram rotunditatem assequuntur, vitra inæqualem superficiem fortiuntur, collisione periclitantur & micando inæqualiter nullius sunt usus. Sin verò Lances exactæ sunt rotunditatis, tunc expoliendi labor eò facilius succedit, præsertim, cum lentes sunt alicujus magnitudinis.

Nec dissimili ratione vitra perpoliri posse censeo, si laminæ tela obducantur, & caveatur, ne vitra inter velocissimam agitationem radantur.

Machinamentum supra descriptum aliis etiam rebus deservit.

Insuper hoc machinamentum tornatile, aliis quoque rebus, (verbi gratiâ, lignis, ebori, orichalco, &c.) in rotundam vel angulosam figuram convertendis applicari potest, si retinaculo scamni b, singularis matrix accommodetur, & è regione a clavis acutus. Quod si etiam expetis, ut tornus communi modo torqueatur, tunc, sine cingulo, accipe fusum, vel, si in orbem
semper

femper agendus sit, tunc rursus utere antè memorato cingulo & Zonâ, cum calamo & orbiculo : quo pacto etiam commodius angulosæ figuræ formari poterunt.

Quod porrò modum explorandæ bonitatis lentium, quæ ad tubos adhibentur, concernit, tria hîc respicienda sunt. Nam primùm ipsa lens consideranda, quomodò excavata, elaborata & expolita sit : careat enim oportet vesiculis, arenulis, vertigine. Ejusmodi quidem vitra nusquam meliùs, quæ huicrei deferviunt, quàm Venetiis parantur. 2. Nec oportet esse vitrum nigricans, fuscum, flavum, neque viride, sed admodùm nitidum, album & alieni coloris expers; attamen, quod vitrum leviter cæruleum est, valdè se commendat ad concinnanda inde dioptrica specilla, & sæpè meliùs, quàm quæ nimis alba sunt : nec non semper magis telioscopiis parâdis idoneum est, quàm Crystallus montana naturalis. Nam etiamsi sit valdè perspicua & fulgida; tamen majorem efficit refractionem, quàm reliqua vitra : id quod inexpertus forsan vix credit. 3. Numquid verò specillum concinnè expolitum & elaboratum sit, ægrivus quidem ab inexercitatis, qui hoc artificium non attigerunt, dignosci potest : nihilominus tamen, ut quilibet bonitatem specillorũ à vitiis internoscere queat, aliquot notas apponam, ad quas eorum bonitas exigi poterit.

Quantam lenti ad telioscopia sine eligenda.

Crystallus montana majori refractioni obnoxia, quam vitrũ, præsertim Venetiis constitutum, & idcirco minus etiam idonea ad telioscopia paranda.

I. Bona sunt specilla, cum rectè apparent excavata, hoc est, cum in convexis & concavis lentibus nulla parva foramina, cavernulæ vel leves rasuræ deprehendantur, quæ iis arenâ, quâ excavantur, imprimi queunt, sed cum undiq̃ue elaborata conspiciuntur.

Quomodo bona & perfecta specilla scilicet nuntent à vitiis sine discernenda.

II. Bonitatis quoque indicium est, quando convexum specillum undiq̃ue in margine æq; crassum. Si enim in ambitu est dissimilis crassitie, argumento est, centra ab utroque latere non sibi respondere, quam ob causam ejusmodi specillum in tubo nullius est momenti, nec in dioptriciis aliquid præstare potest.

III. Inspice, tuo specillo adhibito, corpus aliquod rotundatum, vel quadratum, vel alterius figuræ, & animadverte diligenter, utrum perfectam suam figuram retineat, nec ne? Et

enim, si hoc objectum in formâ oblongâ, vel aliâ diversâ figurâ, cernitur, non satis rotundatum est vitrum, nec excavatum ac elaboratum.

IV. Videndum etiam est, nunquid specillum inæqualiter micet, vel rectè sese habeat? Hoc fit, quando objecta in rectâ lineâ posita & specillum incurrentia seu erecta corpora in specillis minimè curva, obliqua, elevataque apparent: id quod deprehendere licet, si specillum fenestris obvertatur, & fenestræ in illis cum lamellis plumbeis resplendentes in rectâ lineâ & genuinâ positione visui objiciantur, neque versus peripheriam specilli incurvatæ vel arcuatæ se sistant. Quòd si enim exactè omnes fenestræ partes in rectâ positurâ exhibentur, indicio est, specillum rectè esse excavatum, & ex legitimâ sectione elaboratum, tam in medio, quàm in ambitu.

*Quâ ratione
varia lentium
figura cognoscatur.*

Hoc etiam modo cognoscere potes, quali segmento specillum convexum constet, majorine vel minori. Nam, quod majus sphaeræ segmentum capit, in eo fenestellæ speculariæ grandiores apparent, quàm in alio, quod minus capit. Et quò magis exiguæ fenestellæ in specillo conspiciuntur, eò minorem possit sibi tubum. Idem quoque de cavis specillis esto judicium: quò enim Rhombi specularii minores in iis apparent, eò profundiores sunt, eoque minori sphaerico segmento constant.

*Nota perfecta
expolitionis.*

Tertiò, ratione expolitionis in specillis insuper attendendum est; 1. Num etiam omnes leves rasuræ sint perpoliando remotæ? 2. An specillum adhuc quasdam nebulas veluti nubeculas, ostendet, quæ faciunt, ut lentes quasi cuticulâ obductæ apparent? In quibus namque illæ cernuntur, nondum sufficienter expolita sunt. Neque etiam hic non notandum, quòd specillum supra modum possit expoliri; cujus rei fit ex eo significatio, quando specillum inæqualiter micat, eò quòd non rectè sit expoliturum, legitimaque sectio figuræ mutata & vel specillo nimium, in medio vel margine, poliando ademptum. Hoc facile accidere potest, si tela laminæ, in quâ expolitio facta, segmento vitri non exactè congruit. Illud vitium qui vult declinare, necesse est, ut cuilibet segmento sphaerico peculiare suas telas & poliendi instrumenta applicet. Plura quidem adhuc de modo expolien-

Cuilibet lamina vel vitri segmento peculiare telam quod politura inferri applicandum.

expoliendi vitra, tum de reliquis, quorum breviter in hoc capite mentio facta est, in medium proferre potuissim, si id instituti mei ratio permisisset: quia verò in hisce Selenographiæ prolegomenis de talibus ex professo agere non constitui, ideoque pauca hæc dicta sufficiant.

CAPUT II.

DE VARIETATE, DIFFERENTIIS, FABRICÂ, usuque Tuborum Opticorum, & quomodo boni à vitiosis sint discernendi.



Vod recens inventi tubi optici, (sanè ingeniosi & nunquam pro dignitate satis laudandi inventi,) beneficio, corpuscula quælibet parva & oculorum sensui vix obvia, imò tam propinqua, quàm remota objecta, tam junioribus, quàm senioribus (nisi planè depravato & obcæcato visu laborant) magna, perspicua, distincta, appareant & represententur, id non ampliùs in hominum ignoratione versatur. Quæ verò causa sit, cur oculus uno tubo plus armari queat quàm altero, ad clariùs visu apprehendendum res objectas, illam, hoc in capite, pluribus persequar.

*Tubi optici
omni sano o-
culo servant*

*Unus tubus
altero obje-
ctum clariùs
oculo detegit*

Primum autem sciendum est, Tuborum ex sphericâ sectione paratorum quadruplicem esse in primis differentiam, quatuorque genera.

1. Primum genus dicitur Telioscopium vel Telescopium.
2. Secundum vocatur Helioscopium.
3. Tertium Microscopium.
4. Quartum Polemoscopium.

*Quatuor Tu-
borum gene-
ra.*

Quod igitur primum dioptræ genus, Telescopium appellatum, attinet, eo ipso Tubus hujusmodi opticus intelligitur, qui oculis non tantùm ad accuratam corporum terrestrium vulgariter à plerisque, verùm etiam cœlestium inspectionem, siderumque observationes applicatur. Hoc tubi genus sicuti certâ quadruplici viâ paratur, ex quo postmodùm innumeri ferè alii existunt, ita proposui hoc genus prius ordine & sigillatim,

*De fabricâ
Telescopii.*

antequam reliquorum trium à me fiat mentio, describere.

Primum igitur ejusmodi Telescopium communiter ex gemino vitro, convexo & concavo, construitur. Concavum oculo proximè admovetur: convexum autem rei visibili, ut notum est, obvertitur. Magna verò differentia inter utrumque vitrum, tam absolute, quàm erga se invicem, consideratum, quoad effectus intendendæ aciei visus, & ampliandæ magnitudinis, rerum visibilium, deprehenditur; quâ de re postea sequetur.

Possunt autem hujusmodi Telescopia, secundum diversitatem longitudinis, aliter atque aliter elaborari.

Fabricatele-
scopiorum u-
nini pedu.

1. Quæ namque Telescopia ad usum è tubulis educta, unum æquant pedem, horum vitrum unum ex spherico segmento utrinque convexo, cujus diameter quatuor pedibus Gedanensibus longa sit, alterum ex utrinque concavo in globo expolitum, cujus diameter quatuor digitos & semis æquet, constare debet. Hic pes Gedanensis ad pedem Rhyndanicum fortificatorium in minimis particulis expressus, talem habet rationem, qualem 914. ad 1000; & ad Parisiensem autem Regium qualem 914. ad 1055.

Ratio men-
sura pedu
Gedanens.
Rhyndanici
fortificatori
& Parisiensis
Regii.

Structura
Tubi unini
ulnae.

2. Sin autem Tubi longitudo ulnam exæquare debet, tunc vitrum convexum utrinque ex uno segmento, cujus diameter sit quinque pedum circiter, paretur; globulus autem concavo accommodatus non superet 5; digitos, necesse est.

Compositio
Tubi 3 pedu.

3. Quòd si convexum utroque in latere ex aliquo segmento, cujus diameter octo pedum, est paratum, & prius concavum retinetur, tunc Tubum opticum 3; pedibus longum suppeditat.

Tubi duarū
ulnarum &
ampinū.

4. Insuper, si istiusmodi concavo utrinque convexum, cujus segmentum diametro decem pedum constat, aptaveris, Telescopium ultra duas ulnas longum obtinebis.

Tubi quinque
pedum.

5. Adhæc, vitrum utrinque convexum & in paropside, cujus diameter duodecim pedes adæquat, expolitum, egregium Tubum opticum quinque pedibus & amplius longum præbet.

Quò longior
tubus, eò ma-
jus segmen-
tum convexi.

Ex quibus facillè intelligitur, tubum, quò longior & productior, eò majus & obtusius segmentum vitri exigere.

Nota-

Notatu quoque dignum est, quòd vitrum convexum uno in latere planum, duplo longiorem Tubum efficiat, quàm si vitrum utrinque convexum fuerit, quodq; ejusmodi dioptra imagines objectorum longè majores & distinctiores repræsentet, angulumque visionis ampliet.

Contrarium autem in vitris concavis accidit: quæ namque uno in latere sunt polita cavaq; , minores requirunt tubos opticos; majores autem, quæ utrinque sunt excavata.

Eodem modo vitra in minori spherâ elaborata, longiores sibi vendicant Tubos, in majori, breviores; & semper quidem tantò longiores, quantò minor spherâ existit.

Quin & alia regula convexis ac concavis vitris communis, hîc notanda est: si vitro utrinque, vel in uno latere convexo, applicetur concavum uno in latere, tunc quidem corpora aspectabilia clariora apparent, quàm si utrinq; concavum adhibeatur; sed contrà non in tantà magnitudine, quàm per vitrum utrinque concavum cernuntur.

Rursus utrinque concavum in minori spherâ paratum, majora reddit objecta, quàm quod in majori spherâ politum, & quidem secundum proportionem globorum. Hinc fit, quòd concava in minori spherâ & convexa in paropside minùs elevata, expolita, longiora instrumenta optica suppeditent & objecta viciniora majoraque reddant & exhibeant.

Hic autem animadvertendum, quòd lente cavâ acutiori, hoc est, minoris spheræ, uteris, eò obscurius objecta visibilia apparere: idcirco viâ mediâ hîc ingrediendum, & media quædam proportio harum lentium eligenda, quam usus & quotidiana experientia unumquemq; edocebit.

Vt autem proportionem utriusque lentis ad adornandum bonum & satis longum Tubum opticum adsequaris, scito, hîc primùm opus esse vitro utrinq; concavo, & in spherâ 5¹ digitorum elaborato; ut & vitro utrinq; convexo & ex segmento, cujus diameter duodecim pedes æquat, (ut supra quoque dictum) parato: ita enim egregiù tibi comparabis tubum quinq; , vel quinque & semis pedibus longum, & siderum observationibus perquam idoneum, id quod tamen eâ conditione dictum

Vitrum uno in latere tantum convexum imagines rerum duplo ampliores utrinq; convexo reddit.

Vitro uno in latere cava, minores, in utroq; majores expescunt tubos.

Vitra in minori spherâ elaborata, majores in majori, minores tubos requirunt.

Regula convexi & concavi vitri communis.

Proprietas utrinq; concavorum tam in minori, quàm majori spherâ elaboratorum.

Vitro nimis cavata imagines rerum obscuriores depingunt.

Fabrica egregii ejusdem Tubi optici.

*Tubus Opti-
cus undecim,
vel circiter,
pedum.*

accipias, ut specilla sint bona, non colorata, rectè polita & lævigata: quandoquidem objecta satis magna, clara & distincta præsentabit. Quod si meliorem adhuc expetis Tubum, ad dilatandum eò magis visionis angulum, convexum ad jam dictam proportionem uno in latere sit planum, alterum autem specillum maneat utrinque concavum: ita comparabis tibi satis longum & egregium tubum undecim vel circiter pedum, qui tibi haud dubiè satisfaciet, modò lens utraque perfectè fuerit elaborata.

*Lens utrinque
concava com-
modior est
concavo-pla-
nà.*

Illud autem diligenter est inculcandum, quòd in fabricà hujusmodi tubi, vitrum utrinque concavum præstabilius sit concavo-planà, eò quòd hoc imagines rerum aspectabilium non tantas faciat apparere, quàm illud, & præterea sæpe in perfectione deficiat. Majus enim artificium est superficiem vitri exactè planam, quàm cavam reddere & expolire, sicut omnes, qui hanc tenent scientiam, & ejusmodi vitra diligenter elaborarunt, experimentis edocti, fateri coguntur. Quod sanè P. C. Scheinero planè contrariatur, uti videre licet ex *libro 2. Rose Ursinae cap. 33. fol. 135.* ubi de dubiis practicis disserit.

*Lens convexa ex segmento
obtusiore
meliorum &
longiorem
præbet Tu-
bum, quam
ex segmento
sphaerico ac-
tiores.*

Insuper, quòd lens convexa, ex segmento sphaeræ obtusiore parata, & optico Tubo admota, majorem vim habeat in repræsentandis visibilium speciebus, quàm quæ acutiore & globosiore constat, etiamsi seorsim hæc conspiciii loco usurpata imagines rerum oculis majores, illa minores, exhibeat; similiter lens concava acutior plus augeat species visibiles quàm obtusior, licet illa extra tubum omnia minora præsentet; quodq; minor breviorq; tubus minoris sit virtutis, & magis refractionibus obnoxius, testem malo nunc appellare perpetuam nudamq; experientiam, quàm demonstrationem ex doctrinà refractionum petitam, ad quam hæc speculatio propriè pertinet.

*Tuborum de-
monstratio
apud quos
auctores ex-
tet.*

Quòd si tamen, PhiloMathematici gaudent ipsas inspicere demonstrationes, eas, ex Clarissimorum quorundam Mathematicorum scriptis abundè de hæc materià evulgatis percipere possunt, è quorum numero modò allegare satis sit Keppleri Dioptricen, Rosam Ursinam, & Oculum P. C. Scheineri, Antonii de Dominis tractatum de radiis visus & lucis, ut & Maurolycum.

rolycum. Propositum namq; meum non est hîc deditâ operâ ea tractare, quæ ad fabricam lentium & Tuborum Opticorum spectant; sed hanc materiam in peculiarem tractatum refero. Et tantùm de primo genere Tuborum (nempe Telescopiis) quod duplici lente concavâ & convexâ constat, dictum esto.

Alterum genus Telescopiorum, ex duabus lentibus convexis paratur. Et lens oculis admovenda communiter è parvo segmento desumitur: magnum enim segmentum nimis longum requireret Tubum. Ideoq; pro longitudine Tubi majoris minorisve, lentes quoque sunt elaborandæ. Hoc autem discrimen est inter hoc & prius Telescopium, quod illud objecta omnia erecta, & secundum suam veram positionem; hoc verò inversa omnia præsentet. Quocirca hoc inprimis deservit observationi stellarum, præsertim macularum Solarium. Quemadmodum enim primum genus imagines rerum visibilibus, quæ in tabulam trajiciuntur & in eâ repræsentantur, inversas exhibet: ita hoc alterum, Solis Maculas situ erecto, prout in cœlo juxta suas plagas reperiuntur, convenienter ostendit.

Tertium genus, ex tribus diversis vitris, utpote duobus convexis & uno concavo conficitur. Atverò necesse est, ut superior lens convexa sit nonnihil planior in tali formâ si effectus fabricæ debet respondere; concava oculo proxima retinetur. Inter has duas altera convexa ex segmento minoris spheræ elaborata locatur. Proprium autem hujus lentis in tubo situm, & proportionem ad reliquas duas, ipsa te praxis edocebit.

Quartum genus Telescopii, ex tribus specillis convexis fabricari potest, si legitimo ordine & secundum proportionem suam singula in Tubo stantur, quod objecta erecto, pulchro, distincto, claroque situ, si vitra ad perfectionem perducta fuerint (veluti primum & tertium Telescopii genus idem præstat) conspicienda præbet.

Antequam autem ad reliqua genera progrediar, paucis etiam aliquid de materiâ Telescopiorum, ex quâ Tubi ductusq; eorum formantur, monebo. Ductus majorum Telescopio-

rum

*Telescopia
côstiti quôq;
ex duplici
lente conve-
xâ.*

*Duo conve-
xa in tubu
rectè dispo-
sita omnia
invertunt.*

*Telescopium
ex duabus
convexis lenti-
bus & unâ
cavâ para-
tum.*

*Telescopium
ex tribus
convexis spe-
cillis adori-
natum.*

*Papyraci
tubi cur non
satis com-
modi vide-
antur.*

rum plerumq; ex papyro concinnantur, sicut ejusmodi Tubi Iohanni VVifelio, Optico Augustano, qui diligentissimam in iis adornandis posuit operam, nec non Vangelistæ Torrezelli, Magni Hetruriæ Ducis Mathematico, sunt usitati. Verum papyracei Tubi ob certas causas, quas jam adducam, mihi non arrident. Primum enim ductus eorum si valdè angusti parantur, cælo humido fiunt angustiores, hincq; ægrè possunt extrahi & contrahi; si verò satis fuerint laxi, sicciore tempestate fiunt laxiores, unde è suâ legitimâ sede facillè dimoventur: at semper tubum in suam sedem reponere, magnum adfert tedium. Deindè non sunt durabiles, sed haud ægrè corrumpuntur, præsertim si aliquid extraneæ humiditatis concipiunt. Adhæc, inter dilatandum & contrahendum, volitantibus pulvisculis, facillè specilla consperguntur & maculantur: unde obscuriora evadunt. Deniq; quod omnium pessimum, in ejusmodi lōgiore papyraceo tubo rarò superius & inferius specillum æqualiter inter se distant, præsertim si aliquot constat ductibus. Dum namq; ductus dilatantur, situs rectus lentium turbatur, ob quem errorem species rerum aspectabilium malignè representantur. Quandoquidem omnes lentes in Telescopiis necessariò exquisitè debent esse parallelæ, si imagines rerum non confusæ, sed distinctæ, amplæq; debent apparere. Ductus igitur in eadem parallelâ lineâ semper exactè cohærere necesse est. Quod si Tubi ex lamellis ferreis (quod quidem etiam fieri potest) parantur, alia difficultas nascitur. Etenim si ex pluribus fistulis lamellarum ferrearum Telescopium conflatum est, pondere vix tractabile evadit. Quamobrem Tubi è ligno optimo siccoq; diligenter fabrefacti & tornati, nec è multis partibus ductibusq; compacti, ut parallela lentium linea ne turbetur, semper mihi sunt omnium convenientissimi visi, & ex voto satisfecerunt. Quando ergò longitudo Telescopii duodecim pedes æquat, tunc anteriorem ejus portionem octo pedibus vel circiter longam fabrefieri curo. Et quia impossibile est dioptras ex uno ligni segmento parari, ideoque eas ex diversis partibus, ad lineam rectam diligentissimè dispositis, arctèq; conglutinatis construi jubeo. Residuum fragmentum duos

Quid in Tubo magni ex lamella ferrea paratur, desideretur

Tubi ex solido sicco, ligno parati probantur, & eorum fabrica delimitatur.

duos tresve præbet ductus, ut Tubus Opticus secundùm parallelam specillorum lineam rectè, possit dilatari.

Quod foramina duo Tuborum, quæ in singulis reperiuntur, & inter utramq; lentem constituta sunt, attinet, de iis tenendum est, quòd parum referat, utrum posterius foramen oculo vicinum, & concavo vitro incumbens sit paulò latius, an verò angustius, modò tantæ sit capacitatis, ut commodus & liber sit transitus oculi, ab unâ lente ad alteram. At foramen tubi vitro convexo proximum, debitam exactamq; obtineat proportionem necesse est: nam si foramen illud, iusto amplius est, species rerum visibilium non satis claræ neq; distinctæ apparent; sin verò nimis parvum est, iterum visionem impedit. Hic usus & experientia me docuit, quòd foramen magnorum Telescopiorum convexo specillo propinquum in diametro se-squi pollicem non excedere debeat: quæ quantitas etsi alicui valdè exigua videri potest, tamen praxis quemlibet edocebit, hanc proportionem foraminis majori tubo omnium optimè respondere.

*Foramina
Tuborum
quomòdò cõ-
parata debe-
ant esse.*

Quando igitur Telescopia quadruplicis generis ad proportionem rationemq; modo dictam (plures enim modos hac vice, ut ut possem, recensere superfedeo) sunt elaborata, & libenter scire velimus, quale Telescopium sit omnium perfectissimum, quo accuratissimè objecta cernere possimus: tunc in primis ad hæc quatuor respiciendum est.

1. Quodnam sit clarissimum & purissimum?
2. Quodnam imagines rerum reliquis majores sistat?
3. Quodnam objecta minus coloret & 4. Omnium minimam refractionem præbeat?

*Nota per-
fissimè Tele-
scopii.*

Quod priores duas notas bonitatis Tuborum concernit, equidem fateor, quòd si quis duobus Telescopiis sit instructus, eaq; ad examen accuratius iis contuendi species rerum externarum, facile internoscere queat, utrum utri sit anteferendum: illud nimirum quod objecta visibilia clariùs & distinctiùs repræsentat, At verò nondum hoc examen sufficiens est, ita ut non sit, alicui errori obnoxium. Siquidem ferè impossibile est, hoc modo determinare, quantum id sit, quod alterutrum Telescopium

C

præstet

præstet claritate & magnitudine, nec non qualis sit exacta differentia perspicuitatis? Etenim visus uno tempore magis est ad acutius videndum, quàm alio, dispositus; quam rem etiam aeris qualitas, vel impedire, vel promovere potest: adde, quòd Telescopia longè meliora appareant, si obversa Soli aspectabili rei externæ adhibeantur, quàm à Sole averfa, quodque omnia majora conspiciantur per quasdam exhalationes inspecta, quàm sine iis: ut taceam alias causas, quæ Tubis diligenter examinandis possint esse impedimento. Quapropter meliorem detegam modum, eumque infallibilem, quo Telescopiorum bonitas explorari & valor eorum accuratissimè potest deprehendi.

*Infallibilis
modus valo-
rem & boni-
tatem Tubo-
rum Optico-
rum explo-
randi.*

Ingredere cum uno Telescopio cameram obscuratam, admove illud foramini fenestræ, & obverte Soli ad eum modum, quo Maculæ Solares solent observari; ex adverso autem Tubi statuatur tabula alba, in quâ circulus observatorius sit expressus, ad magnitudinem imaginis Solis. Postea fac Solem per Tubum circulo observatorio Tabulæ allabi; quod si discus Solis major fuerit circulo, propius admove Tabulam Tubo, donec Sol peripheriâ suâ circum exactè adimpleat: tunc attende diligenter claritatem Solis, colorem limbi & maculas, si quæ Soli intint. Hoc factò, alterum quoque Telescopium foramini fenestræ impone in eadem distantia; tabulæ albæ & iterum lumen Solis admitte, sic facile perspicies, nunquid discus Solis major sit delineato circulo, Maculæque Solis sint majores prioribus, & utrum omnia magis perspicua, vel obscuriora appareant? Quod si ergò notaveris utriusque magnitudinis & perspicuitatis differentiam, tunc inde valorem Tuborum facile æstimabis, præsertim si ductus rectè sese habuerint. Ad hanc regulam, priores duæ notæ dirigi possunt.

Tertia nota, num lentes colorent, nec ne? sequente modo explorabitur; admove Tubos Opticos Astris, Iovi, Saturno, vel Stellis fixis: quod si hæc aspectabilia corpora cœlestia, pura, nitida, coloris cærulei, flavi vel rubri expertia, rotundaque exhibuerit, non oblonga, inprimis Iovem (Saturnus quippe raro rotundus perspicitur) tunc bonæ notæ sunt lentes, in suo segmen-

segmento perfectæ & bene politæ : sin verò superficies segmenti, in specillis fuerit inæqualis, difformis & vitiosa, radii supra modum refringuntur & colores inducuntur. Refractio quidem aliqua in lentibus concedenda est, ob quam species rerum visibilium vel ampliantur vel minuuntur : attamen quò minor est refractio lentis, eò magis ad æqualitatem tendit, nec alienos invehit colores.

4. Ut autem hæc res eò meliùs cognoscatur, certas suppeditabo regulas, secundùm quas ea poterit examinari. Sed quia doctrina ista nonnihil est intricata, nec cuivis patet, quid & quotuplices sint Radium refractiones, nec non unde oriantur, ideoque de illis certa principia & præcepta ad mentem omnium ferè Opticorum, præmittam & proponam, ex quibus antè memorata rectiùs percipientur & uberiùs cognoscantur.

Certa Regula, numero quinta, de natura, differentiis, & productione refractionis radiorum.

I. Quòd omne punctum visibile radios à se projiciat sphericaliter, & quidem in oculos perpendiculariter, per medium aliquod diaphanum, quod vel rarius vel densius esse potest. *Anton. de Dominis C 4. de luce & umbrâ pag. 10.*

Regula prima.

II. Quòd omnis radius in diaphanum perpendiculariter & ad angulos rectos incidens rectè procedat, neque frangatur, sed irrefractus pergat, transeat, & ideo directus vocetur : quodque omnes alii radii non perpendiculares, sed ad angulos obliquos incidentes, in punctis incidentiæ & inclinationis frangantur. *Vitell. lib. 2. Theor. 42. usque ad 48. Maurolycus lib. 1. de lumine & umbrâ pag. 36.* Et quidem ad perpendicularum, quando radii ex medio primo rariori provenientes, incidunt in densius secundum. Contrà verò à perpendiculo, quando videlicet isti radii, è perspicuo densiore, rarius quoddam feriunt. Perpendicularis autem ad quam, vel à quâ refractio fit, est linea, quæ à puncto incidentiæ ad angulos rectos superficiæ mediæ seu diaphani secundi insistit. *Keplerus in Diopt. Ax. 2. Scheinerus in Rosâ Ursinâ lib. 4. part. 1. c. 23. pag. 452. Et in oculo ejusdem lib. 2 part. 1. cap. 3. pag. 59. Aguilonius lib 2. Optic. proposit. 8. pag. 120.* Et hæc causa est, quare radii in densum politumque vitrum incidentes refringantur, non tam propter densitatem & crassitiam, quæ communiter exigua est,

regula secunda.

quàm ob figuram vitri convexam & concavam, quam certa segmenta sphaerica & conica suppeditant. Hæc efficit, ut, quò radorum incidentia magis inclinatur ad angulos obliquos, & à centro deflectit, eò majorem inducat refractionem: quò minor autem est angulus incidentiæ, eò minor fiat refractionis: anguli enim incidentiæ & inclinationum, refractionum angulis sunt proportionales. *Vitell. lib. 2. Optic. Theor. 50 & lib. 10. Theor. 14. Maurool. lib. transparent. Theor. 10*

Regula ter-
tia.

III. Refractio quoque radorum major fit à lentibus convexis, quæ constant minorum sphaerarum segmentis, (quia in medio plùs adsurgunt, & in margine magis attenuantur) quàm quæ constant sectionibus majorum sphaerarum, propter majorem scilicet anguli incidentiæ obliquitatem: & quidem in omnis generis convexis ad perpendicularum: unde angulus visionis dilatatur, atq; species rerum visibilium majores apparent, vi 5. & 6. *hypothef. Optic. Euclid. & Vitell. 20. l. 4. ut & Maurool. l. 1. diaphan. Prop. 4. pag. 36.* Quæ sub majori angulo videntur, majora & propinquiora videntur, & quæ sub minori, minora & remotiora.

Regula quar-
ta.

IV. Major item fit radorum refractionis à lentibus concavis (sed à perpendicularo) quæ constant minorum sphaerarum, quàm majorum segmentis: hincque fit ut hæc minorem angulum visionis, illæ verò majorem efforment.

Regula quin-
ta.

V. Quò propiores sunt radii perpendiculares centro lentis, eò rectius incidunt, fortiùs penetrant, minùs refringuntur, clariùsque species rerum visibilium repræsentant: quò remotiores autem sunt à centro lentis, magis que ad peripheriam tendunt, eò obliquiùs & debiliùs superficiem incidentiæ seu diaphani feriunt, eo que magis refringuntur, & objecta minùs distinctè spectanda præbent, vi *propositionis 47. lib. 2. Optic. Vitell. 1.* Ex hisce primò efficitur, quòd omnia convexa, in quibus radii ad perpendicularum refringuntur, bases angulorum species efformantium dilatent, & imagines rerum aspectabilium amplient: & contra, quòd omnia concava, in quibus fit refractionis à perpendicularo, bases angulorum species afferentium, contrahant, & ideo species rerum visibilium minores præsentent. Secundo, ex iisdem sequitur, quòd radii in lentibus, sive cõvexis,

Qua lentis
magis minur-
ve imagines
rerum præ-
sentent?

sive

sive concavis, magis circa marginem, quàm centrum refringantur, quodq; hanc ob causam illic angulum visionis magis amplient, & propterea species rerum visibilium circa peripheriam majores appareant, quàm circa centrum. At illud quidem in omnibus specillis sphericorum segmentorum accidit, in uno tamen evidentius, quàm in altero, prout segmenta majora, vel minora fuerint. Atq; ideo omnes Tubi meliores pretiosioresq; censendi sunt, inprimis autem observationibus siderum magis idonei, qui minorem refractionem inducunt. Quomodo verò hoc indagandum sit, nunc etiam paucis indicabo. Et licet multis modis refractionis inæqualitas in Tubis deprehendi possit, præcipuè per maculas Solares, sicut prolixè *Christophor. Scheinerus in Rosâ Ursinâ lib. 4. part. 1. tradit*: tamen inter illos quatuor sequentes, non minimum obtinent locum. Notes autem hic velim, quòd si quis cum fructu in hac materiâ versari voluerit, eum nosse oporteat, rationem observandi maculas Solares; cujus notitiâ si non nemo destituitur, sequentia capita, in quibus hac de re agetur, consulat.

*Refractionis
Tuborum in-
æqualitas
quibus signis
dignoscenda?*

I. Certam aliquam maculam, in quacunq; disci Solis parte, sive orientali, sive occidentali, hærentem, ipsamq; Solis imaginem per Tubum admitte, & Maculam Solis fac cadere in horizontem circuli observatorii orientalem, ejusque centrum nota in suâ sede: post immoto Tubo & instrumento observatorio, concede Soli & Maculæ suum liberum cursum diurnum, & per intervalla distincta, donec, per centrum, ad peripheriam occidentalis circuli observatorii partis, Macula pervenerit, iterum centrum Maculæ in chartâ diligenter signa, quoniam sat temporis suppetit, eò quòd Sol suo transitu, circa nempe Apogæum, duo circiter minuta prima temporis consumat. Hic incesus Solis, vel est rectilineus, vel curvilineus. Si namq; per centrum circuli observatorii transit, motus ille fit secundum rectam lineam: si verò nonnihil remotior à centro alterutram partem versùs circuli incedit, fit secundum lineam inflexam & curvam, curvitatissq; facies convexa ad centrum semper inclinabit, concava verò averfa ab eodem ad puncta Zenith vel Nadir convertetur. Itaque ex incesu rectæ lineæ,
refra-

Primus modus explorandi divinitates & differencias Tuborum, in refringendis.

refractio non colligitur, sed curvæ. Nam quò major curvatis flexus, in æquali distantia à centro circuli observatorii apparet, eò major est istius tubi refractio. Per hoc examen enim majoris & minoris curvatis refractionisque utrinque peripheriam versùs, quæ ex diligenti punctorum notatione deprehenditur, lentium ac Tuborum differentia, nec non bona vel mala figura cognoscitur.

*Secundus
modus differ-
entia refra-
ctionum.*

II. Similiter, si Macula circa horizontem ortivum vel occiduum apparet, tunc primùm locus Maculæ in circulo observatorio signatur, deinde recta linea, per hoc punctum, per centrum jam dicti circuli, ducitur, ubi distantia maculæ à peripheriâ & à centro, ad exactam mensuram revocatur: discrimen quippe utriusque quæsitam ostendit differentiam, quæ semper major erit utrinque in margine, quàm in medio. Quànto igitur magis minusve lentes tuborum in refringendo, circa margines & centrum, excedent vel deficient, tantò viliores, vel meliores Tubi sunt æstimandi.

*Tertius mo-
dus indagandæ differ-
entia Tuborum,
in refringendo.*

III. Adhæc, si duæ Maculæ, secundùm diametri Solaris longitudinem, nonnihil distantes occurrunt, tum earum interstitium, tam circa horizonta, quàm medium notato, siquidem & inde differentiam refractionum perspicias: illud enim intervalum semper in medio (ut & antè dictum) arctius, quàm in marginibus, observabitur.

*Quartus mo-
dus explorandæ inæquali-
tatis refractionis.*

IV. Insuper, vim & naturam lentium inæqualiter refringentium, major quædam Macula Solis deteget, si propria ejus longitudo in diametro, cum circa horizontem, tum circa medium exactè observetur. Nam & ex hac notâ refractionis differentia, & quinam Tubus optimus atque observationibus corporum cœlestium maximè idoneus sit, innotescet. Et tantùm de primo genere Tuborum Opticorum, nempe Telescopiis, dictum sufficiat.

*Helioscopii
usus & fabrica.*

Secundò, quod *Helioscopium* attinet, cujus *Scheinerus lib. 2. Rosæ Ursinæ fol. 128. 130. & 132.* mentionem facit, & usum in Maculis Solis observandis ostendit, de hoc tenendum est, quòd illud ipsum rectè ad inspiciendum Solem citra læsionem oculi dirigatur, id quod Telescopio fieri nequit. Hinc ope Helioscopii,
non

non solum Maculæ, verum etiam Ecclipses Solis commodè possunt animadverti. Hoc autem duobus modis construitur. Vno quidem modo ad mentem Scheineri, lentes tam cavæ, quam convexæ Helioscopiorum, ex vitris diversi coloris, rubri, cœrulei, flavi, viridis, possunt parari, ita tamen ut ea sint satis diaphana & æqualiter colorata, ut ut rarò utraq̃ue bonitas vitri concurrat. Admittit autem Helioscopium, vel unum convexum, vel concavum & convexum, vel duo convexa, vel denique plura ad formam Telescopiorum, modò lentes artificiosè constructæ rectè tubo imponantur.

Alter modus est facilè probabilis: sicuti ex praxi meâ domesticâque experienciâ didici; ita namque quodlibet Telescopium quovis tempore, quando opus est in Helioscopium potest mutari. Accipiantur duo vitra plana quomodolibet colorata, ad magnitudinem concavarum lentium Telescopii efformata, in medio utriusque locetur papyrus ejusdem quantitatis, uno foramine parvo pertusa, quæ cum vitris firmiter, vel filo, vel, quod melius, singulari glutino (quo Artifices vitra polienda instrumendo ligneo conjungunt) connectatur: postmodum hæc conglutinata vitra cum papyro applicentur lenti concavæ Telescopii, oculo vicinæ. Hoc pacto paratum habebis Helioscopium, quod spectandis Maculis & defectionibus Solis aptum est, ipsumque Telescopium indemne manet, quotiescunq̃ hæc colorata vitra eximuntur.

Ex quo Telescopio Helioscopium constructa.

Tertium genus Tuborum *Microscopiam*, quod communiter etiam vitrum muscarium appellatur, constituit. Hoc minima corpuscula & animalcula (quæ per se aciem luminum vix incurrun) magnitudine Camelorum ferè ac Elephantum conspicienda præbet, ita ut non sine magnâ admiratione, jucundâque oblectatione spectentur. Constat autem duobus vitris & tubulo unius pollicis, vel circiter, in quem corpuscula induntur. Alterum vitrum oculis proximum est convexum, ex minuto spheræ segmento politum, cujus diameter, æquat summum duos pollices: alterum inferius & fundo propinquum, in quo res perlustrandæ collocantur, est tantum simplex frustulum vitri utrinque plani, cujus operatio in eo duntaxat consistit, ut lu-

Microscopii structura & usus.

men

*Alia ratio
preparandi
Microscopi-
um.*

men admittat. Aliàs etiam ejusmodi Microscopium ex duobus vitris convexis construi, & in formam tubuli redigi potest: siquidem & eo modo minutissima objecta apposita, quæ sensum oculorum effugiunt, clariora & distinctiora, quàm in priori Microscopio, apparebunt. Vnum convexum, quod ad res spectandas dirigitur, elatum & ex parvo sphaeræ segmento elaboratum sit necesse est: alterum autem, quod admovetur oculo, nonnihil planius formandum; ubi quoque debita proportio lentium & ductuum Tubuli, secundum qualitatem ac figuram specillorum, probè consideranda est, si quàm acutissimè minutiores corpusculi partes, in oculo depingi debent.

*Polemosco-
pium ab Au-
tore inven-
tum.*

Porro ad quartum Tuborum genus me converto, quod *Polemoscopium* voco, quoniam id convenientissimè tempore belli, tum ab obsidentibus, tum obsessis, usurpari potest. Hoc instrumentum Opticum ipsemet Anno 1637. excogitavi & adornavi, neque credo ante illud tempus (quod citra jactantiam dictum velim) unquam fuisse conspectum, aut ab ullo compositum. Et, quanquam ex aliis intellexi, hic adesse quempiam, qui sibi hujus Polemoscopii inventionem arroget: tamen, si sic loqui perrexerit, se ipso teste futilis erit. Is enim ipse non est nescius, quòd, non semel, sed aliquoties, hoc organum opticum penes me viderit, & undique versum perlustraverit, quia excogitatio & fabrica ejus, sibi valdè arridebat. Quòd autem bellus homo semiperfectâ imitatione (siquidem hoc affectatum ejus Polemoscopium nunquam id præstabit, quòd meum, quoniam ex Catoptrici tantum vitris, non autem simul Dioptrici est compositum) Instrumentum illud exprimere voluerit, videtur id simili ingenio confectum, quo Hispani, à Genuensi Columbo edocti ovum erectum, extremitate ejus contusâ in acumine constituerant; quod, antequam factum viderant, sic illis fuit perspectum, ut quod ignoravère maximè: quemadmodum in *Historiâ novi orbis Calvetonis pag. 23.* memoratur. Namque libenter concedo, fabricam ejus, introspectis omnibus partibus, non esse admodum operosam, nec inventionem ejus adeò magni momenti, eò quod ex partibus, artificibus notis, sit compositum. Eapropter verò vel maximè hoc ipso nomine se non

non parum commendat Pelemoscopium nostrum, quòd è facile parabili ratione exstructum possit efficere, quod ab aliis instrumentis longè majori operà & sumptu confectis, frustra expectes.

Minimè præstantissimum id, cujus usus à diffinitione magnè dependet.

Hoc autem opticum Instrumentum, non solùm jucundæ speculationis ac delectationis plenum est; sed & apprimè utile ac necessarium. Primùm namque quodvis adspectabile objectum, pronum, supinum, vel in anteriorem vel posteriorem faciem flexum, erectum vel inversum potest præsentare. Deinde instructus hoc instrumento, quaslibet res visibiles per angulum rectum, hoc est, per radios rectangulos, reflexos, ut & refractos aspectu queo percipere; id quod reliquis Tubis denegatur: illi siquidem omne alpectabile sensui oculorum per radios rectos ac refractos objiciunt. At beneficio hujus instrumenti rem aliquam perspicere possum, quam alter hoc destitutus, aspectu nequit sentire, & quemlibet videre, quæ me iterum haud potest. Hinc è conclavi prospiciens, omnia, quæ foris, vel in loco propinquiore, vel remotiore, geruntur (quæ alter per transfennam, imò per se nequit ob incommoditatem loci aspicere) in omnem faciem erectam, eversam, & lateralem conversa in conspectum meum possum adducere admodùm clarè & perspicuè, sub tanto visionis angulo, quantum vel optimum Telescopium queat efformare. Præterea hoc opticum Instrumentum non minùs utiliter ad videndum adhibetur, quando muro, corribus loricalibus, sepi vel alii ejusmodi velamini, adsto, ubi superiori parti admotum res extra videndas obtutui objicit, ita ut à nemine exteriorum cerni queat spectator. Omnium denique utilissimus & maximè conspicuus est ejus usus, dum tempore obsidionis scabello valli innitens, supra & extra loricam, omnia, quæ ab hoste in fossâ geruntur, hoc instrumento accuratè possum observare, præsertim, quando jam vineæ in fossam sunt translata; ubi nemo obsessorum, citra magnum vitæ discrimen, aliàs levatâ supra vallum facie, ob præsentiam hostilium militum, ad omnia, quæ superius in vallo geruntur, attentorum, auder fossam intueri; quâ de re postea pluribus agam, modò priùs constructio ejus fuerit exposita.

Pelemoscopij usus.


D

Hic

*Constructio
Polemio-
pii.*

Hic igitur Tubus, tam ex Catoptricus, quàm Dioptricus paratur fundamentis : etenim duobus speculis planis & gemino vitro dioptrico, concavo nimirum & convexo constat.

Tubi figura exterior est, ut in *A* exprimitur : apud *g* angulū obtinet rectū : materia ejus, ex ære flavo sive orichalco conflatur : magis quippe idonea est, quàm ex albâ laminâ ferreâ. Partes habet quinque distinctas, nempe *a*, *d*, *c*, *g*, *e*, in eum finem concinnatas, ut vitra commodè imponi & eximi possint quotiescunq̄ue opus fuerit. Prima pars habet in superiori superficie rotundam arculam spiratim insertam, cui rotundum inest foramen trientem ferè pollicis æquans, & pervium. Huic arculæ postmodum lens concava includitur, filoq̄; ferreo munitur. Inferius autem versus *a*, è regione foraminis, locatur portio puri boniq̄; speculi plani *h*, ex segmento Elliptico parati, ad eam magnitudinem, ut commodè disponi & circiter 45. gr. inclinari possit, sic ut linea *a* apposita demonstrat. Verùm ut eò melius & certius firmetur, frustulum cupri instar *i* curvati primò supponatur, & ne folium removeatur, papyrus cerâ illitam aggluina, postea marginem cerâ circumda, ne specillum loco dimoveri vel excidere possit; dehinc pars prima *a* unâ cum arculâ *b*, in quâ concava lens est collocata quatuor cochleis jungitur parti *d*, quæ in fistulam *C* inseritur, ut tubus, efflagitante necessitate, pro libitu queat extendi. Secundò parti instrumenti ad angulū rectū curvatæ, rursus speculum planum elliptici segmenti *k* impōitur, ut linea ad *g* ostendit, quòd ut convenienti loco sit positum multùm refert: si namq̄; ad alterutrum latus inclinaverit, vel supernè aut infernè devolutum fuerit, neque radii, qui ad *f* per angulum incidentiæ in speculum *g* cadunt, in idem *a* per angulum reflexionis feruntur, neque ab *a* per foramen ad oculum perveniunt. Quilibet autem ex praxi ipsâ cognoscat, quantum momentum in justâ speculi hujus ordinatione sit positum. Propterea initio, paucâ cerâ appositâ, est in suo loco disponendum & retinendum, donec de legitimo ejus situ planè constiterit. Interdum etiam antè in *a* non rectè collocatum est : unde fit, ut species rerū visibilibus non directè, ut fieri deberet, sed obliquè in oculum incurrat.



incurrant. Veruntamen industrius, diligens & attentus hujus studii cultor admonitus, errores illos evitabit. Quartum vitrum, nimirum convexum, ad s in tubo d orbiculo n inclusum statuitur, qui sic formatus est, ut commodè in tubum possit inferri, & ut locus situs hujus lentis conveniens, huc illucque movendo orbiculum, tandem inveniatur. Sed quærat forsân aliquis ex me, qualis lentium convexarum proportio huic instituto deserviat? Cui respondeo, variæ quidem lentes, sive obtusiores sive elevatiores ad placitum adhiberi posse, modò hoc discrimen observetur, nisi velit operam ludere, quòd illæ magis elevatæ etjam longiorem tubum requirant d, ut & totum Polemoscopium longius. Duæ insuper cautelæ opifici hujus Polemoscopii, nisi velit errare, sunt necessariae. Altera est, quòd positus utriusque lentis, concavæ & convexæ, hic aliam elongationem, quam in cæteris Telescopiis requirat: nam distantiam in hoc instrumento contractiorem esse manifestè oportet, si debet expectationem implere. Altera est, quod præstet hîc adhibere lentem plano-concavam, quàm utrinque cavam, eò quòd aspectabilia magis perspicua, & quantum instituti ratio postulat, satis distincta præsentet. Mirum autem fortassis alicui videbitur, qui fiat, quòd utraq; lens scopum suum adæquat, quum tamen è regione alterà alteri non exactè respondeat, & prætereà speculum sit interpositum? At verò neutrum usui hujus Polemoscopii officit, si modò vitra sint æqualiter in suis Tubis disposita: qualiter enim radii refracti à convexà lente in speculum incidunt, taliter reflexi in concavam b feruntur, neque inde refractio diminuitur. Quòd autem lens convexa in Tubo d, cui cava adhæret, statuatur, sit hac de causâ, ut Polemoscopium, pro ut expedit & ratio postulat, queat prolongari, quod tamen in hoc optico instrumento exactam præsentandi species rerum visibilium rationem tantùm abest, ut impediât, (etiamsi duplo longius productum fuerit) ut potius in majori longitudine, quàm minori, objecta evidentiora visui exhibeat. Itaq; quilibet hoc instrumentum, longius vel brevius, arbitrato suo, ad modum supra dictum construi curabit. Meum quod attinet, diamèter ejus est 1½ pollic., longior tubus 22. pollices, &

Lentes in Polemoscopio breviores exigunt distantiam, quam in Telescopio.

brevior octo pollices æquat. Sed ut paulò ante dixi longitudo potest variari: quò namque est brevior tubus, eò minores reddit aspectabilium imagines. Particula e planè possèt omitti, nisi ideò adderetur, ne cuilibet indifferenter ad videndum pateat aditus, idcirco etiam figuræ vv & x, duo orbiculi, nimirum r & t, sunt appositi. His igitur omnibus probè observatis, singulis vitris in suis convenientibus locis rectè dispositis, & quinque partibus suis cochlearum ope arcè inter se connexis, Polemoscopium rectè construitur. Quòd si idem Polemoscopium lentibus fuerit destitutum, etiam quidem objecta repræsentat, sed sub parvâ imagine, & remotiora vix valet adsequi. At omnibus suis specillis, ut supra commemoravimus, præditum, & remotiora & propinquiora aspectabilia satis clarè & distinctè ante oculos proponit. Quin & hoc instrumentum sine duobus dioptriciis vitris possèt usurpari, & remoto tubo a: quomodo verò hac ratione species visibiles repræsentaverit, id tuè permitto experientiæ. Vt autem pleniorem ejus usum addiscas, insuper nota, non parvi interesse, qualem situm antè speculum a, erga posterius g obtineat. Nam, secundum utriusque dispositionem, omnia objecta vel erecta, vel supina, vel inversa cernes.

Polemoscopium abisq; lentibus quid præstat?


Ut omnia prona & erecta in Polemoscopio cõspiciantur.

1. Si primùm omnia erecta prona vis intueri, ut specula erga se invicem sint parallela, necesse est, sicut ex diagrammate C, propè A apparet. Nec refert (quando parvo foramini oculum applico) utrum longiorem tubum perpendicularem, vel breviorẽ horizonti parallelum statuam, vel sursum, vel deorsum inclinatum; an verò utrumque tubum longiorem ac breviorẽ, dirigam horizonti parallelum. Adhæc, licet foramen planè invertatur interiora versus tendens: tamen hoc in visis objectis occurrit discrimen, ut cuncta à tergo conspiciantur.


Ut omnia supina appareant.

2. Si verò velis objecta supina intueri, specula ita sunt inter se aptanda & flectenda, ut angulum acutum constituent: quod fit, si alterum erga alterum rectè dispositum inclinet ad 45. gradus, & cavernula lateri tubi admoveatur. Nec interest, instrumentumne in applicatione ad oculum teneam parallelum horizonti, an verò perpendiculare sursum vel deorsum conversum, veluti prope D & C videre licet.


3. Quod



A



B



C



D

fig C.

Ant. Sculpt.

3. Quod si cupis objecta aspicere inverſa, ita ſpeculum circumduc, ut intrinſecùs ad angulos rectos (ſicut ex B apparet) vergant : quod fiet, ſi foramen ad interiora flectatur, & inſtrumentum perpendiculariter ad horizontem, ſurſum vel deorſum ſtatuatur, ut retrò inſpiciatur; quoniam parallelus hujus optici inſtrumenti ſitus, imagines rerum viſibilium non invertit, ſed eas rectas præſentat; ut jam antè dictum. Denique ex hac flectendi ac convertendi tubos diverſitate, alii atque alii ſequuntur videndi modi, qui varietati ſitus loci poſſunt accommodari : id quod exercitatio quemlibet edocebit. Etenim, cùm ex loricâ in foſſam, vel è muro, aut ſepimento vallato, vel alio velamine, proſpicitur, tunc Polemoſcopio longiore opus eſt; quanquam hoc pacto nihilo plus præſtabit, etiamſi aliquot ulnas æquet longitudine : eò tamen longitudo deſervit, ut utervis hoſtium & obſeſſorum & obſidentium alterius obductus commodè queat perluftrare. Inter alia verò commoda, quæ hoc opticum inſtrumentum militi, vel tribuno militum, præſtat, hoc non eſt minimum; ſi virgæ ambulatoriæ ac menſoriæ includatur, & opertum circumferatur, ut, ſicubi uſus eſt, inde depromatur, quod poſtmodum latiùs explicari & ad uſque pedes octo produci poteſt. Diameter ejus eſto 1½ pollice longa, & curvaturæ 2. pollicibus longitudinem arbitrato quiſque ſuo determinabit. Vnum autem hoc non eſt obliſcendum, ut ſpecula ſibi invicem ob productam tuborum longitudinem ad amuſſum reſpondeant : quod niſi fit diligenter & circumſpectè parùm accuratè res objectæ viſu percipientur.

Vi omnia videantur inverſa.

Polemoſcopium virgæ ambulatoriæ includere.

Inſuper, hoc prænarato modo quiſpiam, ſi plura ſpecula inter ſe fuerint ordinata in ſuis tubis, corpus rotundum, anguloſum vel columnam aliquam plus dimidio & quæ iſto in loco gerantur, videbit, imò alia quoque conſimilia artificia, remotiora & abdita corpora viſui objiciendi excogitabit, præſertim, ſi in Catoptriciſ & Dioptriciſ fuerit exercitatus.

Tandem, quod demonſtrationem hujus Polemoſcopii atinet, quare nimirum ad certas flexiones ſpeculorum, interdum objecta erecta, quandoque ſupina, nonnunquam inverſa præſententur; & quare etiam diverſus locatus Polemoſcopii, vel paralle-

parallelus vel perpendicularis, sursum deorsumve ad horizonta vergens, idola specierum visibilibus variet? quilibet in Catoptrici versatus ejus rationem perspicit. At verò ut & imperitiores nullo negotio fundamenta hujus scientiæ discant intelligere, nonnulla certa principia Catoptrica præmittam, ex quibus post, ipsa demonstratio poterit elici.

Principia
Catoptrica,
ex quibus
demonstratio
Polemoscopii
fit.

I. Propter levitatem terri politiq; corporis radii in superficiem ejus cadentes reflectuntur, per *Theor. 1. lib. 5. Vitell. & Theor. 25. lib. 1. Maurolycus de lumine & umbrâ.*

II. Radii sub alio nullo angulo in speculis reflectuntur, quàm in quem inciderunt, quia natura semper rectam & breviorẽ ingreditur viam. Hoc est: Angulus reflexionis semper equalis est angulo incidentiæ. *Vitell. Theor. 10. & 20. Alhacen lib. 4. num. 10. 18. Antonius de Dom. cap. 2. pag. 3. Maurolyc. Theor. 27. & 29.*

III. Quicquid per reflexionem cernitur, in uno tantum fit loco, nempe in eo, in quem reflexio incidit. *Vitell. Theor. 24. lib. 5. Anton. de Dominis cap. 2. num. 8.*

IV. Radius perpendicularis, non solum in se ipsum reflectitur, sed etiam reliquis est fortissimus; & qui radii ei sunt viciniore, illi quoque sunt valentiores. *Euclid. Theor. 2. Catopt. Vitell. Theor. 11. 12. 13. 14. lib. 5. & Theor. 47. lib. 2. Alhacen lib. 4. num. 10. 11. & 12. Anton. de Dominis cap. 7.*

applicatio
principiorũ
ad demonstratio-
nem Pole-
moscopii.

1. In formã
reclã.

1. Ex quibus quatuor principiis sequentia demonstrare non est difficile. In diagrammate C, penes A esto a b c Polemoscopium, d g unum speculum in tubo curvato, & alterum speculum sub cavernulã e f, objectum perpendicularare est o u. Ex istis duobus punctis, incidunt duo radii in speculum d e in g & h. Iam, quia certum est, quod angulus reflexionis (sicut paulò ante principium secundũ Catoptrorum docuit) sit angulo incidentiæ æqualis; sequitur, quod, si duo hæc puncta sub uno angulo 45. grad. in speculum d e incidunt, necessariò reflexi sub eodem angulo in speculum c f incidunt, ita, ut quilibet radius in puncto incidentiæ quasi peculiarem angulum rectum constituat, velut ex g & h apparet, siquidem punctum o objecti, in inferiori speculo ad f, & u ad c in se ipsum reflectitur; ideoque, quando id per foramen intueor, in genuinã suã formã, nempe erectã

erectâ & perpendiculari mihi apparet, si nimirum specula in lineâ parallelâ sibi sint opposita. Atque hoc modo fit visio directa.

2. Quod visionem attinet, proponitur ea in C & D. Nam ex hac perspicitur, quòd speculum sit conversum, & oculus in superiori vel inferiori parte inspiciat, unde radii non directi, sicut ante, sed planè inclinati in inferiori speculo, o scilicet versus sinistram (in figurâ C) u verò dextram versus appareant, & hinc objectum conspicitur supinum. Idem fit apud D, converso instrumento, ita ut o in dextrâ parte & u in sinistrâ præsentetur.

2. In formâ
inclinatâ.

3. Quomodo verò fiat inversa visio, ex iconismo B non potest esse obscurum. Etenim, quoniam inferius speculum penitus est inversum, & oculus interiori parti est applicandus, ideoq; punctum objecti inferius u incidit in speculum c f & fit superius, o verò quod superius erat, inferius existit ratione oculi. Sed, quia hæc sunt intellectu facilia; idcirco nolimus hîc esse prolixiores. Quando autem sufficienter in hoc capite, non tantum de Polemoscopio, sed & de reliquis Tubis, imprimis autem de Telescopio actum est; restat, ut etiam doceatur, quomodo Telescopium siderum observationibus sit commodè adhibendum & quid hujus ope intra paucos annos fuerit, in cœlo detectum, de quibus omnibus in capitibus subsequenter dicitur fusiùs.

3. In formâ
inversâ.

CAPUT III.

DE OBSERVATIONIBUS CORPORUM COELESTIUM in genere, tam ab Antiquis, quàm Recentioribus Astronomis habitis, præsertim

de observationibus fixarum Stellarum, adminiculo Telescopii, singulari usu & modo eas instituendi.



Isi Veteres Astronomi, inter quos maxime inclaruere Meton, Aratus, Aristillus, Timocharis, Calippus, Aristarchus, Hipparchus, Menelaus, Ptolemæus, & Albategnius,

Ortus & progressus Observationum Astronomicarum multè imperfectè laborat.

tegnius, indefessâ operâ, cœlestium corporum observationibus incubuerunt, & adhibitis organis non exiguis sumtibus paratis, nimirum Regulis Parallacticis, Armillis Zodiacalibus, Quadrantibus, Radiis, Annulis Astronomicis, Torquetis & aliis admodum defudarunt, motum Stellarum, præsertim fixarum, earumque longitudes, latitudes distantiasque rectè determinare: tamen abacum Astronomicum omnibus suis partibus expletum, tam quoad motum fixarum & præcessionem æquinocetiorum, quàm quoad quantitatem anni Tropici & Siderei nobis non reliquerunt: id quod posteriores accuratæ observationes, quæ prioribus in debitò puncto non respondent, clarè ostendunt, quemadmodum Stellæ fixæ ab Hipparcho observatæ, & à Ptolemæo in suo magno Astronomico opere promulgatæ satis probant; ita ut ex his facilè colligi liceat, quòd maxima causâ istius defectus, imperfectis organis Astronomicis sit adscribenda.

Et, quamvis Copernicus, ante centum, & quod excurrit annos, magniam ad hanc scientiam sideralem suis observationibus contulerit diligentiam, ut in observationes Veterum Astronomorum inquireret, & si fortè istæ cœlo aberrarent, correctiores cœlestium motuum Tabulas construeret: tamen, quia & ille parvis & maximam partem ligneis instructus fuit instrumentis, ideoque nec hic Astronomiam ad perfectionem potuit perducere, donec Nobilissimus & Celeberrimus Vir Ticho Braheus patrum nostrorum memoriâ huic studio incubuit, & ad hoc egregia, varia & pleraque metallica affabrè elaborata instrumenta, (utpote Quadrantes simplices & Azimutales, Parallaxica instrumenta, Armillas Zodiacales & Æquatorias, Arcum bipartitum & alia, quæ in Mechanicâ ejus Astronomiâ extant delineata) attulit. Etenim hisce organis justæ magnitudinis & exactioris operæ, per integros octo & triginta annos motum stellarum observavit, & non sine ingenti Astronomiæ commodo finit, sicut experientia optimos quosque Astrorum Consultos docuit. Primum namque hic incomparabilis Astronomus motum fixarum stellarum aliquantum diversum ab observationibus antiquorum Astrosophorum de-

prehen-

*Nobilissimus
Ticho Braheus
fuit in-
saurator A-
stronomia.*

prehendit nimirum, quòd intra annos 71¹2, in successione Signorum, unum integrum gradum progrediantur; non autem intra centum, ut Ptolemæus tradidit; neque intra 66. annos, velut Albategnius censuit insuper, omnium fixarum (quarum mille & viginti duæ priscis Astronomis innotuerunt) Longitudines & Latitudines, summâ diligentia observando, investigavit, consignavit, &, quicquid erroneum fuit, emendavit: quin etiam veram quantitatem anni tropici & sideris determinavit. Fundamentum verò motuum cœlestium non lubricum, sicut Veteres, constituit, qui longitudes fixarum, vel per Sirium, vel per Eclipses, vel Lunam, stellulam aliquam turgentem, vel, ut Hipparchus, per distantiam Lunæ à fixis indagavit; sed certiori viâ instituit, diurno tempore intercapedinem Veneris à stellâ Arietis inquisivit, & per hanc fixam ad reliquas progressus est: in quo instituto non intricarum Parallaxium coactus est habere rationem, sicut ipse Tycho lib. 1. Progymnasm. Astronom. pag. 103. tradit, quem Astrophilus consulat. Proinde tanti viri labor immensus, diligentia incredibilis, summaque industria, quam in his Astronomicis observationibus exactè restituendo & ad posteritatem transmittendo siderum motu adhibuit, non satis potest laudari. Hoc unum duntaxat fuisset optandum, ut suo tempore Telescopium esset adinventum, ejusque usus innotuisset: ita namque Catalogum Stellarum fixarum longè auctiorem reddidisset, eumque non tantum centum, sed mille fixis locupletasset; siquidem obscuriorum per universum Cœlum sparzarum, quæ nec à lynceo nudâ oculorum acie spectari queunt, ingens est numerus, sicut quemlibet observatio & attenta fixarum inspectio per Tubum Opticum satis edocebit. Has nebulosas & incognitas stellas, primum per specillum beneficio detexit & toti Mundo manifestavit magnus ille Galilæus de Galilæis, quemadmodum ex Sidero ejus Nuncio apparet, ubi pag. 31. & 32. scribit; quod sex stellis Tauri, quæ Plejades dicuntur (quandoquidem septima ferè nunquam apparet) aliàs 36. adjecerit, earumque interstitia, magnitudines, nec non veterum novarumque discrimen adnotaverit, ope eximii sui Telescopii. Sic etiam à Veteribus tres

Galilæi beneficio Telescopii, in diversis Asterismis plurimas stellas detexit.

E

tantum

tantum stellæ in cingulo, & sex in ense Orionis observatæ, & consignatæ fuerint : tamen iis octoginta eodem Tubo visus apposuit : quin & nebulosæ in capite Orionis, quæ vix visus acie fit conspicua, eodem Telescopio vidit insuper aditare unam ac viginti, ut & nebulosæ præsepis alias triginta sex.

Eandem stellarum frequentiam identidem & ego non semel, sed multoties, in his Asterismis, Telescopio meo conspexi ibique revera extare deprehendi : imò quascunq̄ue stellas in Cœlo per Opticum Tubum rectè constructum intueri lubet, circa eas statim, aliæ plures & minores diversæ magnitudinis, claræ tamen, radiis suis distinctæ, & majores circumdantes manifestè apparent. Tales Stellarum per Telescopium animadversiones ut sunt aspectu per jucundæ, mireque oculos afficiunt : ita quemlibet industrium Astrophilum meritò excitant, ut ejusmodi stellarum copiam, in cæteris quoque Asterismis cœli, querere & diligenter observare studeat. Eodem amore & desiderio sidera cœli contemplandi & ego bonæ notæ Telescopiis instructus, jam dudum captus fui. Postquam enim Tubi mei Optici Planetæ Iovis Comites quatuor mihi sæpe numero rectè detexerant & ostenderant, ad alias quoque stellas indagandas multò cupidissimè sum progressus. Hinc Anno Christi 1642. Mense Augusto & Septembri, ut & Anno subsequente 1643. mense Octobri, non solum Iovem, ejusque Satellites, in signo Aquarii stellato commorantes, per Telescopium inspexi, sed & illud ad vicinas stellas & inprimis ad eas, quæ sunt interceptæ inter primam fusionis aquæ quartæ magnitudinis, secundum Vranometriam Bayeri, & inter stellam in primo flexu aquæ duarum sequentium quintæ magnitudinis, applicavi, quas in subjecto diagrammate per A & C notavi : ubi in hoc spatio cœli alias insuper stellulas diversæ magnitudinis & coloris, numero scilicet triginta tres, eodem observavi telescopio : quamvis enim globo Cœlesti Tychonico & canone restituti motus fixarum ejusdem Tychonis, per hunc cœli complexum, septem duntaxat reperiantur : tamen illarum longè plures, nempe quadraginta, numeravi, magnumque adhibui studium, ut singularum longitudes, Latitudines & distantias accuratè

*In Asterismo
Aquarii inter
stellam i
fusionis aquæ
& primam
flexu aquæ,
duarum se-
quentium
complexum
33 stellula-
rum notavi.*

Longit. 13 11 17 1. 31 A. A
 Longit. 34 22 17 1. 31 B. B
 Longit. 18 9 17 1. 31 C. C
 Longit. 28 32 17 1. 31 D. D
 Longit. 22 46 17 1. 31 E. E

Pars Gemellationis Piscium, cum notis
 factis, in eadem regione, Anno 1643.
 Die 2 Octob.

A. Duxum originem unicolorum. 6. BR
 B. Euxum originem al. 5. BR
 C. Duxum originem unicolorum. 5. BR
 D. Duxum. 5. BR
 E. In his locis in ceteris procedunt. 5. BR



Fig. E.

John Suckling

accuratè determinarem & in chartam legitimo referrem ordine, quas omnes in apposita figurâ D exhibeo. Deinde, propè parvulam stellam B, in primo flexu aquæ duarum antecedente (etiamsi adeò sit exigua, ut vix à perspicacissimi visus acie prædito cerni queat) novem adhuc alias, & sinistram versus secundum successionem signorum quinque insuper diversas, & notæ stellæ C quartæ magnitudinis vicinas Tubo deprehendi intra 12. & 15. gradum piscium. Inter quas unica tam parva est, ut non nisi per eximium Telescopium possit conspici.

Cæterùm de his quinque minimis stellis, à me noviter in cœlo repertis, subsequente capite pluribus agam, præsertim quum me ad hoc institutum quasi invitent literæ Patris Antonii Mariæ de Rheita, quas postridie Nonas Ianuarii, Anni Christi 1643, ad Præclarissimum Puteanum exaravit. Præterea alias novas & ante hac incognitas exiguas stellas in Asterismo Piscium (ad quarum contemplationem me Iupiter eâ in parte Zodiaci versans excitabat) & quidem inter A duarum exiguarum antecedentem sextæ magnitudinis, & E in lino boreo à connexu præcedentem, numero unam & viginti observavi; quamvis prioribus Astronomis quinque duntaxat perspectæ fuerint. Longitudines quoque & Latitudines earum non minori operâ, quam antecedentium, à me supputatæ & adjectæ sunt. In hisce verò observationibus, illud inprimis consideratione dignum est; quare reliqui Astronomi Telescopiis instructi stellas omnes fixas, tum antè quidem cognitatas & in globo cœlesti consignatas, tum noviter repertas, nec nudis oculis obvias, non in tali proportione ac magnitudine, quali aliàs Planetæ & reliqua objecta apparent, conspiciant; sed absque Tubo stellæ hæcenus cognitæ ferè majores apparent, propter radios & lumen illorum adventitium. Præterea non aliter hæc stellæ conspiciuntur, tum interveniente Telescopio, tum sine eo, dentatæ, radiantes, scintillantes, interdum etiam non rotundæ, coloratæ, minimè verò planæ & sine radiis, quemadmodum Sol, Luna, & reliqui Planetæ omnes, exceptis Iovialibus. Ex quibus quidem colligere licet, permagnam & ferè incredibilem earum distantiam à terrâ, eò quod Tubus Opticus in augendâ

*In Asterismo
Piscium, 21.
Stella parva
fuit à me
animadvertita.*


*Mathematici
hæcenus
stellas fixas
per Tubum
Opticum rotundatas absque
radiis aspiciere haud potuerunt.*

rerum quantitate nihil efficere possit, quum tamen is tam Solis, quàm reliquorum Planetarum (qui etiam aliquot mille semidiametris terræ à nobis removentur) magnitudines adaugeat: uti Galilæus existimat, & reliqui quoque Mathematici sunt ejusdem sententiæ, quòd eodem tubo, quo Planetæ & reliqua rotunda corpora non aliâ, nisi hac ipsâ cernantur figurâ, fixæ tamen stellæ non orbiculas videantur; ita ut mirari subeat, cur Galilæus, & alii, quibus non defuerunt optima Telescopia, fixas nunquam rotundas, radiorum expertes, nec ampliori quâdam magnitudine præditas, conspicati sint; quum tamen ego meis Tubis eas contrâ sæpius rotundas deprehenderim, & semper tales, quotiescunq̃ placuerit, intueri possim; quemadmodum illi testimonium perhibebunt, qui meis tubis usi, ejusmodi formâ rotundâ illas viderunt.

*Quomodo
Telescopium
sit adornan-
dum, ut quo-
vis tempore
stella fixa ro-
tunda. Cra-
diis adventi-
tium excita ap-
pareant.*

At fanè alio modo Telescopia mea apto, cùm iis fixas contemplor, quàm, cùm ea ad Planetas Iovem, Solem, Saturnum vel Lunam adhibeo. Qui aptandi tubos modus huicq̃ rei accommodandi ut perfacilis ei videbitur, cui semel fuerit demonstratus: attamen parvi non est æstimandus, eò, quòd à tantis tamque perspicacibus Viris hætenus animadversus neutiquam fuerit. Namq̃ue etiamsi Galilæus papyro foramine perforatâ, oculoq̃ue adnotâ, fixas rotundas & orbatas radiis adventitiis conspexerit, tamen hac ratione minutissimæ in obtutum venerunt, ita ut quandoq̃ue præ nimia parvitate visum effugerint. Alioquî certum est, quòd Galilæus fixas nunquam rotundas Tubo potuerit aspicere; sicut verba ejus, quæ in Nuntio Sidereo pag. 30. extant, id testantur: *Fixa Stella* inquit, *peripheriâ circulari nequaquam terminatæ, conspiciuntur, sed veluti fulgores quidam radios circumcircâ vibrantes, atq̃ admodum scintillant es: consimili tandem figurâ præditæ apparent cum Perspicillo, ac dum naturali intuitu spectantur.* Neque alii Mathematici suis Telescopiis id præstare potuerunt, inter quos est etiam Hortensius. Is enim in dissertatione de Mercurio pag. 37. ita scribit: *Quòd Telescopium non omnes radios adventitios stellarum abscindat, non aliundè est, quàm à forti earum radiatione, ut in fixis Marte & Mercurio, in quibus & parvitas corporis facit, ut nunquam exactè rotundi & calvi, sed semper hirsuti compareant &c.* Negat etiam Kepplerus ullam quantitatem stellarum fixarum, sub specie

specie rotundicorporis detegi, per inspectionem Telescopii, afferitque, quò perfectius instrumentum, hoc magis fixas representari, ut puncta mera, ex quibus radii lucidi in speciem crinium exeunt, dispergunturque; veluti hæc verba adducit. *Herigon lib. 2. Theor. Planet. pag. 619.*

Ego verò, ut paulò ante quoque dictum, commodè per meum Tubum fixas rotundas possum inspectare, & reliqui tali figurâ eas conspicient, si modo præstans adfuerit tubus & cum rectè tractare noverint: non tantùm enim orbiculate, ut aliàs per papyrum perforatam inspecte videntur, sed & satis magnæ, secundùm proportionem inerrantium, apparent. Quocirca cum tubo hac simplici, faciliq; viâ procede. Accipe Tubum, qui observationibus Iovis ac Lunæ accommodatus est, & angustius redde foramen convexi lenti proximum, vel novam chartam impone, cujus foraminis circumferentia magno pîso sit æqualis, vel vacuum excavatum, æquet circumcirca parvitatem subjecte formæ in orbem actæ . Quo factò, Telescopio fixas primæ vel secundæ magnitudinis intuerè, & tum eas exactè rotundas suoq; colore conspicuas, unamq; omninò alterâ majorem deprehendes: Arcturus namq; major apparebit, quàm Aldebaran; Aldebaran major, quàm Cor Leonis, & sic consequenter, ita ut non sine admiratione quispiam eas spectaverit.

Hoc igitur parvum foramen, in primis adhiberi potest ad inspectionem illarum stellarum, quæ valentiore lumine præditæ sunt, puta Veneris, Sirii &c. Verùm stellis languidioris luminis, sicut est Aldebaran & aliæ, convenit nonnihil amplius foramen, & hoc angustiori est præstabilius. Sin verò placet, minores illas novas stellas, quarum ingens est multitudo, tubo vestigare & detegere; maximè idoneum est foramen amplum, in quo tantùm hoc desideratur, quòd stellæ per hoc inspecte non appareant rotundæ. Sic & maculis Lunæ spectandis, tale foramen aptum est. Quare, quò fortiores radios stellæ vibrant, eò minus eis competit foramen, ita tamen, ut non sit infra parvitatem jam delineatæ cavitatis. Ejusmodi parvo foramine Marti quoque & Mercurio adventitii radii prorsus possunt adimi. Et
licet

Quibus parvum foramen, & quibus amplius conveniat?

licet Veneri admodum fulgens insit lumen, præcipuè, quando plena est lumine, circa Apogæum, & propiùs abest à Sole, ubi valentiſſimos vibrat radios: tamen, prædicto modo, & radios adventitios detraxi, & planè rotundam conspexi. Hoc loco etiam illud monendum, nec animadversione indignum duco, quòd Luna per hoc parvum foramen spectata parùm videatur, parumque transluceat; remoto autem hoc parvo, & substituto majori, pristinoque foramine, omnia distinctè clareque in lunâ queant considerari. Etsi verò hic modus observandi stellas fixas minus operis & industriæ requirit: tamen mihi persuadeo, quòd impostherum diametri visibiles fixarum, hac ratione certius & expeditius exquiri, & proportio earum inter illas & Planetas Venerem, Iovem & Saturnum, exactius, quàm nudo visu, investigari possit.

Quomodo di-
ametri fixa-
rum possint
observari,

Cur fixæ &
nonnulli Pla-
netæ adeò
validè scin-
tilent, & su-
as inde dia-
metros am-
plient?

Sed, hac occasione, quispiam fortè quæret, quâ fiat, quòd fixæ, quemadmodum & Venus & Mercurius tam fortiter scintillent, & majores, quàm revera sunt, appareant? Huic respondeo, quòd hæc corpora cœlestia præ reliquis luce clariori, acutiori, eminentiori & penetrabiliori prædita sint, & hinc majorem in foramine pupillæ inducant reflexionem: unde scilicet lucidiora & grandiora effulgent, quàm reliqua minùs fulgida. Huic astipulatur Galilæus, inquiens: *Objecta quantò vividiorè lumine sunt, tantò magis diffundi videntur.* Quòd igitur fixæ adeò tremulo motu suos vibrent radios, & valentius lumen, quàm pleriq; Planetæ, præ se ferant; hæc procul dubio caussa est, quia lumen suum non à Sole mutuatur, sed à DEO nativum, propriumque lumen accepere. Hinc etiam intelligi ratio potest, cur fixæ, quæ multis radiis adventitiis abundant (sicut talis est canis major) & sub aspectum veniunt, nobis majores appareant, quàm ipse Iupiter; detracto autem capillitio, statim minores evadant Iove, qui lumen non adeò fulgidum & penetrabile, sed imbecille ac moderatum obtinet? Ita enim Sirius aliquantò tantùm major cernitur, quàm Aldebaran, quum tamen quoad corpulentiam (si nudus oculorum aspectus hic judicare debet) triplo major Sirius, quàm Aldebaran, appareat; quam apparentem magnitudinem diffusum illud radiorum capillitium efficit.

Quare fixæ
majores ap-
pareant, quàm
revera sint?

ficit. Hujusmodi exemplum mihi anno Christi 1644. die 22. Martii, Vesperi, horâ septimâ, occurrit, ubi Iovem Veneri conjunctum & alterum Planetam ab altero 45. min. vel circiter distitum, & soli propemodum æquè vicinum, conspexi: Venus autem multò major, quàm Jupiter, in aspectum veniebat, quoniam primùm terræ vicinior erat, & deinde fulgido gaudet ac diffuso lumine, unde radii adventitii oriuntur, qui in oculis meis majus Veneris jubar efformabant, ita ut incredibilis magnitudinis utriusque Planetæ differentia mihi videretur. Postquam verò Telescopio capillitium Veneri ademeram, tantùm aberat, ut Iove major, ut potius minor eo, cerneretur. Proinde valido stellarum lumine quandoque decipi possumus, ut corpus stellans magnum existimemus, quod tamen revera minus est, præsertim deficiente claro hujus corporis minoris celestis lumine: tunc enim eò magis radii adventitii accrescunt, secundùm hanc Galilæi in Nuncio Sidereo pag. 32. regulam: *Luminis augmentum magis magisq̃ increfcit, prout lucidorum parvitas decrefcit.*

Veni per Telescopium inspecta, longè minor leve apparet.

Porro, ope hujus Telescopii, quoque cognosci potest, quid sit *via lactea*, quæ semper affulgente serenitate, in certo cœli loco conspicitur: de quâ Philosophi, cum primis Peripatetici, complures disputationes, amplosque commentarios nobis reliquerunt, in quibus alii eam volunt esse meteoron, alii aliquid ab hoc diversum. Iam verò beneficiò Telescopii certò constat, *Galaxiam* seu *Viam lacteam* nihil aliud esse, quàm innumerarum exiguarum stellarum densam coacervationem, ingentemque cumulum, in quâ plurimæ satis magnæ & valde conspicuæ apparent, sicuti cuilibet bono Telescopio instructo licet oculorum sensu intueri. Sed, quærat hîc aliquis, quomodo earum observatio sit instituenda? Is sciat, ad hunc scopum facillè perveniri posse, modò in promptu sit nobile Telescopium. Nam, si hoc in quamlibet cœli regionem manu dirigatur, tunc diligenti observatori istiusmodi stellulæ frequenter ante oculos versabuntur, præsertim si crebris actionibus huic observandi labori adfuetus fuerit. Inexercitati plus hîc laboris & tœdii experientur; ita, ut quandoque cœperint antè defatigari, quàm unicam

Via lactea est innumerarum parvarum stellarum cœgens.

Modo explorandi incognitarum stellarum frequentiam.

exigu-

exiguam stellam quærendo investigare, eò quòd instrumentum Opticum nequeant immotum tenere. Hinc licet ejusmodi exiguæ stellæ interdum sub aspectum cadant, tamen, priusquam rectè considerari & numerari queant, ob agitationem instrumenti Optici, rursus evanescent & inconspicuæ fiunt. Propterèa illis suadendum est, ut instrumentum peculiare sibi curent fabricari, in quo si Telescopium collocetur & semel rectè disponatur, tunc, arbitrato suo, quisque has exiguas & multò plures alias stellas poterit inspicere & contemplari.

Tale instrumentum Solertissimus Dominus de Cartes in suâ dioptricâ pag. 132. quidem descripsit : at quia illud ut usibus meis deserviret, in commodiorem formam redegi. Quia istud autem haud adeò difficulter est parabile, ideoque in gratiam Astrophili schema ejus hic apponam, & simul, quomodo illud secundùm omnes suas partes construendum sit, breviter indicabo. Constat enim distinctis membris, quæ inter se aptè conjunguntur, sicut ex apposita figurâ patebit. Habet scilicet quatuor pedes, qui fulcro decussatim ordinato innituntur, & partem b muniunt; fulcro decussato adherent quatuor trochleæ, quæ faciunt, ut hoc instrumentum in quolibet pavimento firmiter queat collocari; b iterum magnâ ex parte est excavatum, ita ut in eo lignum i, cum oblongo ejus terete possit moveri, ipsumque instrumentum dilatari. Ut autem dilatatum maneat, trochlea lateri i est adjuncta, ut non solum longius educi, vel, re exigente, contrahi; sed & trochleâ queat firmari. Sic & superior pars c constat lignis cavatis, ut lignum teres d in eo quoque ad quodvis latus commodè flecti & dirigi, sine ullâ fulcri agitatione, & nihilominus trochleâ c stabiliri possit. Quod alterum lignum majus & longius e attinet, illud in foramine partis superioris d, fursum ac deorsum movebis, secundùm quamlibet positionis differentiam, ad quam stella conspicienda vergit, eamque in arcu f trochleâ itidem firmabis. Huic ligno e in superiori parte nonnihil excavato Telescopium imponitur, & funiculo illigatur. Quod si stella in altitudine 80. vel 90. graduum versatur, instrumentum magis educendum, & in altum eò usque elevandum est, donec
 sine

Fabrica instrumenti cui Telescopium imponi, & quolibet stella oculo armato inspicere & accuratè considerari potest.



sine nimiâ corporis inclinatione, observator Telescopium altitudini stellæ convenienter accommodaverit : id quod ope hujus instrumenti haud ægrè potest obtineri. Insuper etiam cum hac parte instrumenti e, Quadrans major vel minor potest connecti, ut simul altitudo stellæ præcisè innotescat, nec opus sit Quadrantem manu tenere : ita enim inter observandum non facîle titubabis, sed sine hesitatione, altitudo stellæ tibi in Quadrante monstrabitur. Etenim, postquam Instrumentum hoc, ad locum optatum stellæ, prout situs id efflagitaverit, congruenter est ordinatum, & expetita stella inventa, statim trochleâ firmetur; ita namque perpendiculum immobile, in Quadrante index erit gradus elevationis Stellæ : manibus autem Quadrans retentus ex facili vacillat, unde & gradus, præsertim in parvo Quadrante, huc illuc quoque nutare solent.

CAPUT IV.

DE OBSERVATIONIBUS PLANETARUM, præcipuè Saturni, Iovis, Martis, Veneris, Mercurii & Stellarum Iovialium, cum propriis, tum alienis primariorum aliquot Astronomorum : ubi & breviter demonstratur, quinque illas novas stellas nuper à P. Antonio Mar. de Rheita animadversas, quas Urbanoctavianas appellat, & circumjoviales esse contendit, revera non fuisse Ioviales, sed maximam partem novas, incognitas fixas.

Siquispiam tempore priscorum Philosophorum inventus fuisset, qui docuisset, non omnes Planetas esse rotundos, neque numero septem, sed undecim, & forsitan etiam plures reperiri, Martem item Venerem & Mercurium lumine suo, adinstar Lunæ decrescere & accrescere, ut alia nova fideralis Scientiæ inventa taceam; certè doctrina ejus, velut absurdissima & ineptissima rejecta, isque homo haud dubie simplex, rudis, & imperitus habitus fuisset. Postquam autem Tubi optici sunt adinventi, eorumq; usus longè utilissimus per-

F

spectus


*Posterior a-
ta semper
aliquid novi
apparat.*

spectus & Cœlestibus corporibus contemplandis accommodatus, hæc jam dicta sententia Paradoxis, à Mathematicis non annummeratur; eò quòd hæc & alia mirabilia Phœnomena, nobilis Telescopii ope detegantur, ut ut Periparetici Philosophi, de certitudine hujus rei adhuc multum dubitent. Quamobrem constitui, in hoc capite succinctè recensere, insignium quorundam & fide dignorum Mathematicorum observationes, circa hosce jam memoratos Planetas, iisque proprias meas addere, quas oculari per Telescopium inspectione, mihi comparavi, & verissimas esse deprehendi.

Saturnum telescopio primùm ovalis, deinde, in utroq; latere, ex duobus insuper globulis compositum, hæcenus apparuit.

Quod igitur primùm ad *Saturnum* attinet, is jam inde usque à multà antiquitate ipso oculorum testimonio non refragante, rotundus habitus est: postquam autem oculo armato inspectari cœpit, ovalis ferè, sicut Kepplerus, & alii Mathematici contestantur, apparuit. At simul atque hoc instrumentum opticum perfectius est redditum, de die in diem, per Telescopium magis elaboratum inspectus, non solùm ovalis, sed & in utroque latere duobus adhærentibus globulis præditus apparuit, ita ut ex tribus partibus compositus videatur, quemadmodum ex præsentè figurâ G, apud B, manifestum est. Hac specie Saturnum sæpenumero conspexi, utpote, Anno 1643. mense Octobri & Novembri: duo adhærescentes globuli ut plurimum Eclipticæ parallelæ erant. Totus autem sum in hac opinione, quòd non semper Saturnus oblongus, & quidem duobus parvis globulis acuminatus appareat, sed quòd interdum hi globuli post Saturnum latitent, quasi duæ stellæ (& quidem definitis temporibus) quæ Saturnum circumeunt. Memini namque, quòd ipsum, mense Septembri & Octobri, Anni 1642. planè rotundum conspexerim, & quidem distinctis vicibus. Eandem figuram in Saturno quoque observavit, Summus Philosophus & Astronomus P. Gasendus, Lutetiæ Parisiorum, eodem anno, mense Augusto, ut extat in ejus judicio de novem stellis circa Iovem visis pag. 14. Atque refert ibidem, quòd Galilæus ante 30. annos, eum quoque tali figurâ rotundâ suo telescopio spectaverit. Adhæc de eadem stellâ Saturni commemorat Matthias Hirschgarter, in suâ detectione dioptricâ, quòd

Duo globuli Saturno adhærescentes, videntur duæ stellæ cum orbentur.



G. G.

G. G.

quòd Primarius & Nobilissimus Vir, cui nomen Fontana (sicut ex aliis illud nomen didici) Neapolis, egregio quodam Tubo hunc Planetam inspexerit, eumque planè aliâ & diversâ, quàm cæteros, formâ observaverit: siquidem in quolibet latere, loco supradictorum globulorum, anfulam bifectam adjacentem vidit, ita ut quælibet à vero corpore distincta, sensu oculi armati percepta sit, & per cujuslibet ansulæ cavitatem prospectus in cœruleum cœlum ac æthera patuerit; veluti apud præfatum Autorem pag. 22. scriptum legitur. Ejusmodi faciem Saturni in præfens diagramma G retuli, & apud A consignavi.

Hæc relatio de stellâ Saturni multis perquam admirabilis & vix credibilis videtur; nec ego diffiteor, quòd initiò me ab assensu sustinuerim: postquam autem longiores ac meliores tubos mihi comparavi, & per eos Saturnum inspexi, hanc jam descriptam faciem Saturni non merum somnium esse, sed magnam partem ita cerni reapse deprehendi. In nonnullis tamen partibus aliquantum diversam ejus faciem animadverti ab eâ, quam paulò ante designavi. Medium enim, idemque maximum corpus Saturni, in oblongiori formâ mihi apparuit; Brachiola quoque utriusque lateris, ex parte alia mihi visa sunt: siquidem illa inter se, cum medio corpore Saturni adeò arcè non cohærebant, sed ubi in unum continuum Corpus coire & cohærescere debebant, in tam acutam & exilem cuspidem definebant, ut non percipi posset, quòd cum oblongo Saturni corpore strictè copularentur: præterea spatium, quo Brachiola ab ipso Saturni corpore aliquo modo separabantur, per quæ cœruleum cœlum licebat intueri, non æquabat istam latitudinem, quàm prior figura repræsentat, sed minus erat. Insuper, quod in exprimendâ verâ hujus Planetæ formâ maximè dignum est animadvertione, uterque arcus, tam interior, quàm exterior, brachia terminans, nequaquam sectionem circuli, ut ab Eximio Fontana annotatum; sed parabolicam, seu potius hyperbolicam sectionem refert; sicut ex figurâ C cognoscitur. Hanc enim veram esse Saturni faciem, longo & exquisitæ operæ tubo accuratè intueri, omniaque probè considerare potui, ita ut

*Alia facies
Saturni à
Nobil. Fontana
observata.*

*Facies vera
Saturni de-
scribitur.*

unusquisque, qui cupiditate reperiendi veri ducitur, huic indefessæ observationi tuto possit fidere.

*Cui facies
Saturni non
eadem appa-
ret?*

Si verò quispiam suo tubo Optico, quem nihilo deteriore esse judicat, hæc omnia non tam exactè inspicere & distinguere poterit, is sciat, etiamsi hæc Telescopia diligentissimè & perfectè ex sphericâ sectione sint elaborata, & longitudine sex vel etiam octo pedes adæquent, nihilominus tamen jam memoratam Saturni faciem, omni ex parte non representent, sed si vel omnium optima sint, nec tamen hanc magnitudinem excedunt, non plus detegant, quàm loco brachiorum, suprapositos sub figurâ B duos globulos. Quandoquidem ad hoc negotium requiritur tubus aliquantò longior, & ad minimum undecim vel duodecim pedibus productus; quin & nullâ imperfectione laboret, sitque claris ac perpolitis lentibus præditus necesse est, id quod plerunque tam longis solet deesse.

*Qualia cor-
pora sint brachio-
la Saturni
nondum
potest defini-
ri.*

Qualia verò sint corpora hæc duo brachio-
la Saturni; utrum
semper ejusmodi facie, instar lunæ crescentis, & decre-
scentis, & in eadem distantia à Saturno, & equali latitudine sint conspi-
cua; vel an ex parte rotunda sint corpora, quæ definitis tempo-
ribus augeantur & minuantur, motum suum variant, & quan-
doque propius ad Saturnum accedant, quandoque etiam pla-
nè occultentur? nondum hac vice possum determinare. Hic
quippe Planeta tardissimè suam periodum absolvit, & præterea
diligentissimas plurium annorum observationes per supradi-
ctum longiorem, & suis affabrè politis lentibus instructum tu-
bam desiderat. Itaque judicium meum suspendo, & hanc ma-
teriam in aliud tempus reservo. Atque hæc pauca quidem
hactenus de Saturno.

*Verò facies
ut apparet?*

In stellâ IOVIS etiam occurrunt non unius generis me-
morabilia, ope telescopiorum præstantiorum observata. Glo-
bus equidem Iovis non infuetâ & peregrinâ formâ, instar Sa-
turni, sed satis rotundus conspicitur: nihilo tamen minùs de-
prehendere licet, eum non esse omnibus numeris orbiculatum,
neque politum instar tornati ac lævigati globi: quoniam si il-
lum per tubos meos (quorum adminiculo diameter ejus sex,
imò verò septem ferè digitos æquat) inspecto, discum ipsius
minùs

minùs radiosum, atque magnis certisq̃ue maculis conspersum, ad exemplum ferè Lunæ, reperio, quæ cæteris partibus longè obscuriores cernuntur.

Hanc figuram Iovis perquàm diligenter, quoad fieri potuit, in Diagrammate antecedente, penes E volui exprimere. Propter immensam autem distantiam Iovis à Terrâ, hæ maculæ nondum telescopiis hætenus usitatis, etiamsi præstantissima sint, internosci & à se invicem, (prout Maculæ Lunæ) distingui potuerunt. Interea speramus Telescopia longè perfectiora, ex sectionibus Conicis hyperbolicis in medium allatum iri, quæ figuram formamq̃ue cælestium corporum adhuc apertius, illustriùsq̃ue detectura sint.

Cœterùm, quòd hæc stella IOVIS semper aliis exiguis Planetis, qui Sidera Medicea, Ioviales, Circumjoviales, & Iovis Comites appellantur, & Iovem Satellitum instar concomitantur, cinctâ sit, jam omnibus ferè Doctis notum est. Hos parvos circumjoviales Planetas, primus Galilæus de Galilæis, suo eximio Telescopio Anno 1610. detexit, sicut observationes ejus in Nuncio Sidereo publicatæ, nos docent. Quin & paulò post Simon Marius hosce Iovis Comites in suo Mundo Ioviali prolixè descripsit, & pariter ex assiduis eorum observationibus, Tabulas motuum eorundem deduxit. Et, quia horum Iovialium animadversiones non minùs delectabiles, quàm utiles sunt, ideoq̃ue & ego istorum observationibus Anno 1642. 1643. 1644. & 1645, creberrimè & diligenter invigilavi, ex quibus miros ac concitatos illorum motus, & inprimis arctas visuq̃ue jucundas conjunctiones, & nonnunquam eorum eclipses animadverti. Horum igitur Planetarum Iovialium omnes & singulas observationes aliquot figuris, servatâ ubiq̃ue debitâ proportione, proposui, ut & exiguarum fixarum novarum, quæ circa Iovem sunt visæ, iconismum, sub finem hujus tractatus, loco appendicis, exhibui & adjeci. Hæ observationes quotidie fuerunt continuatæ, quando per serenitatem cœli licuit, ita ut unâ nocte quinquies, imò etiam sexies, quandoq̃ue has animadversiones reiteraverim: singulis etiam observationibus, suum competens verumq̃ue tempus, unâ cum descriptione situs Ioviali-

Jupiter 4. exiguis Planetis circumjovialibus est.

1642-1645

Iconismum Iovialium & fixarum novarum ubi extat?

Iovialium addidi. Id quod, quantum ego scio, post *Galileum* à nemine adhuc in tali formâ est præstitum. Interim optandum esset seriò, ut ejusmodi observationes Iovialium, antehac ab Astronomiæ Cultoribus sæpius fuissent institutæ, & quotannis adhuc instituerentur : hoc namque pacto interdum ex conjunctionibus Iovialium, præsertim Iovi viciniorum, quæ fiunt ex motu contrario, in diversis ac longè distitis locis, & ex notatione temporis occultationis alterius ab alterâ (id quod ex altitudine alicujus fixæ captâ, certè cognosci potest) longitudines locorum, ob velocem horum comitum Iovis incessum queunt investigari, vel minimum eorum motus examinari & corrigi. Nam licet Simon Marius jam fundamenta horum motuum jecerit, tamen ipse pag. 10. Mundi Iovialis ingenuè fateatur, ipsos nondum ad suam perfectionem, ut quidem par esset, fuisse perductos. Proinde quoniam hæ conjunctiones Iovialium non infrequentes sunt, idcirco ex earum observationibus utilitas haud exigua in universam Sideralem Scientiam redundabit. Hinc incitatus sum, ut hæc jucundas ac notabiles conjunctiones, tam inter sese, quàm cum Iove sæpius observaverim, sicut ex observationibus Iovialium apparet. Nam Anno 1642. die 20. Augusti S. N. horâ 11. min. 40. ubi exigua stella B à Iove tegebatur : at mediâ duodecimâ, quod tempus 10. minutis anticipat, adhuc erat conspicua. 2. Die 17. Septemb. horâ 9. min. 46. 3. Die 20. Septemb. hor. 10. min. 44. 4. Sic & die 23. Septemb. ejusdem anni 1642. erat conjunctio vicinorum Circumjovialium, ita ut una planè alteram cooperiret. 5. Die 4. Octob. similis accidebat Conjunctio. 6. Die 26. Octob. hor. 8. min. 45. ut & die sequente, iterum erat arcèssima duarum synodus. Atque ejusmodi coitus sæpius eveniunt, quemadmodum unusquisque cultor Astronomiæ poterit spectare & observando experiri. Etenim omnes quatuor interdum in unâ rectâ lineâ rectâ conspiciuntur; nonnunquam una & altera parvam admittit latitudinem : quandoque tres unum efficiunt triangulum : aliquando majores apparent. Causam verò hujus diversæ apparitionis paulò post edisseram. Nam initio hic sciendum est, quòd quatuor Iovis Comites, & noviter re-

Observationes Iovialium, ad investigandas locorum longitudines inserviunt.

Observationes arcium conjunctionum & Eclipsium Circumjovialium.

De naturâ & proprietate Circulorum Iovii.

ter reperti Circumjoviales Iovem, tanquam centrum suum, respiciant, eum semper concomitentur, salvo motu ipsorum proprio, sive ille sit directus, sive stationarius, sive retrogradus, ita ut circa Iovem circumagantur, sicuti cæteri Planetæ circa Solem.

II. Deinde; quòd motus illorum sit ab occasu in ortum secundum s. f. dum in ulteriori parte Iovis moventur, & rursus, dum ad citeriorem partem feruntur ab occasu in ortum, & quòd usque & usque in rectâ lineâ videantur, modò respectu Iovis in ortu, modò in occasu; eò quòd orbitæ earum Eclipticæ sint parallelæ.

III. Adhæc notandum, quòd interdum sint parvæ latitudinis, tam Borealis, quàm Australis, participes: et quidem Australis, cum à nobis sunt proximè remoti; Borealis autem, cum nobis sunt proximæ. Id verò in maximis elongationibus à Iove non contingit; siquidem tunc Eclipticæ parallelæ incedunt. Atque hoc ipsum Simon Marius in Mundo Ioviali confirmat.

IV. Insuper, quòd Mercurius Iovialis semper majorem admittat latitudinem, quàm Venus Iovialis, & hæc rursus majorem, quàm Iupiter Iovialis, & sic consequenter: ita tamen, ut nunquam earum latitudo tanta sit, ut Iovem supra vel infra timeant.

V. Præterea observandum, quòd Motus earum periodicus sit inæqualis circa Iovem: quòd namque ei sunt propiores, eò velociores; quòd remotiores verò ab eo, & suis elongationibus sunt viciniore, eò tardiores incedunt, ita ut ferè Stationarii videantur.

VI. Porrò animadvertendum, quòd remotior à Iove, Saturnus nimirum Iovialis, nunquam à Iove, vel dextram vel sinistram versus, plus deflectat, quàm 13. vel 14. min. primis, quòdque suum integrum circulum peragret 16. dieb. 18. hor. & 9. min. At verò Iupiter Iovialis octo tantum min. primis ab Iove digreditur, suamque periodum conficit 7. dieb. 3. hor. & 57. min. Tertia nempe Venus Iovialis, quinque duntaxat min. primis à Iove recedit, & absolvit suum motum, 3. dieb., 13. hor. & 18. minut. Vltimus, Mercurius scilicet Iovialis, à Iove solum abit, 3. minutis

minutis primis, & suum curriculum velociter peragit, intra diem unum, 18. horas, & 28. minuta, secundum Tabulas Simonis Marii, quarum certitudinem quilibet Astronomus, meis suisque observationibus, explorare poterit.

VII. Adde, quod proprio destituantur lumine, illudque tuò à Sole, non autem à Iove, accipiant, atque hanc ob causam, non tantum à corpore, sed & umbrâ Iovis eclipsin patiantur.

*Cur Ioviales,
interdum ma-
jores, interdum
minores
appareant?*

VIII. Sequitur, ut rationem reddam, cur hi satellites Iovis quandoque minores quandoque majores appareant? Itaque dico, causam hujus apparitionis diversâ, esse sphaeram vaporosam, quæ æquè Iovi atque Lunæ competit, & necessariò densior est, quàm aura ætherea. Quocirca, quando Ioviales in ulteriori parte Iovis versantur & sphaeræ ejus vaporosæ objiciuntur, suntque à nobis remotiores; sequitur, ut majores nobis appareant, quàm si in ceteriori parte Iovis & atmosphaeræ ejus incedunt. Etenim ex Optices Doctrinâ constat, quod omnes radii in densius diaphanum incidentes refringantur ad perpendiculum, & inde angulus visionis dilatetur, omniaque objecta appareant majora, sicut ex *Maurolyci libro primo, Theor. pag. 36. &*

*Objectioni
cuiusdam oc-
curritur.*

ex Vitell lib. 30. Theor. 35. & 41. discitur. Sed hîc forsan nobis quispiam posset objicere, quod contrarium potius inferatur, ex majori distantia harum exiguarum stellarum: nam, quò remotiores à nobis essent, eò minores apparerent, & quò propiores, eò majores. Verùm ad hoc respondendum est, quod harum Circumjovialium distantia & latitudo, orbium respectu Terræ non attendi debeat: siquidem aliquot pauca tantum minuta à Iove recedunt, & ideo tantilla distantia hosce Comites Iovis non duplo majores reddere, neque etiam communis refractione hîc aliquam evidentem variationem adferre potest; eò quod hæc apparitio satellitum Iovis accidat, quando Iupiter supra horizonta est altius elevatus, & ab omni refractione liberatus. Et tantum de naturâ & motu horum quatuor novorum Planetarum, stellarumque Iovialium, succinctè dictum esto: nullum namque alium, vel numerum, vel motum, hîc deprehendere potui, ut ut semper vigilem oculum ad earum contemplationem crexerim: neque, quod sciam, ab alio deprehensus est. Quan-

Quanquam, ante paucos annos, nimirum, sub exitum anni 1642. è religiosa familiâ, *Antonius Maria de Rheita*, in quâdam epistolâ, ad Clarissimum Puteanum, (cujus ante quoque meminî) perscriptâ adseveravit, à se insuper Colonia Agrippinæ, quinque novas Ioviales repertas & jam memoratis quatuor additas fuisse: sed (quod veniâ ipsius dixerò) præcipitantia definiendi, ipsum in errorem conjecit. Quinque quippe stellas fixas novas putavit esse quinque erroneas Ioviales: quemadmodum à Præclarissimo P. Gassendo, in judicio de novem stellis circa Iovem visis sufficienter demonstratum est. Vnicum tamen, in eo judicio, aliquis desideret quod Cl. Gassendus existimet, hæc quinque stellas esse ordinarias illas in Asterisino Aquarii, quæ quoque in Globo Cœlesti consignatæ reperiuntur, & etiam à me inter fixas præcedentis figuræ D positæ & literis C, D, E, F, G, notatæ sunt.

Atqui dictus Reverendus Pater Rheita inter hæc quinque jam memoratas fixas solum C, in numerum novarum cooptavit: reliquæ quatuor fuerunt, ex ordine novarum stellarum, quæ nudo visu non conspiciuntur, nisi ei præstantioris notæ Tubus Opticus admoveatur; sicut ex sequentibus res evadet manifestior. Itaque, quod res non aliter sese habeat, meis observationibus harum stellarum fixarum, abundè satis confirmor, & Benevolum Lectorem planè securum reddere possum. Quandoquidem & ego citiùs eas animadverti, quàm præfatus R. Pater: die namque 28. Augusti anni 1642. & postea die 4. Septemb. eas ipsas observavi, ubi & Iovem eodem in loco deprehendi, nempe in 13. gradu 20. min. Piscium, in quo ipsum quoque R. Pater, die 29. Decemb. conspexit: & rursus eum die 28. Augusti in 14. gr. 15. min. Piscium spectavi, quo illum R. P. die 4. Januarii anni 1643. vidit. Quâ de re nemo miretur, quod ita factum: siquidem mihi tum erât retrogradus, ipsi verò directus, procedebat autem à suâ statione & motu secundum successionem signorum, unde ipsum, in jam dicto loco, priùs cernere potui. Itaque, circa hoc tempus, Iovem perquam diligenter Tubo consideravi, singulis noctibus serenis, eò quod observationes Iovialium continuare constituissem,

G

quibus


*Quinq; novi
Planeta reli-
quis 4. Iovi-
alibus à R.P.
Ant. Mar. de
Rheita su-
peradditi,
non fuerunt
errones, sed
unum eorum
fixa in Aqua-
rio; reliqui
4. nova stella
incognita.*

*Stellæ viben-
oçtavianæ
priùs ab Au-
tore, quàm à
R.P. Antonio
de Rheita,
visæ & obser-
vatæ.*

quibus etiam aliquot menses tribui; sicut ex observationibus videre licet: ubi, non solum vigilem armatumque oculum ad stellam Iovis, & ad quatuor ejus comites direxi, sed etiam circumspexi, num plures, quam hi quatuor ipsi adstarent, qualis tamen generis nullos potui deprehendere, nisi tantum incognitas stellulas fixas nonnullas, quibus Jupiter erat circumdatus. Die namque quarto Septemb. (qui fuit dies 29. Decemb. in observatione Reverendi Patris) ipsas quinque parvulas fixas, quas R. P. novas Ioviales esse censuit, etiam offendi, earumque positum tum erga Iovem, tum inter se se in chartam retuli, veluti patebit ex adjuncto diagrammate D, quod precedenti tertio capiti est insertum. In eo quoque locum Iovis simul notavi ad diem quartum Septembris & 28. Augusti, qui respondent observationi R. Patris ad diem 29. Decemb. & 4. Ianuarii ut ex collatione ejus Schematis cum meo apparebit: siquidem in ea nullum aliud discrimen conspicitur, nisi quod Jupiter ipsi nonnihil altior fuerit, propter minorem ejus latitudinem Australem. Melioris autem intellectus gratia retinebimus locum Iovis, quem R. Pater observavit, ubi Iovi, die 29. Decemb. viso, duae stellulae ad dextram nempe c & h, (in priori Schemate D) adstiterunt. Stellula C non fuit nova, sed una e fixis in globo coelesti quoque consignata & Astronomis cognita, quae Bayero dicitur: sequens in primo fluxu aquae Aquarii duarum: altera vero h. fuit nova, & antehac incognita exigua fixa. Ad sinistram latus Iovis steterunt tres etiam incognitae stellulae, nimirum i, k, l. Has quinque parvulas fixas, R. Pater in numerum novarum Circumjovialium recepit.

Quod ut probem, eas primum certis distinguam circulis, & verum earum situm delineabo, ad exemplum R. Patris & P. Gassendi in Iudicio de hisce stellulis, qualis iconismus in figura 1, extat. Quando enim ex loco Iovis ad diem 29. Decemb. anni Chr. 1642. circulos per omnes quinque hasce stellulas duco, easdem initio consimili numero obtineo quinque, praeterea quod mihi sit l (in praesenti figura H) remotissima in extremo circulo, quae a R. Patre litera F signata, ut Schemate I
manife-


Schem.
 Exhibens Stellar fixar novar.
 Dentisci No. 1642 observatas.



Schem.
 Rhetanum, P. Gysendo
 transmissum.



Schem Rhetanum C. Lobkovitzis
 transmissum.



Schem antecedar
 innotum.




fig. H.

Tab. Scalpa

manifestum; & mihi in sequenti circulo penextimo C sit, quæ ipsi est E; in tertio verò circulo mihi h, quæ illi D habetur in quarto k mihi, quæ signo H à Rever. Patre est expressa; in interiori autem circulo mihi i, quæ ipsi b dicitur, & quidem Medicæa vocatur, quum tamen itidem fixa fuerit, sicut paulò post evidentiùs illud monstrabo, & de stellulâ ejus G quoque nonnulla monebo. At verò si meum diagramma rectè cum R. Patris figurâ debet comparari, necesse est, ut figura ejus planè invertatur, & inferior facies fiat superior, oculusque sursum convertatur, eò quòd hæ stellulæ inverso ordine à R. Patre fuerint observatæ, quemadmodum etiam à P. Gassendo in suo judicio de hisce stellulis fuit ostensum, & plenius à me quoque mox ostendetur. Quo facto, cum meo diagrammate maximam partem congruet. In eo solummodo aliqua reperitur differentia, quod mea l, ipsi in F paululùm sit altior. Verùm certò mihi persuadeo, quòd hîc à vero situ earum nonnihil aberraverit, quem ex duabus observationibus non adeò accuratè deprehendere potuit, sicuti cuius notum, qui observationum Cœlestium non imperitus est. Mearum autem stellarum situm quoad longitudinem & latitudinem, summo studio ex vero loco lovis, in transitu harum stellarum, ex diametro ejus & aperturâ tubi conquisivi, & proinde illum rectè se se habere certus sum: non enim acquievi in unâ vel duabus, sed multò pluribus observationibus. Veteres autè loviales Planetas ex observatione P. Gassendi consignavi: unus quippe illorum non tantam habuit latitudinem, quanta fuit ei à R. Patre assignata, quâ de re plura postmodum sequentur. Sed quæret hîc forsan aliquis, qui factum, quòd R. Patri hæ stellulæ progredi visæ sint, & quidem, ut ille in suâ epistolâ asserit, ab occasu in ortum? Huic respondeo, causam esse in promptu. 1. Quia primùm omnes hæc stellas ordine inverso annotavit, unde ipsi, ex ortu occasus factus, ita ut dicente ipso *ab occasu in ortum*, stellam moveri, nihil aliud sit, quàm moveri ab ortu in occasum, veluti mea figura palàm ostendit. 2. Quia Iupiter tum fuit directus, & ideo secundùm seriem signorum, longitudine unius gradus ab illo loco digressus est, quo die 29. Decembris

G 2

substitit:

substitit : hinc sibi R. P. persuadere non potuit, Iovem tantillo tempore eò usque fuisse progressum, & idcirco maluit credere hæc Pseudojoviales, in tam evidenti illarum à Iove factâ elongatione, fuisse promotas, sicut ex apposita figurâ elucescit. Quando namque loca stellarum ex Asterismo Aquarii & situ Iovis (quem respectu earum, die 4. Ianuarii Anno Chr. 1643. obtinuit) in hanc figuram 1. refero, sub ejusmodi angulo, quasi Iupiter stationarius fuisset, tunc idem motus, quem sibi R. Pater imaginatus est, prodibit : ubi nimirum H in I ex mente ipsius sex dierum spatio transiit; secundùm meam autem figuram 1, (k scilicet in o) id equidem accidisse animadverto. 3. Quòd Rev. Patri E, quem penextimum appellat, maximus omnium Pseudoplanetarum fuerit, omninò verum est : fixa namque quintæ magnitudinis, à me literâ C signata, fuit : atque vero quoque verius est, aliquas harum fixarum majores antiquis Jovialibus apparuisse, præsertim i inter alias. 4. Adhæc, quòd stellula F, veluti scribit, tandem evanuerit, etiam veritati est consentaneum : nam, quoniam Iupiter, die 4. Ianuarii, ad eam propius accessit (quæ revera exigua stella est) ideoque eam Iupiter suâ præsentia & jubare rexit, juxta Opticum Axionta : *Majus lumen obfuscet minus* : sicut ex *Athasen lib. 1 n. 32. pag. 39. 20.* clarè perspicitur. 5. Quòd etiam in ejus figurâ, stelle E & D, in K & L moveri visæ sint, refractionem in causâ fuisse puto. Nam, quia hæc stellulæ tunc horizonti vicinæ fuerunt, idcirco non parvè refractioni fuerunt obnoxie. Hinc propriè loquendo, in eadem ferè lineâ rectâ perstræerunt, quemadinodum ex motu Iovis licet colligere.

Ex hisce omnibus circumstantiis manifestum evadit, quòd Ite quinque stellulæ, à R. Patre Jovialium numero ascriptæ, Pseudojoviales & merè fixæ fuerint. At fortè nobis objiciet quispiam, illas fortassis existisse Joviales, quæ die 28. Augusti & 4. Septemb. effulserunt ? Respondeo, eas nequaquam ex Jovialium numero fuisse : siquidem ego, post hoc tempus, mense Septembri, Octobri ac Novembri, manifestè observavi, hæc quinque Fixas in pristino suo loco immotas permansisse, Iovem verò retrogradum hæc post se reliquisse, aliquo inter-

vallo,

vallo, id quod meis suppleo observationibus. Qui verò hæc fidem adhibere renuit, hunc amicè rogatum volo, ut eximio quodam Telescopio (tale quippe ad hoc negotium requiritur) hæc stellulas ipse in Asterismo Aquarii hæud gravatini inquirat: nam, quin omnes hæc quinque in suo pristino loco, & in eadem distantia sit adhuc reperturus, nullus dubito. Quandoquidem idem ipse quoque circa Autumnum Anni 1643. frequenter tentavi, postquam in manus meas iudicium de novem novis stellis pervenerat, ut mihi, nonnihil tum fluctuanti, veritas rei indubitato constaret. Semper autem, nec solummodo Anno 1643, sed Anno quoque 1644. & 1645. deprehendi, quod hæc quinque stellulæ, ad unam omnes, in hoc Signo Zodiaci Aquarii, in eadem planè distantia etiamnum persisterent, sicut eas in Asterismo Aquarii sub figurâ D expressi. Verùm sciendum est, observatorem hic requiri exercitatum in Telescopio dirigendo ad fixas. Etenim, quia Iupiter non amplius apud hæc stellulas visitur, ideoque inventu sunt difficiles, sicut quilibet, qui hujus rei fecit periculum, facillè mihi assentietur. Qui verò minùs erit exercitatus, si debitam solum adhibuerit curam, eas, citra dubium, tandem inveniet, ut & reliquas omnes 33. quas observavi.

Stella Urbanoctaviana P. Ant. Mar. de Rheita, adhuc in pristino loco reperitur.

6. Quod autem R. Pater existimat, suum Telescopium adeo esse eximium & præstans, ut hæc quinque antehac à nullis aliis conspici nequiverint; in eo quoque hallucinatur: siquidem & ego meo Telescopio hæc ante, quàm ille, vidi, imò etiam aliquid amplius, dum apud stellam i (quæ ipsi stella b est) aliam adhuc parvulam conspexi literâ m notatam, quam ille hæud dubiè, suo Telescopio non assequutus est: alioquin ille decem Ioviales, vel stellas Urbanoctavianas vidisset; qui numerus denarius ipsi forsitan magis arduisset. Quocirca non est, quòd oculo suo Enochiano tantùm tribuat, quàm alia quoque dentur Telescopia, quæ majora adhuc faciunt apparere objecta: nisi posthac alia phænomena Cœlestia nova & antehac incognita in lucem protulerit.

Davialia Telescopia R. Antonii Mar. de Rheita præstantiora

Tandem non diffiteri cogor, quòd quispiam in observando per tubum Ioviales, à vicinis & circumstantibus fixis minori-

In exercitatu observator facillè à fixis in observatione Iovialium decipitur.

bus fa-

bus facile queat decipi, inprimis, si observator adhuc fuerit in-
 exercitatus, & exigua fixa cum Iovialibus in eadem rectâ lineâ
 appareat, quod sæpenumero accidit, sicut & mihi idem ferè con-
 tiguisset in hoc æthereo spectaculo, nisi diligentiorum curam ad-
 hibuissem, & semel ac iterum iterumque hæc stellulas obser-
 vassem 1. Mense namque Augusto, Anni 1642. quum primùm
 exiguas illas stellas circa Iovem observare inciperem, semper
 animadverti, unam prædictarum affixarum, nimirum 1, in eâ-
 dem lineâ rectâ cum Iove stantem, ideoque etiam initiò eam
 è numero Iovialium rebar esse. Verùm, quia progressu tem-
 poris, & quidem die 4. Septemb. deprehendebam, Iovem, hanc
 fixam, ultra semissem gradus, post se reliquisse, hinc certior fi-
 ebam, eam ipsam, non Iovialem, sed fixam esse: Circumjovi-
 ales quippe semper cum Iove ferebantur. Propterea etiam ob-
 servationibus prioribus, ante quartum Septemb. institutis, non
 omni ex parte standum est, eo quòd hæc fixa se se comitibus
 Iovis immiscuerit: posteriores verò sunt tantò certiores. Cau-
 tior enim ab hac mixturâ stellarum fixarum cum Iovialibus fa-
 ctus, semper illas ab hisce internoscere ac separare didici, sicut
 hæc in re me novitū observatores poterunt imitari, ne, quòd
 dici solet, ad idem saxum allidant, & ab his incognitis Fixis de-
 cipiantur. Proinde spatium cœli, quod Iupiter emetiri solebat,
 de die in diem diligenter Telescopio cōsideravi, ut explorarem,
 num etiam in eo novæ parvulæ Affixæ præstò essent? In quas
 cum incidebam, eas accuratè, tam secundum longitudinem,
 quam latitudinem notare, & in chartam referre cœpi. Com-
 modius enim id fieri licebat, quando Iupiter ab illis paulò re-
 motior adhuc incidebat, quam si propius illas attingebat, ubi
 tum claritate luminis sui eas valde obscurabat. Hoc factò, ve-
 ri Ioviales Planetæ à fixis, etiam si cum illis in eadem lineâ re-
 ctâ versentur, facile discerni queunt, per differentiam observatæ
 Longitudinis ac Latitudinis, ita, ut hoc pacto præceptus lapsus
 non sit timendus. Quocirca operæ pretium esset, ut omnes par-
 væ Fixæ, Eclipticæ vicinæ & tubo visorio observatæ, secundum
 Longitudinem & Latitudinem distribuerentur, & consignatæ
 cum Mathematicis communicarentur.

*Quomodo
 observatio-
 nes Iovialium
 restituenda,
 ut nunquam à
 Fixis quisi-
 am decipi
 possit?*

Itaque.

Itaque, quæ hæcenus de novem stellis Iovialibus, à P. R. Ant. Mar. de Rheita noviter, ut putat, repertis, dicta sunt, sufficere potuissent, nisi etiam hîc consideranda esset Censura Excellentissimi Doctissimiq; Viri D. Ioh. Caramuel Lobkovvitzii, quam proximè elapso tempore nempe Anno 1643. adversus iudicium de novem stellis, circa Iovem visis, Gallici Lyncis P. Gassendi, publicavit. Quandoquidem in hac censurâ laudatus D. Lobkovvitzius aliquot rationibus, adversus Iudicium P. Gassendi, certat, iisque demonstrare conatur, præfatos quinque Ioviales P. Rheitæ revera Errones, non autem fixas esse, & ejusmodi Errones quoq; circa Saturnum ac Iovem reperiri. At enim verò, ut, pace tanti Viri, meam quoque sententiâ de hac censurâ, in medium adferam, existimo, eum mihi deinceps ob jam dicta argumenta, & quæ prioribus nunc quoque superaddam, adensurum certoque sibi persuasurum, paulò ante nominatas quinque stellulas fuisse incognitas Fixas, exceptâ unâ, quæ ab Astronomis jam dudum Sideri Aquarii adscripta fuit.

Quod enim primò ait D. Lobkovvitzius pag. 119. suæ censuræ, se demonstraturum, vel Rheitanas observationes infideles, vel stellas observatas circa Iovem Erraticas esse; expendemus in sequentibus ejus verbis, vim hujus demonstrationis, quando ita pergit & infert: *Cumq; Gassendus, nec velit, nec possit adstruere illud prius, hoc secundum concedat necessarium est. Ut hoc evidenter commonstrem (addit ulteriùs) unum atq; alterum Theorema præmittam.*

Examen Censuræ Lobkovvitzii in Iudicio Gassendi opposita.

Primùm: *Si visum consulas, Planetam directum fugiunt omnes stelle occidentales, & orientales appropinquant.*

Secundum: *Planetam retrogradum visu consule fugiunt omnes orientales stelle & occidentales stelle.* Hæc ille.

Quod igitur spectat ad primam propositionem, in quâ hæc Hypothesica continetur: vel Rheitanas Observationes infideles fuisse, vel stellas observatas circa Iovem Erraticas esse, facile D. Lobkovvitzius ex responsione meâ ad prius hujus hypotheticæ membrum colliget, quid de eo sentiam: non enim planè observationes Rheitanas infideles dixerim, eò quòd revera quinque istæ stellulæ, prout à R. Patre observatæ sunt, in æthere reperiantur. Non tamen inde sequi necesse est, illas fuisse

fuisse Errones circa Iovem : siquidem (ut jam jam demonstra-
bo evidentiùs) potuerunt hæ stellulæ circa Iovem esse Fixæ in-
cognitæ, vel non satis R. Patri perspectæ, velut ex Schemate
ejus examinato luculenter id apparebit, dum probavero, mo-
tum istarum stellarum in Zodiaco, fuisse duntaxat apparen-
tem, non realem, & ita visum ex motu Iovis proprio, qui mo-
dò fuit directus, modò retrogradus.

Duo illa Theoremata, quæ fundamenti loco ponit, mihi non
adversantur, imò potiùs ad institutum meum probandum faci-
unt. Ut igitur rem ipsam aggrediar, initiò mirari subit, qui fi-
at, quod Schema Rheitanum novem stellarum, circa Iovem,
Dn. Gassendo oblatum, in pluribus discrepet ab eo, quod Dn.
Lobkovvitzio exhibitum fuit. Imò ne dicam de differentiâ
proportionis circulorum & Eccentricorum utrobique ut ut
non exigua occurrat, id imprimis monendum duxi, quare utro-
biq; insignis quædam diversitas situs stellarum istarum, respec-
tù Verticalis, vel potiùs Signiferi & motus proprii, quem, in-
ter diversas observationes, in suis Eccentricis, creduntur perfe-
cisse, in collatione utriusque figuræ, reperitur, quum tamen
quilibet sedulus observator in id unicè incumbat, ut suas ^{rationes}
perquam exquisitè delineet, & cum Amicis suis communicet :
nisi enim id fiat, iudicio plerunq; est, vel observationem ali-
quo adhuc laborare vitio, vel observatorem quædam in ambi-
guo reliquisse.

Quamobrem, quòd idem quoq; observatori nostro usu ve-
nerit, ex collatione utriusque Schematis demonstrabo. Atque
ut hoc commodiùs fiat, illud invariatur, in præcedenti dia-
grammate H, numero 2. & 3. æri incisum exhibeo. Videre
autem ex figurâ Gassendi numero 2. licet, quòd linea ortus &
occasus Iovialem veterem Planetam quartum b, quasi inter-
fecet. Atqui in Lobkovvitziano Schemate (ut ex paginâ ejus
85. & pag. 120. & ex numero 3, Figuræ antecedentis consta-
bit) illa ad undecim gradus, vel circiter, altior incedit.

Secundò, Verticalis linea T V in Schemate Gassendi, &
præcedente figurâ 2. ita comparata est, ut stellulam G ad fini-
stram relinquat. In Lobkovvitziano verò Schemate num. 3.
eandem stellulam G, occasum versus promovet. Tertiò,

Tertiò, Linea X Z in Schemate Gassendi, quæ tres veteres Ioviales rectâ pertransit, etiam per stellulas E & D fertur. At verò in Schemate Lobkovvitziano, linea tres antiquos Circumjoviales transiens, non simul permeat C C, sed infra eas, ad triginta propè gradus, deflectit. Igitur tanta differentia videtur intolerabilis, nec diligentem arguit observatorem: siquidem ex illâ sequitur necessariò, vel alterutrum vel utrumque Schema perperam fuisse constitutum.

Quartò, spatium motus proprii octavæ Pseudojovialis E K apud Gassendum, erga septimam D L, longè alium obtinet situm, quam in Schemate Lobkovvitziano: sic & extremus PseudoPlaneta F à Verticali lineâ duntaxat ad 17. grad. in priori figurâ, in posteriori verò ad 25. fermè grad. recedit. Ex quibus abundè patet, motum proprium harum stellarum ex tam enormi discrimine utriusque Schematis, haud quaquam perfectè derivari posse, ita ut hic major diligentia observatoris meritò desideretur. Sed hoc missum facio, nec scrupulosè hâc vice inquirò. Quocirca quum videam Lobkovvitzium tantum stare Schemate ipsi transmissò, nec Gassendi attendere, ideoque illud unice posthac considerabo, & ex eo cum Lobkovvitzio conferam. Antequam autem motum harum stellarum exquirere incipio, obstacula quædam sunt removenda.

Primum enim est hoc valde admirabile atque paradoxum, quòd R. Pater Antonius M. de Rheita, planè in eâ sit sententiâ, nobisq; velit persuadere, se quatuor Veteres Ioviales (Medicæas alias dictas) vidisse, quemadmodum ex ipsius Schemate Iovi appposito conspicitur, & quidem in sequente ordine & positu. Tres namque in rectâ constituuntur lineâ: quartus verò & Vltimus Iovialis latitudinem tantam hic obtinet, ut illa, si ex centro Iovis Eccentricum ad illum excurrentem mihi imaginer, ad 15. gradus excreseat. Hoc verò est contra observationem & sententiam omnium Mathematicorum: quatuor enim hi Ioviales Erronès, nunquam, tam Boream versus, quam

Iovialium situm erga Iovem, quoad latitudinem.

Austrum, latitudine, plus tribus minutis, à Iove recedunt; imò, Iupiter Iovialis, & Saturnus Iovialis, quando in maximâ elongatione à Iove versantur, (ut hoc tempore extiterunt, sicut ac-

H

curata

curata, observatio Dn. Gassendi testatur) nunquam ullam admittunt latitudinem, quemadmodum omnes quoque, ad unam, observationes mee Jovialium, in appendice enumeratae, fidem faciunt. Proinde quarta illa stellula, cui tantam tribuit latitudinem, non genuina fuit Jovialis Medicæa, neque una, secundum opinionem R. Patris, ex novis Vrbanoctavianis, sed haud dubie fixa. Verum hic mihi forsân aliquis objiciet observationem P. Gassendi, qui eodem die quatuor etiam Joviales Errones animadvertit. Equidem libenter concedo, omnes quatuor à Gassendo esse visos, sed sub alio positu erga Jovem, quam à sæpe nominato R. Patre. Quippe proximum Jovi Sidus tantum ab eo distat unâ semidiametro, quæ sesquiminutum non excedit: id quod probè notandum. Alterum, duabus diametris cum semisse: Tertium, tribus diametris cum dodrante: Extremum, quinque diametris cum quadrante: sicut in judicio, pag. 23. legitur. Vbi & hoc addit, omnes quatuor in unâ *rectâ lineâ* existisse, nisi quòd alterum à Jove Sidus aliquantò Borealius, licet insensibiliter ferè, apparuerit. Hæc observatio perspicuè docet, quartæ stellulæ & ultimæ, minimè tantam competere latitudinem, quantam R. P. Rheira representavit, sed eandem planè in unâ rectâ lineâ cum tertiâ & primâ ad Jovem fuisse inventam, ita, ut nequaquam hæc stellula in numerum quatuor Jovialium Medicæarum queat recipi; sed extra earum censum existisse.

Quid verò causæ fuerit, cur Reverend. Pater eo die tantum tres veteres Joviales, P. Gassendus autem omnes quatuor, conspexerit, non me clam est, dum animadverto tempus observationis horarium à neutro fuisse additum, etiamsi uterque unâ eadem vesperâ observaverit. Hinc igitur factum, ut ambo non uno momento & minuto temporis, hæc stellulas animadverterint; sed ut alter horulâ vel sesquihorulâ citiùs, alter tardiùs, hæc observationes instituerit. Quod si ita observatio fuit perfecta (de quo nullus dubito) omninò fieri potuit, ut R. Pater proximum Jovi Jovialem, qui ex observatione Gassendi tantummodò sesquiminuto ab eo absuit Lutetiæ Parisiorum, cernere haud potuerit. Proinde, si R. Pater aliquantò citiùs se ad observandum contulit, tunc hunc Jovi viciniorem, qui à conjunctione

junctione Iovis moveri cœpit, nondum aspectu percipere potuit : quod si verò tardiùs Iovem observasset, ita, ut idem Iovialis ad conjunctionem Iovis properasset, iterum eundem conspici non potuisset. Etenim ex observationibus Iovialium certò compertum est, viciniorem Iovialem esse velocissimum, suamque integram periodum, uno die, & aliquot insuper horis, absolvere (sicut & suprâ dictum) ita ut unum minutum longitudinis cum semisse, minùs sesquihorâ, præsertim cum Iovi propinquior in rectâ lineâ incedit, conficiat. Ex quibus faciliè intelligitur, certumque mihi est, R. Patrem hunc minimum Iovialem, & proximum Iovi, tum Telescopio suo non conspexisse; sed tantùm tres reliquos Comites Iovis majores. Et quanquam P. Gassendo ratione distantie paulò aliter visi fuerint, tamen hoc me non conturbat : fieri namque potuit ratione motus eorum, ut tempore observationis R. Patri in æquali & tali extiterint distantia, quali utroque in Schemate reperiuntur. Præterea R. Ant. M. Rheite observatio Medicæarum confirmat, tempus vel anticipasse, vel postposuisse nonnihil in contemplandis hisce Sideribus illud, quo Gassendus observationi eorum incubuit : unde eò magis mea stabilitur sententia, quartum & Iovi viciniorem à P. Rheita non conspectum esse, sed tantùm tres reliquos majores Ioviales, ut & paulò ante dictum.

Quòd verò quartam stellulam latitudinis non expertem pro Ioviali arripuerit, ideo factum opinor, quòd R. Pater sciverit numerum Iovialium Medicæarum esse quaternarium : & quia id temporis hæc stellula fixa Iovi proxima fuit, adductus est credere, eam esse quartum erronem Iovialem. Atque hoc primum est, quod circa hanc observationem Iovialium notandum duximus.

Secundum est illud, quòd hoc tempore stellæ Medicææ, quemadmodum P. Gassendi observatio, quam in suo iudicio proponit, evidenter ostendit, non occidentales, velut Pater eas consignavit, sed orientales extiterint : unde necessariò sequitur, tubum Opticum R. Patris Rheite hæc cœlestia Phœnomena inverso situ representasse. Id quòd Vir ille rarâ eruditione clarissimus, Caramuel Lobkovvitz libenter in suâ censurâ pag. 131.

concedit, ita inquit : *Nam Rheitanus* (nempe tubus) *licet non constet quatuor lentibus, tamen exhibet nobis turres Cæli pendulas, & lineas universas invertit, adeoq; & Coloniae eosdem Satellites occidentales & Parisiis orientales conspecti, observationibus, licet videantur coherere non posse consentientibus.* Hæc ille. Quapropter, quum Tubus visorius Rheitanus omnia objecta inversa ostenderit, sequitur, non solum Medicæas inverso posito, sed & reliquas omnes novas Urban-octavianas eodem situ fuisse conspectas. Non possum igitur non mirari, quare Dn. Lobkovvitz Schema illud inversum, quod ipsi primâ vice oblatum fuit, non voluerit antè rectum, stellulasque in legitimo suo situ constituere, quàm motum novarum stellarum Pseudojovialium demonstrare. Quilibet enim ex his facillè intelligit, quòd si hoc Schema inversum, qualiter communicatum est, retineatur, omne id, quod orientale debebat esse, occidentale fieret, &, quod occidentale, contrà orientale existeret. Hincque accidit, ut in Schemate Lobkovvitziano quædam stellulæ videantur Iovi propinquiores factæ, quæ tamen debebant esse remotiores; & ex adverso, nonnullæ magis recessisse, quæ tamen viciniores factæ sunt.

Etenim, ut hoc eò meliùs intelligatur, Lobkovvitzianum Schema invertam, &, ut naturali harum stellarum situi conforme sit, efficiam. Quâ in re nullo singulari opus est artificios; si namque inferior pars Schematis in superiorem convertatur, peracta res est. Ita pars ea, quæ antè conspexit occasum, jam vergit ad ortum, & quæ dextra fuit, ad sinistram inclinat. Et ut nihil dubii inexercitato hic relinquatur, is, per lentem utrinque convexam, & ad modum vitri comburentis paratam, hoc Schema, in debitâ distantia, quæso, inspiciat, tum statim deprehendet, quo pacto Schema debeat esse inversum. Nam nullâ aliâ certè comparebit specie, quàm eâ, quæ æri H, ad numerum 4. incisa est, & à Francisco quoque Pennemanno, qui censuram Lobkovvitzii de judicio Gassendi publicavit, fuit exhibita, eiq; censuræ præmissa, nec non à me priori diagrammati, numero 2. inserta.

Postquam hoc Schema sic inversum est, & ex superiori demonstratione constat, quartam stellulam latitudine præditam,
& à

& à Patre Rheita Medicœis Sideribus adscriptam, non revera harum unam fuisse stellarum, ut ut ex earum numero fuerit, quas novas Urbanoctavianas appellat; ideoque Lectorem rogatum volo, ut hoc Schema à me inversum, vel alterum Gassendi, numero 2. probè consideret in eâ proportionem & situ, quo hic collocantur. Quo facto, collatisque hisce figuris cum meâ, quam, ex meâ observatione, æri H, ad numerum 1. incidi, ex hisce perspicuum fiet, stellulas in Lobkovvitziano Schemate literis C C vel in Gassendi lit. E D signatas, eodem modo sitas esse, quo in meo Schemate C h, & quartam Pseudo-Medicœam P. Rheitæ, quo in meo i ponitur: rursus in Lobkovvitziano E, & in Gassendi Schemate H, esse eam, quæ in meo K. Quod attinet in meo Schemate exiguam stellulam m, nihil ea habet commercii cum novem illis Urbanoctavianis: siquidem illam suo perspicillo Rev. Pater non conspexit, quemadmodum antè quoque memini. Atque ut in comparatione harum stellarum pergamus, in Schemate Lobkovvitziano M, vel in Gassendi F remotiorque à Iove sinistram versus, est in meâ figurâ l, ut ut ea in meo iconismo paulò sit declivior. Nam hanc differentiam inde ortam puto, quòd R. Pater ex unâ & alterâ observatione, veram ejus distantiam à Iove tam exactè pervestigare non potuerit. Insuper, quòd nec in cæteris adeò accuratam omnium rationem adhibuerit, ex collatione utriusque Schematis ipsius apparet: quemadmodum enim jam antè demonstratum, quasdam stellulas in priori Schemate, aliquot gradibus sublimiores vel decliviores, quàm in posteriori constituit.

Præterea quoque animadvertes, quòd penextima P. Rheitæ stellula, quam in meo Schemate C refert, maxima harum fuerit splendore, eò quòd extiterit una veterum Fixarum, in primo flexu aquæ duarum sequens dicta, quintæ magnitudinis. Hæ jam memoratæ quinque stellulæ sunt P. Rheitæ novæ Urbanoctavianæ, sicut etiam paulò post id ex motu illarum, quem exercuerunt, ostendam.

Sed quæret hîc forsân aliquis: quorsum igitur spectat stellula G, quam non solùm Schema Lobkovvitzii, sed etiam Gassendi

fendi exhibet? Is sciat, hanc quoque peculiarem esse Fixam, quam & R. Pater cum reliquis observavit. Hanc equidem Anno 1642. quum reliquarum observationi incumberem, non vidi, quoniam in tanto ambitu Iovem non circumspexi. Nuper verò, nempe die 9. Novemb. An. 1645. quum Schema Rheitanum denuò accuratè perlustrarem, & stellas Urbanoctavianas, iterum in Asterismo Aquarii Tubo meo collustrarem, eandem stellulam G unà cum cæteris adhuc in hoc signo conspicuam esse, & in rectâ ferè lineâ cum sideribus k & i à me observatis, & ad semigradum circiter, altiores repeririprehendi. Hæc verò stellula non omnium minima, sed satis conspicua, quam in meo Schemate numero 1. literâ n notavi. Ex quibus apparet, hanc ipsam eandem esse stellam G in Schemate Rheitano.

Proinde, quicunq; hæc Schemata stellarum Urbanoctavianarum, cum meo Schemate & fixis à me observatis, diligenter contulerit, is fatebitur, scio, non tam ovum ovo esse simile, quàm hæc stellulas in diversis Schematibus expressas, ratione situs observatis à me & in peculiari Schemate notatis, etiamsi eas quatuor mensibus citius nimirum die 28. Augusti, & 4. Septembris Anni 1642. animadverterim: Rheitanæ quippe observationes in diem 29. Decembris, ejusdem anni, & diem 4. Januarii anni sequentis, incidunt.

Ex quibus simili ratione colligitur, quod, si erronee fuissent quos distinctis temporibus, & ut concedam etiam hoc, in eodem situ Iovis, respectu Eclipticæ, observavimus, impossibile foret, ^{Tuq;ior} nostras adeò inter se conformes esse, hæcque stellulas in eadem formâ, situ & distantia, ab utroque nostrum, visas esse. Etenim, ut omnibus Mathematicis notum est, Sol quidem periodo unius anni redit ad idem signum, & ad eundem gradum Zodiaci, quem ante annum obtinuit: verùm, spatio plurimorum annorum, non idem semper revertitur concursus, positusq; reliquorum Planetarum, tam secundum latitudinem, quàm longitudinem, respectu Solis. Quamvis enim unus & alter ad eundem fortè recurrerit locum, & intervallum à Sole: tamen tertius, quartus & reliqui, nequaquam se ad eundem referent

ferent cum Sole positum. Eodem quoque modo cum Iove, suisque Medicis comparatum est. Equidem Iupiter quotannis bis ad eundem locum Eclipticæ reversionem facit: attamen comites ejus, stellæ Medicæ, non consimili tempore ad solita loca remeant, eundemque situm erga Iovem retinent: quia sunt erronee, nec æqualem exercent motum, iisdemve feruntur tempore spatii. Hocq; idem etiam in novis hisce Vrbanocætanis, vel novis potius Fixis (quas optimo titulo **ULADISLAVIANAS** possum vocare, siquidem eas regnante feliciter **ULADISLAO IV.** prius hinc conspexi, quàm Rev. Pater) valet citra contradictionem. Nisi enim hæ stellæ Fixæ fuissent, sed Erraticæ, planè fieri non potuisset, ut observationes nostræ, inter se convenissent, propter diversum earum Motum, secundum P. Rheitæ sententiam. Et, si casu quodam unus vel alter erroneus eodem in loco constitisset; tamen in reliquis id non accidisset; sed ratione situs modò hoc, modò illud, defuisset. Quia verò suum situm non mutarunt, necessario sequitur, hæc stellæ fuisse Fixas quæ ad hanc usque horam in signo Aquarii (ut antè quoque dictum) inveniuntur, quemadmodum cuivis bono Optico Tubo instructo, id experiri licet. Apud Iovem autem non ampliùs, nisi elapso spacio annorum ab hoc usque tempore spectare illas integrum erit, si modò Iupiter tunc eandem recuperaverit latitudinem.

Quòd verò hæ stellulæ R. Patri movere visæ sint, equidem satis notabiliter, intra sex dies (sicut ex proposito ejus diagrammate patet) nihil habet admirationis, eò quòd hic apparens motus exiguarum stellarum ex motu proprio & directo Iovis necessario provenerit, eique soli tribuendus sit. Quòd ut eò meliùs intelligatur, motum cujuslibet sic nobis dicendæ **ULADISLAVIANÆ** stellæ in suo Eccentrico, ejusque progressum visam ad integrum usq; gradum, quem Iovis motus induxit, in schemate meo conatus sum adumbrare, & quomodo in secundâ statione Iovis, die 4. Januarii R. Patri appa-
 ruerint, quemadmodum in ejusmodi situ eas, die 28. Augusti,
 Anno

Anno præcedente conspexi. Hoc ipsum videre est, in figurâ H, apud num. 1, ubi motus cum o, in quolibet Eccentrico est expressus.

Age ergò motum harū stellarū inter se conferamus & videamus, utrum motus earum, contra primum & secundū Theorema Lobkovvitzii peccet? In inverso schemate Lobkovvitziano num. 4, stella extrema M, nempe Vrbanoctavianarum, ad inferiorem locum L retracta est: in meâ figurâ num. 1, extrema itidem in o stat depressa, sextus erro Lobkovvitzianus, nimirum E dextram versus deorsum in F promotus est. In Gassendi schemate, H transit in I. Consimili modo in meo schemate stella k, in o promotior est facta, & i in o, quod æque oportuit esse, etiamsi R. P. Rheita ejus motum non adnotaverit, quia hanc stellam inter Medicæas retulit, quæ tamen revera, sicut antè demonstratum) ejusdem est conditionis, cum reliquis **ULADISLAVIANIS**.


Quod attinet duas extremas stellas, septimam nimirum & octavam, seu penextimam, sunt illæ in figurâ ipsius sublimiores factæ, & evertæ, in D D. Ego verò, attento motu Iovis proprio, non potui animadvertere, eas loca sua mutasse; sed maximam partem in eâdem rectâ lineâ perstitisse. Cur autem ipsi hoc situ apparuerint, id ex majori refractione profectum credo. Cæteroque, quòd motus earum ex proprio Iovis motu derivatus, planè cum illius motu consentiat, ex collatione utriusque satis abundè patet, ita, ut secundum Theorema primum, illæ quæ propius ad Iovem accedere, & illæ quoque, quæ longius ab eodem recedere debuerant, hoc pacto non alium exercuerint motum; nisi quòd omnes occasum non ortum versus propressæ sint, quemadmodum R. P. Rheita, & D. Lobkovvitz contendunt.

Atque, ut finem huic materiæ imponam, ex his ante dictis quilibet satis superque intelligit, quòd R. P. Rheitæ Vrbanoctavianæ sint omninò Fixæ meæ **ULADISLAVIANAE**, quæ in eodem adhuc loco Zodiaci conspiciuntur; nec propterea observatio ejus sit infidelis dicenda, ut Cl. Lobkovvitz paginâ

Observationes Stellarum Fixarum circa Saturnum Martem, et Jovem,
 Habito Danturci Anno Grægorii 1644.

Die 29 Septemb. hori 10 Vig.

Die 30 Septemb. hori 8 Med.



3. ♄.




Die 19 Novemb. hori 9. 48. v.

4. ♄.

Die 22 Novemb. hori 9. 45. v.

5. ♄.

Die 26 Novemb. hori 10 Vig.



1. ♃.

Die 16 Septemb. hori 2 n.

2. ♃.

Die 30 Septemb. hori 8 30 n.

3. ♃.


Die 29 Nov. hori 9. 48.

4. ♃.

Die 28 Nov. hori 11.

5. ♃.

Die 22 Nov. hori 7 n.



1. ♃.

Anno 1647. Die 2 Nov. hori 9 30.

2. ♃.

Anno 1644. Die 30 Septemb. hori 8. med.




fig. I.

Aut. Sculp.

ginâ 119. vult inferre : manent enim illæ novæ stellæ, & observatio Rheitana suam meretur laudem.

Cœterùm, quod ad CircumSaturnales & CircumMartiales attinet, quin non minus fixæ fuerint, quàm illæ, quæ Iovi adstere visæ sunt, nullum est dubium. Etenim, quod hoc non infrequens sit, sed sæpius contingat, ex observationibus continuis aliquot annorum satis cognovi. Quandoquidem nullo tempore, circa Saturnum & Martem, ut ut diligentissimè non vulgaribus Telescopiis eos sæpius inspexerim & consideraverim, peculiare Errones offendere potui, nisi duas illas anfulas, in utroque latere Saturni, quas si quis erroneas velit appellare, per me licebit. Hoc equidem certum est, quod frequenter stellas fixas incognitas diversæ magnitudinis, quandoque plures, quandoque pauciores, tam circa Saturnum & Martem, quàm Iovem, Tubis meis Opticis deprehenderim. Id quod nonnullis observationibus in figuram I relatis comprobabo.

Anno 1644. die 29. Septembris, horâ 10. vespertinâ sex circa Saturnum stellulas animadverti. Quantum verò una ab alterâ, vel etiam à Saturno remota fuerit, numeris declaratum est, qui, minutâ prima gradus unius indicant : differentiam namque istam anxie sollicitèque, quantum fieri potuit, semper adnotavi. In secundâ observatione Saturni plures earum animadverti, ita ut denarium numerum attigerint. In tertiâ verò observatione, earum tres duntaxat conspicuæ fuerunt. In quartâ tantum duæ comparuerunt. Et in quintâ observatione rursus tres adfuerunt. Hujuscemodi plures observationes in medium possem proferre, si opus esset; sed brevitatis studio ad eas, quæ circa Martem, & reliquos Planetas visæ sunt, propero. Quippe quoties ad stellam Martis Perispicillum adhibui, diligenterq; attendi, & circa hanc diversas offendi, veluti ex quinque adjunctis Martis observationibus, perspicuum est : atq; ex tertiâ, quartâ & quintâ observatione fit evidens, Martem tum fuisse retrogradum. Eodem modo circa Iovem interdum septem inveni, quemadmodum hæ duæ observationes id confirmant, præter quatuor illas Medicæas, quæ in rectâ versantur lineâ. Talia exempla plura in Appendice observationum Iovialium abundanter B. Lector reperiet.

I

Atque

Tam circum
Saturnales,
quàm Circu-
Martiales
obita: fixæ
sunt.

Observatio
Saturni pri-
mâ.

Observatio
Saturni se-
cundâ.

Observatio,
Observatio 4

Observatio 5

Observatio-
nes Martis.

Observatio-
nes Iovis.

Modus capiendi distantiam Circumjovialium ab ipso Iove.

Atque tantum breviter fit dictum, de novis Pseudojovialibus stellis Rev. Patris Antonii de Rheita, & insuper de iis, quæ in stellâ Iovis sunt animadversione digna. Restat ut paucis modum detegamus, capiendi Telescopio distantias Circumjovialium ac vicinarum fixarum à Iove. Id ante nos Eminentissimus Mathematicus, Galilæus, facere consuevit, dum primò ambitum Tubi optici rimatus est, ex quo postmodum distantias stellarum colligebat. Id quod equidem non malè factum. Longè tamen certior hæc via est, si quoque mensura diametri Iovis per Telescopium instituitur & postea attendatur, quot diametris Iovis hic vel ille erro Iovialis ab ipso Iove removeatur. Citra ullam enim difficultatem hoc fieri potest, eò quòd minores Ioviales parum à se invicem sint distiti. Hinc si contemplator Cœli aperturam Optici instrumenti ad longitudinem diametri Iovis revocaverit, atque ad hanc distantiam satellitum Iovis intervalla exigere solitus fuerit, tunc ab inquirendâ digressionem Circumjovialium non facile deerrabit. Deinde quoque ex hac Tubi dispositione citra laborem perspicitur, quando in rectâ stent lineâ, eandem obtineant latitudinem, & quinam Errones Ioviales in conjunctione versentur, vel Triangulum forment? Denique assidua diligentia & exercitatio tali modo Cômities Iovis stellas observandi per Opticum Tubum quemlibet multò certiozem reddet, nec de verâ distantia finet esse dubium.

*Observatio-
nei stella
Martis, &
descriptio
Telescopii,
per quod ge-
nuna ejus
facies depra-
bendi queat.*

1. Stellam MARTIS, quod attinet, & illa proprio destituitur lumine, quemadmodum omnes reliqui Planetæ & Circumjoviales; nam illud in parte nobis adversâ à Sole mutuatur; in alterâ verò parte aversâ obscura est, & Conicam de se projicit umbram. 2. Deinde Solem quoque semper suum agnoscit centrum. Inde fit, quòd unâ vice terræ propinquior sit, quàm alterâ, præfertim quando Mars est acronychius, hoc est, in oppositione Solis moratur, ita ut tum nobis septuplo ferè propinquior sit, quàm cum in conjunctione Solis versatur: unde quoque longè major apparet.

3. Adhæc planè mihi persuadeo, hunc planetam, ceu corpus aliquod opacum, sui luminis admittere vicissitudines, instar Veneris,

neris, Mercurii & Lunæ, ita tamen, ut nunquam possit conspici Corniculatus vel Falcatus, more reliquorum inferiorum; sed phasin *duplum* seu bisectam obtinere, quando est perigæus, & in quadrato Solis versatur, sicut Kepplerus idem statuit, in Epitome Astronomiæ Copernicanæ pag. 843. Etenim quòd hæc sententia non solùm sit probabilis, sed & ipsi consentiat experientiæ, Optimo Telescopio deprehendi, Anno 1645. die 26. Martii horâ septimâ vespertinâ, sicut & die 28. ejusdem, ubi maximam partem dimidiatus apparebat, sicut phasin ejus delineavi in præcedente figurâ G, apud D.

Aster Martem dimidiatum observavit.

4. Insuper quam speciem visus hic Planeta per tubum à Nobili Fontana retulerit, ex tractatu Matthiæ Hirschgarteri notum est: siquidem eum, ceu Montem inæqualem asperum, in mucronem fastigiatum, & nequaquam rotundum, conspexit. Quod si ejusmodi facies stellæ Martis revera spectaretur, ea profectò singulariter mirabilis, & stupenda foret. Verùm, mi benevole Lector, edisseram tibi veriore[m] stellæ Martis formam. Non diffiteor equidem, si hunc Planetam, per talem Tubum opticum intueor, quali Lunam, Jovem & Saturnum contemplor, quòd Mars eandem fermè præbeat figuram, quam ex Matth. Hirschgarteri Tractatu recensui; sed sciendum est, quòd Telescopia, hoc pacto disposita, minùs sint idonea, ad cognoscendam genuinam stellæ Martis speciem: quippe lumen Martis superfluum, quod in eo abundat, nisi adimatur, non rotundum, sed in mucronem turbinatum, & rubicundo circulo, quasi iride cinctum, apparebit. Quando verò tibi ejusmodi præparas Tubum Opticum, qualem capite tertio descripsi, ut Stellæ Fixæ rotundæ cernantur, & foramen chartæ vitro convexo appositum coarctabis, tunc reapse deprehendes Fontanam adventitio Martis lumine fuisse deceptum, nec aptum adhibuisse Telescopium ad prohibendum illud: siquidem eo modo Mars diligenter inspectus, non aliâ, quàm Sphæricâ apparebit figurâ, qualem clarè, perspicuè & evidentè, hac ratione intueri licebit: quod quidem per usitata Telescopia non poterit fieri. Vnde reliqui hoc adminiculo visorii instrumenti non instructi, nunquam Martem rotundum sine radiis conspexerunt. Eâ etiam

In quali formâ Mars à Fontanâ fuerit observatus.

Telescopia usitata observationibus Martis minime inserviant.

Corpus Martu[m] est rotundum.

de causâ nunquam decrementum Martis cernere potuerunt. At enimverò, si, prænarrato modo, Tubum tuum Opticum, præsertim, si satis longus, perfectè elaboratus, optimisque lentibus præditus fuerit, apraveris, tunc Martem, bisectò existente, ^{in Telescopio} tibi licebit conspiciere.

De stellâ Veneris & Mercurii.

Quod stellam VENERIS ac MERCVRII attinet, de utraq; nostræ tempestatis Mathematici plura & antehac in observata scripserunt, quàm antiqui. Nam non tantùm Solem, tanquam suum centrum, respiciunt, eumque modò superiores, modò inferiores circumeunt; verùm etiam lumine suo adinstar Lunæ crescunt, decrescunt, & omnes suas phasès constituunt. Id quod veteres Astronomi neq; animadverterunt, neque tradiderunt.

in Telescopio facta.

1. Venus lumine plena & rotunda conspicitur, quando est occidentalis directâ & conjunctionem cum Sole in Apogæo vel Aphelio celebravit. Quando paulò longiùs progreditur, fit gibbosa, & quando ad maximam elongationem à Sole (quæ 47. gradus nunquam excedit) pervenit, dimidiata per Telescopium cernitur. Sed, cùm fit retrograda, & ad alteram conjunctionem in perihelio atq; infra Solem properat, magis magisque lumine decrescit, ita ut tandem falcata & corniculata appareat, donec radios Solis incurrat, & ab iis occultetur. Rursum, quando mane, post conjunctionem cum Sole, ex radiis Solis emergit, & orientalis ac matutina incipit fieri, primò falcata Tubo Optico videtur, postea, in maxima elongatione, bisecta, & tandem, in recurso ejus ad Solem, & paulò ante immersionem in radios ejus, iterum rotunda & plena Telescopio deprehenditur. Hujus diversæ apparitionis stellæ Veneris, unusquisque bonæ notæ Tubo Visorio instructus, poterit facere periculum: dignum enim est, hoc eximium cœleste spectaculum & diligenti oculorum aspectu & accuratâ mentis contemplatione. De me ingenuè fateor, quòd non sine singulari animi, & oculi voluptate, hæcè diversas Veneris facies, sæpenumero sim intuitus. Propterea non possum non memoriâ repetere figuram ejus, quam Anno Christi 1644. Mense Septembri obtinuit. Nam, quum ante Solis ortum inciperet sese conspiciendam præ-


dam præbere, ad omnes & singulas ejus phases studioſe attendi. Atque certò mihi perſuadeo (quod tamen citra jaçantiam dictum eſto) has obſervationes Veneris non eſſe vulgatas, & celebratas antehac: ſiquidem eàs non ſolummodo horis antelucanis, & ante ortum Solis; ſed etiam de die, & clariffimo præaltoque Sole, per Teſcopium affabrè elaboratum, optimis lentibus præditum, concinnèq; diſpoſitum, ſummo cum ſtudio notavi. *Obſervationes Veneris diurnæ.* Quamobrem hæc phases Veneris omnes & ſingulas à me obſervatas in gratiam Philo-mathematicorum & Aſtrophilorum æri inciſas non ſolùm hîc oculis ſubjiciam; ſed etiam omne id, quod circa quamque phaſin animadverſione dignum eſt, hîc exponam: quippe quin ex hiſce bene à me perſpectis, & diligenter exploratis Veneris apparitionibus nonnulla, quæ antea minùs cognita de Venere fuère, poſſint elici, nullus dubito. Deprehendi namque, quòd phases Veneris, de die, claroq; Sole, meliùs & certius queant notari, quàm de nocte; & quòd parvum foramen convexæ lenti Perſpicilli applicatum faciem Veneris magis detegat, quàm magnum; & quale inter utrumque ſit diſcrimen; quòdque, non ſolùm Venus, in maximâ elongatione à Sole, de die, nudis oculis poſſit conſpici; verùm etiam nonnunquam, paulò poſt primam ejus emerſionem ex radiis Phœbis; & id genus alia, quæ ſequentur.

Iam igitur ad ipſas accedo obſervationes. Anno 1644. die 30. Septembris ſc. n. horâ 5; matutinâ ante ortum Solis, die quinto poſt ejus emerſionem matutinam, die verò duodecimo, poſt conjunctionem cum Sole, primùm cœpi faciem Veneris Tubo meo Optico ſpectare, quali ſoleo alias Jovem, Lunam & Saturnum obſervare, jubar ejus admodum tenue apparebat, & vix magnitudinem ſeſquipollicis equabat cornuaque ejus videbantur præacuta, diameter quidem ſatis magna cernebatur. Erat hoc ſpectaculum Veneris egregium viſuque non indignum, quale in præſenti diagrammate K, numero 1. præſentatur: Facies Veneris non apparebat major, quàm Lunæ Novæ, duorum aut trium ad ſummum dierum. Eâdem quoque facie poſtridie, nempe die 1. Octobris eâdemque magnitudine, ſive per magnum, ſive per parvulum foramen, convexo vitro *Veneris obſervatio prima.*

vitro impositum, conspiciebatur. Diameter ejus satis apparebat magna, imò quadrante major, diametro Iovis. Hic autem animadvertendum est, quòd consultò diametrum ejus unam alterà majorem in præsentè Schemate non constituerim, tametsi Venus circa priùas observationes major videbatur, quàm postea: siquidem veluti Venus diametro minuebatur, ita lumine crescebat. Quemadmodum enim, nulla infallibilis, evidens certaque ratio decrementi & incrementi diametri, hætenus fuit inventa & liquidò demonstrata: ita quoque nos hic nulla cogit necessitas, quare diametrum ejus vel ampliem vel contraham. Quocircò placuit eam ab omni parte æqualem retinere, eò quòd omnes nostræ observationes non diametri Veneris variationem, sed phasium diversitatem inquisiverint.

*Observatio
Veneris
secundæ.*

2. Die 13. Octobris horâ sextâ matutinâ ante ortum Solis iterum Phosphorus à me fuit observatus, qui quidem nudo vi sui major videbatur, quàm die 30. Septembris. Atque etiam per Telescopium, tam majori, quàm minori foramine præditum, phasis ejus magnitudinem quatuor digitorum excedebat. Horâ septimâ, post ortum Solis, rursus Venerem orientalem non solum sine Telescopio, sed & oculo Telescopio armato intuitus sum. ubi phasis ejus uno pollice minor, quàm horâ sextâ apparebat: cornua quoque ejus longè acutiora deprehendebam, quàm ante ortum Solis. Horâ octavâ Venerem adhuc nudis oculis potui spectare, ut ut jam satis parvam. At per Tubum à me inspecta, diametro non defecerat: eandem enim nunc etiam observabam, quam horâ sextâ notâram. Phasis autem non tantummodo videbatur evidentior, & cornua ejus acutiora; sed etiam ipsa erat in ambitu cōtractior & tenuior, ita ut eam 2½ digitis majorem æstimare non possẽm. Circa nonam nondum vilum meum effugerat, etiamsi satis parva cerneretur. At circa decimam sensim obscurior facta, evanuerat. Quod veram ejus diametrum in collatione hujus observationis cum eâ, quam die 30. Septembris institueram, attinet, ea jam perspicuè diminuta erat. Advertendum igitur hic est, quòd Venus licet magnitudinem 2½ digitorum non excesserit, de die, Sole satis alto, non tantum nudis oculis, verum etiam Perspicillo egregiè lustrari



lustrari potuerit : id quod antehac parùm fuit animadversum, dum multi crediderunt, eam de die priùs conspici non posse, quàm si bisecta fieret, & in maximâ elongatione Solis versaretur.

3. Die 20. Octobris horâ septimâ, sub ortum Solis, iterum phasin Veneris observavi quatuor ferè digitis majorem. Horâ octavâ verò, Sole sublimiore, eam beneficio Telescopii, non tribus digitis majorem notavi, sicut in subjecto diagrammate numero 3. videre est.

*Observatio
Veneris ter-
tia.*

4. Die 30. Octobris ante ortum Solis Lucifer satis grandis emicabat : Tubo lustratus & 5¹/₂ digitos circiter ejus diameter æquabat. Post ortum Solis autem, oculo armato conspecta 3¹/₂ digitos vix excedebat. Vide phasin num. 4.

*Observatio
quarta.*

5. Die 6. & 9. Novembris denuo Venerem Orientalem fulgente Sole observavi, & diametrum ejus 4¹/₂ digitos æquantem deprehendi. Hoc ipso die autem non solum eam circa octavam matutinam, sed etiam circa nonam, decimam & undecimam, cum Telescopio & sine eo dilucidam, & illustrem conspexi. Et credo, eam diutius à me & fortè per integrum diem visam fuisse, si porrò, præ occupationibus, attendere potuissem. Paulò ante meridiem circa undecimam, semper Venerem magis acuminatam, mundam & liquidam animadverti, ita ut minimè possim affirmare, sicut alii ante me fecerunt, Venerem tum cornua, non acuta, sed obtusa præsentare. Notari hic quoque potest, quòd si Veneris diameter, quinque digitos, vel circiter attingat, & per usitatum foramen, vel ante, vel sub ortum Solis, inspiciatur, non rotunda, sed angulata & inæqualiter radiosa appareat. Verùm, cum parvum applico foramen, eam formâ rotundâ & fastigiatâ perspicio. Die 21. Novembris adhuc in eadem fermè consistebat magnitudine.

*Observatio
quinta.*

6. Die 15. Novembris horâ 10. ante meridiem, diameter ejus non planè quinque digitos adsequabatur.

*Observatio
sexta.*

7. Die 21. Novembris ante Solis Ortum diameter ejus sex digitos superare videbatur. Sed ad decimam non major 5¹/₂ digitis cernebatur. Vera autem ejus diameter, circa hoc tempus non tantâ erat, utpote quæ non multò major erat, quàm Iovis.

*Observatio
septima.*

8. Die

*Observatio
oſava.*

8. Die 25. & 28. Novembris, horâ nonâ & decimâ, ante meridiem, Venerem planè biſectam, inſtar Lunæ, quando in quadrato Solis verſatur, intuitus ſum. Equidem ante ortum Solis quodammodo gibboſa videbatur, magnitudine ſeptem fermè digitorum. At denſè circumfuſum lumen faciebat eam ſolito grandioſiorem, ut & antehac ſæpiùs accidit. Hic rurſum eſt obſervandum, quòd licet ejuſmodi phaſes in Venere, de die, & Sole præalto claròq; appareant, non ſufficiat radios adventitios, per vulgare & magnum foramen, ſuperiori circulo lentis convexæ impoſitum, Veneri detrahere; ſed præſtet etiam de die minùs foramen adhibere. quod hoc tempore manifeſtiſimè ſum expertus.

*Observatio
nona.*

9. Die 30. Novembris, ad horam nonam & decimam, ante meridiem, Venus aliquantùm gibboſa apparebat, ita, ut linea ſectionis luminis & umbra, non ampliùs recta fieri cœperit, ſicut in priori figurâ numero 9. ante oculos poſitum eſt.

*Observatio
decima.*

10. Die 2. & 4. Decembris, horâ nonâ matutinâ, denuo cogebam vitro averſo Tubi viſorii parvum foramen imponere, ut Venerem radiis adventitiis nudatam & phaſin ejuſ evidentè & perſpicuè cognoſcerem. Atque, ut idem facerem ſequentibus diebus, me neceſſitas impulit. Hoc die, pars ejuſ luminofa, non multùm à ſeptem digitis abſuit.

*Observatio
undecima.*

11. Die 11. & 13. Decembris horâ nonâ matutinâ, ad priorè magnitudinem, octavus quoque digitus acceſſerat.

*Observatio
duodecima.*

12. Die 17. Decembris, horâ nonâ matutinâ, lumen ejuſ ad novem uſque digitos, vel circiter, dilatatum apparebat.

*Observatio
decima tert-
tia.*

13. Die 13. Januarii Anno 1645. Venus, Sole ſatis ſublimate exiſtente, jubar ſuum ſupra decem digitos latè explicuerat.

Ex hoc tempore, Venerem, ingruente obſcuro aère & intervenientibus aliis occupationibus, ampliùs nec videre nec obſervare mihi licuit. Iam verò addam aliquas concluſiones ex hiſce obſervationibus elicitas.

Venu perigea nudis oculis ſpectata admodum apparet parva.

I. Quòd Venus matutina nudis oculis ſpectata, ſæpe non adeò magnam præ ſe ferat ſpeciem, præſertim, quando conjunctioni Solis vicinior eſt, & in perigæo exiſtit, ubi phaſis ejuſ adhuc parva, etiamſi diameter, & integrum ejuſ corpus tum omnium maximum ſit.

II. Quan-

II. Quotò longius Venus à Conjunctione Solis recedit, eò majus apparet lumen ejus, tamen si diameter decrefcit.

III. Quàm maximum autem ejus jubar, in confpectu oculorum relinquatur, quando magnitudinem quinque vel ſex digitorum adæquitur. Poſtea de die in diem lumine deficit, ſicut antea creverat, uſque ad conjunctionem Solis, ita ut de eà hoc axioma poſſit uſurpari: quò magis lumine Venus grandefcit, eò minor fit diameter ejus, minorque apparet.

IV. Antelucano & matutino tempore ſemper Venus grandior elucet: At de die, & Sole in excelſo poſito, anguſtior viſu nudo apprehenditur, ubi tamen Tubo inſpecta, ratione temporis, diameter ejus indifferens animadvertitur.

V. Adminiculo Teſcopii Venerem, etiamſi lumen ejus nondum digitos duos magnitudine ſuperet, tam per magnum, quàm parvum foramen, tamque ante, quàm poſt ortum Solis, diſtinctè & clarè contemplari licet.

VI. Quàm primùm autem Venus lumine adaucta conſpicitur, ante Solis ortum commodiùs adhibito parvo foramine luſtratur, & quò magis matutinum eſt tempus, eò minore opus eſt foramine. Poſt ortum verò Solis foramen magnum idem poteſt præſtare.

VII. Sed, cum quinque digitos exæquat, tum ante, tum poſt ortum Solis, & de die, minus foramen Tubo ſemper imponendum eſt. Namque, quò magis lumine crefcit, & phaſis amplior fit, eò minus foramen adhibendum eſt, ſi modò nobis non inæqualiter flammea & anguloſa, ſed genuina, diſtincta & globoſa debet apparere.

Tandem priuſquam ad Mercurium perveniamus, pariter Veneris Veſpertina decreſcentis, poſt Solis occaſum habitas, obſervationes aliquot ſubjiciamus. Ex quibus quidem phaſibus, æque clarè decrementum Veneris patebit, ac ex antecedentibus incrementum ejus innotuit.

14. Anno 1645. Menſe Octobri atque Novembri, paulò poſt ejus emerſionem veſperſtinam, toto orbe propemodum pleno lucebat.

15. Anno ſequenti 1646. die 20. Martii, horâ 7. veſperſtinâ,

K.

Venus

Venus quotò longius à Sole recedit, tantò lumen ejus crefcit.

Venus nudo viſu apparet maxima, quando phaſis ejus quinque vel ſex non ſuperat digitos.

Venus quò magis lumine crefcit, eò magis ratione magnitudinis decreſcit.

Venus ante Solis ortum major apparet.

Venus corniculata æque perſpicue per magnum, quàm parvum foramen ſervatur.

Quidnam obſervandū, lumine cum ſit auſa?

Quando minori foramine uti oporteat?

Obſervationes Veneris veſperſtina.

Obſervatio 1

Obſervatio 2

Venus ratione luminis admodum decreverat; ita ut ejus diametrum, 5. digitos vix superantem, deprehenderim.

Observatio 3 16. Die 3. Aprilis, horâ 7. vespert. pars ejus lucida, tres circiter aequabat digitos.

Observatio 4 17. Die 8. Aprilis, horâ 7. vespert. Phasis Veneris, vix duos excedere digitos videbatur, acutisque splendebat cornibus.

Observatio 5 18. Die 14. April. horâ 7. vesp. lux ejus vix magnitudinem sesquipollicis habebat. Erat autem ejus ferè similis facies, phasi crescenti primæ, Anno 1644. die 30. Sept. temp. mat. observatæ.

Observatio 6 19. Die 21. Aprilis, Phasis Veneris Corniculata, non unius digiti magnitudinem superabat: qualem certè tenuissimam faciem, vix memini me unquam observasse.

Observationes Mercurii. De MERCVRIO hic etiam quasdam adjiciam observationes, quas non ingratas fore spero: quia illæ perraræ solent esse, eò quòd in Aphelio non ultra 28. gradus à Sole recedat, & in Perihelio non ultra 18. gradus; unde minùs sæpe conspicitur, etiamsi in maximâ à Sole elongatione versetur, propter crepusculum diurnum, vel matutinum vel vespertinum, in quo crebrò latitat, ita, ut pauci reperiantur, qui lucis ejus incrementa & decrementa, Telescopio exactè consideraverint, vel phases ejus consignerint. Causa procul dubio ea potissimum fuit, quòd semper idem foramen æquè amplum in convexâ lente retinuerint. Postquam enim pro positu Mercurii angustius foramen quandoq; imposueram, & hoc pacto Mercurium lustraveram, tum phasim ejus clarè & distinctè potui deprehendere, quemadmodum posthac quilibet bono ac longo Tubo visorio instructus, hæc luminis vicissitudines in Mercurio poterit animadvertere.

Cur hæc vicissitudines Mercurii observari non potuerint?

Et ad phases Mercurii considerandas angustiore foramine uti necesse est.

Observatio Mercurii 1. 1. Prima Mercurii observatio à me fuit instituta, quàm æri incisam priori loco delineavi, Anno Christi 1644. die 22. Novembris st. n. horâ septimâ matutinâ. Contemplatus namq; sum ipsum probo perspicillo, & deprehendi illum adhuc parum lumine diminutum, & ejus diametrum parvam, imò Martis diametro minorem, quantum ex collatione cum Veneris diametro colligere poteram, ita ut nondum sesquiminutum compleret.

2. Die

2. Die 30. Novembris eâdem horâ septimâ matutinâ iterum cum Telescopio diligenter perspexi & observavi eum nondum bisectum, sed gibbolum apparuisse : tamen credo, illum majorem, quàm dimidiatum hoc tempore haud fuisse ; quòd mihi autem phasis ejus major aliquantulum apparuerit, inde oritur, quòd lumen ejus superfluum, parvo adhibito foramine, nondum penitus adimere possumus. Quippe constat ex observatione Veneris, quòd nec exiguo foramine ipsi omne lumen circumfusum detrahare possimus, nisi hoc fiat, post exortum illustris Solis, & luce serenante. Sed quia id in Mercurio fieri nequit, propterea quòd diameter ejus minor sit, & Soli proximus adstet, nec de die conspiciatur, hinc fit, ut phases ejus uno vel etiam sesquidigito majores queant apparere, quàm revera sint. Hinc planè sum in eâ sententiâ, Mercurii diametrum eam ob causam semper majorem apparere, & ideo eam tantò minorem æstimari posse.

Observatio
Mercurii 2.

Cur phasis
Mercurii a-
liquantulum
majori, quàm
revera sunt
nobis appare-
ant?

3. Die 2. Decembris horâ septimâ 15. min. matutinâ phasis minor, quàm bisecta apparebat, sicut ex figurâ num. 3. constat. Nudo oculorum aspectui minor; sed Telescopio lustratus major, quàm antea videbatur. Capiebam etiam Radio Astronomico Mercurii distantiam à Spicâ Virginis, quam adinveniebam 30 45. ut & intervallum ejus à Venere quod erat 28 55. nec non intercapedinem Veneris à Spicâ Virginis, quæ fuit 8 46.

Observatio
Mercurii 3.

4. Anno 1645. die 16. Maii horâ 8; vespertinâ iterum Mercurium observavi, qui nondum dimidiatus apparebat, sicut ex diagrammate ejus numero 4. patet. Diameter ejus major comparebat, quàm quum Matutinus esset, nec non aliquantulum major stellâ fixâ primæ magnitudinis, cum eum applicato parvo foramine vitro convexo inspiciebam. Die 18. Maii horâ nonâ vespertinâ non multò diversus à priori formâ eminebat.

Observatio
Mercurii 4.

5. Die 19. & 20. Maii horâ 9; vespertinâ se se dimidiatum ferè representabat. Die 23. & 24. Maii, eodem ferè modo sese conspiciendum præbebat.

Observatio
Mercurii 5.

6. Die 30. Maii horâ 9; vespertinâ, rursus Mercurium observavi, eumque propemodum bisectum notavi, ubi & si-

Observatio
Mercurii 6.

mul nova Lunæ cornua, post quintum interlunii diem animadverti præsentia. Phasis ejus in præcedente Schemate, numero sexto exprimitur.

CAPUT V.

DE MAGNO ET ADMIRANDO LUMINE Solis, ejus Maculis ac Faculis, de naturâ earum, & quomodo illæ diverso, novo faciliq; modo queant observari; nec non de illis, quæ circa observationem istarum sint consideranda.

Opera Dei immensa, admiranda & innumerabilia sunt.



Quando opera Dei in hoc mundo, sive in Cælo, sive in terrâ, nobis consideranda proponimus, quorum minimam tamen partem cernimus & cognoscimus, longèq; plura nos latent, & numerosiora sunt, quàm ut ea enarremus, sicuti Rex & Proph. DAVID *Psal. 40. v. 6.* memorat; tunc cogimur cum Ecclesiast. egregio Sapientiæ DEI prædicatore. in hæc verba erumpere: *Domine, quàm admirabilia & desiderabilia sunt opera tua, quis expleatur videndo gloriam tuam? conspicua ea est in immensâ altitudine, expanso puro Firmamento.* Inprimis autem Sol ad aspectum nunciat de glorioso DEO, de quo paulò ante dictus sapiens Doctor Ecclesiasticus, cap. 43. v. 2. & seq. sic loquitur: *Sol exorians annunciat diem, instrumentum est admirabile & opus Altissimi. Cum in meridiano est, arefacit regionem; & ex adverso æstus illius quis subsistat? in caminum sufflet operibus æstus sui. Tripliciter Sol exurit montes, vapores igneos efflat, & resurgens radius hebetat oculos. Magnus est Dominus, qui fecit illum, & sermonibus suis sedavit iter illius!*

Solis encomium ex Ecclesiastico.

Sol ex primavâ luce factus est die quartâ.

Hanc splendidissimam Mundi lampadem Phœbeam, tanquam eminentissimum DEI opus, attentiore animo meritò considerare & paulò prolixiore calamo describere par est. Vbi principio Theologis illis non refragamur, qui docent, primam illam lucem; à DEO, ex nihilo creatam, die quarto creationis, in corpus Solis fuisse translata. Quin etiam textui Mosis non contrariari videtur, Lucem primogenitam ejusdem fuisse cum Sole naturæ: quia tum quoq; ex Lucis istius motu & conversione, qua

ne, quâ matutinum quâ vespertinum tempus, dies ac nox à se invicem potuerunt discerni. Hoc tantummodo isti luci defuit, ut demum die quartâ peculiarem speciem, formam & locum in cœlis à DEO obtinuerit. Porro verò nunquid hæc princeps Lux clara & lucida, vel ignea fuerit nubes, non jam disputabo. Alioquin existimo, tam documentis sacræ Scripturæ, quàm evidentibus rationibus probari posse, Solem esse verum & realem ignem. Verùm: quia hæc de re jam satis abundè egerunt Christophorus Scheinerus in Rosa Vrsinâ lib. 4. parte 2. Franciscus Patricius, libro nonodecimo Pancosmias pag. 108. & P. Franciscus Reita à Talleacotio, in Meteorologia, lib. 1. de Meteor. ign. cap. 10 ideoq; ne actum agam, B. Lectorem illos lectum ablego. Interea hoc certum est, quòd hic Siderum princeps, Sol, per se sit sphæricus, sicut circumactus ejus in orbem evidenter ostendit, non tamen exactè politus & tersus in superficie, instar convexi speculi, multò minùs ex sui similibus & uniusmodi per omnia partibus compositus; sed constat ex multiformibus ac diversi generis; quæ distinctæ partes non solum distinctis temporibus dispar habent lumen; sed & suum distinctum, & in varietate aliquâ continuaque fluxione constitutum motum, ita quidem, ut is de die in diem, quodammodo variet: unde manifesta in Sole generationis & corruptionis vestigia apparent. Hoc pronunciatum autem dubio procul Aristotelicis nimis durum admodumq; intolerabile videbitur: at, si veritatis sint amantes, neque in meridie cœcutire velint, patientur evidentibus argumentis sibi demonstrari, quòd Maculæ luculæ faculæque, tam primariæ quàm secundariæ in Sole conspectæ nequaquam (ut illi nimis quàm sæpè hîc nobis occidunt) à fallaciâ visus proveniant, sed esse vera & genuina phænomena, ipsamque objecti repræsentationem. Nam, quia affirmanti incumbit probatio, idcirco, tuendæ veritatis gratiâ, illud ipsum, in recensendis meis Macularum Solarium observationibus, indubitatis rationibus comprobabo, ita ut nemo nisi contradicendi pruritu laboret, jure queat refragari.

Quemadmodum igitur hæc faculæ, maculæ & umbræ exterram Solis speciem mirè variant: ita & in corpore Solis distinctos for-

Sol verus & Materialis ignis est.

Sol est S; ariscus in superficie, nonnihil asper & ex heterogenis partibus constat.

In Sole vestigia alterationis & corruptionis deprehenduntur.

*Sol est corpus
compactum,
ex sententiâ
Kepleri*

etos formant colores, quorum nonnulli ab ipsâ quoque Solis luce proficiscuntur, ita ut Sol circa centrum & medium versus semper clarior & lucidior appareat: quò verò magis illa lux circa peripheriam tendit, eò fit debilior & obscurior: qui color ignis flammæ non dissimilis est. Quod naturam singularis materiæ Solis, ex quâ hoc corpus constat, attinet, ita de eâ solertissimus Mathematicus Keplerus, in Astronomiæ Parte Opticâ pag. 225, & cap. 34. de Motu Martis pag. 176. scribit & sentit: *Corpus Solis ex materiâ constare omnium, totius mundi densissimâ, & intra cujus angustissimû orbem, tantum conclusum sit materiæ, quantum in totâ aurâ ciberæ per infinitam ferè solidæ spheræ mundanæ amplitudinem est dispersum. Esse autem densitatem hujus corporis in summo gradu, requirit ejus calorifica vis tam acris, tamq̃ longè porrecta. Equidem ignitorum, quæ sunt ejusdem quantitatis tantò quilibet violentius urit & longius, quantò densius: plus carbo quàm flamma, plus ferrum candens quàm carbo.*

Quocirca, quum Sol sit adeò densum corpus, ex sententiâ Kepleri, ideoque eò valentiùs emittere potest lumen.

*Solem esse a-
liquatenus
lentum &
spongiosum.*

Alii verò, cum Raphaele Aversâ, statuunt contrarium, nempe Solis naturam esse liquidam; sicut Aristarchus Samius, in suo Systemate Mundi, nuper Parisiis publicato p. 23. existimat: *Solem non planè esse durum, veluti Crystallum aut lapidem, aut aliquod tale corpus, cujus partes flecti non possint, sed aliquatenus lentum & spongiosum cum superficie rudi, asperâ atq̃ inequali, totâq̃ montibus & vallibus respersâ, idemq̃ omni ex parte interius & exterius multis montibus & caritatibus, ceu fibris & venis scaterere, instar spongiæ sive pulmonis alicujus animalis.*

Quæ opinio licet mihi non adeò videatur absurda: tamen judicium de eâ cuilibet liberum relinquo, & , ut accuratè utraque expendatur & disputationes conferantur, opto: siquidem tam abstrusa materia ulteriori consideratione per est digna. Quandoquidem planè mihi persuadeo, in orbe universo nihil majus, nihil cum majori admirabilitate conjunctum, quàm lumen Solis, quod de se in totum Mundum diffundit, & terram versus quoque circulariter ac pyramidaliter projicit. Hoc autem fit sequente modo.

*Quomodo
Sol lumen
suum in ter-
ram spargat*

I. Lumen quidem Solis pèr lineas rectas propagatur; sed id non simpliciter est accipiendum: verùm ita, quòd aspectabile hoc corpus Solis in quodlibet punctum terræ conum illuminationis ejaculetur, cujus basis est visibilis circulus Solis, vertex autem quodlibet illuminatam punctum. II. Quo-

*Sol triplici
modo radiis
suis ejacula-
tur.*

II. Quoniam hæc nostra terra, regione vaporosa est circumdata, ideoque Solis radii triplici modo progrediuntur, nempe directo, refracto & reflexo. Hinc fit, ut adeo diversæ, sint radiorum Solarium operationes, & ut alio tempore alioque loco plùs, alio minùs aliquid excalfaciat: actio autem ejus fortissima est radiis directis, quia illi sine ullo impedimento in superficiem terræ incidunt. Postea operatur etiam radiis refractis, qui licet sint debiliores, tamen & illi uno in loco valentiores existunt, quàm in alio, prout radii Solis obliquiùs vel rectiùs in spheram vaporosam incurrunt, eaque vel densior vel rarior, profundior aut tenuior extiterit; quo pacto radii solares enerwantur, & quasi hebetantur. Tandem quoque Sol agit radiis reflexis, qui sicut maximè infirmi; unde & Solis actio per hosce valde debilis redditur: fit enim, Sole infra horizontem existente, ubi radii & lumen ejus in aversam hemisphærii partem delabuntur, ex quibus stellæ supra horizonta de nocte illustrantur, & nos inde lumen Solis in terram refusum accipimus, & sentimus omnium infirmissimum lumen, & perexiguam calorem Solis.

Qui hanc triplicem Solis actionem in hæc inferiora per radium triplicem rectè percipit, is complures jucundas quæstiones, tam Geographicas & Opticas, quàm Astronomicas, haud ægrè comprehendere, intelligere & solvere poterit: quales sunt

1. Quare Sol estate magis terram calfaciat, quàm hyeme, quum tamen, circa brumam, terræ propinquior sit, quàm circa solstitium æstivum?
2. Cur Sol exoriens & occidens minùs caloris introducat, quàm circa meridiem?
3. Quamobrem Solis radii in murum vel vallem devenientes sint efficaciores, quàm si in planitiem labantur?
4. Quid est, quod Sol iis in locis, ubi polus est sublimior, minùs excalfaciat, quàm ubi est declivior?
5. Quid causæ, cur homines, qui incidentiæ perpendiculari radiorum Solis subjacent, maximum æstum percipiant?

Et aliæ hujuscemodi quæstiones, quas silentio præterimus, eo quod à nostro instituto sint alienæ.

Aliquot difficultatum quæstionum solutio à triplici projectione radiorum Solis dependet.

Restat, ut & quædam de Solis loco, magnitudine, distantia à terrâ, ut & de motu ejus, & mensurâ gyratione attingam.

Quod

*Sol centrum
Mundi occu-
pat.*

Quod ad locum Solis attinet, in illorum sententiam eo, qui statuunt hoc amplissimum, clarissimum & utilissimum jubar, quòd non tantùm radiis suis universum orbem terrarum illustrat, sed & calore suo omnes creaturas fovet & sustentat, ab omnipotenti DEO in hujusmodi loco esse constitutum, statim in principio creationis, ex quo, ceu medio, radios suos æqualiter versus omnia extrema jacere possit; nimirum in ipso centro Mundi. Soli namque nullum alium locum in universitatis corpore competere multi præclari Astronomi evidentibus rationibus, certisque demonstrationibus comprobarunt; ita ut hac nostrâ tempestate peritissimi sideralis scientiæ Magistri huic sententiæ adstipulentur. Soli Peripatetici hoc dogma omnibus viribus eunt impugnatum, eò, quòd stante hoc Theoremate, Terra ex centro Mundi necessariò contra sententiam Aristotelis sit dimovenda; cujus omnia præcepta solidissima esse censent, ita ut nefas ducant, vel latum unguem ab ipsis discedere, præfertim quum situs Solis in centro Mundi motum Terræ supponat & stabiliat, atque è contrario (ut ipsi perperam inferunt) quietem Solis in centro Mundi. Verùm ex statu Solis in centro Mundi, non statim necessarià Mathematicorum ratione quies Solis concluditur. Etenim, licet Astronomi recentiores adstruant diurnam terræ circumvolutionem circa suam axem, & annum motum secundùm seriem signorum per duodecim Eclipticæ signa, quàm conversionem geminam; alii cum Ptolemæo, Soli & primo Mobili tribuunt; tamen Soli non omnem denegant motum, sed asserunt, Solem in suo centro gyrari, ita ut unam conversionem circa axem 27. diebus vel circiter absolvat, hoc est intra annum spatium ter & decies ab ortu in occasum respectu motus apparentis. Interim tamen est motus s. s. sicut Planetæ in suis Epicyclis moventur. Hinc Sol non semper eandem retinet faciem, veluti Luna, sed quotidie eam variat: id quod ante annos non ita multos primùm fuit animadversum. Hodie cuilibet iste motus, ex variatione macularum in disco Solis, apertè potest monstrari & indubitatò oculis subijci. Hic motus quidem fit circa axem Solis, ita tamen ut ejus poli non uno in loco stabiles persistant; sed annuo spatio convertantur:

*Sol in centro
Mundi exi-
stens move-
tur.*

*Sol periodi-
cum motum
suum circa
axem 27. di-
ebus ferè per-
agit.*

vertantur : diurno namq; & menstruo intervallo ex plagâ occidentali in orientalem magis magisq; promoventur. Poli duo sunt, Austrinus & Aquilonaris; & quo pacto unus movetur, eodem & alter. Alter autem in visibili hemisphærio semper progreditur; alter in oppositâ parte. Polus, qui hemisphærium apparens respicit, ab occasu in ortum fertur: oppositus contrario motu incedit; ita, ut si unus oriatur, alter vice versâ occidat. Atq; hic motus semper est sui similis & regularis; ex quo motus macularum curvilineus & rectilineus necesariò sequitur: sicut in sequentibus ostēdetur fusiùs.

*Poli duo in
Sole mobiles.*

*Quomodo
Poli movē-
tur?*

Denique de distantia Solis à Terrâ, e jusq; magnitudine, hæc tenenda sunt. Illa non semper est æqualis, respectu Terræ. In maxima namq; elongatione, & terrâ existente, quasi in Aphelio, tum Sol à nobis est remotus, mille centum & octoginta duabus semidiamentris Terræ, quæ constituunt milliar. Germ. semel millena sedecim millia quingenta & viginti. Quando verò in Perihelio versatur, abest 1101. semidiamentris terræ, quæ faciunt milliar. Ger. 946860. Quanquam Keplerus hanc distantiam Solis à terrâ longè majorem reddit, eamq; extendit ad 3469. semidiamentros Terræ; sicut apparet ex Astronomiæ ejus Copernicane lib. 4. pag. 490. Sol autem, secundum hypotheses Tychoonis Braheï, major est Terrâ 140. vicibus, ita ut diameter ejus æquet miliaria Germanica 8944. Secundum Keplerum autem Solis diameter est 15. partium, qualium Terræ est una. Quare meritò utique stupendam magnitudinem Solis, immensamque distantiam ejus à terrâ, & singularem motum admiramur, atque cum Rege & Prophetâ Davide, exclamamus, ex Psal. CIV. v. 24 : *Quàm magnificata sunt opera tua, Domine, omnia in sapientiâ fecisti : impleta est terra possessione tuâ !* Et iterum, ex Psal. CIII. v. 22 : *Benedicite Domino omnia opera ejus ; in omni loco dominationis ejus.*

*Distantia So-
lis à Terrâ
quanta?*

*Magnitudo
Solis.*

Sed tantum de fulgentissimo Solis jubare, quod Sirachides c. 43. v. 2. pulcherrimè nuncupat instrumentū, seu vas admirabile: restat autem, ut etiam succinctè, at perspicuè tamen & distinctè, de maculis & Faculis in superficie Solis conspicuis, deq; genuinâ earum constitutione, generatione, dissipatione, & motu, tum rectilineo, tum curvilineo, agam; ita ut hunc minimè dubiis observationibus stabiliam, nec non modum observandi, cum omni præparatione & cautione, detegam. L At

*De maculis
Solis, post Ga-
lileum, nemo
prius, aut lu-
culerius scri-
psit Christo-
phoro Schei-
nero.*

*Utius ob-
servationum
Macularum.*

Atque Maculæ quidem & Faculæ Solis, admodum mira apparent phænomena, iis imprimis, qui nunquam illas antehac contempserunt: cum multa etiam insuper singularia & inaudita circa eas occurrant. Et sanè omnino nova inter reperta referri debent: quippe quæ, non nisi ante paucos annos, adminiculo Tubi Optici, à Galilæo, eminentissimo illo Philosopho Italo, sint detectæ. Quanquam circa idem ferè tempus, in iisdem observandis maculis, valde admodum occupatus fuerit incomparabilis & omnigenæ eruditionis, Christophorus Scheinerus, qui in suis postmodum editis observationibus tantam profectò ostendit diligentiam, ut hac in materiâ omnibus palmam quasi præripuisse dici possit; ut ut graviter quoscumque moneat Astronomos, ne non exemplum à se capientes, ad ista tam recentia & præcisè planè incognita phænomena, quàm maximè diligentissimè oculum & mentem advertant. Quandoquidem igitur ille hac in re tam laudabiliter nobis præiit, dum, posteritatis juvandæ ergo, circa observationes macularum istarum omnem movit lapidem, ut & naturam earum & motum genuinum quàm accuratissimè indagaret; attento, exactam Solaris istius phænomeni scientiam, non Astronomiæ tantùm, sed universæ quoque Philosophiæ naturali, emolumentum insigne allaturam: æquum sanè est, ut vestigiis ejus insistamus, & quantum possumus itidem in hæc omnia studiosissimè inquiramus. Quæ autè commemoratus autor præstitit, in egregio ejus opere, quod Rosam Urfinam, sive Solem inscripsit, Annoq; Christi 1630. divulgavit, præclarè videre est. Quemadmodum negari sanè haud potest, rectè perspectà macularum Solarium naturà de haud paucis controversiis Physicis Astronomicisque, iisque vix parùm arduis, indubitati aliquid statui posse. Namq; Peripatetici cum primis ex ortu & interitu Macularum istarum tandem aliquando intelligent, doctrinam de generatione & corruptione cœli, non esse inane cerebri figmentum, & imaginariam aliquam apparitionem; sed ex naturà ipsà Cœli haustam, & revera in æthere fundari. Astronomi verò ex animadverso cursu Macularum Solis, & menstruam conversionem Solis in axe circa polos mobiles, plus quàm sufficienter demonstrabunt, & sententiam etiam suam de cœlo liquido, evidentissimè confirmabunt,

ncc

nec non differentiam Longitudinum Locorum, lato modo, in diversis & remotioribus civitatibus inde discent deducere, ac hujusmodi alia. Quoniam autem hoc non paucis observationibus statim explorari & cognosci, neque tam citò macularum natura, materia & motus alterationis indagari potuit; idcirco supra laudatus Vir Scheinerus laborem curamque multorum annorum huic rei coactus est impendere, ut aliquid certi de Maculis Solis proponeret, & invictis rationibus probaret, eas non à fallaciâ visus, & phantasiâ, aut commento aliquo humano, proficisci (veluti nonnulli satis insubidè censent) sed reapse in Sole inesse, cum eo gyrari, & esse phænomena cœli essentialia.

Ob hæc aliasque causas & ego motus sui, exactis observationibus, per ipsum integrum quadriennium, hæc Solis Maculas ex amore veritatis notare. Illæ verò, ad unam omnes Scheineri animadversiones, circa Maculas Solis sine ullâ dubitatione confirmârunt, meque docuerunt, semper novas Maculas, in superficie Solis generari & corrumpi, eas habere suum motum aënum & menstruum, ortus & occasus Astronomicos ac Physicos, & reliquas omnes subire mutationes, quas sæpe laudatus Scheinerus deprehendit: maximâ namque diligentia, & apparatu boni Telescopii, ac cæterorum Instrumentorum hæc animadversiones administravi, unde quoque illas Appendici Selenographiæ inserui. Quandoquidem illæ, eò inprimis deseruiunt, ut unusquisque suas observationes cum hijs conferre, harum difformium macularum uniformem motum, ex iis addiscere atque eò meliùs intelligere possit, & eas omni parallaxi destitui, certò sciat, quemadmodum Galilæus & Scheinerus antehac quoque diversis in locis animadverterunt: præterea ut perspectum ei sit, has maculas superficiæ Solis inesse, neque umbras existere ab alijs corporibus in Solem projectas, neque, tanti æstimandas, ut habeantur sidera, sicuti Iohannes Tardè, & Carolus Malapertius eas Sidera Borbonia, & Austriaca contituerunt: manifestò quippe perspiciet, sentietque hæc sequentia de Maculis Solis asseri posse. 1. Maculas in disco Solis contentas nihil esse aliud, quam compactam aliquam & obscuram

Et autor observationes Macularum instituit.

Maculas esse fulgorem è massa Solis, vi caloris expulsum.

*Faculae esse
lucidiores
Sole partem*

*Vmbrarum
affectiones
quales?*

materiam, nostris terrenis nubibus non dissimilem, & unà cum Sole mobilem. 2. Faculas admixtas esse lucidissimas solis partes, quæ distinctis locis, atque temporibus magis magisque in Sole conspiciuntur. 3. Vmbras illas, quæ corpus Facularum sequuntur, & cum luculis permiscetur, raritate, formâ & magnitudine variari in superficie Solis, instar fumi & nebulæ, quibus Sol hinc inde quasi obductus, tanquam speculû tactu vel halitu oris inquinatum apparere. Et licet non adeo sint durabiles, veluti Maculæ, tamen subinde in Sole, vel faculis permixtæ, vel solæ videntur, moxque iterum dissipantur & evanescent.

*Quotuplicia
sunt Macula-
rum Solarium
genera?*

Postquam autem in hanc materiam de Maculis & Faculis Solis incidimus, nemo nobis vitio vertat, quòd in eâ tractandâ aliquantum hîc simus prolixiores, ut eam nonnihil clariorem reddamus. Etenim non ignorandum est, Maculas Solis esse duplicis generis, alias Primarias, alias Secundarias. Priores rursus sunt duùm generum, vel majores vel minores; eæque iterum vel simplices, vel compositæ, seu mixtæ. Simples eæ dicuntur, quæ nullas habent admixtas faculas. Atque illæ denuo sunt integræ, & quodammodo regularem aliquam figurâ præ se ferunt; aut sunt laceræ, neque ad ulla figuras ordinarias queunt reduci.

*Nucleorum
densitas &
nigredo ma-
jor ceteris
Macularum
partibus.*

*Rariores
Macularum
affectio,*

*Macula non-
nulla, cum-
primis ma-
jores, rutila-
sunt.*

Compositæ ac mixtæ sunt, quæ, vel non continuâ, sed interruptâ serie, densè cohærent, vel simul faculis ac Maculis constant. In hisce, tam simplicibus, quàm compositis, utriusque speciei, aliæ adhuc occurrunt differentiæ: aliæ namque sunt densiores, aliæ rariores. Densiores sunt, quæ constant materiâ magis compactâ, & ideo in Sole communiter diutius durant, antequam extinguantur. 2. Deinde sunt etiam quædam, quæ nucleo valde compacto, & materiâ admodum nigrâ densioreque, quàm reliquæ maculæ partes, apparent. At verò Maculæ rariores nullum obtinent nucleum, & nihilominus quandoque eque diu durant, atque Maculæ nucleo præditæ, ita ut integram Solis diametrum perambulent: illæ de integro non sunt unius formæ, sed modò obscuriores, modò clariores.

3. Sic & aliæ comparent Maculæ, præsertim quæ majores existunt, colore diluto & croceo, instar halonis (qualis circa Lunam fo-

nam solet videri) tinctæ : in minoribus ejusmodi color rarò animadvertitur. Ejusmodi notabile exemplum conspicere licuit Anno 1642. mense Octobri, quod in I^a figurâ H H proponitur, ubi major macula, quæ geminum habebat nucleum, flavâ halone erat circumdata, & ad egressum usq; Maculæ è disco Solis persistebat. Id quod rarò fieri solet. Nam plerûq; in medio Sole enascuntur. 4. Maculæ quædam etiam dicuntur steriles, quia carent nucleis, & colore materiâque sint uniformes. Talem Maculam visam Junio Mense, anni 1642. in quartâ figurâ L L, deprehendis. 5. Insuper aliæ sunt Maculæ, quæ licet ordinario modo statim in ortu appareant circa horizontem Solis, tamen non manent eedem, sed vel crescunt, vel decrescunt : sin autem eandem semper obtineant magnitudinem, tum in eodem statu dicuntur permanere. Hujusmodi crescens macula occurrit in V figurâ M M, mense Junio & Julio, Anni 1643. consignata literâ f, atq; Augusto anni ejusdem in IX. figurâ ac congerie Macularum e. Longè plures autem decrescentes Maculæ reperiuntur præcipuè in X figurâ Q Q, visæ Anno 1643. mense Septembri & literis c, d, & e, notatæ. At eâdem magnitudine persistentem cernere licet in I^a figurâ H H, quàm mense Octobri Anni 1642. observavi. In ingressu quidem hæc, ut & omnes reliquæ, non nihil gracilior, quàm medio Solis apparet, non quòd revera fuerit gracilior, sed quod omnibus maculis Solis commune sit, circa margines & peripheriam Solis attenuari, in medio verò grandescere, eò quòd circa margines, per angulum visionis acutiorem, quàm in medio conspiciantur, quum hoc pacto non vera earum longitudo, sed Latitudo, & ut sic dicam, profunditas aspectu percipiuntur, vi optice Regulæ : *Omnia, quæ sub majori angulo majora, quæ sub minori angulo minorâ spectantur.* Vitellio lib. 4. Theor. 20. Alhaf. libr. 47. num. 40. 41. 42. Maurolyc. lib. 1.

6. Adhæc permultæ observantur, quæ non ordinario modo mox in ortu, Solem incurrant, sed existunt ac generantur, modò in citeriori, modò in ulteriori superficie Solis, modò in parte orientali, modò in occidentali, modò mediâ; quarum nonnullæ sibi constant, & nonnunquam etiam crescunt, ad usque occasum

*Exemplum
Macule magna ab halone crocâ coronata.*

Cur macula in Marginibus Solis sint tenuiores, quàm in medio?

Macula quædam non in ipso Solis horizonte statim videntur & generantur.

suum; nonnullæ verò priùs esse definunt, quàm ad occidentalem horizontem perveniunt, ita ut, quãdo unã die, & quidẽ in medio Sole orientantur, & alterã rursus intereant, quemadmodũ ex III. figurã K K, & orientali maculã c, mense Majo visã, fit conspicuum. Quanquam etiam inter alias ejusmodi Maculæ, quæ tamen admodum sunt raræ, ex tam durabili, tamque tenaci materiã compactæ existunt, non unã tantum, sed & alterã vice visibilem Solis hemisphærium pertransientes. Illæ verò Maculæ *reduces* appellantur: qualis fuit, mense Julio anni 1643. conspecta, & expressa in VI. Figurã sub maculã a; sicut ibidem accuratè est descripta. Sæpenumero etiam in disco Solis uno tempore æquales invicem duæ Maculæ, quæ, quoad materiam, magnitudinem, consistentiam ac colorem, planè uniusmodi videntur, ita ut observator existimet, eas consimili tempore vel occasuras, vel interituras esse. At verò hoc rærenter fit: altera namque earum aliquot diebus citius, præ alterã, antequam observator putasset, evanescit: id verò admirabile est.

Quenam Macula appellatur Reduces?

VII. Genus Macularum,

7. Complures etiam Maculæ multis Faculis & Umbris cinctæ, primùm in exeunte Solis margine apparent, Faculæque cum umbris, elapso uno alteroque die, recedunt, salvã manente nec mutatã Macula: & rursus, ante egressum Macularum è Sole, in occidentali ejus orã, communiter sunt reduces, ita ut quemadmodum istæ Maculæ faculis stipatæ advenerunt, ita quoque non sine iis iterum è Sole egrediantur. Notabile occurrit exemplum in IX. figurã Q Q, anno 1643. mense Augusto, ubi primùm nudè Faculæ comparuerunt, ex quibus sequente die, sex exiguæ Maculæ sunt natæ, quæ diebus insequentibus mirè variarunt: at Faculæ mox tertã die defecere, neque priùs iterum affulsere, quàm sub exitum Maculæ ex Sole. Ejusdem quoque generis fuit Macula a in VI. Figurã repræsentata, & Anno 1643. mense Julio observata. Nonnunquam etiam Macula in Sole sine Faculis oritur, quæ postmodum Faculis comitata è Sole recedit; veluti in VIII. figurã talis exhibetur, quæ mense Augusto anni 1643. fuit animadversa.

VIII. Genus Macularum,

8. Nonnullæ Maculæ in Sole ex umbris nascuntur, & intra paucos dies subito crescunt, grandescunt, & densantur: verùm paulò

paulò post, opinione citiùs, in umbras resolvuntur, antequam sub horizontem occiduum ferantur, ita ut illis accidat, quod proverbii loco dici solet: quod citò fit, citò perit.

9. Quod Faculas attinet, nec illè generis ejusdem sunt: quædam enim splendidiore lumine, quædam debiliore illucent: quædam colore aliquantò flavo sunt præditæ: aliæ sincero gaudent lumine & candicante. Lucidæ autem Faculæ semper se se illustriùs efferunt supra reliquam omnem lucem Solis, ita, ut hoc lumen super cæterum Solis jubar semper emicet. Atq; tales Faculæ rursus duùm sunt generum. Nonnullæ reperiuntur stabiliores ac durabiliores, ita ut, cum in ortivo Solis horizonte apparent, non diffugiant, sed permaneant, usq; dum se in occidentuam partem Solis recondant & evanescant; quod etiamsi perarò fiat, tamen ejusmodi exemplum in X figurâ RR, sub literâ a invenies, à me An. 1643. men. Sept. observatum. Et licet illa de die in diem variaretur: tamen in Sole persistit, & iterum egressa est, in occiduo limbo. Reliquæ verò sunt minùs stables, & tantummodo circa horizonta Solis, ad biduum vel triduum permanent, post, si ulteriùs progrediuntur, in medio Sole extinguntur, vel in Maculas abeunt. Ubi & hoc notandum, quòd, quàm diu hæ faculæ in complexu Solis hærent, in dies crebriùs varias subeant mutationes, quàm maculæ; in super quando Faculæ cum umbris miscentur, se se latius extendant, adeò ut interdum quadrantem, interdum trientem diametri Solis occupent. Ejusmodi magnæ & valde dilatæ Faculæ & umbræ, supra quàm fortasse cuiquam credibile est, in VII. fig. OO occurrunt, quæ sunt à me visæ, d. 20. Jul. An. 1643. Quot verò milliar. Germ. hæ Faculæ æquaverint, quilibet ex perspectâ magnitudine diametri Solaris potest dimetiri. Si namq; assumitur diameter Solis 8944. mill. Ger. tum hæ faculæ 2981. mill. Ger. longæ, & 994. mill. latæ fuerunt; quæ longitudo ac latitudo immanis est dictu, in comparatione cum terrâ nostrâ: siquidem longitudo harum Macularum multò major est longitudine Europæ, Asiæ & Africæ, quæ duntaxat ad 2700. milliar. excurrit, ita ut istæ Faculæ, universam istam omnium trium orbis partium magnitudinem 300. mill. excedant; earum verò latitudo complectitur spatium, quod

IX. Affectio-
nes Facula-
rum mira.

Facularum
distinctio.

Magnitudo
quorundam
Macularum
& Facula-
rum.

Macula Solis non sunt phantasmata, sed realia corpora. quorum magnitudo aliquot milliaria Germanica comprehendit.

Cur Maculae sint multo majores quàm apparent?

Maculae in certâ ratione Solis parte generantur.

Latitudo Macularum, utramq; Eclipticæ Solis partem versus, quantum fit?

Cur circa Polos tantummodo secundariæ Maculae umbrae & exiles Faculae inveniuntur?

quod à mari Mediterraneo, se se ad Caput bonæ spei extendit.

10. Verùm, ut ad Maculas revertar, non est, ut sibi ququam persuadeat, eas esse fallaces apparentias, sensuumque ludificationes inanes: revera quippe sunt substantiæ corporeæ, quæ trinâ dimensione longitudinis, latitudinis ac profunditatis constant, licet hæc ultima sit investigatu difficilis: perspecto enim Maculae ac diametri Solis commensu, inventa est longitudo ejus. Exempli gratiâ: si una se se habet, velut 1. ad 24. tunc 384. milliaria Germanica longa est. Ejusmodi Maculam invenies in IV. Figurâ L L, Anno 1643. die 18. Junii, sub literâ b. At verò nonnunquam sunt majores, adeò ut, longitudine, Africæ sint æquales. Quin & minima, quæ tantùm instar puncti apparet, longitudine milliarium Germanicum superat. Quæ magnitudo licet videatur incredibilis: tamen hæc maculae per se sunt multò adhuc majores, quàm apparent. Et enim, quum Sol longè major sit, quàm ipsum Macularum corpus, ideò averfam earum partem plùs dimidio illuminat. Hincque macula videtur minor, quàm reapse existit; secundùm demonstrationem Opticorum, præsertim Alhaseni, de Crepusculis, num. 3. qui ait: *Sisphericum luminosum illuminat opacum minus, plus hemisphærio illuminabit.* Videatur etiam Vitellio lib. 2. Op. Th. 27.

11. Insuper etiam scitu est necessarium, quòd Maculae primariae, non omni in loco Solis generentur, sed peculiarem suam sedem in medio disci Solis obtineant, in quo, quasi Zodiacum suum constituunt, oriuntur & intereunt, cursumque suum perficiunt. Zodiacus autem iste, multò latior est, quàm Planetarum in Cœlis: siquidem se se ad quadraginta, quinquaginta, imò etiam interdum ad sexaginta gradus extendit, ita ut utroq; in latere Eclipticæ, hoc spatium ad triginta gradus excurrat. Circa polos nullæ magnæ conspiciuntur Maculae, sed tantùm secundariæ umbræ, & interdum exiguæ faculae. Causa hujus rei non videtur esse difficilis investigatu. Quum enim condensatio ac rarefactio Macularum, ex rotatione & motu Solis proficiscatur, fieri potest, ut, quia in medio Solis, motus ille longè concitatior est, eâ in parte crebriores & grandiores Maculae generari queant: ex adverso, quoniam motus Solis, circa polos

polos remissior est, idcirco iis in partibus tam densissima corpora nequeunt existere, sed inibi solum Maculæ secundariæ, umbræ & Luculæ reperiuntur.

12. In his circumscriptis finibus, & quasi Zodiaco suo, Maculæ primariæ semper suum exercent motum, qui triplex est, utpote: Localis; Generationis ac Corruptionis; Rarefactionis & condensationis. De duobus ultimis motibus, in præcedentibus, breviter actum est, ubi quoque simul de Augmentatione ac diminutione, & sic etiam de Rarefactione & extensione Macularum aliquid diximus: restat, ut nonnulla etiam de motu Locali Macularum, qui triplex est, in medium adferamus. Hic namque primum per motum Solis diurnum (si is in Eclipticâ mobilis constituitur) peragitur, cujus ope Maculæ simul ab ortu in occasum promoventur. Alter fit per motum Solis Ascensionis & descensionis quotidianæ, quem verticalis linea, cum lineâ Eclipticæ ad centrum Solis vergente, comprehendit. Hinc quippe Sol motu suo diurno quotidie, tempore antemeridiano, ascendit, & pomeridiano descendit; unde angulus Eclipticæ & Verticalis, singulis momentis in Sole mutatur, ob variam Eclipticæ exaltationem, ejusque ad verticalem circulum inclinationem, & quidem intra horam sensibilibiter. Propterea etiam Maculæ, non uno in loco Solis semper videntur insidere. Est quidem in hoc angulo rectè intelligendo & inquirendo difficultas: ille tamen angulus, quem Ecliptica ad locum Solis cum circulo verticali constituit, etiam in Globo mechanicè inveniri, & demonstrari potest.

Tertius motus Macularum proprius & naturalis est, qui semper incipit, in parte Solis orientali, & in occidentali desinit, quem, intra duodecim, tredecim, aut summum quatuordecim dies, peragunt, prout majorem, vel minorem obtinent latitudinem. Hic tamen motus singulis anni diebus, non est uniformis, nec eadem feruntur lineâ in suo Zodiaco: motus enim illarum est maximam partem curvilineus, qui tamen uno tempore magis est flexuosus, quàm altero. Esti verò hic motus, primo intuitu, cum summâ irregularitate videtur esse conjunctus: tamen per se tantum est anomala quædam æqualitas, dum

Limites Macularum sunt certi.

Motus Macularum localis est triplex.

Primum fit cum motu diurno Solis.

Alter per motum Solis Ascensionis & descensionis, seu Anguli Eclipticæ & Verticalis.

Tertius motus Macularum est pro primis, ab ortu Solo orientali usque ad occidentalem.

M earum

earum via regia magis minusve est curvilinea. Nam intra unum semestre, hoc flexuosum iter Austrum versus vergit; intra alterum semestre Boream versus tendit. Atque hunc motum quotannis Maculæ incommutabili ratione exercerit. Quamvis enim una Macula, interdum evanescat, in medio disco Solis, & alia nascatur: tamen & ea eundem retinet situm, motumque quovis tempore, nec ab eo recedit, nisi quod declinatio ab Eclipticâ Solis nonnihil variet. Sed ut obscurus ille motus, magis fiat perspicuus, eum adhuc dilucidius explicare conabor.

Plenior explicatio motus Macularum Solarium.

Maculæ istę, dum in superficie Solis hærentes moventur, quotidie duodecimam diametri Solis partem ab ortu in occasum progrediendo emetiuntur, ut in explicatione triplicis motus jam supra dictum. Hoc iter instituitur, vel motu recto, vel curvilineo. Recto, bis duntaxat, in anno. Atque primò quidem, sub initium Decembris, ubi Maculæ situ recto Solem perambulant, isque motus rectus quatuordecim dies, vel circiter, durat. Postea iter suum magis magisque flexuosum constituunt, ita ut convexâ arcus parte ad Arctopelioten, cavâ verò ad Notozephyrum inclinent. Idque durat trimestri spatio, mense Decembri, Ianuario & Febuario. Post contingit earum æquilibrium vernale, ubi æquali distantia, ad Eclipticam inclinatâ, Euro & Zephyro absunt: hoc enim nullo alio fit tempore. Subsequentibus mensibus tribus, nempe Martio, Aprili & Majo, ita suum gressum attemperât, ut convexa obliquitas earum ad Corum; cava verò ad Euroaustrum vergat, pedentim tamen minuatur & decrescat, adeò, ut primo Junii rectâ iterum incipiant lineâ incedere. Mox obliquum suum cursum contrario modo permutant; ita, ut Junio, Julio & Augusto mensibus, convexitas Notapelioten versus, & concavitas Corum versus tendat. Exinde sequitur Æquilibrium Autumnale. Extremis tribus mensibus, iter Macularum rursus fit reflexum, & convexa pars obliquat in Notozephyrum, & cava in Arctopelioten, ita tamen, ut, sub Decembrem, iterum fiat directum. Atque hæc conversio alternatioque motus continua, oritur propriè loquendo, ex motu Polorum Solis annuo; sicut etiam paulò ante monui.

13. Porro

13. Porro, quod attinet spatium diurnum Macularum, quod efficiunt in Solis superficie, de eo sciendum est, quod, tametsi motus earum est sui similis, & æqualis; habeat tamen speciem dissimilitudinis & inæqualitatis, præsertim circa horizontes Solis, ubi spatium semper angustius est, quàm in medio: quò namque peripheriæ vicinior est, eò fit minus; quò propius autem ad centrum accedit, eò magis evadit. Quum enim corpus Solis perfectè globosum sit fabricatum, adeo ut nihil fieri possit rotundius, ideoque necesse est, ut cuncta spatia diurna (ut & Maculæ ipsæ Solis per se) circumferentiæ propiora appareant tenuiora, & remotiora ab iis, medioque propinquiora conspiciantur grandiora: illa siquidem sub minori, hæc sub majori angulo visionis cernuntur. Verissimum enim est illud Axioma Opticum: *Quæ sub majori angulo, etiam majora videntur.* Nihilominus, quando in æquali distantia ab ortu & occasu videntur, tum etiam servant æquabile spatium diurnum, quemadmodum hoc omnibus observationibus, quotidie eadem hora institutis, liquidò compertum est.

Motum Macularum Solis, specie inæqualis, verè æqualis, & sui similis.

Quæ sub minori angulo visionis spectantur, minora; sub majori majora apparent.

Ex his omnibus prænaratis constat, motum quidem annum Macularum esse certum & constantem; materiam autem earum valde inconstantem & mutabilem. Quod si Peripatetico contra omni ratione pugnare placuerit, nostramque sententiam impugnare, eum etiam atque etiam oratum velim, ut haud gravetur recitare, definitionem Generationis & Corruptionis in Physicâ Aristotelis expressam. Nam, quin hanc promat, nullus dubito: *Generatio est motus seu mutatio à non esse ad esse. Corruptio autem est mutatio ab esse ad non esse.* Quòd si hæc supposita definitio Generationis & Corruptionis rectè se se habet, ut certè habet; utique clarissimè illa evincit, in cælo inesse alterationes & alternationes Generationis & Corruptionis. Tametsi enim interdum menstruo, imò etiam bimestri & trimestri spatio (ut antehac observavi) planè purus & à Maculis primariis vacuus Sol apparet: tamen sæpè citius indifferentes Maculas, modò minores, modò majores modò ordinarias, modò extraordinarias, in disco Solis ortas animadvertes. Iam quæso, mi Peripatetice, dic mihi, annon liceat affirmare in ortu harum Macularum

Ex definitione Generationis & Corruptionis Aristotelicâ probatur Cæli esse corruptibile.

Nonnunquàm Sol intra mensem unum, duos aut tres, exerts est Macularum primariorum.

Macula, Facula & Umbra in Sole existentes, & iterum evanescentes, planum faciunt, in Sole dari generationem ac corruptionem.

Major fit alteratio in Sole, quam apud nos in terrâ.

Quatuor evidentibus rationibus ostenditur, Maculas & Faculas non in aërea regione, neque extra corpus Solis, existere posse.

esse factam mutationem, à non esse ad esse? Imo & tu, nisi indubitato sensus oculorum testimonio velis contradicere, addeverabis, Maculam, quæ visibile Solis hemisphærium peragrat, nec unquam revertitur, item dilutissimas Maculas ex unâ densâ natas, & rursus magnam Maculam, ex multis minoribus enatam, vel Maculas ex Faculis, vel Umbras ex Maculis vel Faculas ex Umbris partim majores, partim minores; partim crassiores, partim tenuiores, imò quandoque tantas, ut trientem diametri Solis æquent, & suâ magnitudine hemisphærium terræ queant obtegere, deficientes tamen paulò post, & ad nihilum recedentes, dixeris esse mutationem ab esse ad non esse. Ego verò mi Peripatetice, ex his nihil aliud colligere & adfirmare possum, nisi majorem alterationem in Sole, quam hîc in Terrâ. Sed vos duri Capitones è grege Peripateticorum, nondum hac *avopia* forsan adducimini, ut huic sententiæ subscribatis; quin potius excipiatis, credo, has apparitiones posse esse fallaces, & meras illusiones visus: vel phœnomena illa Macularum & Facularum in aëre, & non in æthere existere. Verùm Antagonistis illis, ut tempori ac chartæ parcam, has sequentes quatuor tantum rationes, responsionis loco, ad diluendum propono.

1. Nullum corpus sublunare, motum ejusmodi regularissimum exercere potest, qualem Maculæ continuò servant.

2. Si Faculæ longè infra Solem subsisterent & moverentur, utique sæpe extra discum Solis apparerent: at hoc nunquam fit, sicut ex luculentis observationibus constat.

3. Quod si hæc Faculæ non forent genuinæ Solis partes, sed aliquid singulare extra has, sequeretur, lucidius clariusque lumen, quam ipsum Solis (eò quòd Faculæ per se sint longe splendidiore, ut supra ostensum) in Naturâ rerum dari posse. At enim, hoc non tantum rationi, sed & ipsi sacræ scripturæ repugnat. Quandoquidem Ecclesiasticus cap. 43. v. 17. ait: *Lumen Solis esse omnium fulgentissimum.* Enimverò, quia non clarius nec illustrius lumen, quam Solis est, dari potest, sequitur, Faculas esse genuinas Solis partes.

4. Præterea, si hæc phœnomena ex aërea regione nobis illucescerent, tunc notabilem parallaxin tam longitudinis, quam altitu-

altitudinis gignerent. Nam etiam si ea locarentur supra Lunam, nihilo secius parallaxin integri gradus obtinerent. At verò, quoniam omnis parallaxeos sunt expertia, sicut ex omnibus observationibus, quæ diversis in locis etiam remotissimis, tam in Indiâ, quàm in Germaniâ, eodem tempore, fuerunt consignatæ, fit conspicuum: omnes quippe ea parallaxi carere animadvertentur. Nam quando Sol penes nos incontaminatus, hoc est, sine Maculis apparet, tunc in omnibus universæ Terræ regionibus talis quoque conspicitur. Ex quo firmissimè colligitur, hæc Maculas & Faculas, non solum Lunâ, Mercurio & Venere esse altiores; sed æque altas, atque ipsum Solem, imo ab ipso Sole non avellendas, ob rationes jam allatas & vi Axiomatici Astronomici: *Quò minori Parallaxi corpus æthereum est prædictum, eò sublimius fertur: & quò majori deprehenditur, eò terræ est propinquius.* Quam demonstrationem nemo Philosophorum, nec ipse Aristoteles, refellere poterit; est namque invictissima & evidentissima. Etsi verò hæc rationes adductæ firmo stant talo, tamen vereor, ut aliquid apud Peripateticos hisce proficiam: siquidem omnes illos, qui generationem ac corruptionem, in Cælo probant, odio plus quàm Vatiniâno prosequuntur, ut & istos, qui ejusmodi argumenta in medium proferunt. Tanta est præoccupatæ hujus opinionis, cælum esse omnis generationis ac corruptionis expertis, efficacia, quæ veritati planè vim infert. Propterea ego ferè despero, me illam opinionem convellere posse.

*In veterata
opinionu me
guarv est.*

Facilius equidem crederem, ipsum Aristotelem, si in vitam rediret, proclivius nostræ sententiæ, quàm discipulos suos, accessurum, & omnia argumenta allata concessurum: siquidem citra dubium, incorruptibilitatem cæli inde collegit, quòd nec ipse, nec omnes reliqui Philosophi ante ipsum, aliquid notabile, in Cælo animadvertissent, ex quo generationem ac corruptionem cæli efficere possent. Quod fundamentum eò usque perstitit, donec contrarium fuerit probatum. Iam verò, quia demonstrationibus certis & testimoniis haud fallacibus ostensum est, hodieque fide oculorum haudquaquam fraudulentâ & fucosâ confirmari, commonstrari, ac in tenebris quasi manu prendi potest, in Cælis dari tam magnas, tamque mul-

tas alterationes, quantæ & quot in globo nostro Terreno non deprehenduntur, ideoq; omni asseveratione cogimur affirmare: *Cælum esse Alterationibus obnoxium*. Quamobrem, si hodie redivivo Aristoteli, Maculas & Faculas in Sole ante oculos ipsius statueremus, & liquidò monstrarem, non dubitarem, quin tantus Philosophus perspicacissimo suo ingenio, tanquam Veritatis Cultor & fraudis inimicus, statim defertâ suâ priori sententiâ, totus in nostram iret, eamq; strenuè posthac defederet. At verò sectatores (proh mirû & improbable!) planè alio modo philosophantur, quàm eorum Doctor & Ductor, qui dicere generosè & laudabiliter est solitus: Amicus Plato, Amicus Socrates, sed magis amica veritas. Etenim ideò solùm incorruptibilitatem Cœli statuunt, quia Præceptor eorum Aristoteles, sic statuit, dixit, atq; scripsit. Atque hoc argumentum ab autoritate Aristotelis, pluris faciunt, quàm omnes rationes, observationes & evidentes demonstrationes in contrariam partem. Verùm quæ, qualis, & quanta sit, hæc Peripateticorum probatio, quilibet veritatis amicus, facilè perspicit. Pluribus quidem possem, hunc motum Macularum persequi & asserere; sed quia non id primarium meum institutum est, & præterea jam satis abundè de eo à P. C. Scheinero in publicatâ Rosâ Vrsinâ actum, idcirco B. Lectorem, qui plura de hâc materiâ scire gestit, hunc Autorem consulat, moneo. Quicquid autem hæctenus de hisce phœnomenis Solis à me scriptum fuit, id non alienis, sed meis, iisque quàm fieri potuit accuratissimis & compluribus observationibus edoctus verum comperi. Hinc verò earum nonnullas Selenographiæ meæ, in gratiam Astrophilorum, inserui, ut scilicet illustrarent ea magis, quæ brevitatis studio fortassis obscurè à me dicta videbuntur.

*Methodus
observandi
Maculas.*

1.

Quod ordinem attinet observandi Maculas, studui hic totus insistere vestigiis Scheineri. 1. Proinde operam dedi, ut motum ac progressum quotidianum, cujuslibet Maculæ & Faculæ, quàm diu in disco Solis perstitit, circulo includerem, nec non interdum duarum diversarum Macularum aliquantum distitarum, ac distinctarum integras periodos in uno eodemq; circulari schemate exhiberem. 2. Linea per centrum ducta

notat

notat Eclipticam Solis : A, lævam verfùs eſt margo orientalis, quem Maculæ primùm ingrediuntur; B eſt limbus occidentalis, dextram verfùs, Macularum, quem ſub egreſſum ultimò attingunt. Et hi ſunt ambo Horizontes Solis, nempe A & B.

3. Quævis peculiaris Macula eſt ſeorſim ſuis literis elementariis ſignata. Numeri denotant diem, quo ſunt obſervatæ Maculæ : adjunctæ tabellæ verò, commiſſum eſt tempus in horis ac minutis, quo obſervatio fuit peracta, & appoſitum m antemeridianum, ac u, pomeridianum tempus ſignificat, ſimul etiam angulus Eclipticæ & verticalis eſt expreſſus. At tempus, non ex altitudine Solis, ut Scheinerus fecit plerunq; in ſuo opere, ſed ex Sciatherico horologio in horas ac minuta diſtributo. Nam iſte modus & facilior eſt, nec ad lapſum tam pronus, atque alter : modò de Meridianâ lineâ certò conſtet, & partitio horaria rectè fuerit inſtituta, ad certam nempe elevationem Poli : alter autem modus imperitis ac incautis multifariam errandi occaſionem poteſt præbere. 4. Faculæ & Maculæ in Figuris repræſentatæ, de die in diem, annuente cœli ſerenitate, ſunt obſervatæ; præterea diligenter fuit determinata earum magnitudo, proportio, diſtantia, ut & color, denſitas, nuclei, umbræ & cognatę res, ita ut omnia, quæ faciunt ad explicationem formę ac motus earum, ſummo ſtudio ſint animadverſa, æriq; incifa. 5. Quid ulterius in earum obſervatione quotidie occurrerit, quomodo miris variaverint modis, ſuam figuram, quem motum diurnum & annuum obtinuerint, & quid inſuper animadverſione dignum circa illas, id ex adjunctis notis, & deſcriptione illarum clarè perſpicias, & longè melius intelliges, ſi figuras omnes inſertas probè conſideraveris, & obſervationes tibi familiares reddideris. Demum verò, ex his ita præcognitis quædam jucundę quæſtiones etiam haud difficulter ſolvi poterunt.

Quæſtionum enodatiæ.

I. An Maculæ ſint dicendæ ſtellæ, quę circa Solem ſuum motum exercent, eumq; conſtanter ac ſemper obſervent? Nam, quid ad hanc quæſtionem reſpondendum ſit, ex obſervationibus haud obſcurè patet. Quòd enim nequeant eſſe ſtellę, ex his colligitur. Primùm, Maculę nunquam ferè apparent rotundę,

An Macula ſint ſtellæ?

rotundæ, stellæ verò semper. 2. Deinde si essent stellæ, non tam miras subirent mutationes, nec jam majores, jam minores conficerentur, sed eandem formam obtinerent. 3. Oporteret, illas singulis diebus & omni tempore reverti, & nunquam evanescere. At hoc non fit. Quare rectè inferitur, Maculas non esse stellas.

1. *Questio.* II. An Maculæ nigrescentes communiter crescant, & au-geantur : albescentes contra decrescant & diminuantur ? Re-spondetur, quod sic fit.

3. *Questio.* III. Vtrum Faculæ plerunq̄ue Maculas magis sequantur, quàm præcedant; an verò se se magis Eurum, quàm Zephy-rum versùs extendant ?

4. *Questio.* IV. Num Facula illucente, ut plurimum Macula soleat eam excipere ? Respondeo : non contravenire observationes.

5. *Questio.* V. Quæ testantur quoq̄, quod Maculæ non circa centrum suum circumagantur, sed semper nobis eandem faciem ob-vertant.

6. *Questio.* VI. Annon Maculæ in Faculas abeuntes plerunq̄ue majores evadant, quàm antea fuerunt ? Et hanc quæstionem sine ullâ dubitatione affirmandam esse docent observationes. Plures quoq̄ue aliæ ejusmodi quæstiunculæ, de conditione Macula-rum & Facularum, ex ritè perceptis comprehensisque his ob-servationibus, queunt decidi, quas perspicaciæ Benev. Lectoris committo eruendas & determinandas : restat namq̄ue adhuc aliquid dicendum, de methodo observandi has Maculas & Fa-culas, ad quam nunc accedo.

*Modi aliquot
obseruandi
Maculas So-* Etenim istæ diversis modis possunt notari, quemadmodum Scheinerus lib. 3. Rosæ Vrlinæ pag. 151. meminit.

1. Primò namq̄ue libero nudoq̄ue oculo hæ Maculæ, præfer-tim majores insignioresq̄ue in Sole, vel oriente vel occidente, vel etiam nonnihil caliginosis vaporibus impedito, queunt spectari.

2. Quando speculum equabili & planâ superficie præditum ita aptatur, ut in eo tantùm pateat exiguum quoddam foramen circulare, idq̄ue radiis Solis opponitur, tum & ipsum satis evi-denter Maculas & Faculas Solis in paulò remotiore (ad pedes

20. vel

20. vel plures à speculo) pariete aut albâ tabulâ repræsentabit: siquidem radius Solis reflexus, eò usque clarè penetrans hoc potest præstare.

3. Si radii Solis per angustum & rotundum foramen obscuræ cameræ trajecti incidant in obtentam tabulam albam, tunc etiam imago Solis cum Maculis in conspectum veniet, modò locus undique sit obscurus, & conveniens intervallum, quindecim vel etiam viginti pedum, inter tabulam ac foramen interjectum: alioquin nisi hæ circumstantiæ observentur, parum vel nihil de Maculis Solis videbitur.

4. Quando duo vitra colorata sumuntur, & illis folium papyri candidioris tenuissimâ perforatum acu inferitur, & cerâ vel bitumine ea conglutinantur; tum etiam Maculæ, sine lesione visus, (ut & Eclipses Solis) queunt observari; imprimis cum nulla alia præstò sunt adminicula.

5. At verò longè melior est observandi modus per Helioscopium in Solem directum. Sed quomodo illud sit præparandum, suprâ capite secundo, à me fuit explanatum.

6. Nec ille modus prætereundus, ubi radius Solis per unicum vitrum convexum foramini (inprimis mobili) inclusum immittitur in cameram obscuram. Verùm si distantia, inter vitrum & oppositam tabulam, non satis ampla datur, tunc ægrè quoque Maculæ in tabulâ poterunt agnosci.

7. Optimus autem & commodissimus est modus, observandi Maculas per Telescopium, præsertim si rectè ille adhibeatur. Sol igitur, cum versatur, vel in ortu vel in occasu, Tubo optico inspectus, si quas obtinebit Maculas, proderet. Christophorus Scheinerus sæpe eas in Sole tenui nubeculâ cincto, Telescopio contemplatus est. Atqui alicui sua fors non sim, ut simile quid tentet facere: fieri namque facilè poterit, ut Sol dissipatis nubibus, inopinatò clarissima ejus lux oculo, hoc oculari utenti effulgeat, illumque unâ vice ob vehementem radiorum Solis in oculo concursum, nimiumque hinc natum calorem, planè obœcet.

8. Quocirca inter alios observandi Maculas Solis, jam memoratos modos est præstantissimus, qui fit cum Machinâ Helioscopi-

Præstantissimam ratio Maculas Soli observandi.

N


lioscopi-

lioscopica, C. Scheinero excogitatus, & ferè semper maximèq; frequentatus. Hæc Machina est peculiare organum, cujus meminit lib. 2. cap. 22. pag. 105. cap. 34. pag. 138. & in principio libri tertii pag. 151. ubi prolixè illud describit. Etenim ex diversis partibus, nec non aſſerculis, est constructum, quibus Telescopium firmatur ac fulcitur: è regione Tubi Tabella chartacea appenditur, stans ad angulos rectos, in quam Sol cum suis Maculis recipitur. Tota verò machina firmissimè inter se connectitur, ita ut una pars sine alterâ nequeat moveri. Hanc autem Machinam, quoties Maculæ Solis per eam observantur, oportet semper modò attollere, modò deprimere, prout Sol vel ascendit vel descendit: & quia Sol motu diurno velociter progreditur, ut is, qui Tabellam & totam Machinam ad hunc motum vult promovere ac regere, flexis genibus in nitatur necesse est, ne Sol observatorio circulo excidat. Verumenimverò admodum difficile, imò ferè impossibile est, ut unus homo directiùs gubernandæ huic machinæ, ad motum Solis, simul observandis ac notandis Maculis sufficere possit.

9.
 Alium omnium
 optimum mo-
 dum observa-
 di Maculas
 Solis per fa-
 cilem parabi-
 lem Machi-
 nam.

9. Posteaquam autem structuram hujus Machinæ diligentius mecum expendi, faciliorem & commodiorem modum observandi Maculas adveni, ita ut unus aliquis citra difficultatem Machinam regere, idemq; simul possit observationi vacare. Modus hic administratur per foramen mobile & versatile, de quo Scheinerus in sua Rosâ Vrsinâ lib. 2. cap. 5. & pag. 73. affirmat, quod id efficere, sit artis laboris, sumptusq; non vulgaris: & capite 6. pag. 74. addit, quòd is qui hanc difficultatem superaverit, rem non vulgarem consequatur. Hæc autem inventio non solum opportuna est observationi Macularum, sed & Eclipsium Solarium, in quibus ut omnia rectissimè & accuratissimè administrantur, maximopere requiritur. Quam ob rem operæ pretium erit fabricam istius Machinæ non nihil uberiùs ac clariùs hic describere, simulq; adjicere rationem instituendi observationes per eam: hunc in finem, & ut eò meliùs simulachrum Machinæ Helioscopicæ Benevolo Lectori ante oculos itatur & exprimat, idcirco eam diligenter æri incisam subijcere & declarare volui.

1. Hic



1. Hic autem modus observandi equidem in camerâ obscuratâ instituitur : attamen non sanè opus est ut adeò sit tenebricola, qualis intentâ requiritur obscuritas, cum species rerum visibilium forinsecus constitutarum, ad tabulam transferuntur, ac in eâ præsentantur : una namque fenestra manere etiam potest patula, ut & janua sine ullo impedimento. In ejusmodi conclavi, vitrearum fenestrarum locò oportet habere ligneas: ex medio unius harum quadratus asserculus est refecandus, ut in locum hujus foraminis, alia quædam fenestrellâ lignea, convenientibus juncturis aptata subire queat, sicut ex f in adjunctâ figurâ. L. apparet. In hac fenestrellâ rursus foramen, sed rotundum, ad capiendum globum mobilem ac versatilem ad omne latus quaquaversus, excavetur; is autem sequente modo paratur.

*Enumeratio
partium hu-
jus Machinæ.*

*Primo parti
est fenestra
gemma li-
gnea.*

*Sphæra cum
canali.*

2. Sphæra quædam, vel ex solido siccoq; ligno, cujus diameter octo vel novem æquet digitos, est efformanda & exactè rotundanda; vel ex orichalco, quod durabilius (quo & ego sum usus) adornetur : at verò intus sit, hæc metallica sphæra cava, ita, ut superficies ejus tantum ad quadrantem unius pollicis crassa sit, ne nimia gravitate fiat intractabilis. Hæc sphæra contineat perforatum foramen rotundum, duos pollices circiter amplum, ut ei canalis itidem ex aurichalco formatus b, commodè queat inferi. Is sesquipedem longitudine adsequatur, habeatque duas agglutinatas quadratas fibulas, quales r exprimit, ut, instar vaginularum, quadratum baculum g octo vel novem pedibus longum arctè possint recipere.

3. Hic globus, cujus axem canalis pertransit ad dictum modum efformatus, orbiculo k (cujus latitudo sit unius digiti) est claudendus : eum namque ambient, duæ tabulæ d ad formam globi curvatæ & cavatæ, quæ globum undique cingunt, & firmâ junctione tenent, ut nullus unquam excidendi locus sit; in omnem tamen loci positionē, ope canalis b, pro lubitu, utrumque latus versus, sursum ac deorsum moveri atque flecti, sine ullâ difficultate, modò globus sit perfectè rotundus, possit. Ne verò aliqua uspiam pateat rimula, per quam lux penetret, ideoque orbiculus k & tabulæ d albâ alutâ sunt opplendæ.

*Orbiculus &
duæ tabulæ
Machinæ.*

N 2

Deinde

Deinde alia ansula, nempe e, priori orbiculo adnectitur, ut ejus ope sphaera fenestellæ f clavis queat adfigi. veluti apposita figura facit manifestum.

*Usum hanc
partium.*

4. Istud eo imprimis deservit, ut semper hæc machina, quando non placet observare, unâ cum canali b & fenestella f eximii, imò exigente observatione aliam plagam, Eurum, Austrum vel Zephyrum versus ea in aliam ligneam fenestram, jam ad hunc usum destinatam & paratam inferi possit.

*Fabrica facili-
tatis ejus-
dem Macbi-
na ex lignis
sphaera.*

Ejusmodi sphaera mobilis etiam minoribus sumtibus, ex aliâ viliori materiâ, nempe ligno firmiter concinnari potest, quemadmodum talis globus fenestellæ aptatus cum omnibus necessariis partibus æri incisus in præcedente Figurâ F repræsentatur. Etenim hic tantum requiritur Globus exactè ad tornum rotundatus, sicut isthic est k : atque fenestella l . habet perforatum foramen rotundum, cujus exterius latus minus sit circulo maximo Globi. Dehinc sit etiam in promptu circulus ligneus, cujus foramen non amplius sit, jam memoratâ fenestellâ, ut ex na appareat. Globus igitur, fenestella, & circulus ligneus sunt tres præcipuæ partes hujus facili parabilis machine. Proinde globum k impone tornato foramini, quod inest fenestellæ l, eidemque globo superinduc circulum ligneum m, quem quatuor ligneis cochleis arctius adstringe, & junge fenestellæ. Hoc factò globum à fenestellâ & circulo ligneo comprehensum, in omnia latera, & angulos poteris flectere ac dirigere: vide tamen, ne lumen aliquod possit penetrare, neve non rimulâs, si quæ adsint, obtures. Regimine verò cochlearum, motum Globi, modò laxiorem, modò arctiorem reddere poteris, prout eas vel adstrinxeris vel dilataveris, quo pacto metallicum globum tractare nequies, ob suam gravitatem. Hinc ligneus, altero ex orichalco, est ad imponendum & eximendum, tractabilior. Et quamvis hic globus ligneus, facile videatur inventum, si obiter duntaxat consideretur: tamen idem multis aliis etiam rebus utiliter applicari potest, utpote Sextanti, Radio, & aliis instrumentis Astronomicis, cujus ope, quaquaversum commodè moveri possunt. Sed de iis hoc loco non attinet plura dicere.

5. Postea

5. Postea ad observationem Macularum requiritur etiam scamnum *m*, quod ex diversis partibus (veluti in adjuncto diagrammate imago ejus est expressa) constat, & primum quidem valido ligno tribus pedibus longo, & quatuor fulcris innitente, ut stare queat immobile. Dein huic scamno, duo ligna perpendiculariter erecta adfigantur, quæ æquent longitudine quatuor pedes vel circiter; hæc spirarum tortilium scalpturâ constant, & cochleæ dicuntur, ac repræsentantur per *x* & *y*: per has trochleas trajiciuntur, duo Pericochlia *o o*, ut horum ope, asser *n* cochleis imponendus pro re natâ vel attolli, vel etiam deprimi possit.

scamnum & spiras.

6. Præparatis jam his adminiculis, tum ad observationem Macularum accedi potest. Quocirca primum fenestella, unâ cum globo & canali aptè combinata, majori lignæ fenestræ imponatur: dehinc Telescopium bonæ notæ canali indatur, & longior baculus *g*, fibulis *r*: ex adverso autem constituatur scamnum *m*, cum suis erectis cochleis ac asserere *n*; longiori verò baculo aptetur ad angulos rectos tabella *h*, quod faciliè fieri potest, modò tabella sit satis crassa: at dorso tabulæ duæ parvæ fibulæ adduntur, quibus teres ferrum *i* inferitur, ita ut hoc possit moveri; huic aliquod perpendiculum appenditur, ut hujus ope, angulus verticalis & Eclipticæ, vel potius punctum verticale, possit observari.

Modo connectendi hæc Machinam, ut unum fiat corpus.

7. Huic tabulæ folium, mundæ & candidæ papyri, cum cerâ agglutinatur, in quo ducendus quidam circulus, qui observatorius dicitur, sicut in adjunctâ figurâ conspicitur: postmodum tubus opticus beneficio baculi longioris, qui globum & tabellam unâ disponit, ad Solem est dirigendus, ita ut Sol suis radiis in tabulam adlabatur, & circum observatorium collustret. Quod dum fit, attendendum est diligenter, num discus Solis major minorve sit circulo observatorio *s, z, u, vv, ?*. Si namq; hoc fiat, tunc vel tabella baculo inserta magis à globo est elonganda, vel Telescopium in canali *b*, est dilatandum aut contrahendum; id quod haud difficulter fieri potest, eò quod tubus canali impositus, suos liberos servet ductus, & tantummodo linteolo obstruatur, ne vel excidat vel lumen Solis

Ratio tradendi hæc Machinam, & observandi Maculam Solis.

ad latera per aliquem rimam penetret : atque hoc pacto discus Solis observatorio circulo satis exactè potest accommodari. At tamen semper præstat initiò attentè observare & notare, quantum peripheriam discus Solis, secundùm longitudinem baculi & distantiam, in chartâ tabellæ formet, ut circulus observatorius exactè magnitudinis rectè determinari, & postea semper usurpari queat.

Qua ad instituendâ perfectam observationem Macularum Solarium requiruntur.

8. Priusquam autem incipias observationem, in promptu tibi sit sciathericum Horologium, minimum in terna & ternâ, vel, si fieri potest, in singula minuta divisum : postea in mensulâ, alteri fenestræ admotâ, sit accuratè expressa linea Meridiana, cui secundùm horizontem sciathericum horologium appone. Post hæc instituaturs observatio, ita ut Sol circum observatorium collustret : hoc dum ritè fit, tum Macula stilo quodam plumbeo signetur ; quo pacto perpendiculum ita est dirigendum, ut in centrum circuli observatorii incidat, & hujus ductu punctum verticale ad s notandum, & simul exquisitum tempus horarium, ex sciatherico horologio alteri fenestræ admoto depromendum, & unâ cum die observationis in chartam referendum.

Quid in Macularum le-gitimâ delineatione sit observandû?

9. At verò non unâ observatione sis contentus, sed mox fac denuo periculum, an Macula nova, in conveniente distantia, tam à peripheriâ, quàm alterâ Maculâ rectè se se habeat, ut & magnitudo, facies & forma ejus ? Insuper utrum densior, an verò rarior, nucleone sit prædita, an verò non ? Nihilo quoq; segniùs Faculas, si quæ adsint, præsertim quo in loco primùm extiterint, vel evanuerint, quomodo creverint vel decreverint, clariùsne, an verò obscuriùs apparuerint, & horum similia notabis; quemadmodum frequens usus hoc quemlibet docebit, & idem ex meis observationibus fit conspicuum. Cum primis etiam est animadversione dignum, quòd si distinctæ, vel Macule vel Facule adsint, ita ut illæ non unâ vice possint consignari, tunc opus erit, ut singularis harum observatio, ut & puncti verticalis exactique temporis instituaturs; etenim, si nimis diu hisce immoraris, faciliè potest error committi, eò quod angulus verticalis & Eclipticæ, citò mutetur, & proinde etiam punctum verticale.

10. Post-



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

10. Postquam igitur uno die, Maculę Solis cum genuinis coloribus, umbris & Faculis, rectè sunt notatę, tum de die in diem, fudo existente cęlo, ille labor est continuandus, ut ex hisce accuratis observationibus Macularum, cursus & mirabilis mutatio, deprehendi possit. Pręterea hęc animadversio dignum est, quod Sol semper in tabulā & circulo observatorio, suam faciem inverfam exhibeat, ita ut verus limbus Solis orientalis hęc sit, & occidentalis vv : sic & superior pars Solis in Eclipticā, in circulo observatorio quasi esset inferior, pręsentatur : quamobrem, si Macularum nativus situs in Sole representari debet, tunc circulus observatorius, unā cum Maculis, & chartā planē est invertendus, ita ut posterius latus chartę fiat prius, & pars signata u superiorem, signata verò s inferiore m z semper sinistrum, & vv dextrum occupet locum.

Quid alterius in continuatione observationum sit attendendum?

11. Quod hic modus observandi, sit longè facilior & expeditior, quā Machina Helioscopica Scheineriana, quilibet, qui utriusque rei fecit periculum, fatebitur. Hic enim discum Solis, sine aliquā difficultate, tam in chartā, quā in circulo observatorio possum retinere, dum tabellam lente moveo, eamq; motis cochleis vel attollo, vel deprimo; aut etiam imponendo unum digitum baculo, universam hanc Machinam dirigo, veluti hoc quemlibet experientia, rerum Magistra, luculenter docebit.

Modus hic observandi Maculas Solis Scheineriano præferitur.

12. Investigatio autem Eclipticę in circulo observatorio valde est necessaria : quippe sine illā omnis observatio est imperfecta. Hęc autem inquiritur per angulum Verticalis & Eclipticę, qui diversis modis vel mechanicè, vel beneficio calculi cognoscitur, sicut sphericę doctrinę Doctores & inter alios etiam Scheinerus, in suā Rosā Vrsinā lib. 2. cap. 38. 39. & 40. pag. 144. & 149. docet. Modus equidem explorandi hunc angulum, per calculum est omnium certissimus, sed simul magno labore & molestiā conjunctus, præsertim, cum complures dantur observationes. Quocirca aliam rationem sum ingressus, non quidem eam, quā communiter usus est Christoph. Scheinerus, quærendo eum per Globum, vel Astrolabium, eò quod hic facilis lapsus intra unum & alterum gradum fieri queat; sed con-

Angulus Eclipticę ac Verticalis hic requiritur, & quo modo is sit investigandus.

sed construxi peculiarem tabulam, nostrę Gedanensi Elevationi Poli, quę est *14. 13.* accommodatam, ita ut omnes angulos Verticalis & Eclipticę, per integrum annum computaverim, ad singulos gradus Eclipticę in duodecim signis, & ad quamq; semihoram, & hęc una opera in omne tempus sufficit: ut verò labor hic admodum sit operosus: tamen si quis eo jam est defunctus, tum sit pergratus, jucundus & modus excerptendi angulos ex eâ perfacilis & minüs molestus, modò habeatur ratio partis proportionalis. Neque etiam hic modus est errori obnoxius, si locum Solis intra gradum tantum habeamus cognitum, & tempus verum observationis: hęc namque præcognita mox angulum commonstrant. Ipsam hęc apponere tabulam non necessarium duxi, quoniam unice Latitudini Dantiscanę Civitatis deservit, in quâ vix adeò multi Vranię Cultores inveniuntur. Qui alio in loco ejusmodi observationes vult instituire, is, ad minuendum multum laborem, & lucrandum tempus, hanc operam concinnandi Tabulam Angulorum Verticalis & Eclipticę, cum otium suppetit, suscipiat, & suę Elevationi Poli applicet: siquidem hac ipsâ, studium rectè consignandi Maculas, in legitimo puncto verticali mirè levabitur.

*Ratio inven-
niendi Ecli-
pticam Ma-
cularum So-
li.*

13. Angulis itaq; ex modò dictâ tabulâ, ad quamlibet Macularum observationem inventis, necessè est, ut primò perpendiculum, ope regulę ex puncto verticali signato, per centrum Solis, ducas, ex puncto s, u versüs: postea, si tempus observationis est antemeridianum, tum angulum, beneficio semicirculi legitimè in gradus distributi, (quem Transportorium vocant) circulo observatorio applica, à lineâ verticali, vel puncto s, sinistrum orientalem limbum z versüs procedendo, eumque in peripheriâ circuli observ. nota. Dehinc duc lineam per hoc punctum & centrum; tunc veram Eclipticam Solis ac Macularum adinvenisti, tempore observationis. Quod si hęc observatio horis pomeridianis est habita, tum hunc angulum ex altero latere occidentali sinistro vv, ab s numerando efformes. Delineatâ jam Eclipticâ hoc modo in omnibus figuris ac singulis observationibus, restat, ut Maculę ac Faculę, quę intra 14 dies vel circiter conspectę sunt, in unum circulum observato-

servatorium, quantum fieri potest, redigantur; ut commodius earum Motus diurnus & annuus, nec non magnæ alterationes, queant deprehendi. Hoc autem facile fit, quando centra circulorum observata acu jungis, & unam Eclipticam alteri applicas: sic enim Maculæ in aliâ mundâ chartâ purè possunt exprimi. Id autem in reliquis omnibus continuatis observationibus, quas evulgare cupis, agendum est. Postquam igitur Maculæ in unam chartam & figuram sunt relatæ, scias & earum positum esse inversum, prout durante observatione, in Tabellâ visæ sunt. Quamobrem & hic (quemadmodum etiam supra, numero 10. memini) opus est, ut omnes Maculæ in unâ figurâ expressæ, perforentur acu, ut in altero latere fiant conspicuæ: hoc namque pacto in mundâ chartâ denuo legitimo ordine consignatæ, possunt repræsentari, prout reapse sub Sole motum suum exercuerunt, non aliter quali Telecopio eas in Sole vidisses. Hic quidem modus rectè exprimendi curriculum Macularum subter Solem cum labore & tædio est conjunctus: conatus & alacritas tamen legitimè exhibendi motum earum, omnem molestiam debet tolerare, & superare. Sed & labor iste non nihil minui posset, si ad eum tubus opticus ex duobus convexis paratus adhibeatur: hic enim refert Maculas in Tabellâ eo situ, posituque quem in Sole obtinent, sicut etiam hujus supra capite secundo, mentionem feci. Itaque huc usque de ratione observandi Maculas Solis à me dictum esto. Quod si quispiam fortè nonnulla in hisce non satis explicata desiderat, hunc rursus ad Rosam Vrsinam Scheineri ablego, qui de unâ hac materiâ prolixum conscripsit tractatum. Interim nullus dubito, quin si Benev. Lector rem ipsam sit ingressurus, & observationes ipse concinnaverit, ultrò sit ingenuò confessurus; à me quoque omnia, quæ huc spectant, sufficienter in medium esse allata.

*Modus delin-
candi Ma-
culas obser-
vatas.*

14. Hicque jam memoratus, per spheralem Machinam observandi modus, etiam convenienter ac utiliter, imò longè convenientius & utiliùs, quam reliqui omnes, ad Eclipses Solares adhiberi potest. Si non vis usurpare Tubum opticum ad declinandam majorem refractionem, tum licet accipere vitrum

*Nobilissimus
modus obser-
vandi item
Eclipses Solis
per hanc Ma-
chinam hic
detegitur.*




convexum

convexum planioris superficiei: postea in tabellâ exprime exactè circulum observatorium, cui include alias quinque minores æqualis distantia à centro, ad repræsentandum digitos Eclipticos, imò, ut omnem Solis defectionem eò accuratiùs observes, 24. circulos concentricos poteris efformare, ut & quadrantes digitorum Eclipticorum indicent. Sole igitur deficiente, intra spatium duorum extimiorum circularum, non solùm verum observationis tempus, & punctum verticale, sicut in Maculis facere consuevisti (ex quibus postmodum angulus Verticalis & Eclipticæ, & ex hoc, Ecliptica ipsa inquiritur) diligenter notes, verùm etiam in omnibus phasibus, & Segmentis circuli, curvatum latus Solis deficientis tribus punctis designatum, in quolibet segmento circuli, tam respectu peripheriæ, quàm mediæ partis, vel, quod præstat, integram lineam, perquam diligenter annota; ex quâ deinceps exactam Lunæ diametrum elicies, ut & locum, quo Sol respectu Eclipticæ primùm incepit deficere: perspicies etiam, quomodo Luna subtermeaverit, & cursum suum quasi contorserit, & quomodo Eclipsis in orientali limbo defierit; quanta extiterit, quem angulum orbita Lunæ cum Eclipticâ constituerit, si puncta verticalia, ope perpendiculi, ad cuiusque digiti defectum, probè observata sint. Hæc omnia certè, si Sol tantummodo per nudum foramen in obscuram cameram adlabitur, nequeunt observari; quoniam hoc pacto cuspides deficientis Solis, semper obtusæ in albam tabulam incidunt: præterea Eclipsis Solis semper minor aparet, quàm revera ipsa est; sicut Kepplerus in suis Paralipomenis in Vitellionem cap. 1. pag. 54. demonstrat.

*Observatio
Eclipsis.*

Vt autem hic modus observandi Eclipses Solares eò meliùs percipiatur, adducam in exemplum observatam à me Eclipsin Solis, Anno 1645. Mense Augusto, cui quoque Schema observationis adjungam. In hoc sex crassiores circuli, duodecim digitos Eclipticos referunt; subtiliores autem & intercurrentes concentrici, quadrantes digitorum; reliquæ omnes sectiones circularum sunt phasæ Eclipteos Solis, quarum 30. sunt: adstantes numeri significant, quot digitorum ipsæ phasæ fuerint. Proposueram quidem plures observare phasæ, nimirum ad tactum



J. M.

tactum cujuslibet segmenti circuli : verum intercurrentes nubeculæ & inquietudo aëris, hoc meum propositum impediabant, ita ut plures earum consignare nequiverim. In superiori parte dextram versus, initium Eclipsis Solis accidebat, postea Luna magis magisque Solem intercorrebat, eumque obscurabat eâ formâ, quæ ex appositâ figurâ M conspicitur, ita ut maxima Solis defectio hîc Gedani 7 $\frac{1}{2}$ digitos æquaret : postea sensim decrefcebat, ita ut finis in superiori margine sinistram versus conspiceretur. Quod verum tempus observationis cujuslibet phasis hujus Eclipsis attinet, & illud Astronomiæ cultoribus hîc indicabo : hoc namq; non solum per accuratum sciathericû solare lineæ Meridianæ admotum; sed & per altitudines Solis, quoties illæ non obstantibus nubibus capi potuerunt, diligenter fuit indagatum, prout sequens recensio, illud, cum digitis & phasibus, ostendit.

Eclipsis Solis, observata Gedani,

Anno Æræ Christianæ 1645.

Die 21. August. st. n.

CRESCENTIS OBSCURATIONIS

Phases	Secundum accuratum Sciathericum lineæ Meridianæ applicat.			Altitudo Solis per Quadrantem Orichalc. sequens.			Tempora inde supputata.		
	Hor.	"	"	Grad.	"	"	Hor.	"	"
Initium	11	23	45						
$\frac{1}{2}$ digit.	11	27	0						
$\frac{1}{4}$ digit.	11	31	30	47	15	0	11	31	6
2. digit.	11	33	30						
2 $\frac{1}{2}$ digit.	11	38	0						
3 $\frac{1}{2}$ digit.	11	42	30						
4 $\frac{1}{2}$ digit.	11	45	30						
5. digit.	11	56	0						
5 $\frac{1}{2}$ digit.	12	1	30						
6. digit.	12	7	30						
6 $\frac{1}{2}$ digit.	12	11	30						
6 $\frac{1}{4}$ digit.	12	16	30						
6 $\frac{1}{2}$ digit.	12	21	0						

O 2

7. digit.

	Hor.	h	"	Grad.	h	"	Hor.	h	"
7. digit.	12	22	0						
7½ digit.	12	25	0						
7¾ digit.	12	27	0						
7⅞ digit.	12	30	0						
7⅘ digit.	12	31	30						
	12	36	30	47	0	0	12	37	13
7⅙ digit.	12	41	20	46	50	0	12	41	52

DECRESCENTIS OBSCURATIONIS

7⅙ digit.	12	45	30						
7⅚ digit.	12	50	40						
7¾ digit.	12	54	45						
6½ digit.	1	1	50						
6. digit.	1	6	0	45	40	0	1	6	8
5½ digit.	1	8	30						
5¼ digit.	1	12	20						
5. digit.	1	15	30	45	5	0	1	15	36
4¾ digit.	1	20	0						
4. digit.	1	23	45	44	20	0	1	24	25
3¾ digit.	1	31	30						
¾ digit.	1	47	30						
¾ ferè	1	49	0						
Finis.	1	53	0						
	1	56	0	41	55	0	1	55	50
	2	26	0	38	44	0	2	26	40
	2	30	0	38	24	0	2	30	0

CAPUT

CAPUT VI.

DE LUNA IN GENERE, EIUSDEM MACULIS, lumine, modo illuminandi, aliisque hūc spectantibus scitu dignissimis rebus; tum quid veterum Philosophorum cohors de his rebus omnibus senserit, tum quid Astronomi ac Philo-Mathematici recentiores, ex certis infallibilibusque argumentis, inque naturā fundatis, statuunt, brevis dissertatio.



Uemadmodum DEUS ter Optimus Maximus, pro suā immensā Sapientiā & inperscrutabili consilio, corpora cœlestia ad certam mensuram & magnitudinem, creavit: ita non minūs illa in certo ordine distantiaque collocata discrevit, imò (quod permulti ingenio & sapientiā summi viri sibi penitus persvasere) in veram harmoniam cœlestem redegit. Inter omnia autem corpora cœlestia, Lunæ locum cœli inferiorem (ex vulgi sensu loquar) terræque viciniorem, assignavit: quo de utique nullus Philosophorum vel Mathematicorum, hāc nostrā ætate, dubitat: & procul dubio non solum in hunc quidem finem, quantum imbecillis humanus noster intellectus fortè colligere nobis permittit, ut eò efficacius operationem suam in terram extendere, radiosque fortiores in nos terrícolas spargere possit; sed, ut potiùs ex notabili suā magnitudine, quæ ex viciniore distantia oritur, faciliùs & certius facies ejus peregrina, mirabilesque phasium vicissitudines, ac velocissimus, variusque ejus motus præ stellis cæteris cognoscatur, exploretur, ac perpendatur; quò scilicet feliciter beneficio hujus, reliqua corpora Ætherea remotiora, & ratione apparentiæ minora, si non penitus, aliquantò tamen veriùs, ratione animoque lustrentur atque ponderentur, quin imò ipse ex mirabilibus hisce operibus Creator Cœli & terræ suspiciatur, honoretur, atque celebretur.

Corpora Cœlestia harmonici a Creatore sunt disposita.

Cur Deum Lunæ locum respectu terræ viciniorem assignaverit?

Quam quidem causam finalem, antiqui illi Ethnici Philosophi

Luna à veteribus Cœlestis disciplina prima Magistra habita fuit.

losophi ut omni ex parte non consideraverunt, eamque, quia lumine fuerunt destituti divino, attendere non potuerunt; nihilominus tamen ex illorum scriptis satis superque videre est, quòd Luna ab omnibus, Cœlestis disciplinæ prima Magistra habita fuerit : quia nempe hujus & cursus & varietas in oculos facillè incurrit, nec difficulter animum, ad alia cœlestia remotiora meliùs cognoscenda, quasi manu ducit : minùs enim à nobis remotorum corporum, majorem & in sensus magis incurrentem notitiam habemus. Idcirco initio statim, scalam Astro-nomicam ad Lunam, direxerunt, cujus videlicet beneficio sperarunt (nec frustra) paulatim cumque tempore ulteriùs, ad reliqua astra perveniri, & oculis atque animo, tum motum tum naturam essentiamque illorum explorari posse. Diversas itaque & mirabiles foverunt opiniones, de Lunæ figurâ, Maculis, lumine, & naturâ, nec de ullâ unquam, quàm de hac materiâ, graviores & vehementiores conflictationes & disputationes, inter antiquos illos Philosophos viguere; quas insequentibus non solum breviter, sed maxime erroneas opiniones refutandas, & è contra veras magis magisque stabiliendas esse mecum planè existimo : ultrò quidem falsus, egregiè arduum sic mihi suscipiendum esse negotium, tum ad veterum placita examinanda, tum ad naturalem Lunæ vultum patefaciendum, ne ab hominibus cerebro fictum potius admiremur opus, quàm à Creatoris DEI digitis factum.

Antiqui Philosophi varias de Luna habuerunt opiniones.

Faciem Lunæ esse imaginem Oceanus Clearchus & Argesinax existimavit.

Hac opinio refutatur.

Primo autem, ex antiquissimis Philosophis nonnulli, inprimis Clearchus & Argesinax, existimarunt, Maculas Lunares simulacra esse specularia & imagines magni maris in Lunâ apparentes, per reflexionem ad nos transeuntes; teste Plutarcho in libro de facie Lunæ. Cum sententiæ verò hujus falsitas, tum ipsius rei impossibilitas, hinc patet clarissimè : nam, cum certum sit, extraque omne dubium, Lunam circa totam moveri terram, idque fieri non motu solum proprio, viginti septem circiter diebus, sed & motu diurno, uti volunt Peripatetici spatio scilicet viginti quatuor horarum, inde omnibus terrarum incolis, ubivis locorum ea fit aspectabilis : idcirco, omnino necesse esset, eam, quâ aspectum, & quâ Macularum situm figuramque;

figuramque, singulis momentis variari debere, quòd autem longè se aliter habet; taceo radios obliquè in speculum incidentes tantùm in partem planè obversam pertingere posse; quapropter omnia illorum simulacra quæ in terris sunt non ad nos sed in cælum reflecterentur. Adhæc Luna nobis occidète Antipodibusque oriente planè diversas Maculàs quàm Europæis fore apparituras; nam cum mare unà cum continente aliam figuram ibidem præsentet; utique & aliæ Maculæ diversæ & mutata, ratione reflexionis, apparerent; quod sanè contra experientiam pugnat. Nullo enim unquam tempore, quantum memoriæ proditum habemus, majores illas & veteribus cognitatas maculatas, variatas fuisse legimus; quod & observationes hodiernæ, mare Æthiopicum, Pacificum & Indicum pernavigantium, fatis superque confirmant.

Maculae Lunares cum non sint variabiles, idcirco non possunt esse simulacra speculata.

2. Alii, ut Empedocles & Stoicorum permulti, Lunam mixturam & confusionem aëris caliginosi & ignis carbonosi esse; & quæ non ex se se accendatur, propriamque habeat lucem, sed obscurum quoddam sit corpus, semper fumigans & igne ustum: hinc ratione ignis, partim esse luminosam, ratione autem aëris caliginosi, partim obscuram, teste Plutarcho, statuerunt. Diogenes Physicus pumiceam esse censuit, inò vitream translucidam & partim etiam obscuram. Pythagoras, Anaximenes, Parmenides & Cleantes, igneum corpus dixerunt. Zeno, Parmenidis discipulus, igneum astrum esse, mente præditum, & prudens, & artificio confectum; teste Francisco Patritio in Pancosm. lib. 20. Sed hæc opiniones nullius refutationis indigent, cum nulli sint hoc nostro ævo, qui has amplectantur.

Empedocles Lunam mixturam aëris caliginosi & ignis carbonosi esse statuit.

Diogenes pumiceam esse contendit.

Alii permulti pro corpore igneo, mente prædito, habuerunt Lunam.

3. Alii in hac opinione fuerunt, quòd certa corpora Solem & Lunam interjacentia, radiis Solaribus, ad quasdam partes Lunares, viam præcluderent, Maculis inde suam ducentibus originem. Qualia autem sint corpora, haud intelligo; namque si essent nubes, Maculæ continuò mutarentur, quæ tamen invariabiles permanent: si verò Maculæ Solares, cui quæso fuerunt illo tempore cognitæ? Et posito eo, tale quid ex illis Maculis posse oriri, hoc tamen hic attendisse non sufficeret; quoniam & illæ mutantur, tum quoad situm, tum quoad substantiam,

Alii putarunt ex certis corporibus Lunam ac Solem interjacentibus, Maculas oriri Lunares.

tiam, imò interdum spe citius in Sole planè evanescunt, unde & Maculis Lunaribus talis mutatio competeret, quod sanè experientiaè omninò adversatur.

Diogenes Lunam statuit circa axes mobilem convertibilem, ab unâ parte proprium lumen habentem, ab alterâ nullius profusum lumen esse participem.

4. Diogenes Laërtius refert, Berosum Chaldaëum docuisse, Lunam ab unâ parte proprium habere Lumen, ab alterâ verò penitus esse obscuram; ita ut ex illius conversione corporis, lumen quotidie crescat, usque dum totum hemisphærium luminosum sit conspicuum. Impossibilitas autem hujus rei, & ex hoc facillè colligitur: cum enim certa quædam Macula, exempli gratiâ, in phasi falcatae Lunæ crescentis ad limbum occidentalem sita esset, necessariò illa Macula paulatim ad ortum vergeret, sectionemque luminis & umbræ ad Plenilunium usque semper sequeretur; quo tempore, jam non in occasu illa prædicta Macula, sed in ortu videnda esset; quod autem non animadvertitur: sed, si Macula quædam peripheriæ occidentaliori adhæret, circa Novilunium, in quâdam phasi à conjunctione recenti, ibidem persistit, licet lumen Lunæ quotidie crescat: adeò ut Maculæ locum fixum ferè semper obtineant, unumque solummodo hemisphærium nobis sit conspicuum; attamen Luna paululùm libratur: de quo suo loco & tempore fusiùs tractabimus.

Maculae Lunares fixum semper obtinent locum.

Libratio aliqua Disci, in Lunâ animadvertitur.

Peripatetici Lunam ex partibus densioribus atque rarioribus constare sentiunt.

5. Peripatetici, ad partes densiores rarioresque stabiliendas, omnem movent lapidem: densiores, partem Lunæ lucidiorem, ob majorem resistantiam; rariores verò, ob minorem opacitatem, Maculas referre, ajunt; sed omnes inter non convenit, Alii enim Maculas Lunæ lucidiores, ex partibus rarioribus, quòd plùs luminis imbibant, oriri; Maculas verò obscuriores ex partibus densioribus, quòd non tantùm luminis non retineant, progenerari sentiunt: quia sibi imaginantur, quòd Luna non per radios Solis reflexos conspiciatur, sed quòd à Sole illustrata & completa lumen ejus effundat.

Densiores partes opaciores, & rariores partes ab opacitatis infusione puriores nominat Aguilonius.

Franciscus verò Aguilonius lib. 5. Optic. pag. 422. Densiores partes, opaciores, & rariores partes, ab opacitatis infusione puriores, nominat. Ut ut autem sit, res eodem recedit, nec ideo meliùs hæc sententia confirmatur. Nam si Maculæ Lunares (non loquor hic autem, de illis majoribus, quæ nudo

visu

visu spectantur, verùm de reliquis minoribus, quas Montes & Valles recentiores esse autumant, & oculo armato solummodo aspectabiles fiunt) constantem quandam & invariabilem colorem quocunq̄ tempore retinerent; speciem aliquam veritatis hæc opinio præ se ferret: at indicatæ Maculæ Lunæ minores, lumen & umbram de die in diem, imò in horam, variant: dum non solum obscuriores vel lucidiores, majores minoresve, & denique prorsus lucidissimæ evadunt; sed pars obscurior, nimirum umbra, continuò in orbem agitur, motum Solis respicit, caditque in partem ejus adversam, pro naturâ umbræ ex Sole oriente. Quodque umbræ projectio aliter fieri nequeat, ex Opticis omninò clarè probatur, ipsoq̄; adeo Aguilonio libr. 5. Opt. prop. 60. pag. 424. inquit: *Corpus opacum in adversam luminis partem umbram projicit;* cùm corpus opacum lumini impervium sit, ut loquitur autor jam modò dictus lib. 5. Definit. 3. pag. 358. vel ut Franciscus Patritius lib. 2. de diaphano ait: *Opacum est, per quod lumini non est transitus.* Certissimum igitur est, ubi umbra, ibidem & corpus opacum dari, tanquam causam umbræ efficientem: nam corpus diaphanum umbram de se spargere haud valet, quia lumini pervium est. Quibus præsuppositis necessariò sequitur, quòd si corpus quoddam opacum de se umbram projiciat, altius id etiam sit cæteris partibus; quæ elevatiores & depressiores partes, nullis sanè rebus convenientiùs comparari possunt, quàm montibus & vallibus. Hi Montes, quò magis in altum assurgunt, eò longiorem & obscuriorem; quò autem decliviores, eò minorem & debiliorem umbram projiciunt; quod iterum ex Aguilonio lib. v. ex confect. prop. 61. probatur: *Majus opacum corpus, majorem umbram progignit:* & ibidem: *Corpus opacum, quò plures radios luminosi interceptis, eò amplio rem umbram producit.* Hac de re multa insuper in præfens quidem dicerentur, quoniam verò inferiùs hæc opinio de Montibus in Lunâ revera existentibus confirmabitur, idcirco in commodiorem occasionem illa quæ restant, rejiciamus; quia in explicationibus Iconismorum Lunarium, faciliori etiam negotio, tanquam oculari demonstratione, id fieri poterit, ita ut quantum sufficit hac de materiâ in posterum simus disputaturi.

Certa Maculae Lunares in continuâ variatione luminis & umbra versantur.

Corpus opacum lumini resistit.

Corpus opacum umbram projicit.

A Montibus altioribus, longior & obscurior oritur umbra.

P

Si verò

Si verò hi dicti Philosophi, partes rariores, densiores, & opaciores, sic intelligi velint, ac si res quædam essent, quæ certis rebus terrenis, veluti paludibus, sylvis, aquis, & his similibus, non inconvenienter comparari possent; certè, non solùm facilè, hæc concederentur; sed & haud absurda esse, satis superque posset demonstrari. Verùm valde sanè dubito, quin hac in parte (ut solent esse difficiles) non nobis tantùm, sed & veritati daturi manus: ac fortè etiam dicta pipulo excipient, quòd eorum majori contrarientur. Cum hoc enim malunt Aristotele, itemq; Plinio, Ptolemæo, Tychone, Scaligero, & Fromondo &c. statuere inò summis viribus stabilire; Lunam, cùm ex stellarum sit numero, clariori, pellucidâ, incorruptibili & immutabili materiâ constare, subtilioremque esse ipso igne & aquâ; præterea lucem substantialem perfectam; hancque materiam duntaxat analogicè se habere ad elementarem; inò quintam esse essentiam, quæ materiam habeat homogeneam. Ad hæc autè respondeo; primùm, Lunam planè esse obscuram, & nullo lumine proprio præditam, sed omne lumen à Sole mutuari; & ideo corpus diaphanum & pellucidum minimè esse posse: quæ ipsa sententia nullis certè eget demonstrationibus, siquidem & rudioribus, ex luminis decremento & incremento uti & phasium vicissitudine, quâ ratione mox plena, mox gibbosa, dimidiata & falcata apparet, id satis constat. Proprium enim si haberet lumen, vel corpus diaphanum esset, semper lumine plena conspiceretur, etiam tempore Eclipseos, quando umbram terrenam incurrit. Ipsoque etiam Eclipseos Solis tempore (quæ ex solâ interpositione Lunæ, inter Solem & oculum nostrum proficiscitur) nulla planè foret obscuratio, si corpus diaphanum & pellucidum esset: loco enim luminis Solaris, quod tum tegere videtur, aut proprium suum lumen: aut Solis, ratione suæ diaphanæ substantiæ nobis communicaret. Sic enim in Opticis docemur: quòd lumen non impeditum, per totam spheram activitatis suæ, in instanti necessariò deferatur, & quòd luces coloresq; in corporibus diaphanis distincti penetrent: verùm Eclipseos Solares contrariù confirmant quæ sæpissimè tantas adduxerunt tenebras, ut non solùm stellæ, circa meridiè effulserint, sed &

aves,

*Aristotelici
Lunam ex
materiâ cla-
riori immu-
tabili ac in-
corruptibili
constare, qui-
tamq; esse ef-
sentiam ajūt*

*Ratio, cur
Lunâ planè
sit obscura &
nullo proprio
lumine pro-
prio prædita.*

*Luces & co-
lores in Cor-
poribus dia-
phanis di-
stincti pene-
trant*

aves, ex aëre in terram deciderint, quod diverſi & fide digni Hiſtorici teſtantur. 1. Herodotus lib. 2. de bello Lydos inter & Medos. 2. Thucidides lib. 2. anno primo belli Peloponneſiaci. 3. Ptolemæus lib. 5. Magni operis cap. 11. & Theon in ſuo Commentario. 4. Iulius Capitolinus, An. Chriſti 237. 12. Aprilis. 5. Ammianus Marcellinus lib. 20. 6. An. 1187. 4. Septembris. 7. Anno 1560. die 21. Auguſti, Clavius teſtis. *Contimbricæ Solem, circa meridiem, non modico tempore conſectum latuiſſe, tenebrasq; fuiſſe quodammodo nocturnis majores; neq; enim quò pedem quis poneret, videri potuiſſe, clariffimeq; ſtellas in cælo apparuiſſe: aves etiam, mirabile dictu, ex aere in terram, præ horrore tam tetæ obſcurationis, decidiſſe:* Adhæc, quotieſcunq; Luna ſtellam aliquam & oculum noſtrum intercurrit, penitus ab illâ tegitur & obſcuratur, adeò ut nuſpiam appareat; quod aliàs, ſi ex parte tantùm diaphana eſſet, impoſſibile foret. Idcirco merito Luna corpus opacum, imò opaciſſimum, & omninò lumini impervium nominatur; judice ſcilicet Opticâ, uti jam ſatis oſtenſum, quæ ita corpus opacum definit, quòd radiis corporis luminofi reſiſtit, neque tranſitum permittit.

Verumenimverò inveniuntur, qui opacitatem & perſpicuitatem diſtinguunt, dum ajunt: Lunam non penitus eſſe opacam, nec penitus imperviam lumini. Quorum ſententia in duas abit partes; nam alii volunt penetrari à lumine ad aliquam uſq; partem profunditatis, non per totam; alii volunt, habere eam partes aliquas, per totam profunditatem perſpicuas, neque ſuperficietenus illuminari ſolùm Lunam à Sole, ſed imbibere uſq; ad aliquam ſui partem ejus lumen: neque per reflexionem reſunderè hùc lumen ſolare lunam, quo pacto ex ſolâ extimâ ſuperficie reſunderet, ut ſpecula faciunt: ſed illud ut inſuſum; uti Claramontius lib. 7. cap. 10. pag. 157. meminit. Atque hic ita ibidem pergit; *lumen Solis incorporatur in Lunâ, ita ut Luna ſit corpus perſpicuum & tranſparens, ſaltem circa ſuperficiem ejus. & fortè per totum, licet propter magnitudinem corporis lunaris lumen Solis non poſſit totum corpus lunare penetrare: ſic quòd aquè inter ſe appareat lumen in parte Lune verſâ à Sole, ſicut in parte Lune verſâ ad Solem. Sic ergo lumen Lune quod videmus, non eſt ſolum lumen Solis reſlexum ſuper corpus Lune, ſed lumen Solis Lune imbibitum & incorporatum.* Hæc quanti faciendâ, ex prioribus Ecli-

Ex Eclipſibus Solaribus deſiſſimas aſſiſtiſſe tæbras, variis comprobatur Exempis.

Luna ꝑ corpore opaciſſimo jure habetur.

Alii Lunem partim eſſe opacam, partim lumini tranſitum permittere: alii aliter ſentunt.

Claramontius putat, Lunam; lumen ſolare non per reflexionem, ſed illud ut inſuſum, nobis communicare.

bus Eclipsibus & stellarum occultationibus satis superque liquet.

Cæterum alii sentiunt; totam Lunam per aliquas tantum partes & rimulas penetrari, à lumine Solis. Idque demonstrare conantur, ex diversis coloribus Eclipsium Lunæ: cum enim id temporis, Luna à radiis Solaribus, propter terram interjacentem, minime illustrari possit, necesse, ut minimum pars aliqua sit luminis ejus proprii. Ego autem hæc non nego; sed potius confirmo. Nam, cum Eclipsis Lunæ existit in Apogæo, umbram percurrit acutiorem (quæ quò longius abest à corpore Solis, terrâ majori, eò acutior evadit) quam obrem rubicundior aliquantulumque lucidior, quam in Perigæo cernitur, quo tempore per densiorem, obscuriorem & magis nigricantem movetur umbram; idcirco etiam tristior, obscurior & subnigrior apparet, experientia testante. Quòd verò hi colores à lumine Lunæ proprio & vi creationis indito non oriantur, clarè probat Optica, cujus hoc est fide dignissimum pronunciatum: quo medium obscurius, atque à primo immediatoque lumine liberius, eò clarius lumen, cum rerum formis repercussum elucescit. Nam omne corpus lucidum tantò clarius apparet, quantò ambiens est obscurius. Quis item nescit, Lunam melius de nocte, quam de die conspici posse? Sequeretur igitur, colores Eclipsium Lunæ circa Apogæum obscuriores, circa Perigæum autem clariores existere. Ex quibus liquidò constat, lumen illud debilius, vel colores in Eclipsibus apparentes, non ex proprio Lunæque insito lumine, oriri; sed à Solis luce, unà cum lumine Lunæ secundario, quod circa Novilunia animadvertitur: quo de autem fusiùs infra, præsertim capite 12. & 13. dicitur.

Neque non tamen ex variis exemplis innotuit Lunam sæpissime, tempore totalis obscurationis, omnibus coloribus exutam, penitusque fuisse obscuratam, adeò ut prorsus visui se se subduxerit; quod nunquam fieri potuisset, si particulam solùm luminis proprii habuisset, ut volunt Sectatores Philosophiæ Peripateticæ: quod jam suis temporibus Thales Milesius & Anaxagoras, Philosophorum antiquissimi, Vitruvio referente, l. 9. c. 4. cognoverunt. Vt & nostrâ ætate (alios ut taceam) Keplerus

*In Eclipsibus
Lunaribus
varium color
animadvertitur.*

*Eclipsium
colores non à
lumine Lunæ
proprio oriuntur.*

*Lumen in
obscuriori
medio clarius
elucescit.*

*Lunam eclipsatam inter
dum penitus
in celo evanuisse, exemplis
probatur.*

plerus trium Imperatorum Mathematicus, sicuti & videre est in sua Astronomiâ Part. Opt. pag. 297. eum scribere : Anno 1601. Decembri, tenuissimo cornu superstate, caliginosam partem non vidi. Et iterum in Epitome Astron. Copernic. lib. 5. pagin. 825. Luna interdum subito penitus amittitur, ut ne vestigium quidem ejus appareat; cum tamen proximè locum ejus, cerni possint fixæ quartæ vel quintæ magnitudinis: quare tunc locum non habet suspicio caliginosi nimium aeris. Sic factum est, Anno 1620. 14 Lunii. Ejusmodi notabile exemplum & mihi animadvertere contigit, Anno 1642. die 11 Aprilis: Luna enim, tempore totalis obscurationis penitus evanescebat, ita ut Spectatorum haud pauci, nec locum Lunæ in cœlo invenire, vel indigitare potuerint; & quamvis Telescopio instructi essemus, nihilominus visum Luna illudebat, cum tamen stellæ quarti & quinti honoris, satis essent aspectabiles. Hæc se ita habere, Iohannes item Phocylides in Epitome Astronomiæ reformatæ pag. 65. testatur, inquires: Cum defectus circiter jam foret maximus, nubibus paululum à validiore vento depulsis, cœlum undiq; ad quadrantem ferè circum locum deficientis Lunæ, ita clarum visui est restitutum, ut & quartæ ac quintæ etiam magnitudinis stelle accuratè undiq; circa Lunam dignosci & numerari potuerint. Vbi interim Luna? disparuerat aded, ut sine nudis oculis sine adminiculo tubi visorii, ne minimum quidem ejus in cœlo vestigium sit animadversum, ac si ipsa magico aliquo carmine deducta esset. Hæc ille. Tale Phœnomenon eodem tempore & Ultrajectenses observarunt.

Ex quibus prolatis, licet clariùs sit demonstratum, Lucis vel minimam particulam Lunæ non inhærere; at tamen dubito, quin Philolophi Peripatetici his observationibus fidem sint habituri, qui, ut suismet id intuerentur oculis; potiùs fallaciæ visus uti consueverunt, adscriberent. Quid autem ad hæc respondeam: nihil quicquam aliud, quàm quod Doctissimus Iohannes Fabricius, in narratione sua de Maculis Solaribus ingemiscendo protulit: Proh! ed progressa est pertinacia nostra, ut sensus etiam fidem non inveniant amplius: quin imò imaginatio tantam habeat censendæ veritatis prerogativam, ut vix permittamus argumentis à sensu ductis revinciri nostras obstinationes. Hoc enim plerisq; nostrum innatum est, ut etiamsi errore commonstrato causâ ceciderint, non tantum non cedant, sed de genu etiam pugnent adversus manifestam veritatem. Ita ille & quàm verissimè. Interea licet hæc minimè credant, irasci tamen pro-

Exemplum
primum

Exemplum
secundum.

Ejusmodi Ex-
emplum &
ab Autore
observatum.

Hæc etiam
Eclipsin Io-
hannes Phocylides obser-
vavit Fra-
ncoverta.

Peripatetici,
nec fidem ob-
servationi-
bus astrono-
micis adhi-
bent, si con-
tra illorum
præconcep-
tam opinio-
nem pugnare
videantur.

Tam perti-
nacissimi sumus,
ut vis sensus
fidem ampli-
us inveniant

Peripatetici etiam atq; aliam rogant, ne oculos nobis invident.

pterea nolimus, sed pertinacem obstinatumque animum ipsis libentissime relinquemus; obnixè rogantes, modò ne nobis sensus oculosque invideant, qui hæc & alia ipsis incredibilia, in naturâ probe fundata, confirmant, neque non ad talia credenda animos nostros incitant, commovent & impellunt.

Diversitas colorû aspectu, in corporibus Cælestibus, & Lunam partibus confuso heterogeneis, probat.

Sed ne nimis digredi videar, ad Lunam me iterum convertam; quam nec quintam esse essentiam, nec partibus constare homogeneis, colores stellarum diversi testantur. Alius enim color apparet in Corde Leonis, alius in Palilicio, alius in Spicâ, alius in Syrio, alius in Cane minori vel Lyrâ, aliisque in Arcturo. Hi autem colores nullatenus ortum trahunt à spherâ nostrâ vaporosâ (alias omnes stellæ in æquali altitudine, similibus etiam coloribus tinctæ cernerentur) sed corporibus cælestibus planè inhærent. Cùm igitur lux stellarum sit colorata, experienciâ teste; necessariò, & certam opacitatem istis corporibus inesse, conceditur, recteque affirmatur, stellas haud pellucidas & transparentes esse; quippe color ferè nihil aliud, quàm lux cum umbrâ, ab opacitate quâdam ortâ, mixta. At diaphanum, tanquam medium lucis genuinum, necesse ut sit omnium colorum expers, alioqui lux transparenens misceretur, quod in quintâ essentiâ jure non datur.

Stellarum colores non à spherâ terra vaporosâ generantur.

Color essentiam argumentum opacitatis.

Diaphanum omnium colorum expers.

Quibus rationibus Aristotelici incorruptibilitatem Lunæ probare amittuntur?

Porro, Lunam esse corpus incorruptibile, nullisque mutationibus obnoxium, fideles sectatores Aristotelis, sequentibus rationibus evincere conantur. Primo; quod ab initio Mundi, in hunc usque diem, motu stabili & constanti sit lata. Secundo; quod ne minima quidem mutatio, nedum generatio, vel corruptio, ullo tempore, circa Lunam sit adversa. Verumenimvero, quis adeo rudis, qui nesciat, & terram nostram corruptibilem, æque per tot annos in hac mundanâ scenâ existisse, & ad extremum usque diem, unâ cum Sole, Lunâ, & cæteris corporibus æthereis, fore duraturam. Nullas autem generationes & corruptiones in Lunâ unquam fuisse deprehensas, atq; in terrâ, in quâ maximæ alterationes circa urbes, regiones, arbores; plantas & Animalia animadvertuntur, non est quod miremur: nam, si ad certum aliquod tempus nobis Lunam inhabitare, daretur, terramque ex illâ oculis liceret optimis Telescopiis

Cui in Lunâ generationes & corruptiones non deprehenduntur?

scopiis instructis, contemplari; certè haud majores mutationes (quæ tamen partes modo externas concernunt) lunaribus, nec ædificia, nec turres, plantas arbores vel Animalia superficiæ terræ inhærentia, unquam effemus deprehensuri: At mirabiliora, nobis in Lunâ degentibus, viderentur, præsertim quâdam prænotione antecedente; in terrâ, illâ mundi facie, tot varii generis Animalia, tam volatilia, reptilia quàm quadrupedia, inprimis tot hominum myriades, vitam agere, seque per generationes multiplicare posse.

Non sequitur ergo, cum nihil videamus, propterea & nihil extare. Fortassis in tali vasto & supra quàm dici potest egregio corpore, quædam præclariora dantur; licet non sint ibi loci homines, bruta animalia, arbores, plantæ, fruges vel hujus generis quicquam, nostris rebus terrenis prorsus simile; neq; fulmina, venti aut pluviz. Interèa tamen non video, cur ibidem non quædam alia, à nostris terrenis diversissima, atq; imaginatione nostrâ remotissima, inque summâ prorsus nobis inopinabilia esse, & quæ nihilominus generari, mutari & dissolvi possint. Hâc de re Galilæus Vir absolutæ subtilitatis in suo Systemate Mundi plura differit, quæ sane annotationem merentur, inquires: *Quemadmodum haud ambigo, si quis in vastâ Sylvâ, feras inter avesq; natus esset & educatus, nec unquam quicquam de elemento aque cognovisset, hunc talem nunquam imaginando concepturum, in naturâ esse mundum à Terrâ diversum, plenum animalibus, quæ sine cruribus, sine alis velociter incedant, nec in superficie modo, sicut feræ supra terram, sed penitus in ipsâ profunditate: nec solum incedant, verùm, quocunq; placet in loco, subsistant immobiles, id quod aves in aëre præstare non possunt; adhuc ibidem homines etiam habitare, ibi exstruere palatia civitatesq;, tanto autem itinerum uti compendio, ut sine ullo labore, cum omni familiâ ac domo, integrisq; civitatibus, in remotissimas sese regiones conferant: quemadmodum inquam, certò scio, talem, etsi perspicacissimâ præditum imaginatione, nunquam cogitaturum fuisse de piscibus, de oceano, de navibus classibusq;: sic aque, imò multò magis accedere potest, ut in Lunâ, tanto à nobis intervallo remotâ, materiamq; forsitan à terrâ diversissimam habente, Substantiæ quædam existant, & operationes edant, ab imaginatione nostrâ non modò remotas, sed prorsus alienas: quippe quæ nullam cum nostris similitudinem habeant, & proinde omninò sint à nostrâ cogitatione discrepantes. Nam, quicquid sub nostram imaginationem cadit, id aut jam ante viderimus oportet, aut ex rebus rerumve partibus jam ante visis compositum sit, quales sunt Sphynxes, Sirenes Chimææ, Centauri &c.*

Quamvis Luna non homines aliat vel bruta Animalia, possibile tamen, ut quiddam aliud ibidem detur.

In Lunâ possunt esse res plani à nostris diversa & cogitationem nostram supergredientes.

Si quis Elementi aque cognitione destitueretur à nil de navibus, deq; piscibus imaginari sibi posset.

Præterea,

Conceptio & imaginatio humana non solum debilis sed & fallax.

Præterea, hæc se ita habere, & intellectum nostrum humanum, conceptionem & imaginationem, non solum debiles sed & fallaces esse, ex rebus hîc in ipsâ terrâ, in peregrinis nempe regionibus, repertis colligitur. Quis enim unquam sibi imaginatus fuisset, si non prius edoctus, quòd in Africâ & Americâ tot mirabilia genera animalium, tot genera animo non prævisa frugum & Plantarum, tot innumera peregrina genera cochlearum & concharum darentur? Sed plerumque sic nobiscum est comparatum, præsertim cum Vulgo; ut quæ nec viderit aut perceperit, vel oculis aspicere, cognoscere aut Mente suâ stupidâ comprehendere haud valet, statim inter absurda & impossibilia numeret, nec minùs pro stupidis, stolidis, menteque captis omnes habeat contradicentes.

Maximè periclitantur, qui sibi solâ ratiocinatione, non autè simul sensuum experientia comprobari aliquid permittunt.

Insuper ut Peripateticæ familiæ vel obiter commonstrem, quàm nos esse oporteat cautos, circumspectosque in assentiendo his, quæ solâ ratiocinatione nobis ingeruntur, licet habeant magnam speciem, nisi sensuum experientia comprobantur & demonstrantur: &, quòd multùm intersit, inter rationales conjecturas & ocularem experientiam: idcirco, ut ad quæstiones sequentes respondeant, rogo: an Aristoteles cum omnibus suis affeclis sibi unquam imaginari potuerit, viam lacteam multarum minimarum stellarum congeriem esse, priusquam id fuerit Tubo optico detectum? Aut, Venerem & Mercurium, instar Lünæ, crescere & decrescere? Nedum extare, talia permagna corpora opaca, Maculas puto Solares (ut taceam reliqua) in ipso cœlo, non procul à Sole generari & corrumpi? Quamvis (quod faciliè intelligo) illi ipsi hanc ultimam asseverationem minimè amplectentur; & ex hoc quidem fundamento, quòd talia phœnomena ferè nunquam suismet viderint oculis: nec videre cupiant, ne per ipsam ocularem demonstrationem, falsam præconceptam opinionem mutare, contrariumque sibi statuere cogantur.

Abisq; Tubo impossibile fuit Aristoteli, viam Lacteam rectè cognoscere.

Et in reliquis corporibus possunt quedam dari ab imaginatione nostrâ plane remotissima.

Ex quibus utique fit manifestum, quòd alia permulta, tam in Lunâ, quàm in reliquis corporibus cœlestibus, dari possint, quæ nobis hominibus, in hunc usque diem, vel oculorum sensu, vel ratione nostrâ assequi non licet. Spe sum tamèn certâ fretus, quòd

rus, quod, cum tempore, & ante interitum Mundi, perquam plurima nobis detegentur ac revelabuntur; quorum Posteritatem habituri sunt cognitionem, quam modò nobis vix imaginari possumus, sicuti & hoc seculo, nobis multa innotuere, priscis majoribusque planè incognita. Placuit enim semper summo Mundi Architecto, ejusmodi ordo, successio & incrementum, tam in rebus Ecclesiasticis, quam Politicis, Artibus & Scientiis. Sed, cum pluribus hæc demonstrare non sit hujus loci, idcirco ad examinandum opiniones de Lunâ restantes nos conferamus.

6. Inveniuntur præterea, qui statuunt (& cum primis Doctissimus Franciscus Aguilonius, ut & eximius Christophorus Scheinerus, in disquisitione Math. pag. 62.) alterum Lunæ hemisphærium exquisitè diaphanum esse: alterum verò, quod scilicet humani vultus speciem nobis ostendit, medio-diaphanum tantum, hoc est, quâdam opacitate respersum, quæ aliquid luminis transmittat: potioremque partem non solum in extremâ superficie, verum etiam in profunditate retineat: quod etiam in lacteo illo cœli circulo, eodem modo accidere arbitrantur. Deinde tradunt, quod densiori nubi non sit absimilis pars Lunæ opacior, quæ pariter Solis aspectum prohibet. Sed distinguenda est hic radiorum Solarium prohibitio: nam talis nubes prohibet quidem lumen Solis primum, ita ut umbra sequatur, non autem lumen secundarium Solis, unde tenebræ existunt, quemadmodum videre est in Eclipsibus Solis totalibus, quo tempore ea existit caligo, ut lumen neque secundarium penetrare possit. Quòd autem ex muro, domo, licet sint corpora opacissima, non tenebræ, sed umbræ duntaxat procreantur, cum tamen neque primo vel secundo lumini aditum vel transitum per se præbeant; ratio est, quia ex circumjacente lumine in istam umbram fit reflexio. Adhæc item, opinationis exponentiæ fundamenta etiam faciliè destrui possunt; si demonstretur, partem Lunæ à nobis aversam, vel invisibile hemisphærium, ejusdem esse naturæ, eisdemque constare partibus ac hemisphærium visibile, nobis obversum, nihilque profus equidem proprii luminis possidere. Id quod nullo quidem negotio fieri poterit, ex

Veniet tempus, quo ista, quæ nunc latent in lucem dies extrahat & longioris evi diligentia.

Latens hemisphærium exquisitè diaphanum, Patens medio-diaphanum tantum esse, statuit Aguilonius & Scheinerus.

Parti Lunæ aversæ eisdem constat partibus, nec quicquam proprii luminis particeps, ac parti Lunæ obversæ.

Q

terit, ex

Lunã nonnũ-
quam parit̃
fatu magnã
hemisphærii
latenti nobis
obvertete

Si hemisphæ-
rum latenti
diaphanum
esset, peregrina
inde existi-
berent pha-
ses.

Singulari o-
pinio Scipio-
ni Claramẽ-
nti de Macu-
lis Lunaribus

Non decet
res philoso-
phicas tra-
ctantes, ad
omnipoten-
tiam & di-
vinam volun-
tatem, tan-
quam ad sa-
crum aliquũ
anchoram,
cessum
confugere.

terit, ex motu nimirum illo novo Librationis reperto, patebitq; præsertim ex Iconismis lunaribus addendis, non eandem semper oculis nostris obversari Lunæ faciem, sed certo tempore, partem haud exiguam, hemisphærii sui latentis nobis à Lunã obverti & conspiciendam præberi. Quæ cum ita revera sint, & ex duobus pleniluniorum limbis, utpote maximæ & minimæ librationis terminis, abundè constare possunt; idcirco hemisphærii latenti exquisitè diaphanum esse penitus corrueat: quod si verò secus esset, sanè mirabiles & peregrinæ phasēs inde orirentur. Lunam autem quãdam opacitate esse respersam, quod attinet, id equidem prædictis rationibus satis refutatur.

7. Reliquum est, opinio Scipionis Claramontii, Mathematicorum omnium, Philosophiæ Peripateticæ in quibusdam sese opponentium, jurati inimici: quam ipse in suo de Universo lib. 8. cap. 9. pag. 183. his verbis proponit: *Considerandum propono, colores in cælestibus, cum nullo ex temperamento prodeant, sed simplicissime naturæ corpori insideant, ex solâ formâ emanare, ita rubedo in Marte, livor in Saturno, flavities in Mercurio &c. & pari modo colores obscuriores & clariores; in Lunã, est scilicet seu picturata Luna, neq; alia colorum causa adduci potest, quàm querubedinis in Marte, livoris in Saturno &c. cur verò placuit naturæ supremæ ejusmodi in Lunã pictura, non est nostræ facultatis cognoscere, sed temeritatis, cognitionem arrogare.* Miror certè, cum huic Viro (qui nescio quis sibi videtur) vel nequicquam ullo tempore deficiat, ad oppugnandas & convincendas omnium Mathematicorum rationes, imò ipsasque oculares demonstrationes contra Aristotelem in medium prolatas, quòd hac in parte, de Maculis nempe Lunaribus, refugium statim receperit, ad omnipotentem & divinam DEI voluntatem; dum asserit, placuisse ita Creatori Cœli Terræque ejusmodi Lunam creare picturatam. Do equidem manibus ambabus, multas abstrusissimas quæstiones nullo negotio hoc modo posse resolvi, si dicamus, à DEI voluntate id provenire, quòd sic res sint conditæ, ut sunt: verum tamen existimo; nonnisi plebejis id permittendum, ut in Logicis Metaphysicis Physicisque parùm versatis; quòd si verò Doctissimi quique hac Philosophandi viâ incedant, qui putant non solum in Physicis, sed & in Opticis ac Astronomicis se multò sapientiores acriorisve judicii esse, quàm omnes Galilæos, Ty-

læos, Tyrones, Gassendos, Kepleros (quemadmodum Clarimontius talis vult videri, cùm in tractatu de Vniverfo lib. 7. cap. 10. pag. 159. de Kepleri Iudicio iudicat) vix id ullo tolerari posse modo. Id verò facere non nefas esset, si nullas profus rationes, Mens nobis suppeditaret, nullaque ocularis experientia vel demonstratio adesset, ita ut planè necesse esset ad tale aliquod commigrare Asylum. At enimverò & ævi felicitate & benigna DEI gratiâ hic abundè juvamus, ut in promptu nobis sit dicere (si & rationi bellum indicere nolumus, nec refragari oculari experientiâ ex innumerabilibus observationibus acquisitâ volumus) quid sint Maculæ Lunares? aut esse viderive, probabiliter possint. Quod si autem in hæc verba illicò erumpere placeat: cur hoc vel illud Naturæ supremæ placuit, non est nostræ facultatis cognoscere, sed temeritatis cognitionem arrogare; certè, nulla ampliùs opus foret Philosophiâ. Hæc paucula sufficiant, quæcunquæ dicta fuerint, de variis Philosophorum opinionibus, substantiam Maculasque Lunæ concernentibus; sicut item, quantum satis est, rationes eorum sunt discussæ, ostenso parùm eas valere: de cætero quid de Lunâ, Maculisque ejus, planè iudicandum, sub capitis huius finem quo ista rejicimus, indicabitur. Paucis ad hæc attingemus opiniones varias de luce, lumine ac illuminatione Lunæ, & quomodo illa lumen suum ad nos refundere & radios spargere possit.

*Varia opinio-
nes de Luce,
Lumine ac
Luna illumi-
natione.*

Postquam enim sufficienter à nobis probatum ac demonstratum est, Lunam nihil quicquam proprii congeniti luminis possidere; non item diaphanam, vel perspicuam esse; neque verò alterum ejus hemisphærium, exquisitè diaphanum, hoc est, quâdam opacitate obvelatum; nec lumen ejus, ad aliquam usque partem profunditatis, penetrare posse: sed corpus esse opacissimum, densissimum, solidissimum, & omni lumini impervium & ita per se obscurum, ac caliginosum; imò ut nonnisi omne lumen unicè à Sole mutuetur. Itaque in sequentibus etiam patefaciemus, Lunam neque lumen vel radios in se attrahere, vel imbibere, & illud tanquam infusum in terram refundere propter opacitatem corporis; sed luce solummodo

*Luna Soli
Lucem non
imbit, sed,
ratione opa-
citatù corpo-
ris, per reflec-
tionem illâ
nobis com-
municat.*

Q 2

repercutsa

repercuſſâ frui, & terræ noſtræ, per radios reflexos, eam communicare. Hanc verò ſententiam noviter non eſſe excogitatam, ſatis ſuperque inde liquet, quòd jam Thales Mileſius, Metrodorus, Anaxagoras, Anaximenes & alii Philoſophi antiquiſſimi docuerint : totum Lunæ hemiſphærium à Sole illuſtrari, Lunamque nullâ ex parte per ſe ipſam lucere; quod item ferè ab omnibus noſtri ſæculi Mathematicis ſtatuitur. Inveniuntur quidem, qui in diverſum abeunt, ex veterum numero autores, Poſſidonius ſcilicet apud Macrobiũ (ut reliquos taceam) qui ſibi perſuaſere reflexionem hanc tanquam à ſpeculo quodam fieri, Neotericorum (ut mox pluribus declarabitur) opinioni, in eo contrariantes, quæ hæc eſt: Lunam inſtar ſpeculi, lucem à Sole acceptam, rurfus emittere. Id verò ſi iſthoc fieri debeat modo, proſus neceſſe erit ut priùs opacitas corporis Lunæ, concedatur, utpote per quam opacitatem, apta eſt ad recipiendum, & repercutiendum lumen Solis, quod facere, niſi talis eſſet, non poſſet : quòd quidem ita ſe ſe omninò habere etiam ex antecedentibus abundè conſtat. Adhæc, ut ſuperficies Lunæ, non ſolum levigata, ſed & exquisitiſſimæ polituræ ſit, ſi faciem ſpeculi referre debeat. Quamvis autem hæc res longè aliter ſit comparata, quemadmodum ex ſubſequentibus patebit: id tamen hac vice concedam, ut eò clariùs percipi poſſet, an hæc inſtantia, aliquo ſolido fundamento nitatur.

Hinc ſententia antiquorum Philoſophorum per multi, ut & ſere omnes noſtri ſæculi Mathematici aſſipulantur.

Poſſidonius ſtatuit, Lunam, inſtar ſpeculi, radios ſolares reſtiteræ.

Luna lavu ac terſa neceſſe ut ſit, ſi ſpeculum eſſe debeat.

Speculorum genera ſunt diverſa.

Si igitur ſuperficies Lunæ, veram ſpeculi faciem repræſentat, neceſſe, ut ſit etiam certæ alicujus figuræ; nam ſpeculorum formæ, ſunt diverſiſſimi generis: aliud enim eſt planum, aliud concavum aut convexum ſphæricum; aliud concavum aut convexum Cylindricum; aliud concavum vel convexum Ellipticum, parabolicum & hyperbolicum, pyramidale, Conchoideum vel Hederaceum; atque tot demum ſpecierum quot eſſe poteſt linea, vel ſuperficies concava, aut convexa politi corporis. Quamvis itaque ſpeculorum genera ſint diverſa, attamen ex prædictis tribus prioribus tantùm Lunæ competit una aliqua forma, reliquæ ipſi haudquaquam conveniunt, uti ex ejus figurâ rotundâ, umbrâque, tempore Eclipſium Solarium, unicuique colligere licet.

Quod

Quod si igitur quispiam existimet, Lunam, speculi formam repræsentare planam; cui sententiæ fortassis permulti calculum suum addent, præsertim qui hoc negotium minimè expendunt, vel, qui rerum Opticarum planè sunt ignari; iis hac vice duoduntaxat argumenta proponam, quas si rectè rationis trutinâ examinaverint, non dubito, quin illicò impossibilitatem hujus rei agnoverint.

Cur Luna, non formam speculi planâ repræsentet?

Initiò, quemlibet fateri oportet, quamprimum Sol superficiem aliquam planam illuminat, eoque ipso momento, totam superficiem, fieri luminosam, ac lucem æque retinere tam diu, quàm Sol radiis suis planum illud illustrat, hoc est usque dum Sol in isto horizonte occidit. Tale igitur quippiam in Lunâ animadverteretur, si pars ejus obversa speculum, planum referat; ita enim, statim primo die, quando tantum luce tenuissimâ est imbuta & corniculatissima apparet, lumine plenam se se nobis ostenderet, ac per quatuordecim dies, facie hac nihil mutatâ cerneretur, donec motu suo proprio Solem allequeretur: neq; itidem, ulla phasis circa Lunam foret aspectabilis, ipsaque adeo per tres aut quatuor dies à radiis Solaribus abscondi posset; veluti in phasi primâ observatur. Quæ cum ergo secus se se habeant, univèrsa atque singula, experienciâ videlicet teste, facillè colligitur, quanti illud de Lunâ planâ planoque speculo similmâ phantasma sit, æstimandum.


Luna, si esset speculum planum, nulla prorsus phasis existeret, sed à primâ statim die illuminationis toto orbe lateret.

Quod si autem cuiquam hæ rationes nondum satis prægnantes viderentur; is (quod nullus negare poterit) sciat: cum pars Lunæ patens, quoad circumferentiam, planè rotunda, corpus autem reliquum instar orbis planum sit; imò partem latentem aut itidem planam certâ tamen crassitie præditam necessariò constare, prout quidem corporis requirit magnitudo, ac ita figuram Cylindri repræsentare, aut, quòd pars averfa speciem sphaeræ dimidiæ referat, quæ sine dubio, secundum illorum imaginationem, etiam lavigata, politaque erit, instar speculi convexi. Posito autem, Lunam habere ex jam dictis formis, quamcunq; voluerint; attamen istâ ratione, mirabilis certè & peregrinus faciei Lunæ foret aspectus. Nam, cum satis bene à me sit exploratum, Lunam in perpetuâ libratione versari;

Alie rationes, cur non sit speculum planum.

idque suo loco ex multò certissimis observationibus demonstrabitur; hoc est, Lunam non perpetuò unum idemque latus, sed & justo tempore partem haud exiguam de illà aversâ facie nobis obvertere: sequeretur itaque, quando Luna, post conjunctionem, à Solis radiis illuminatur, præsertim in maximo, vel minimo librationis termino existens: prius maximam ejus, & quidem totam partem planam, eodem momento illustrari, reliquam autem partem, ex motu librationis, de latere averso, visibilem, tantùm successivè per phases, uti fieri solet, quotidie crescere vel decrescere: præterea verò pars illa plana non perfectè rotundæ figuræ, sed formæ ovalis apparet; secundùm illud Theorema Opticum: *Circulus obliquè conspectus, ut Ellipsis apparet*: Merfennus lib. 1. Opt. pag. 497. Aguil. lib. 4. prop. 66. pag. 286. & lib. 6. prop. 21. pag. 512. Hæc cum aliquatenus obscura videri possint; propterea tres has figuras apponere placuit, quarum beneficio facillimè res plana evadet.

Circulus interdum ut ellipsis apparet.



Aut Sr.

Rationes antecedentes graphicè demonstrantur.

Proinde, cùm extra omnem dubitationis aleam positum sit, Lunam certo motu libratorio circa axes (qui hîc in d & e conspiciuntur) moveri, partim Euroaustrium versùs in signorum consequentiam, partim Corum versùs in signa antecedentia; idcirco triplici modo facies Lunæ à nobis conspici poterit. Primò, uti in A, ubi totam partem planam nobis obvertit; quo tempore, à primâ statim die conjunctionis ad ultimum usque, plena ac rotundissima spectabitur, veluti jam antea dictum. Secundò verò in B, cùm se sursum Corum versùs ex parte

parte libravit; superiùs certam partem abscondit, inferiùs autem particulam de speculo sphærico averfi lateris, apud g, nobis spectandam offert. Vnde quidem fieret necessariò, ut statim, post conjunctionem, planisphærium illud B, similiter totum illuminaretur, nequaquam autem ab initio figuram planè circularem, sed Ellipsin repræsentaret, quæ postea paulatim tantò fieret rotundior, quantò phases quotidie magis magisque accrescerent: at priusquam phases nondum totaliter essent completæ, semper particula aliqua illustrata Euroaustrum versùs deesset, quæ in diem, formam figuramve mutaret; quemadmodum ex sectionibus istis, phases referentibus satis superque colligitur.

Tertiò apud C, quando Luna Euroaustrum versùs, aliquatenus librata, nempe circa conjunctionem apparet, tum ad dextram, pars illa sphærica videretur; quo tempore, non illicò ab illuminationis initio, totum illud planisphærium C illustraretur, verùm principiò sensim per phases lumen Solis acquireret, donec Sol planè horizontem illius planisphærii attingeret, quo tandem & quidem in momento, tota Lunæ facies, maximâ ex parte, lumine plena cerneretur, parte illâ exceptâ sphæricâ superiori, quæ primùm per phases pederetim collustraretur; sicuti cuilibet diligenti Schematis hujus appositi inspectori & consideratori faciliè patebit. Est igitur facies Lunæ haudquaquam plana, nec ullatenus potest speculum planum referre. Quamvis verò à modò adductis argumentis etiam discesserimus, quibus tamen nihil verius vel certius excogitari unquam poterit; nihilominus ex eo quod sequitur sententiæ falsò conceptæ impossibilitas fit manifesta: cum enim effigies Solis in Lunâ nunquam spectetur, veluti id evenire deberet, ex naturâ speculorum omnium, si & ipsa esset speculum; haud utique sanè speculum esse potest Luna.

Addo, neque concavum speculum Lunam repræsentare, id quod ex consequentibus concluditur rationibus. Hoc enim si ita se haberet, Phases confestim post Luminarium Synodum, non à parte dextrâ occidentali nimirum, crescere inciperent, sed à parte orientali sinistrâ; siquidem, cum Sol, speculum aliquod conca-

*Autor negat
superficiem
Lunæ esse spe-
culum pla-
num.*

*Omne specu-
lum aptum
est ad reflec-
tionem si-
mulacri rei
oppositæ.*

*Cur Luna
neq; speculū
concavum
esse possit?*

concavum illuminat, fit principium istius illuminationis in parte Soli obversâ, ita ut pars illa Soli vicinior, semper initio sit umbrosa, uti ex Aguilonii Optic. lib. 4. prop. 94. pag. 313. clare patet; inquentis: *Hoc discriminis interest, quod in concavis umbra ad eandem sit partem, ex qua lumen affulget; in convexis autem pars opaca averfa sit, atq; in oppositum projecta.* Ne dicam has phafes quæ ex parte sinistra splendere inciperent, mox post primam Quadraturam planè aliam inusitatam peregrinamque faciem nobis exhibituras. Cùm autem in his destituat nos experientia; utique, nec pro speculo concavo, accipi poterit Luna. Vt taceam innumera alia absurda, quæ inde orientur.

*Quomodo
Concavum
à speculo con-
vexo differ-
natur?*

*Luna, neg;
speculum re-
præfcat con-
vexum.*

At, si nihilo tamen minùs Luna formam alicujus speculi præ se ferre debet, nulla alia nisi convexa erit; siquidem ex ante dictis liquidò jam constat, faciem Lunæ, neque planam, neque concavam esse posse: confirmante istud modo recipiendi lumen Solare. Vt autem hæc disputatio, à quolibet, licet in Opticis parùm fuerit exercitatus, eò meliùs intelligatur; faciem nempe Lunæ, nec speculum esse convexum, quamvis citra omne dubium figuræ sit globosæ; idcirco quædam Theoremata Catoptrica præmittam, quorum item aliquâ ex parte capite secundo meinini, simulque naturam & qualitatem speculorum breviter contemplabimur: præsertim autem eò, ut quomodo specierum visibilium formæ à speculis nobis fiant conspicuæ, intelligamus.

*Theorema
Catoptricum
primum.*

I. *Corporum terforum politorum, cujuscunq; figuræ sint, superficies à quolibet suorum punctorum luces, colores, & formas rerum oppositarum reflectunt, secundum reſtitudinem linearum.* Vitell. lib. 5. Theor. 1. pag. 191. Alhafen 4. n. 2. Maurolyc. Theor. 25. Eucl. 2. hypoth. Catopt.

*Theorema
Catoptricum
secundum.*

II. *In omni reflexione, à quibuscunq; speculis factâ, semper angulus incidentiæ est æqualis angulo reflexionis.* Vitell. lib. 5. Theor. 10. 12. & 20. & c. Alhafen lib. 4. N. 10. 12. & 18. Maurolyc. Theor. 27. & 29. Anton. de dominis cap. 2. pag. 3.

*Theorema
Catoptricum
tertium.*

III. *Comprehensionem formarum visibilium in speculo sola efficit reflexio, quæ ad visum: unde, secundum dispositionem linearum, reflexionis visus necessariò informatur, hoc est: omnis reflexio in uno saltem loco, & sub certo inclinationis angulo spectatur.* Vitell. lib. 5. Theor. 23. & 24. Alhafen 4. n. 21. Antonius de domin. cap. 2. n. 8.

Quæ quia Theoremata prorsus indubitatè sunt vera, ita ut
à nemine

à nemine, qui suæ est compos mentis, arietari, nedum inverti possint: itaque necessariò sequitur, Lunam tanquam speculum, in unico duntaxat certo loco terreno posse animadverti, non autem ubicunq; locorum supra horizontem ascenderit, ratione scilicet anguli incidentiæ & reflexionis; reliquis namq; foret prorsus invisibilis. Quod si autem quispiam objiciat, se quidem, sine omni contradictione, hæc omnia, quæcunque protuli, concedere; verùm, cum Lunæ superficies speculum convexum repræsentet, idcirco & superficies ejus, ex infinitate inclinationum constet, quâ ratione in omnes partes quaquaversum Luna reflexionem suam projiciat, non autem, ut fit in speculis planis in unum tantum locum. Cui respondeo, primùm; quoniam Lunæ hemisphærium extra plenilunium nunquam respectu terræ totum à Sole illuminatur, imprimis in phalibus falcatis & corniculatis; idcirco etiam mediante illâ infinitate inclinationum, quippe quæ à totâ superficie oritur, non in quacunque partem radii reflectuntur; sed in certum solummodo locum nisi uti suprâ commemoravi plenilunii tempore. Atque licet hæc dentur, tamen nihil aliud inde sequetur, quàm quòd ubicunq; locorum in omnibus partibus, sola effigies Solis, mediante isto speculo convexo, cerneretur, & quidem multò minor, facie Solis apparente: quippe specula convexa, omnia objecta & idola minora referunt, quàm revera sunt; quod palàm est, ex Theoremate illo Catoptrico: *In convexis speculis imagines sunt minores.* Herigon prop. 22. pag. 111. Verùm si huic instantiæ ita occurras; non esse necessarium, ut imagines Solis in speculo Lunæ convexo conspiciantur; nam propter nimiam illam distantiam, planè evanescerent; secundùm illud Opticum Aguil. lib. 5. pag. 420.: *Specula convexa res exhibent multò quàm reipsa sint minores, ac tantò etiam idola attenuantur magis, quantò res ipsa longius à speculo absistunt.* Vitell. lib. 6. n. 41. Alhal. lib. 5. n. 5. pag. 190. Sic Marsennus quoque loquitur in Theor. Catopt. 1. pag. 505: *In convexis speculis sinistra apparent dextra, & imago propius abest à speculo, quàm aspectabile, eòq; minor est; tantòq; minor, quantò minus est speculum; tantò verò major, quantò visibile est propinquius.* Omnia ista ambabus manibus amplector, cum sint certissima, & ipsemet illis utar pro fundamen-

Specula plana in unum solummodo locum, convexa verò quaquaversum reflexionem projiciunt.

Specula sphaerica omnium rerum oppositarum similitudinem referunt minora.

Quòd quid longius à speculo convexo abest, eò magis attenuatur.

Quantò speculum convexum est minus, objectumq; remotius, tantò etiam hoc ab illo representatur minus.

R

to cui

to cui jam jam inædificabo aliquid, ut contrarium inde demonstretur, concludaturque infallibiliter, Lunæ superficiem minimè esse convexam. Primò verò, non sufficit; ut objectum aliquod nobis luminosum appareat, quò id radiis corporis illuminantis perstringatur, sed opus est adhæc, ut reflexi radii perveniant ad oculum nostrum. Idcirco, cum minima pars, reflexionis radorum ab illuminato quodam speculo convexo factæ, certo spectatori in oculos incidit (minima enim est particula illa totius superficiæ sphericæ, cujus inclinatio repercutit radium ad certum oculi locum, uti perquam eleganter hac de re loquitur Galilæus in Syst. suo Cosm.) utique & minimam convenit esse partem superficiæ sphericæ, quæ oculo se se splendentem exhibet, omnibus aliis manentibus obscuris. Quo fit, ut de parte reliquâ nihil profusè videamus, licet tota superficies Soli sit obversa, non solum propter radorum paucitatem, sed & ob nimiam distantiam, à quâ radii hi reflexi, à particulâ illâ minimâ superficiæ speculi spherici convexi, cujus inclinatio id permetteret, penitus absorberentur. Similiter cum Lunâ esset comparatum, si speculi convexi lævorem haberet, ita ut pars minima Solis splendore oculis certi spectatoris ingereret, quamvis totum hemisphærium radiis Solaribus esset expositum: reliqua verò pars, spectatoris oculo tanquam non illuminata, & proinde nec visibilis, ac ipsa denique Luna omninò invisibilis appareret; cum illam particulam, unde reflexio procederet, propter suam parvitatem, nimiamque distantiam, evanescere fit necesse. Et quemadmodum oculo illa esset invisibilis: ita ejus illuminatio nulla evaderet.

A speculo convexo paucissimi radii reflexi certi spectatori offeruntur.

Luna si esset instar speculi spherici, invisibilis foret

Luna, si esset speculi spherici imago Soli instar minutissima stellula appareret.

Cæterum ipse ego planè sum in hæc sententiâ cum Aguilino; licet aliquis juxta Lunam existeret, Solem ne quidem instar minutissimæ stellulæ, propter immensam illam distantiam, ipsi fore apparituram; imò in mediâ elongatione Solis à terrâ, minimam illam imaginem ejus, priusquam ad nos pertingere posset, profusè desituram. Quod argumentum adeo est validum, superficiem nempe Lunæ haud esse lævigatam politamve instar speculi convexi, ut à nemine tentari queat, tantum abest, ut possit convelli & labefactari: nisi fortè isti, id aggredi præfidenter

fidenter audeant qui Opticam & Catoptricam vix à limine salutarunt.

Tandem igitur sollicitissimè quæritur, cum superficies Lunæ, nec speculum convexum, nec concavum, nec planum sit, uti superius abundè demonstratum, & tamen corpus sit opacissimum, quod tantummodo lumen à Sole mutuatur, & beneficio reflexionis ad nos idem transfert; quâ namque figurâ superficies ejus sit prædita, & quomodo radios suos ad terram transfundat? Respondeo: superficiem Lunæ Sphæricam, haudquaquam esse planam lævigatam vel politam, sed plane inæqualem, asperam & scabrosissimam, attamen eâ autem non obstantè, radios suos per reflexionem nobis offerre, & eo quidem penitus modo, quo murus quilibet nobis obversus lumen Solare communicat. Non enim omnia instar speculi plana & polita esse confestim requiritur, quæcunq; per reflexionem agere debent. Quæ ita se omninò habere ex sequentibus mox dilucebit. Ne autem quispiam existimet, memorata illa, aut vigilantium esse figmenta vel dormientium somnia; ex Plutarchi libro de facie in orbe Lunæ pag. 310. sequentia, quæ ad verbum adscribentur, perpendat rogo, probeque animo volvat cogniturus jam à multis retrò seculis eadem esse statuta: Luna inquit naturæ illæ & omnigenæ veteris eruditionis Bibliothecarius, *multas habet inæqualitates, asperitates multas; ut fulgores qui à magno corpore accidunt altitudinibus non exiguis invicem resplendere possint, ac omnimodè reflecti, implicari, resplendentiamq; inter se continuare, quasi à multis ea ad nos ferretur speculis.* Apud quem Autorem hæc quoque pag. 316. extant. *Quod ad faciem attinet in Lunâ apparentem: sicut nostra terra sinus habet quosdam magnos: ita censemus Lunam quoq; profunditatibus & rupturis magnis esse apertam, aquam aut aërem caliginosum continentibus: in quas Sol suo lumine non penetret, sed eas deserens reflexionem dissipatam faciat.* Huic item sententiæ & permulti Græcorum Philosophorum fuerunt adiecti, ut Democritus, Orpheus, Heraclides, Ocellus & alii, referente Francisco Patritio in Novâ suâ Philosophiâ de Univertsis lib. 20. pag. 112.

Sed ad probandum me conferam, Lunam nempe inæqualem & asperam, instar cujuslibet muri à Sole illuminati lucem Solis mutuaticam nobis communicare. Primùm namque id

Quænam superficies Lunæ sit prædita quæritur?

Superficies Lunæ prædita est aspera atq; scabrosa, & nihilominus lucem nobis per reflexionem communicat.

Non omnia, quæcunq; per reflexionem agunt, debent esse corpora polita.

In Lunâ Montes & Valles asperitatesq; existere, veritissimum esse opinionem, probatur.

Luna ad instar muri à Sole illustratæ communicat.

Murus scabrosus luminarius, lumen universale sp. solo quaquaversum reflectit.

quotidiana contestatur experientia, si juxta murum à Sole illustratum speculum aliquod intuearis, mox animadvertes, murum asperum & scabrosum majus lumen (universalius puto, non fortius) in omnes partes ei oppositas reflectere, & quidem æquabile, amabile & tolerabile; quodque à quolibet ex quacunque statione æqualiter spectari poterit: Speculum verò è contra multò obscurius apparere, excepto in unico tantum certo loco, ad quem radii, mediante angulo incidentiæ & reflexionis, pertingunt: deprehendes quoque lumen, nunquam majus ipso speculo esse; atque à nemine alio, quàm ab illo, locum istum obtinenti, spectari. Adhæc lumen illud à speculo reflexum, est vehementissimum intolerabile, visumque offensus; quod cum Lunæ lumine nequaquam convenit: cum hoc, quemadmodum muri, universale, amabile & debile sit. Muri autem istius superficiem tam scabrosam, inæqualem & asperam, tale lumen universale producere vel reflectere valere, inde oritur; quòd, cum superficies illa undique aspera & inæqualis sit, eò ipso quoque composita sit ex innumerabilibus superficiebus minimis dispositis, secundum innumerabilem diversitatem inclinationum (quemadmodum ingeniosè loquitur Galilæus in suo Systemate) in quibus necessariò evenit, ut earum multæ dispositæ sint, ad emittendos ex se radios reflexos in hunc locum, multæ aliæ in alium: & in summa nullus locus sit, ad quem non pertingant plurimi radii reflexi à plurimis superficieculis per omnem corporis scabri, radiis luminosis repercussi superficiem dispersis. Vnde lege quâdam certâ sequitur, quòd ad quamcunq; partem cujuscunq; superficiem, quæ radios incidentes primarios recipienti opponitur, perveniant radii reflexi, & per consequens etiam illuminatio. Fit etiam inde, quòd

Luna superficies cum maxime tuberosa atq; lacunosâ sit, adcirco se omnibus æqualiter luminisam quovis tempore & loco, exhibet

ipsum corpus, in quod incidunt illuminantes radii, ex quocunque loco visum, totum illuminatum & clarum appareat: & proinde Luna ut asperam, nec tersam, habens superficiem, lucem Solis quaquaversum diffundat, omnibusque spectatoribus suis æqualiter se se lucidam exhibeat, necesse est. Quod si verò superficies Lunæ esset perfectæ sphericitatis, & figura ejus summè tornatilis, ut ait Aristoteles, instar speculi levigata, prorsus invi-

sus invisibilis maneret, uti superius jam dictum. Ex his itaque & aliis rationibus, perspicuum fit, Lunæ, superficiem haudquamquam esse lævem politamve, sed omninò asperam atque scabrosam. Idemque ex Opticâ Francisci Aguilonii lib. 3. prop. 20. (licet quidem ille cum opinione nostrâ nihil commune habere voluerit) probari potest; ac præsertim ex illis, ubi docet, quomodo corpus læve & asperum dignosci queat: *Si nulla inquit accidat luminis aut specierum repercussio, quocumq; tandem situ res oculis obvertatur, asperam eam esse aspectus iudicabit. Si enim lævis esset ac perpolita, lumen abs se formasq; rerum ad intuentis oculos aliquâ saltē oppositione remitteret.*

*Quomodo
corpus aspe-
rum a lævi
dignosci que-
at.*

Et quamvis hæc ignorentur omnia; insuper tamen ex spheris & globis illis deauratis, quæ plerumq; in turribus vel ædificiorum & Templorum summitatibus conspiciuntur, id quod volumus, haud difficulter probatum ac planè demonstratum dari poterit: quò enim illi magis sunt polita ac tersi, eò minus de illis à Sole illustratis spectatur; quò autem asperiores, licet sint longè minores, eò melius videntur, universaliusque lumen, cæteris politioribus, de se spargunt. Idemque omninò ex comparatione, omnium politarum spherarum (sive constent ex metallo, vitro, marmore, vel aliâ haud abfimili materiâ) & alicujus spheræ asperæ concavitatibus, & tumoribus plenæ; si simul Soli, vel alio lumini, in unâ eademq; distantia exponantur, magis magisque corroboratur.

*Corpor. spha-
rica, quo a-
spiciora, eò
lumen uni-
versalium de
se spargunt*

Cum itaque ex his dictis, satis abundè demum constet, Lunæ superficiem esse inæqualem & asperam; superest, ut quoq; demonstrarem; asperitatem hanc, nil nisi quàm revera Montes, Valles, Lacus, Maria, Sinus, Promontoria, Continentes & tale quid esse: in oceanis autem illis Lunaribus, partim Insulas præruptis Montibus circumcinctas, partim etiam Insulas à Montibus undique liberatas, existere: præterea hinc inde Rupes præcellas, Paludes, Stagna animadverti, & alia per multa, quæ nostris rebus Terrenis haud certè inconvenienter non nequeunt comparari.

*Partes Lunæ
tuberosæ &
lacunæ Nō-
tes & Valles
sunt.*

Quo quidem nomine nos multò feliciores, qui in hoc reservati sumus seculum, reliquis omnibus nostris esse antecessoribus haud immeritò æstimamus: cum nobis Fortuna, vel potius

*Quod magis
viximus nostrum
simus felicio-
res.*

DEVS ter Opt. Maximus, pro sua clementia & divina voluntate, longè omninò compendiosorem certiorèq; philosophandi viam, præsertim in rebus Astronomicis, corporaq; cœlestia concernentibus, aperuerit & patefecerit. Quippe quibus non solum per rationes, sed & ipsos sensus, inprimis illorum Nobilissimum oculum, non quidem nudum, sed armatum philosophari & quasi rem acu tangere datum; armatum inquam omnium verbis & laudibus non satis extollendo Telescopio; cujus videlicet beneficio tricies vel quadragies propius quàm hæctenus Antecessores nostri, Cœlo admovemur; ita ut non tantum oculi nostri toties acutiores reddantur, sed & corpora illa ætherea tam longissimè distita, multò majora nobis repræsententur. Quo pacto tandem, & multa admirabilia olim incognita in corporibus illis cœlestibus, deprehendere potuimus, quæ superiori ævo nulli in mentem venire potuerunt, quorum jam partim mentio facta est. Inter reliqua autem quæ non ita pridem animadvertimus memorabilia, non infirmum sanè obtinet locum (ut reliqua permulta scitu dignissima taceam, quæ non solum Astronomiæ Geographiæque, sed & rei Nauticæ, maximum afferre possunt emolumentum, id quod suo loco plenius ut dicatur, meminimus) quòd nunc primum rectè à nobis sit observata ac penitus explorata corporis Lunæ & Macularum ejus, partim nudo oculo partim armato aspectabilem, constitutio. De quâ materiâ antiqui illi & Philosophi & Astronomi cum non nisi cogitationibus & speculationibus suis ducti fuerint, tantas inter se sevère lites rixasque ut ex iis non emergere potuerint, nedum aliquid certi statuere. Id quia supra relatum, nolumus jam istud iterum explicando actum agere.

*Adminiculo
Telescopii
tricies vel qua-
dragies jam
cælo propius
admovemur.*

*Ante Tubo-
scopicorum
inventionem,
nulli unquàm
Maculas Lu-
nares rectè
cognovist.*

*Quibus rebus
terrenis, lu-
cidis & ob-
scuris partes
Lunares, cõ-
venienter cõ-
parari pos-
sunt.*

Postquam verò, paucos ante elapsos annos oculis nostris Telescopio prospectum, haud magno certè labore deprehendimus partes illas Lunæ clariores, terræ, minoresque Maculas, Montibus Vallibusque; majores autem faciem quandam referentes, nullis rebus convenientius, quàm nostris Terrenis Maribus, Oceanis, Lacubus &c. comparari posse: de quibus ut hac occasione breviter in genere; ita postmodum fusiùs & in specie agere cum DEO proposui.

Qui ve-

Qui verò cum non paucis aliis idem sentientibus, talia statuere & decernere impulsus simus, ordine referendum erit; hanc præsertim ob causam, ut simul pateat, nos, hanc sententiam non ex animo quodam res novas moliendi propenso, sed vi rationum prægnantium & urgentium, arripere fuisse coactos: *Nam rationi consonum, ac necessarium est (inquit Marius Bettinus in Apiar. 8. Progymn. 6. prop. 1.) ut Astronomi ritè Philosophantes nihil asserant, præsertim novi, in cælestibus Corporibus comperiri, nisi ratio aliqua, præsertim ex phænomenis petita, cogat eos nova illa entia in sublimi asseverare.*

Nihil novi in celo statuendum nisi certa phænomena id cogant.

Quibus rationibus coacti fuimus novitates quædam in celo asseverare?

Confinium Luna lucis & umbrosæ partium, admodum esse anfractuosum atq; asperum.

Puncta clariora in parte Luna obscura sparsim emicant.

Cur superficies Luna non profusè sit lucida?

Areola lucidiores extra confinium conspicuæ, sunt juga montium sublimiorum

Primò igitur probè ac distinctè, beneficio laudati perspicillividentes & observantes; luminis & umbræ, tam in crescente quàm decresciente Lunâ, sectiones anfractuosas, denticulatas & asperas; deinde extra illud confinium in parte obscurâ & minimè illuminatâ, sparsim varias, partim exiguas, partim satis magnas formâ diversissimas claras areolas, non parùm à confinio illuminatæ & umbrosæ partis distantes, esse conspicuas: alias itidem dari, illuminatæ parti adhærentes areolas, paulatim formam figuramque cum lumine crescente mutantem ac variantes, donec parti illustratæ omni ex parte annectuntur, & cum oris vicinioribus lumine prorsus imbuntur: mox quamplurimas iterum novas in illâ tenebrosâ parte orientes, & in locum antecedentium succedentes: contrarium autem accidere in phasibus Lunæ decrescendentibus, ubi areolæ quæ nunc confinium, & parti illustratæ adhærent, paulatim avelluntur, diutiùsque luminosæ conspiciuntur, quemadmodum citiùs præ reliquis locis depressioribus circumjacentibus, Lunâ crescente, illuminantur; omnibus Iconismis Lunaribus id attestantibus. Nihil ergo aliud, ex hoc Phænomeno, quàm Lunam valde asperam, præruptorum, Montium Valliumque profundissimarum undique esse referendam, concludere potuimus. Etenim, si corpus Lunare læve & perfectissimæ rotunditatis figuræ esset; sectio certè illa, lucidæ & obscuræ partis, non nisi etiam exquisitè plana, lævigata & absque omni asperitate cerneretur; quod ex globo planè rotundo & polito fit manifestum. Puncta illa clariora extra lucis confinium emicantia quod attinet, nil nisi cuspides & vertices sunt

ces sunt præaltorum Montium; quæ cum altiora sunt, quam reliqua loca humiliora vicina; propterea & citius à Sole illuminari possunt: quòd aliàs fieri impossibile foret, si nulli Montes ac Valles, partesque protuberantes in Lunâ existerent, sed omnes partes simul illustrarentur; extra autem sectionem illuminationis nullæ prorsus areolæ unquam spectarentur. Hoc equidem accidere circa Montes nostros elevatiores, Turres & ædificiorum summitates, quotidie, Sole oriente, videre est. Fit enim priusquam oritur, ut illi Montes & Turres, quò magis in altum porrigantur, eò citius à Solis luce perfundantur: dum sensim autem Sol ascendit, loca etiam illa adjacentia depressiora, pro suâ altitudine, paulatim magis magisque illuminat: & denique cum altius supra horizontem elevatur, continentes & omnes reliquas partes humiliores, exceptis Vallibus, undique montibus circummunitis. Valles enim, tametsi Sol horizontem stringat, nullo omnino lumine fruuntur, quia Montes quibus circumseptæ, aditum radiis Solaribus præcludunt, ita ut maxima in illis Vallibus gignatur umbra; quæ tantò obscurior, quantò Colles & Montes altiùs assurgunt. At Sole altiore plus luminis hauriunt; & primùm quidem Montes Vallium Soli oppositi, deinceps loca Montium decliviora & Campi his adjacentes illuminantur. Quò autem magis Sol attollitur, eò Vallium umbra plus plusque se comprimit, breviorque evadit; planities verò magis illustratur, clariorque redditur: usque dum Sol punctum attingit verticale; quo tempore totam illustrat Vallem, umbrâ penitus evanescente, & prædictæ Valles æque claræ ac Montium vertices existunt, imò multò illis lucidiores, ob radiorum Solarium variam reflexionem, obtutui se se obijciunt. Verùm secus iterum se habet, Sole ad occasum vergente; Valles namque paulatim (si Montibus undique sint circumvallatæ) à Montium umbris obscurantur. Vbi notandum, quod hæc obscuratio, jam non fiat à parte sinistrâ, sed dextrâ, planè oppositâ: cum enim Sol plagam mutat cœli, & umbram variari necesse est. Postmodum, quò magis Sol descendit, eò umbræ, longiores Vallesque obscuriores existunt; & cum tandem planè occidit, nil nisi altiorum Montium & turrium vertices lumine Solari irradiantur.

Hæc

*Sol oriens,
primquam
loca declivi-
ora, altiores
Montes &
Turres illu-
strat.*

*Quâ ratione
Vallies illumi-
nantur?*

*Valles cum
Sol illu ver-
ticalis existit
eâ, claræ ac
Montium
vertices illu-
strantur.*

Hæc autem ideò tam fusè & distinctè explicare volui, ut eò faciliùs impostherum, inter Montes ac Valles Lunares, hasq̄ue partes nostras terrenas comparationem instituere possim; naturam quoq̄ue omnium & essentiam ac qualitatem eò clariùs & explicatiùs omnibus Selenographiæ studiosis propositurus & traditurus. Sed ad observationes ipsas iterum redeamus, ac recenseamus, quid insuper in Lunâ sit animadversum. Inter alia, diversæ magnitudinis, minores Maculæ nigricantiores, circulis lucidissimis circumdatæ, in phasibus tam Lunæ crescentis, quàm decrescens, sunt observatæ; quæ quoad calorem rarissimè sibi similes, non solùm prope, vel in ipso confinio, verùm etiam in totâ illâ parte Lunæ illuminatâ (hîc Maculas illas magnas, nudis oculis aspectabiles, de quibus impostherum, non intelligo) quemadmodum perspicuè ex omnibus phasium Iconisim deprehenditur. Has Maculas verò, non nisi Valles esse præruptis excelsioribus densissimisq̄ue Montibus undiq̄ue vestitas, ex sequentibus colligere licuit rationibus.

Macula Lunares circuli lucidissimi circumdatæ colorat.

Hi circuli lucidi, montium sunt vestites.

Quibus apparentiis & rationibus firmus persuasi, Montes & Valles in Lunâ extant.

Primò; cùm Valles (ut illas ita appellare liceat, etsi nondum id sit demonstratum) in ipsâ Sectione lucis & umbræ existentes, vel circa illam, semper obscurissimæ ac umbris plenissimæ fuerint deprehensæ; quod ad oculum demonstrat præsertim phasis 11. 12. 14. 26. 27. 28. 30. 31. idemq̄ue & aliæ ostendunt.

Secundò; quia Valles, quò longiùs tempore Lunæ crescentis à confinio recedunt, eò majori lumine perfunduntur, more Vallium Terrenarum: ita ut umbra quotidie decrescat brevior, arctior, rariorque existat; pro majore distantia Lunæ à Sole, vel situ Solis elevatori. Punctum verticale autem cùm attingit Luna, tempore scilicet plenilunii, prorsus hæc modò dictæ Valles illuminantur, & cùm fuerint nigrae obscurissimæq̄; clarissimæ evadunt.

Tertiò; cùm mox post oppositionem, Luna quando decrescere, Sol verò à circulo verticali recedere, horizontemq̄; versus occiduum declinare incipit, umbra in omnibus istis Vallibus & cavernis more & ordine consueto denuo oriatur; nisi quòd umbra locum mutet in latusq̄ue alterum se conferat.

S

Et hæc

Et hæc quidem rationes sunt præcipuæ, quæ nos ad statuendum partes in Lunâ protuberantes, Montes Vallesque commoverunt. Primò (quemadmodum auditum) linea illa Sectionis luminosæ partis serrata, tortuosa & anfractuosa; 2. Areolæ lucidissimæ extra confinium vel Lunæ horizontem constitutæ; 3. Modus illuminandi hos Montes & Valles; 4. deniq; Natura umbræ.

*Probat ex
Opticu, hæc
rationes, cer-
ta indubita-
taq; esse ar-
gumta cor-
poru scabroſi
à l. vi inter-
noſcendi.*

Vt autem pariter certus sis, has rationes non minùs in Opticis, quàm naturâ esse fundatas; adhæc infallibilia quædam indicia atque argumenta nobis subministrata, ad rectè riteque corpus asperum & inæquale, Montibus & Vallibus cumulatum, cognoscenda adducam. Nam non fore ingratum spero, si hoc certis ex fundamentis Opticis pleniùs demonstrem. Duæ autem priores nostræ rationes ex Aguilonii Opt. lib. 3. prop. 20. pag. 170. stabiliri possunt testimonio, quia inquit: *Inſignis aſperitas cognosci poterit ex lumine, quo partes extantes perſunduntur: hæc namq; si ſole colluſtrata reſplendeant, profunditates autem obſcuræ appareant, haud dubium erit ſenſibilis aſperitatis argumentum.* Tertia ratio itidem ex A-

*Eminentia
ex umbru
cognoſcuntur*

guil. lib. 3. prop. 19. pag. 170. corroboratur: *Extantes, ait, gibbi in cavas depressiones umbras projiciunt: ex his ergo colligit viſus profundas esse partes illas, quæ asperæ sunt; illas elatiores, quæ à lumine, quo perſunduntur, splendorem ad oculos remittunt. Iuvat ad hæc ipſam cogitationem corporis ſitus, ſi nimirum obliquè lumini obſiciatur: ſic enim profundæ partes uberius umbras excipiunt &c.* Vt fieri ſcilicet solet quando concavitates in lineâ, vel circa illam Sectionis luminis & umbræ cernuntur.

Quarta ratio, umbram & ejus naturam concernens, ex diverſis ſequentibus Theorematis Opticis indubitato confirmatur. 1. Cavitates & Valles umbræ adminiculo perfectiſſimè cognosci poſſe; teſtatur Merſennus in Opt. Theor. 8. pag. 494. *Corporum eminentias & profunditates ex umbris præſertim aſpectus diſcernit.*

*Umbræ cadit
in adverſam
luminu par-
tem.*

2. *Corpus opacum in adverſam luminis partem umbram projicit.* Aguil. lib. 5. prop. 60. pag. 424. & Rhodius lib. 1. cap. 3. prop. 25. 3. *Umbræ ſuo opaco modo eſt æqualis, modo brevior, modo longior, pro diverſâ luminofi altitudine.* Rhod. lib. 1. cap. 3. prop. 33. & lib. 1. cap. 3. prop. 31.

*Pro corpore
opaco & lu-
minofi ſitu,
variatur um-
bræ.*

4. *Umbræ figuram & motum opaci imitatur, quanquam ad ſolius luminofi motum moveri poſſit: quod ſi circa opacum moveatur, umbræ contrariis motibus ciebitur, idq; pari velocitate.* Merſen. Theor. 23. pag. 484.

Hæc ſi igitur, ut & illa omnia, quæ pro confirmatione
Montium

Montium & Vallium Lunarium à me superiùs sunt prolata, probè ponderentur, rectâque rationis normâ examinentur, ac cum hisce Theorematis Opticis conferantur, præsertim ab illo, qui Opticarum rerum non planè fuerit rudis; facile iudicabitur, plana ac verissima, certisque infallibilibus argumentis cuncta esse demonstrata. Quod si autem cuipiam talia captu & intellectu sint difficilia, illum ad sequentia, cum pluribus hac de re dicitur, ablego.

Interea tamen unus & alter Philosophorum reperitur, ut taceam reliquos, eximius nempe Franciscus Aguilonius & inprimis Doctissimus P. Marius Bettinus vehemens Peripateticus, qui hanc sententiam minimè amplectuntur. Atque apud Bettinum in Apiario 8. Pro. 6. prop. 1. 2. & 3. diversas legere est rationes, ob quas existimat, quæ diximus ita se se habere non posse; eaque fateor primâ fronte magnam præ se ferre speciem veritatis, ita ut non dubitem, quin cuipiam fortassis harum rerum non penitus gnaro, satis negotii faceffant. Quare ordine illas perpendamus probeque examinemus, ut veritas eò magis elucescat: idque inprimis in gratiam Peripateticorum, qui plerumque, adversus luculentas veritatis demonstrationes, nihil secius se se muniunt, ambrosos à Aristotelis autoritate, in quâ eam sibi statuunt scientiæ suæ securitatem, ut etiam in ejus fide universam oppignorent naturam; dicente Iohanne Fabricio in observatione de Macul. Solar.

*F. Aguilonius
& M. Bettinus, Montes
& Valles in
Lunâ mini-
mè concedūt.*

*Peripatetici
plerumque, au-
thoritatem
Aristotelis
demonstratio-
nibus apodi-
cticè præfe-
runt.*

*Bettini argu-
menta exa-
minantur.*

Concedit quidem modò nominatus Bettinus, utpote Opticus, sicuti ex magno illius opere patet, exercitatissimus, idemque se ipsum observasse ait, quòd tempore Quadraturæ, confinium lucis & umbræ, sit admodum flexuosum, asperum & denticulatum, ut lucidissimas extra Sectionem areolas, in parte Lunæ obscurâ, hinc inde conspicuas exhibeat, instar multarum Insularum in vasto tenebrarum Oceano extantium; tum paulatim magis ac magis lumine perfundi, donec ex Insulis quasi Peninsulæ evadant, & continenti luce, reliquo nimirum corpori illuminato majori adjiciantur: mox autem addit, non esse necessarium, ex hoc phœnomeno confestim Montes & Valles statuere; quandoquidem etiam his remotis ea omnia fieri possunt atque accidere ad nostrum aspectum per Tubum Opticum si

*Per partes
variores &
densiores Bet-
tinus ex Lunâ
Montes &
Valles remo-
vere conatur.*

cum si affirmes Lunam prorsus esse levigatam ac rotundam; dummodo partes rariores, diaphanæ & densiores in eâ supponantur. Verba autem autoris hæc sunt: *Ac proinde, dum Solaribus radiis globus Lunaris afflatur, partes densiores (quarum summitates ultimum attingunt ambitum spheræ Lunaris, atq̃ inter quas aliqua rariores ac diaphane interpositæ sunt) quia terminant suâ densitate lumen, quod non terminant rariores, ideo licet situ posteriores, illuminatione tamen priores atq̃ anteriores apparent: hæc ille.*

*Autoris re-
sponso.*

Ad hæc respondeo: me haud satis mirari posse, postquam ope Tubospicilli probè viderat Bettinus confinium lucis esse anfractuosum, ut & quàm plurima puncta luminosa extra illud, in parte scilicet Lunæ, quæ phœbeo lumine nondum erat imbuta, emicare, quòd non simul etiam conspexerit, diversas illas nigricantiores Maculas, concavitates nimirum & cavernas, in parte illuminatâ extantes: Tubus enim, qui phœnomena priora detexerat, & hoc ultimum ostendisse præsumitur; sed fortassis deditâ operâ illas contemplari noluit. Etenim, si per temporis aliquod intervallum continuò ab illo observatæ fuissent, haud ambigo, quin illicò ancipitè illum reddidissent: quippe animadvertisset, quomodo prope confinium Maculæ istæ penitus obscuræ, hoc est, umbrarum plenæ se se detegerent; paulò post, quâ ratione, umbra, Lunâ crescente, in parte dextrâ Solem versus, singulis diebus, imò horis paulatim decreceret, brevior tenuiorque evaderet, pro majori Lunæ à Sole remotione, contra quomodo Valles indies lucidiores fierent, adeò, ut, circa plenilunium, maximo lumine gauderent, illæ, quæ antea obscurissimæ ac nullius prorsus luminis participes fuissent: post oppositionem verò, quomodo umbra se denuo à parte sinistrâ, respectu nostri, in istas concavitates ingereret, ac in singulos dies magis magisque loca illa accrescendo, & se se extendendo obscuriora fierent, usque dum omni ex parte iterum cavernæ circa ipsum confinium obscurentur; nisi quòd circulus quidam lucidus circumcirca remaneat, juga nempe illustrata, altissimorum Montium Vallem constituentium.

Perquàm autem scire etiam gestio, quid Peripateticorum quisunque longè doctissimus ad hæc responderet, & quâ viâ harum Macularum & concavitarum vicissitudines, à lumine & umbrâ

umbrâ orientes, cum suis partibus rarioribus & densioribus comparare vellet; etiam si omnia illa, quæ Marius Bettinus objicit, concederentur, quamvis aliter rem se se habere abundè jam à me superius sit demonstratum.

Nam; describas mihi quæso, pro tuâ opinione ac lubitu, quid partes sint rariores & densiores? procul omni dubio cum P. Bettino inquires: rariores esse, quæ suâ raritate lumen non terminant; quâ efficiunt, ut quidam radii reflectantur, quidam refringantur, ita ut necessariò tam lucidæ & claræ haud conspici possint: densiores verò esse, quæ suâ densitate lumen terminant; quâ ratione radii solummodo reflectuntur: & idcirco albicantiores illuminatioresque etiam videntur, prout ex Opticis accuratè demonstrari poterit. Id quod & ego libenter do; & ipsemet totus sum in hac opinione, aliter esse non posse. Necessariò itaque sequitur; partes rariores non posse claras lucidasve, & densiores minimè obscuras nigricantioresque apparere: tum, quicquid semel obscurum caliginosum videtur, nunquam clarum & lucidum videbitur. Quæ cum ita sint, quæro insuper, tanquam aliquis de trivio, unde accidat, quòd illa nigrities vel obscuritas Macularum, quæ intra terminum lucis cernitur, indies, imò in horam varietur, & quidem ratione Lunæ & Solis distantia, vel potiùs Solis altitudinis, respectu Lunæ? præterea, quò vicinior fuerit Luna oppositioni, quare Maculæ eò clariores & lucidiores, imò circiter luminarium oppositionem (quemadmodum id quidem omnes mei Iconismi Lunares ad unum demonstrant: cui hæc autem nondum sufficiunt, examen ipsemet Tubo quodam præclaro tentet, & nullus dubito quin omnia ita se se habere, animadvertet) penitus omni lumine imbutæ spectentur? post oppositionem verò, cur paulatim iterum nigriores & obscuriores evadunt? Si sunt semel partes rariores, quando in viciniâ Sectionis luminis & umbræ sunt constitutæ; quomodo igitur alterâ vice, circa plenilunium, partes densiores erunt? cum penitus lucidissimæ appareant, teste oculari experientiâ. Annon hæc sint contradictoria, quæ totâ diametro inter se pugnent, æquo Lectoris judicio committo? Imò certè hac de re aliquis non judicare potest aliter, quàm quòd impos-

Quid partes rariores & densiores sunt

Partes densiores & rariores non variant luminis aspectum.

Cum certa Macula maxime lucida, maxime obscura appareant, idcirco non possunt esse partes rariores vel densiores.

*Si quis omnia
phænomena
lunæ per par-
tes rarioras
& densiores
explicare po-
terit, Autor
promittit se
Scilicet Peripa-
tetica addi-
tum fore.*

fibilia hîc statuantur, quæ nullo modo existere possunt. Insuper verò, si quisquam prodibit, qui hoc phænomenon cum partibus rarioribus & densioribus conciliare poterit, ita ut observationibus nostris, in quibuscunq̄ue planè respondeant; profectò me ad Peripateticorum castra transiturum palàm hîc edico. Et tantum respondere volui ad primam P. Mar. Bertini instantiam.

*Ad alteram
instantiam
Bertini respo-
detur.*

Alteram quod attinet, dum inquit : *Cum nulla sint phænomena in Lunæ peripheriâ, vel vestigia partium extra alias extantium, vel densiorum ac rariorum contiguarû sive continuarum; idèò negamus in eâ partes dissimulares, & per consequens etiam Montes in facie Lunæ.* In Apiar. 8. Progym. 6. prop. 2. Quibus verbis breviter voluit indicare, non solum nullas esse in peripheriâ eminentias, sed & per indirectum negare, omnes Montes, Valles concavitatesq̄ue in reliquâ parte Lunæ : nam, si ullo modo (pergit) concedi debeant in ipsâ peripheriâ, necesse est, ut propè Plenilunium vel mox futurum vel ante factum, appareant : at (inquit) *in peripheriâ non spectantur, nec ob oppositoribus observata unquam ponuntur, ac multò minus ponendæ sunt, cum Luna est inter oculum & Solem; nam eas tunc spectari sive in facie, sive in peripheriâ Lunæ falsum est, atq̄ impossibile, ob prædicta.* Hæc autem si indubitatè & apertè essent vera, adeò nollem profectò adversus luculentam pugnare veritatem, ut potiùs victoriam ultrò concederem. Fateri quidem oportet ejusmodi areolas clariore, vel paulò ante, vel post plenilunium, adhuc à nemine extra confinium lucis & umbrosæ partis hactenus fuisse animadversas, nedum asperam & inæqualem ipsam peripheriam tum temporis unquam observatam, teste Galilæo de Galilæis in Nunc. Sider. pag. 20. Idcirco frustrà esse Montes & Valles in Lunâ ut statuantur, hæc dum leguntur, facilè quentiam cogitaturum existimo. Verumenimverò; festina lente, & suspende paululùm judicium tuum, Lector Benevole : certiora (ut ut inaudita) ex me accipies : me, nimirum tempore diversissimo, talia phænomena tam paulò ante, quàm post oppositionem, imò (quod majorem meretur admirationem) eâdem die Plenilunii, ut & in ipso Oppositionis articulo, sæpius observasse. Ne autem verbis id solummodo confirmare videar, nonnullas ex multis observationes in medium proferam.

*Ab Autore
multoties,
tempore Ple-
nilunii, in
ipsâ periphe-
riâ, eminen-
tias esse con-
spectas.*

1. In pha-

1. In phasi Lunæ Adultæ, Anno 1644. die 21. Januarii observatæ, quatuor notabiles areolæ clariores vel illuminatæ Montium vertices extra sectionem luminosæ partis, orientali peripheriæ adhærentes cernuntur; in medio scilicet tres, superius una, Supernam versus: præterea etiam totum confinium satis asperum & inæquale, nisi in illo unico tantum loco, ubi Maculam quandam magnam, Mare nimirum quoddam interfecat, conspicitur: quod fieri haud aliter potuit, veluti sub finem hujus capitis declarabitur.

Observationum probatur.

Observatio prima.

2. In phasi decimâ nonâ, Lunæ ad oppositionem vergentis, Anno 1644. die 22. Januar. primâ statim die, post verum Plenilunium, itidem peripheriâ occidua non parùm anfractuosa apparuit.

Observatio secunda.

3. In facie 22. Lunæ, Anno 1643. die 26. Novemb. depictæ, ut & in vigesimâ tertiâ Anno 1643. die 27. delineatæ non modò peripheria occidentalis dentata & tortuosa, verùm etiam quamplurima puncta lucida fuerunt annotata.

Observatio tertia.

Forfan autem regeas; talia quidem primâ vel alterâ ante vel post oppositionem, sed non eâdem die istius aspectus esse observata, & animadversa? At verò ut & huic objectioni occurram, propterea quarundam aliarum insignium observationum mentionem faciam, quales hætenus vix à quopiam (nec tamen arroganter hoc dictum velim) sunt habitæ: Faciem nempe Lunæ, etiam veræ Oppositionis tempore, interdum non profus levigatâ peripheriâ terminatam & penitus plenam vidi, sed latere quodam satis aspero existente; nonnunquam etiam puncta illuminata, clarissima, extra peripheriam aliquatenus distantia, dilucidè sunt conspecta: quæ asperitas non solum in limbo Occiduo vel Eoo, sed, certo tempore, etiam in limbo Australi vel Boreali fuit aspectabilis. Quod rogo benè noetur: nam attento hoc phænomeno multa incognita & intellectu difficilima impostertum intelligi & explicari posse; sicuti suo loco & tempore monstrabitur.

Autorem, asperitatem peripheriæ lunaris, tam in Australi quàm Boreali parte animadvertisse.

Tale exemplum notabile, se mihi obtulit, Anno 1644. die 23. Januarii, horâ septimâ vespertinâ, quartâ ante verum Plenilunium: quo tempore peripheria Lunæ propemodum rotunda

Observatio quarta.

data

data videbatur, nisi quòd in margine orientali duæ adhuc eminentiæ & areolæ essent conspicuæ. Horâ verò abhinc quartâ, tempore nimirum veræ oppositionis, horâ decimâ vespertinâ, limbus ad ortum vergens, iam prorsus æquabilis & lævigatus erat; rursus marginem Borealem iterum notabilis invaserat asperitas, cum tamen potius decrementum quoddam in latere occiduo conspici debuisset.

*Observatio
quinta.*

Simile præclarum exemplum à nobis observatum, Anno 1644. die 23. Martii, horâ septimâ vespertinâ, nonâ post rectum Luminarium aspectum; ad peripheriam scilicet Zephyrum respicientem, nihil quicquam adhuc decreverat, uti meritò debuisset; verum limbus Australis non mediocriter erat asper & inæqualis, quæ asperitas quintam ferè superficiem partem afficiebat: circa medium, extra peripheriam, quamvis ferè arcè coherent, duæ parvulæ lucidissimæ arcuatæ particulæ, ac si Montium essent vertices, conspiciebantur: quod jure profectò miramur, ejusmodi asperitatem sub ipso Plenilunio vel etiam paulò post, & quidem in alio planè latere, quàm debebat, cerni potuisse. Quæ peripheriæ inæqualitas adhuc horâ duodecimâ à meridie numeratâ, animadvertebatur; tamen paulatim decreveret, planiorq; evaderet; è contrario limbi asperitas Subfolanum respicientis, sensim crescebat. Ex quibus exemplis (alia ut taceam, quæ in commodiorem reservamus locum) satis superque videre est, non modò in ipsâ peripheriâ Lunæ, & extra illam, tam paulò ante, quàm post oppositionem, areolas quasdam clariores esse conspicuas, sed & eadem die, & quidem tempore veræ oppositionis non minùs ejusmodi phænomena apparere: quæ utiq; non sunt nisi vertices & cacumina cellorum Montium ibidem existentium.

*Argumento
Bettini in-
verso, contra
vrium proba-
tur.*

Postquam igitur P. Marius Bettinus in *Apiario suo* 8. *Progymn.* 6. *prop.* 2. *ultim.* in hunc ratiocinatur modum: cum in peripheriâ Lunæ circa Plenilunium nulla sanè asperitas & inæqualitas animadvertitur, nec à quopiam unquam observata ponitur; itaque in peripheriâ, nullo modo Montes & Valles, & per consequens nec in aliâ quâpiam Lunæ parte, concedimus: hoc argumentum inverto, & sic contra illum argumentor: cum sint phœ-

sint phœnomena in Lunæ peripheriâ, vel vestigia quamplurima partium extra alias extantium, à nobis multoties, tam paulò ante, vel post Plenilunium, quàm tempore veræ oppositionis, observata; concludendum esse partes extantes supra alias, hoc est, Montes Vallesque tam in ipsâ peripheriâ, quàm in totâ reliquâ superficie Lunari.

Tametsi verò, hoc unicum sufficeret argumentum ad demonstrandas res prædictas; attamen aliud adhuc afferam, quo indubitanter item probabitur, in peripheriâ Lunari equidem Montes & Valles extare, & simul à quolibet huic rei fidem denegante aspectabiles esse: id quod nobis motus librationis suggerit, certum enim est, quòd, prout manifestè idem à nobis etiam postea ostendetur, Luna non omni tempore unam eandemque faciem nobis conspiciendam exhibeat (licet permulti, tam Veterum, quàm Recentiorum Astronomorum contrarium senserint) sed quòd certo tempore ratione hujus librationis, non parùm circa suos axes moveatur; adeò ut interdum Favonium & Boream, interdum Ortum & Meridiem versùs pars haud exigua nobis detegatur (quemadmodum dilucidè ex tribus illis magnis Pleniluniorum Iconismis deprehenditur; qui jam memoratum hunc motum librationis disci, duobus diversis circulis sive limbis exprimunt; spatium inter utrumque circum Lunæ interjacens, est illud, quod constituto tempore de anticâ Lunæ parte spectatur) hinc fit, extremo in occidente circulo Lunæ peripheriam repræsentante, ut Palus Mœotis longissimè ab eâ distet; Limbo autem proximo Lunæ peripheriam describente, eadem Palus valde ei imminet: contrarium contingit cum Palude Maræotide in latere Lunæ opposito. Cùm itaque interstitium illud Paludem Mœotidem inter & peripheriam maximè extenditur, tunc Luna vix viginti quatuor horarum spatium tantum decrescit, usque dum linea sectionis luminis & umbræ, ad intimum promoveri possit circum. Cæterùm ex phasi vigesimâ secundâ constat, confinium istud, non solum admodum anfractuosum & asperum, sed & diversas areolas clariores extra illud spectari: ex quo necessariò sequitur, Montes

T

ibidem

Alio infallibili argumento, Montes in ipso Luna limbo extare, demonstratur.

Luna motui librationis cuiusdam est subjecta.

Pars Luna librationis duobus Pleniluniorum Iconismorum circulis comprehenditur.

ibidem & Valles existere. Hæc sectio, interdum in ipsam peripheriam redigitur, cum scilicet interstitium Mæotidis arctissimum apparet; sicuti ex Pleniluniis prædictis palam est, reque ipsa verissimum: quo tempore Peripheria minimè inæqualis & tortuosa, sed planissima & æquabilissima exhibetur: interea tamen nihilominus ex priore notum est, hanc ipsam peripheriam anfractuosam fuisse. Concluditur itaque Montes & Valles etiam in ipsa Peripheriâ extare. Quod similiter ex phasi primâ ac novissimâ indubitatè probare licet; in quâ terminus iste lucis & umbræ admodum tortuosus & inæqualis, insuper quoque puncta diversa clarissimè illuminata extra illum sunt conspicua: hoc tamen non obstante, nihilominus definito tempore hæc sectio in ipsam Peripheriam translata, planissima conspicitur; Lunâ nimirum in Capricorno constitutâ.

Ex certitudine Auttor denuo concludit, Montes in ipso termino Lunæ extremo extare.

Videbuntur autem fortè hæc quæ dicta sunt intellectu difficilia, ac cum primis ei, qui in Selenographicis parùm est versatus, cuique motus ille librationis adhuc incognitus; sed cui hæc lubet percipere, motum istum, de quo capite octavo plenius agatur, reddat sibi familiarem: sic nullus dubito, quin statim percipiat, argumentum hoc nostrum, quod modò protulimus ad demonstrandum, esse firmissimum, quòd Montes & Valles in visibili Lunæ Peripheriâ existant. Ut taceam hoc itidem demonstrari posse ex illis lucidissimis globulis, cornibus phasium corniculatarum adhærentibus; ut & ex omnium ferè phasium sectionum inferiore vel superiore parte, ubi frequenter vertices Montium permulti hemisphærii latentis se se produnt.

Cur Montes Lunares non ita distinctè in ipso limbo, quam circa alia conspiciantur?

Porro, quod attinet, tumores & cavitates in ipso Lunæ ambitu extremo, non æque distinctè & apertè esse conspicuas, quàm, cum sectio aliquantulum à limbo distat, inde evenit: quia corpus Lunare sat altis Montibus undiquaque est conspersum; ut apparet etiam terrâ nostrâ asperius, Tabulâ Selenographicâ id attestante; hinc faciliè colligitur, quòd per hos innumeros Montes, & scopulorum seriem, Planities, Valles & Lacunæ, non modò tectæ, sed & ipsi Montes, quasi continuâ serie esse concatenati videantur, ac si planities esset quædam longissimè patens: namque à latere nobis tantummodo conceditur Montium

tium Lunæ aspectus, propter corporis globositatem. Simile in terrâ accidere videmus: si enim spectator aliquis procul fuerit, & in pari altitudine constitutus, tunc multorum ac frequentium Montiū juga, secundum planam superficiem disposita apparent. *Sic æstuosi pelagi sublimes undarum vertices* (inquit Galilæus in Nunc. Sider. pag. 21.) *secundum idem planum videntur extensi, quamvis inter fluctus maxima voraginum, & lacunarum sit frequentia, adeoq; profundarum, ut sublimium navigiorum non modo carinæ, verum etiam puppes, mali, ac vela inter illas abscondantur.* Excipias autem adversus hæc: nihilo tamen minùs, vel minima quædam punctula clarè illustrata, accuratâ inspectione, nobis in conspectum veniunt. Hoc sine ullâ contradictione verissimum concedo. Annon suprà quoque demonstravimus, Lunæ Peripheriam etiam sub ipsius Plenilunii articulo, quodammodo fuisse, tumoribus atque lacunis conspersam; & quod pluris est, claras areolas, erectorum scilicet Montium vertices extra finitorem hemisphærii emicantes extitisse? Profectò hi Montes necesse ut reliquos omnes altitudine antecellant, quòd præ cæteris in tam longissimâ distantia affulgent.

Hactenus autem breviter, quantum fieri potuit, de Maculis Lunæ nigricantioribus variantibus dictum est, nimirum illas, nil nisi Montes & Valles esse in superficie Lunæ extantes, qui ibidem, ut firmiter credo, etiam permansuri, donec Terra hæc nostra, cum totâ Mundi machinâ, in nihilum erit resolvenda. Reliquum est, ut quoque dicamus, quid revera sint Maculæ illæ majores hactenus in Lunâ cognitæ, & nudo oculo semper aspectabiles, de quibus Majores nostri tantas seruerunt lites; & quibus rebus terrenis omnium convenientissimè comparentur?

Quemadmodum, adminiculo instrumenti dioptrici, infallibiliter cognovimus, illas Lunæ partes, tuberosas esse atque lacunosas, quæ scilicet, ratione coloris & umbræ, ex motu Solis, altitudine, & distantia ortæ, quotidie sunt inconstantissimæ; simili modo haud difficulter colligere potuimus, partes illas, Maculas nempe majores antiquiores, loca esse æquabilissimè complanata, ob has quidem sequentes rationes. Primò: quia hæ prædictæ magnæ Maculæ, nec colorem mutant, nedum um-

Vnde cognoscere licuit, Maculas majores hactenus cognitæ Lunares loca esse undiq; complanata.

Ratio prima.

*Ratio secun-
da.*

bram de se spargunt in horam variantem, aut certo tempore planè evanescentem, uti in partibus illis eminentioribus & asperis fuit manifestum. Secundo: quia omnium phasium sectiones luminis & umbræ, Maculas illas majores pertranseuntes, quovis tempore æquabilissimæ & planissimæ cernuntur; contrarium enim se se prodit, quando Sectio per tumores & cavitates protenditur, nullis unquam observationibus contradicentibus; inprimis autem talis apparentia in phasi 6. 8. 14. 15. & 28. clarè perspicitur: ex quibus necessariò sequitur, Maculas illas faciem quandam referentes, planities & loca prorsus undique esse complanata. Hoc maximum esse experimentum asperitatem & lævitatem cognoscendi, & ex terrenis colligitur; cumprimis, si ex loco quodam sat elevato horizontem visibilem aspicias, probeque consideres; tunc enim mox animadvertes, horizontem æquabili quodam tractu apparere, ubi planitiem quandam terminat: quod si autem horizon terram Montibus & Vallibus undique conspersam stringit, mox finitorem admodum asperum, sinuosum & inæqualem videbis, prout in sectionibus phasium lunaribus apparet. Rectè itaque concluditur; si confinium Lunæ fuerit asperum, partem illam montosam esse: si verò planum & æquabile, ibidem etiam superficiem dari æquabilem, quæ Maculas nobis efficit illas majores.

*Asperitas cō-
finii vel hori-
zontis coar-
guit locum
istum esse
Montosum:
aquabilitas
verò Sectio-
nis planitiem
indicat.*

*Luna asperi-
tas compara-
tur Terra.*

Quæritur autem porrò, quid tandem revera sit, hæc asperitas vel planities Lunæ, hoc est, ex quânam materiâ constet, & cui materiæ rectissimè comparari possit? Respondeo: partem Lunæ tuberosam & inæqualem aliàs clariorem, nullis aliis rebus terrenis nobis cognitis convenientius, quàm terræ ipsi & continenti accommodari posse; recipit enim ferè omnes in se qualitates terrenas. Non est autem, quòd quispiam ideo existimet, Lunam ex ejusmodi sabulo, luto, lapide esse compositam, uti hæc Terra nostra; siquidem fortassis planè ex aliâ poterit constare materiâ, ab imaginatione nostrâ prorsus diversâ & modò adhuc incomprehensibili. Hoc unicum audacter affirmo; partes has protuberantes & asperas splendidiores, nulli rei melius, hîc in Terrâ, quàm continenti comparari posse: quamobrem & impostertum hanc partem terram nominabimus,

Loca

*Luna fortitan
plane est di-
versa, à Ter-
ra materiâ.*

Loca Lunæ decliviora plana quod spectat, Maculas illas magnas, quæ perpetuò obscuriores locis Montanis se se nobis offerunt, non minùs congruenter, nostris Oceanis, Maribus, Lacubus, Stagnis & Paludibus æquiparantur (quæ etiam suos anfractus, Sinus & Promontoria habent) quandoquidem æque constantes ratione coloris, & omnis umbræ penitus expertes apparent. Veruntamen hîc non est iterum mens mea, ac si absque omni contradicitione, ejusmodi Lunares, essent aquæ nostris similes; sed, quòd nihil quicquam similius, propter magnam utrarumque affinitatem, hîc in terrâ habeamus, cum quo, illas Lunares conferre possimus. Nam penitus etiam mihi persuadeo, Creatorem Cœli & Terræ, per suam divinam omnipotentiam & infinitam sapientiam, quodlibet corpus cœlestè (quorum certè multa sunt millia) ex diversissimâ materiâ, nullatenus sibi simili, licet omnia sint corpora opaca, creare potuisse.

Luna partes obscuriores plane, nostris Maribus & lacubus comparantur.

Attamen aliud quiddam adhuc datur, cum quo hæ magnæ æquabiles Maculæ, nec minùs convenienter comparari possunt; exempli gratiâ, cum nostris vastissimis quibusdam Sylvis planis & Paludibus. Hæ enim si ex Lunâ inspicerentur, æquè multò obscuriores continente & terrâ firmâ apparerent: similiterque omnes sectiones lucis & tenebrarum, per illas Maculas transeuntes, planissimæ & æquabilissimæ viderentur; quippe, cum ex rariori constent superficie, radios non ita commodè reflectunt: nam arborum rami & folia reflexionem impediunt, radiosque quàmplurimos hinc inde dispergunt. Sed de his fatis.

Macula illa majores, & cum nostris Sylvis in planitie sitis comparari possunt.

Rogites autem; cum magnæ illæ prædictæ Maculæ Maria, aquæ & Paludes &c. esse debeant, cur sectiones luminis & umbræ illas interfecantes non perpetuò etiam æquabili quodam tractu appareant, sed nonnunquam diversæ magnitudinis areolæ clariore, tam in confinio ipso lucis, quàm extra conspiciantur? quam etiam ob causam lineæ istæ sectionum interdum aliquatenus flexuosæ spectentur: interdum etiam sparsim in magnis illis Oceanis, loca fatis magna clarè illustrata, rato tempore & umbrosa existentia se se detegant, experienciâ videlicet

Cur Marium Sectiones aliquando anfractuosa appareant?

*In Oceanis
Lunaribus
non aliter ac
in Terrenis,
extant Insulae
& Rupes.*

*Turres &
Montium ver-
tices Navi-
gantibus se
se primum
detegunt.*

*Reflexio lu-
minis à Mari
debilior, quàm
à terrâ.*

*Quò superfi-
cies magis est
lævigata, eò
reflexio est
debilior.*

teste? Respondeo: Oceanos illos Lunares cum his terrenis hac in parte nihil differre; in quibus æque atque in his, innumeræ celsissimæ rupes, nec minus Insulæ diversæ magnitudinis, partim planæ, partim etiam circumcirca Montibus præruptis circumdatæ apparent: hi enim quando in ipsâ sectione emicant, dilucidè à nobis animadvertuntur, inprimis magnæ illæ Insulæ Montibus undique turgentes & circumcinctæ, tum temporis, umbrarum plenæ & obscurissimæ, adinstar reliquarum Vallium in Lunâ existentium, cernuntur. Fit igitur sæpissimè, ut vertices & juga Montium clarè illuminata, in parte illâ tenebricosâ, extra sectionem satis longè distantia, pro illorum altitudine, spectentur. Tale quidpiam videre licet nobis navigantibus. Quamdiu nil nisi Mare videmus, horizon (hoc est, confinium lucis in Lunâ) æquabilis conspicitur: quamprimum autem Insula quæpiam se se detegit, confestim Montes sublimiores, vel turres altiores, postea reliqua loca decliviora animadvertuntur. Quando autem adhuc vertices Montium & vestigia turrium solummodo apparent, eandem referunt speciem, quam nostræ areolæ illuminatæ in parte illâ obscurâ emicantes.

Denique omninò etiam memorare debemus; quare Maculæ illæ magnæ, aquarum speciem referentes, non æque claræ luminosæque, atque pars reliqua Lunæ, nimirum continens Montosa & lacunosa, Insulæ, Rupes, Scopuli &c. se se visui objiciant? cum tamen, primò, aqua à naturâ lucidior sit & albicantior; secundò, minùs quoque de colore nigro participet, ut loquitur Aristoteles: cui sententiæ & Kepplerus fuit addictus, sicuti ex Astron. suâ Optic. pag. 251. patet. Hæc quæstio autem maximâ ex parte, illis rationibus, superiùs jam allatis, de speculorum reflexione & superficie asperâ Lunari, explicari poterit. Specula nempe, cum superficie lævigatâ & perpolitâ prorsus consent, idcirco & reflexionem luminis necessariò ab iis existere debiliorem illâ, quæ à muro aspero vel terrâ Montosâ projicitur certum est; non loquimur verò hic de reflexione particulari, quæ sub certo inclinationis angulo, certo spectatori objicitur, sed de lumine universali, uti in prædictis monui-

mus.

mus. Haud fecus itaque comparatum est cum illis Maribus & Aquis; cum enim superficies illarum prorsus etiam sit lævigata & æquabilis, & hac ratione, speculo polito haud absimilis; propterea radii reflexi non nisi etiam ad certum determinatum locum feruntur, quem si obtineremus, reflexio admodum vehemens & fortis videretur, in omni autem alio loco multò debilior, quàm quæ à Terrâ spargeretur. Vt autem penitus rem intelligas, oportet, consideres, superficiem aquæ in Lunâ (rectè loquendo) speculum repræsentare convexum; Luna namque globosa existit: quoniam paucissimi illi radii reflexi, sub certo inclinationis angulo in terram pertingentes, tam ratione pauciorum radiorum, quàm immentæ distantia planè evanescent, quemadmodum satis abundè in prioribus fuit demonstratum. Luminis itaque primarii quod à Lunaribus aquis spargitur, nobis Terræ habitatoribus non conceditur aspectus; sed duntaxat luminis secundarii: propterea verò necesse est, ut multò obscurior aqua, quàm terra illa, appareat. Hæc non aliter se se habere, quilibet in plateis ambulans, præsertim, cum pluviae hinc inde cavernulas & foveas aquis repleverint, animadvertet; quæ, cum à Sole, sub certo incidentiæ angulo, illuminantur, & unâ nobis sub eodem reflexionis angulo radii isti objiciuntur, mox fit manifestum, quòd in illo determinato loco reflexio radiorum potentissima sit, simulque effigiem tunc nobis Solis repræsentet, fortioremque esse, quàm terræ sicca, cujus superficies adeò scabra & opaca est: quamprimum autem ex alio quodam loco id contemplamur, planè hæc apparentia variabitur, ita, ut pars illa sicca, paululum elevatior in plateis, fortius, vividius magisque amabile, sibi ubique simile lumen de se sparget, quàm loca illa aquosa, quæ multò erunt obscuriora: præterea lumen illud erit universalius & constantius, quocumque ex loco id aspicias, eò quòd scabra & aspera superficies undique mediantibus innumeris inclinationum angulis, radios reflectere possit, quòd æquabilis superficies, nimirum aquæ, haudquam poterit.

Concludo igitur: superficiem Lunæ clarè illuminatam esse terram, Maculas autem obscuriores majores esse aquas, prout quoque

Superficies aquæ lunaris, repræsentat quasi speculum convexum.

Aquæ reflexionem terrestri debiliorem esse, experimento probatur.

Scabra superficies quæversum radios reflectit.

Partem Lunæ clariorem, Terram, obscuriorem verò aquam esse, affirmatur.

quoque Kepplerus, Siderali Scientiâ Clarissimus, in dissertatione suâ cum Nuncio Sider. paginâ 29. concedit; inquiens: *do Maculas esse Maria, do lucidas partes esse terram*: præterea; nec ideo Lunam esse Terræ nostræ dissimilem, quod haud secus ibidem, quàm hîc in Terrâ, magni Oceani, Maria, Stagna, Lacus, Paludes &c. cum deflexibus Sinubus, Promontoriisque innumeris extant: adhæc, quod etiam continentes, chersonesi ac Insulæ in Lunâ spectentur, partim planæ, in quibus vastissimi campi, partim etiam præruptis rupibus cellissimisque Montibus refertæ; quorum tractus se se quàm longissimè extendunt. De quibus illis postmodum fulcè agetur.

CAPUT VII.

DE MOTU LUNAE, PARALLAXIBUS, REFRACTIONIBUS, DISTANTIÂ, MAGNITUDE & DIAMETRO APPARENTE. Quò verò hæc omnia eò evidentius explicari possint, simul de toto Mundano corpore, figurâ ejus, quantitate & motu, ut & diversis Astronomorum hypothesis, quamvis breviter, perspicuè tamen, pro instituti ratione, differitur.

VNICÂ quidem MUNDI VOCULÂ nimirum, breviter & summatim comprehenditur, non solum totus globus Terrenus, quicquid in superficie & in visceribus ejus existit; sed & latè undique expansum Cœlum stelliferum, tam quoque universa corpora ætherea hactenus cognita, quàm incognita, atque adeò quicquid à DEO unquam in illo conditum & creatum est. Verumenimverò, res sanè difficilis est, de rebus omnibus Mundanis rectè philosophari, etiam si placita solummodo tam Veterum, quàm Neotericorum Philosophorum, in medium sint proferenda; nedum si de iis aliquid certi indubitatiq̃ue statuendum. Idque ex infinitâ innumerabilium Scriptorum varietate etiam colliges: ubi nihilominus vix minima illa rerum pars est explicatâ, quæ nimis quàm amplo

amplo NATVRÆ volunine continentur; & licet ad extremum usque diem adhuc quàm plurima edantur literarum monumenta, attamen res potiores & præcipuæ prorsus intactæ relinquentur. Non est igitur, quòd quispiam sibi persuadeat, mihi esse in animo ut de universo, in hoc perexiguo commentariolo plenè & absolutè agam : sed illa solummodo, quæ ad ejus figuram in genere, magnitudinem & motum necessariò spectant, attingam.

Initiò difficilis & diffusa se se offert quæstio, utrùm scilicet Mundus finitus, an infinitus sit? quemadmodum hoc posterius Veterum Philosophorum quidam Anaximander, Solenus, Melissus, Leucippus, partim etiam Diogenes Apolloniates, & plerique Stoicorum; Neotericorum autem, Iordanus Brunus, Franciscus Patritius, & alii statuerunt : item alia, an Mundus sit finitus in spatio finito vel infinito? sicuti apud Kepplerum in Epitom. Astr. lib. 1. & apud Franciscum Patritium in Pancosm. videre est. Cùm autem utraq; quæstio merè sit philosophica; idcirco eas aliis libenter ventilandas relinquo, ne præter institutum & scopum nostrum, circa res ejusmodi nimis diu morari videar. Quandoquidem etiam totus sum in hac opinione, neminem adhuc penitus id decidisse, vel certi quid super eo statuisse, ne dicam indubitatis invictisque rationibus demonstratum ivisse; Mundum esse figuratum, & quidem Sphæricâ figurâ terminatum; ut ut Aristoteles hac in parte omnem moverit lapidem. Interea tamen haud ægrè (etiamsi multa in partem contrariam possent inferri) conceditur, quod plerisque omnibus Præclarissimis Philosophis probatur, Mundum planè esse rotundum, instar Terræ, Solis, Lunæ imò ferè omnium Corporum Cœlestium. Namque credibile est illud, quod omnia continet, omnino etiam ejusdem esse figuræ, cujus sunt comprehensa, & quidem ejusmodi quæ omnium sit capacissima, ut est circulus; nam corpori inquit perfectissimo, tribuendam etiam figuram perfectissimam, nempe circumulum.

Vtrùm autem Cœlum sit corruptibile an incorruptibile, simplex an compositum, vel potius quinta aliqua essentia, mul-

An Mundus sit finitus, an infinitus?

An Mundus finitur in spatio finito vel infinito?

Mundum esse sphericâ figurâ terminatum.

An Cœlum sit corruptibile, an incorruptibile?

Ex quoniam
Elemento fir-
mamentum
constet?

Platonis has
de re senten-
tia.

Platonico-
rum senten-
tia.

Cœlum igne-
um esse.

Mundum esse
animatum.

Mundum esse
animal divi-
nâ mente
præditum.

tum disputatur? quoniam verò de hâc materiâ in præcedenti-
bus hinc inde mentio est facta, pluribus ista modo non urge-
bo. Verùm alia hîc proponitur quæstio; an nimirum Firma-
mentum, sive cœlum stellatum, vel ipsa etiam astra, ex aère,
aquâ vel igne consistant? Aristoteles, cum omnibus suis Secta-
toribus, Cœlum asserit quintam esse essentiam, cujus Astra
densiores sint partes, uti jam suprâ memini: Plato autem in
Timæo docuit, Cœlum constare ex omnibus quatuor Elementis;
ex purioribus tamen illarum partibus, & magis participa-
re de Terrâ & igne; id quod etiam refert Alcinoüs cap. 12. de
doctrinâ Platonis. Platoniorum pars nobilior; nempe, Iam-
blichus, Syrianus, & Proclus, ajunt: Elementalium qualitatium
summitates Cœlo inesse purissimas, igneum tamen, à prædo-
minio, esse Cœlum: Plotinus, non esse aliud quàm ignem.
Quemadmodum & multi inter Philosophos Græcos, Cœlum
igneum esse statuerunt; nimirum, Thales, Anaximenes, Hera-
clius, Xenophanes, Parmenides, Empedocles, Anaxagoras,
Diogenes, Archelaus, Cleanthes. Inter Theologos à Platonico-
rum partibus stant Damascenus, Augustinus, Cyrillus &c.
Hac de re qui plura desiderat, cognoscere Cœlum omnino ejus-
dem esse naturæ cum Elementis (quemadmodum & ipsemet
non aliter sentio) legat cap. 38. lib. 11. de Idololatriâ Voslij.

Cæterùm, præter hos jam dictos Philosophos & Theolo-
gos, Zoroaster, Hermes, Orpheus, Zeno, Pythagoras & o-
mnes ferè Ægyptii & Chaldæi, non solùm Astris, sed & toti
Mundo animam assignarunt, animatumque statuerunt; (de
quibus Franciscus Patritius lib. 12. p. 91. de Cœlorum nume-
ro sic loquitur: *Quia sunt animalia, & quidem divina, & divinum ani-
mum, & divinam vitam & divinum intellectum habere est necesse*) planè
existimantes, Mundum esse animal æternum, omnia in se ani-
malium genera & species complectens, præterea beatum, o-
mnia videns, omnia audiens, rationali animâ divinâque mente
præditum; uti præsertim ex lib. 32. de naturâ, Platon. pag. 709.
apparet: *Mundum animal esse, idq; intelligens, revera divinâ providen-
tiâ constitutum.* Insuper pag. 713: *Quia divina Animalia sunt, propter-
ea in eodem semper circuitu perseverant.* Quod equidem à nonnullis

Peri-

Peripateticis affirmatur, Alexandro scilicet, Philopono & Simplicio; dicentibus: *Non solum astra esse animata, verum etiam sensitivo animo prædita*: teste eodem Patritio. Patrum quoque permulti, nimirum, Lactantius, Basilius, Ambrosius & Cyrillus, animatum Mundum esse dixerunt. Hanc Mundi animam (quæ alioqui nihil aliud est, quàm vivifica quædam virtus toti Mundo & omnibus ejus partibus divinitus infusa, quâ omnia in suo statu vivunt, sustentantur & vires suas exserunt) *Spiritum Mundi* appellat Doctissimus Comenius; qui nihil aliud est (inquiens) *quàm ipsa vita Mundo infusa ad operandum omnia in omnibus* pag. 25. in Synops. Phys. Contrarium verò inter Philosophos statuerunt Leucippus, Democritus & Epicurus. Aristoteles autem mediam ingreditur viam, dum putat: Mundi partem non universum animatum esse, Elementorum autem qualitates & essentias omnes Cælo ademit. Quod itidem nonnulli Patrum fecerunt, uti: Origenes, Hieronymus, Augustinus, inter recentiores, Aureolus, Scotus, D. Thomas, Cajetanus &c.

Porro, an Cælum mobile, an immobile sit? dignum est consideratu: verum faciliè colligere possum, multos cogitatos, hanc quæstionem prorsus esse supervacaneam, & absurdissimum, de immobilitate Cæli dubitare: siquidem quotannis, imò quotidie, ex ortu & occasu stellarum, Solis & Lunæ, hoc indubitatè & manifestè cognoscere possumus. Verum enimvero, probè hîc distinguendum, Benevole Lector, inter stellarum, aliorumque corporum cælestium, & inter Cæli motum ipsum, tanquam horum corporum domiciliis. Nam, quòd stellæ moveantur, nullus est, qui dubitat, nec in præsens disputatur: quippe in eâ sumus opinione, sicuti & impofterum plenius demonstrabitur; corpora cælestia, in aurâ æthereâ, instar avium in aère, piscium in aquâ, vel potiùs globuli alicujus ex bombardâ explosi, moveri. Si Cælum autem moveri debeat, necesse est, ut, cum Aristotelicis, Ptolemaicis, & Alphonsinis, in Cælo spheræ reales supponantur; hoc est, quemlibet Planetam, peculiari spherâ, cui firmiter adhæreat, circumvolvî; ut apparet in Spheris illis Armillaribus. Verum hæc impossibilia, adhæc mera figmenta esse, jam jam patebit; simul ac de-

Astra sensitiva anima esse prædita.

Quid sit Mundi anima?

Aristoteles Qualitates Elementorum ex Cælo removet.

An Cælum sit mobile, an immobile?

Quomodo stellæ moveantur?

Aristoteles in Cælo spheræ reales supponit.

Quid sit au-
ra aetherea

monstrabitur, Cœlum liquidum & fluidum esse. Ex quibus necessario sequetur, corpora illa ætherea, propter illam Cœli fluiditatem & tenuitatem, certis sphaeris adherere non posse: sicuti in aquâ, aëre, igne vel aliâ hujusmodi liquidâ & fluidâ materiâ, nihil quicquam firmatur. Liquidò itaque constabit, Cœlum tanquam stellarum hospitium revera per se non moveri; sed astra solummodo & corpora Cœlestia, liberè absq; omni impedimento, in purissimâ illâ aurâ æthereâ ferri, quâ totum stellarum domicilium est impletum: quæ ferè nihil aliud est, quàm aër purissimus, uti permulti sentiunt. Patritius verò lib. 7. pag. 17. ait: *Ætheris substantiam nihil aliud esse, quàm purum lumen.* Sed, ut ad propositum redeam, simulque Cœli fluiditatem, liquiditatem, & tenuitatem clarè ostendam, nullamque duritiem vel soliditatem aëris, adamantis instar, in Cœlo nec diversas sphaeras reales, vel Cœlos distinctos (cui sententiæ Neotericorum quàmplurimi fuerunt addicti, Antiquos ut taceam, inter quos non infimum obtinent locum: Copernicus, Tycho Braheus, Rothmannus, Keplerus, Moëstlinus, Galilæus, Longomontanus, Origanus, Gassendus, Bullialdus, Blancanus, Sempilius, Ciccus Esculanus, Michael Scotus, Stevinus, Snellius, Clavius, Maginus, Scheinerus, Crügerus, Eichstadius, Linnemannus, immò ferè omnes, hâc nostrâ tempestate Mathematici) existere posse.

Refraçtio
Corpora cœ-
lestia ex vero
loco remo-
vet.

Primò; hæc sententia sequentibus rationibus corroboratur: Cœlū, si corpus peculiare esset, essentiamq; planè ab aëre nostro diversam haberet, insuper à tot diversis sphaeris realibus, solidis, & imperviis inter se contiguis, quot errantes numerantur Siderum globi, constaret; nunquam certè stella aliqua Fixa, seu aliud corpus cœleste, in vero proprio loco observaretur, multò minus conjunctio aliqua, vel Eclipsis, calculo responderet; ratione variarum refractionum, à diversis sphaerarum superficiebus exiltentium, Opticâ scilicet id clarissimè attestante. Quod si igitur in Cœlo tale quid accideret, de totâ Astronomiâ actum esset; imò omnes observationes Clarissimorum Virorum, uti: Hipparchi, Ptolemæi, Copernici, Tychonis prorsus corruerent. Quum autem penitus nulla refraçtio, in omnibus observa-

fervationibus à tot seculis fuerit deprehensa, evidenter omnino ex Opticis concluditur, spatium illud æthereum, Lunam inter & stellas fixas, nihil quicquam ab aëre nostro sublunari differre, sicuti similiter & Mercennus in Comment. in Genes. Cap. 1. pag. 812. luculentissimè idem confirmatum ivit.

Secundò; cùm Lunæ superficies planè sit aspera & inæqualis, Montibus undique præcellis referta, prout jam ex parte innotuit, & impostèrum etiam pluribus fiet manifestum: idcirco, pariter & ex hoc concludendum, Cælum minimè esse durum, solidum & impervium; aliàs moveri haud posset, nisi vacuo concesso, vel penetratione corporum; quemadmodum facilè colligere quilibet poterit.

Tertiò: Planetas omnes Solem pro centro agnoscere, nullis indiget jam ampliùs argumentis: hinc Mars, Venus & Mercurius modò supra Solem elevantur, modò infra illum conspiciuntur, phasibus Veneris & Mercurii id attestantibus. Quod si igitur Cælum durum & impervium detur, qualis bene DEVS penetratio corporum & dimensionum inde existeret, quando hi prædicti Planetæ sphæram Solis interfecarent! Simile quid accideret apud Ioviales, & CircumSaturnales, nisi Cælum liquidum & fluidum statuas.

Quartò; Animo profectò libenti, à Peripatetico quodam perciperem, quomodo stellæ novæ (quarum novem vel decem egregiæ magnitudinis in Cælo & inter fixas ipsas extiterunt) vel Cometæ (quorum alii Sole ipso altiores fuerunt) generentur & corrumpantur, vel quomodo moveantur in altumque evehantur, si sphære reales concederentur? ut taceam de Faculis & Maculis Solaribus, quæ circa Solem pariter oriuntur, moventur & in nihilum rediguntur. Ita ut certissimum sit, nullum apparere phænomenon, quod non longè faciliùs, datâ Cæli tenuitate seu liquiditate, concipi, salvari & explicari possit, quàm si duros & adamantinos esse cœlestes orbis supponamus. Concludo igitur cum ferè omnibus clarissimis Astronomis ac Philosophis: unicum esse Cælum, idque æthereum, aëris instar, liquidum, in quo Stellæ & Planetæ moventur; non Cælum ipsum, vel Astra orbibus infixæ ferri: quæ opinio, teste

Cælum, si sit durum, necesse, ut penetratio corporum sequatur.

Data Cæli fluiditate omnia phænomena facilius intelliguntur atq; salvantur.

Unicum est Cælum & quidem liquidum.

Patritio lib. 17. pag. 104. Mala omnia in Astronomiam & Physicam invexit. Plura, qui cupit cognoscere ex innumeris Autoribus, Philosophis & Patribus congesta, de Cœlo nempe liquido, legat partis 11. lib. 4. Rosæ Virinæ cap. 26. 27. & sequentia.

*Hypothesium
Astronomi-
carum in-
ventio est u-
tilissima &
ingeniosissi-
ma.*

Quemadmodum igitur nunc duæ diversæ opiniones, inter doctos, tam Veteres, quàm Neotericos foventur; quorum aliqui, sphaeras in Cœlo reales fingunt, aliqui Cœlum liquidum supponunt: itaque diversæ etiam ab illis hypotheses statuuntur, illæ autem in Astronomiâ præstant, quantum Axiomata in Geometriâ; & meritò vera principia sensuاليا Sideralis scientiæ nominantur; per quas hypotheses, figura, ordo & motus corporum cœlestium, oculis subjicitur. Non possum autem certè non mirari, primò quidem, ingenium humanum tales hypotheses, excogitare & invenire potuisse; si nimirum talis equidem ordo atque constitutio corporum, ibidem in Cœlo adsit. Secundò, etiamsi planè alia ab opinione nostrâ diversâ constitutio, figuræ, ordinis, & motus Cœli Siderei detur, nihilominus mirari oportet, has ab hominibus excogitatas, & quasi fictas hypotheses, talem arctissimam habere affinitatem, cum Cœlo & stellis ipsis; adeò ut harum adminiculo motus cœlestes, licet post aliquot secula futura, certissimè prædici, & supputari possint. Ex quibus perspicuè patet, has hypotheses, non esse deliria Astronomorum, uti Philosophus quidam existimat, cujus nomen honoris ergo indicare nolo.

*De primâ
inventione
hypothesium.*

Earum hypothesium, tres sunt principales formæ, ut reliquas diversas præteream, nimirum: 1. Peripatetica, seu Ptolemaica, 2. Tyconica, 3. Pythagorica, seu Copernicana. Ut autem initiò paucis agam, de origine primæ hypotheseos, itemque quibus rationibus impulsivi autores fuerint, tale quid statuere, sciendum: postquam scilicet veteres Chaldæi & Ægyptii, primi Siderum Scrutatores, perspicuè viderunt & observaverunt, non solum singulis diebus, spatio quatuor viginti horarum, stellas omnes & corpora ætherea ab ortu, per meridiem, in occasum moveri & circumvolvi, sed, præter hunc motum, Solem, Lunam ut & reliquos Planetas, adhuc peculiari motu ab occasu

occasu nempe in ortum, esse præditos; tametsi unius Planetæ motus longè velocior quàm alterius existeret: idcirco statuerunt, tot sphaeras reales, quot motus diversos in Cœlo animadvertère, nimirum octo: ita ut extimam, pro firmamento acceptaverint, stellasque fixas appellaverint, quùm initiò nullum alium motum, quàm illum diurnum, ab ortu in occasum, circa illas deprehenderint, & demum in medio, pro centro, Terram & quidem immobilem collocaverint.

Ordinem quod concernit Planetarum vel sphaerarum, quibus moveri debeant, Veteres non omnes unum eundemque servant, licet in hoc inter illos conveniat, proximè majorem, fixis viciniorem sphaeram esse Saturni, deinde Iovis & Martis huic esse proximas, postea, uti chaldæorum plerique, quibus Cicero astipulatur, sphaeram sequi Solis. Ægyptii verò, cum Platone & Aristotele, sicuti apud Plutarchum lib. 2. cap. 15. de Placitis Philos. & Divinum Platonem lib. 32. de Naturâ pag. 713. legitur; statim post Martem Mercurium, deinceps Venerem Solem, & tandem Lunam, Terræ vicinissimam, collocarunt. Supremam autem sphaeram stellarum fixarum, octavam scilicet, firmamentum, existimarunt primum istud esse mobile, quod reliquorum Planetarum sphaeras, secum in quatuor viginti horis simul circumrapiat, ab ortu in occasum contra feriem signorum: qui motus aliàs diurnus stellarum appellatur.

In ordine sphaerarum, Veteres inter se non conveniunt.

Has prædictas octo sphaeras (quas Aristotelici & Peripatetici, pro veris realibus habuerunt, in quibus omnes Stellæ affixæ essent, instar clavi in pariete, cumque quibus simul circumcurfarent) Eudoxus & Calippus iterum in 53. vel 54. distinxerunt, sicut apud Aristotelem lib. 12. cap. 8. Metaphysicorum fusè videre licet, ut & apud Keplerum cap. 2. pag. 6. de Motibus Martis.

Sphaera Veterum reales, in plures fuerunt distinctæ.

Postquam autem Ptolemæus, Veterum Astronomorum Princeps, ex observationibus Timocharis & Hipparchi, dilucidè perspexit, sphaeram octavam, adhuc peculiarem mo-

tum

tum proprium ab occasu in ortum habere, quamvis tardissimum: idcirco necessarium duxit, prioribus 8. nonam addere, ut hæc ultima loco primi mobilis esset, quæ motum illum diurnum conficeret.

Astronomi verò Alphonsini, qui post Ptolemæum elapsis 1110. annis, vixerunt, à Rege Alphonso Castiliæ convocati, ex certis fundamentis concluderunt, numerum sphaerarum, adhuc esse augendum; quia deprehenderant, stellas fixas, declinationes suas, post Ptolemæi tempora, variasse; quem motum, trepidationis vocarunt, & octavæ sphaeræ assignarunt; ita ut decima fuerit addita, quæ primum mobile referret. His decem Sphaeris, posteri undecimam addiderunt, Cælum nimirum Empyreum, sedem DEI, Angelorum, & Beatorum.

*Alphonsini
terram in
centro im-
mobilem sta-
tuerunt.*

*Ordo Sphae-
rarum Ptole-
mæica hypo-
theseos.*

Habuerunt igitur, in hac hypothesi Ptolemæicâ Alphonsinâ, priores Astronomi, Terram nostram immobilem pro centro, circa hanc quatuor elementa, deinde Lunam ejusque sphaeram: cum motus ejus sit velocissimus præ reliquis omnibus corporibus cœlestibus; quæ in quatuor circiter hebdomadis, cursum suum motu proprio absolvat. 2. Dehinc Mercurio, qui concitatissimus post Lunam, sphaeram scilicet secundam assignarunt. 3. Veneri, quia paulo esset tardior, idcirco tertia sphaera est attributa. 4. Hanc sequitur Sol, qui spatio unius anni, signa illa duodecim cœlestia percurrit. 5. Postea Mars; in duobus siquidem annis tantummodo cursum suum absolvit. 6. Mox Iupiter, qui nempe in duodecim duntaxat annis circulum suum pervagatur. 7. Post Iovem sequitur Sphaera Saturni: quippe Saturnus est omnium Planetarum tardissimus, qui triginta circiter annis, circulum suum peragrat. Saturno succedit sphaera octava, stellarum nempe fixarum, cujus revolutiones in circellis ad capita Arietis & Libræ appositis, annis 7000. restituuntur, quibus ad idem punctum recurrunt Anomalie Equinoctiorum. Post hanc, nonam statuerunt, quæ motum suum proprium s. s. s. in 49000. an-

nis

nis primùm absolvit. Denique, Decima reliquas omnes circumdat, quæ diurnas revolutiones conficit, & omnes sphaeras simul secum, tam Fixarum, quàm Erraticarum, contra feriem signorum, ab ortu in occalum, movet & rapit. Ex quo conficitur, Cœlum moveri motu triplici 1. Motu diurno. 2. Motu proprio. 3. Motu'trepidationis, qui Mundi Polum versus fertur. Hic ordo Sphaerarum Corporum cœlestium, in figurâ sequenti perspicuè est delineatus.

Cœlum movetur motu triplici.



Iam quidem meritò de Systemate Pythagorico & Copernicano, aliquid dicere opus esset; certas autem ob causas, etiã si hoc sit antiquius, priùs de Tyconico aliquid in medium proferam, de Pythagorico postmodum dicturus.

X

Cùm

*De Systemate
Tycho-nico.*


Cùm scilicet, Magnus ille Atlas Danicus, Tycho Braheus, ex diligentissimis suis, spatio viginti quinque annorum habitis observationibus, admiculo instrumentorum suorum haud vulgarium, abundè satis pervidisset, multa adhuc Phœnomena cœlestia superesse, quæ nondum, per hypothefin Ptolemaicam & Alphonsinam, salvari & explicari possent: inter alia verò Martis Acronychi Phœnomenon; quando videlicet tempore oppositionis Solis, multò Terræ vicinior, quàm Soli ipsi redditur, & in conjunctione iterum longè fit à Terrâ remotior quàm Sol: (id quo fieri nequeat, impediunt in hypothefi priori sphæræ Reales, quas Peripatetici finxerunt) idcirco planè aliam excogitavit, & pro stabili fundamento, loco Cœli solidi & duri, liquidum & continuum primò statuit, in quo stellæ, vi quâdam naturali, à principio Mundi huc usque liberè absque omni impedimento, certisque legibus intra certos tamen fines, moveantur.

2. Terram immobilem, in centro Mundi retinuit, ita tamen, ut tantùm sit centrum viæ lunaris, Solaris & stellarum fixarum.

3. Solem, centrum omnium reliquorum Planetarum constituit; uti Copernicus, de quo imposterus; in eo tamen differt, quòd apud Tychonem, Sol in suo circulo seu Eclipticâ, amplissimum illud Systema Planetarium, necessariò secum circumrotet: apud Copernicum verò, Terra in Eclipticâ constituta, sphæram duntaxat Lunarem illam minimam secum circumagat.

4. Proximus circulus circa Solem est Mercurii, alter Veneris, instar duorum Epicyclorum; postea Mars sequitur longissimo intervallo, cujus Cœlum in oppositione, à Cœlo Solari magnam aufert partem; ita ut, quando acronychus existit, Terræ fiat vicinior, quàm Soli. Sequitur deinde Cœlum Iovis, Saturni, & denique, quæ omnes alias in se comprehendit, sphæra nempe Fixarum; hæcque unà cum reliquis, motu diurno, ab ortu in occasum, circumvolvitur: quem-

quemadmodum hic ordo corporum cœlestium, ex apposito Schemate clarè patet.



Iam, quod hypothefin Pythagoricam attinet, huic ferè omnes Pythagoræi, in primis Philolaus Crotoniata, Aristarchus Samius, Plato in Senectute, & alii permulti fuerunt additi, teste Plutarcho lib. 3. cap. 13. in Placitis Philosophor. & Archimede, in suo Arenario, pag. 449. Postmodum verò, per aliquot secula, hæc hypothefis in alto jacuit silentio, donec ante centum & triginta circiter annos, Copernicus civis noster, Vir nunquam satis laudatus, singulari DEI providentiâ genitus, prodiit, qui, antiquam illam & ferè oblivioni traditam hypothefin, denuo ex cineribus refuscitavit; nec solummodo illam clariorem, sed & diversis in locis, ubi opus, perfectiorem reddidit. Quam opinionem, ferè omnes Eximii Mathematici, hoc nostro seculo amplectuntur, & contra objectiones contradicentium magis magisque defendere laborant; quippe, per hanc admo-

*De hypothefi
Pythagoricâ.*

*Copernicum
restaurator
Pythagoricæ
hypothefis.*

Per hanc hypothesin, facillimè omnia phenomena stellarum explicantur.

dum feliciter & commodè, omnia phœnomena & motus stellarum, tam longitudinis quàm latitudinis, ut & Planetarum retrogressiones (quare videlicet certis temporibus tardiores, velociore, stationarii. &c.) explicantur & intelliguntur. ita ut ea sententia rationi minùs contrariari videatur. Quo de Systemate, & opinione, qui plura & specialiora postulat, ex indubitatis Geometricis fundamentis demonstrata, legat inter alios nostri ævi Astronomos, Philolaum Redivivum, à Viro summi ingenii descriptum, Galilæi de Galilæis, ex Italis verè Lyncei, Systema Mundi, Epistolam secundam Petri Gassendi, Viri immentæ eruditionis, de motu impressio à Motore translato; Kepleri Teutonicorum Mathematicorum Aquilæ, Epitomè Astronomiæ Copernicæ; Landspergium & alios; quum propositum meum non sit, hanc hypothesin plenè stabilire, neq; sit hujus loci. Brevibus tamen porrò attingam ordinem & motum stellarum, quantum proposita ratio postulat, ut eò faciliùs, motum Lunæ specialem, explicare, & demonstrare possim: quem sanè nullus non ignorare debet, si hæc Selenographia, & quicquid imposterum de phasibus Lunaribus, Motu Librationis Lunæ, & phœnomenis variis dicetur, rectè intelligi debeant.

Abiq; cognitione Lunæ Motuum Selenographia hæc minimè intelligitur.

Sol centrum Universi circa proprium axem movetur.

Initiò, collocant illi laudati & nobis hic imitandi Astronomi, Solem, tanquam animam Mundi, in centro Universi, & motu quidem lationis immobilem; veruntamen, circa proprium axem in 25. 26. vel 27. circiter diebus (quemadmodum ex Maculis luculenter deducendum) circumvolubilem.

Orbium ordo

Illicò verò circa Solem, Mercurii Sphæram statuunt, omnium minimam & mobilem: deinde Veneris: postea Orbem, quem Copernicus vocat magnum; in quo, Terra nostra, unà cum aère circumfuso, & sphæra Lunæ, tanquam Epicyclus, movetur, & quidem motu triplici. Primò, circumfertur Terra in orbe magno, annuo spatio, circa Solem. Secundò, dum ita movetur, simul quoq; ab occasu per meridiem in ortum secundum consequentiam signorum, circa suum axem, Solem versùs singulis diebus, revolutione diurnà in viginti quatuor horis circumvolvitur, instar globuli, in scamno tornatili. Cum itaq; ortum versùs sic vertitur, omnes stellæ & Planetæ, imò Sol ipsè occasum

Terra movetur motu triplici.

casum recedit, & suo tempore occidit. Tertiò, libratur axis Terræ (qui continuè punctum illud Boreale & Australe accuratissimè observat) hinc inde quatuor viginti min. per quem motum mutatio Obliquitatis Eclipticæ à Copernico demonstratur.

Quandoquidem igitur, ex jam dictâ opinione, Terra in Eclipticâ tripliciter, secundùm Zodiaci ductum, fertur: hinc nobis Sol in Ariete apparet, quando Terra revera in Librâ existit, & quando hæc in Scorpione est, tum Sol in Tauro videtur; adeò ut Terra motum suum annuum, per motum Spiralem, conficiat: hoc est, ut se circa axem trecenties sexagies quinquies circiter circumvertat, priusquam totum absolvere possit Zodiacum: in quo annuo spatio, Luna suam spheram (quam aliàs Terra secum ducit) per se (non attento illo priori motu Terræ) duodecies percurrit: unde Plenilunia, Novilunia, Quadraturæ & Menses Lunares trahunt originem.

Terra, per motum spiralem. Eclipticam percurrit.

Hic facilè quempiam cogitaturum existimo, miram hanc esse revolutionem, & rationi quasi contrariam, Terram, totam Lunæ spheram, cum circumfuso aëre secum circumducere; sed respondeo, hoc, quicquid sit, magis tamen rationi consentaneum, quàm, quòd, in hypothesi Tychonicâ, Sol, totam Machinam Planetariam, tale vastissimum spatium, unà cum Planetis ejusmodi immanis magnitudinis corporibus, quæ Lunam multoties vastitate excedunt, secum quotannis, quotidie imò singulis horis, continuè rapere debeat: & quòd postea primum mobile, Solem cum omnibus Planetis & stellis fixis, motu, & quidem contrario, ab ortu in occasum, secum ducere oporteat; ut taceam reliquas difficultates, quæ se se copiosè circa hunc motum primi mobilis offerunt.

Post orbem magnum sequitur Orbis Martis, deinde Iovis, circa quem quatuor parvi quasi Epicycli videntur, in quibus quatuor illi comites Iovis circumvolvuntur, qui semper, licet à parte periodos suas absolvant, motum Iovis concomitantur, quem, tanquam Regem suum venerantur, sicuti reliqui Planetæ Solem: quòd clarè & apertè, hoc ævo, Tubis Opticis, demonstrari & sensu oculorum evinci poterit. Vnde luculenter sanè apparet, non esse tam absurdum & absolum; quòd Terra, to-

Quemadmodum Iupiter Ioviales secum circumducit; ita Terra Lunam.

tam Sphæram lunarem secum circumagat. cum videamus Iovem 4. ejusmodi Lunulas (quæ etiam non exiguæ sunt magnitudinis, utpote quarum aliæ in circumferentiâ 400. Mill. Germ. continent) absq; ullo impedimento & retardatione, in aurâ æthereâ, in Cœlo nempe fluido, ac liquido, secum convertere posse.

Deniq; Saturni Orbis sequitur, circâ quem simili modo, duo parvi Epicycli dantur, in quibus duo illi Circum Saturnales moventur; qui certis temporibus, unâ cum corpore ipso Saturni, miram & peregrinâ figuram constituunt, cum illi sunt vicinissimi; quorum tamen motus hucusq; nondum planè investigatus.

Interstitium, inter Saturni & stellarum fixarum Sphæram minimè est vacuum.

Post Saturnum vastissimum interstitium inter Sphæram Fixarum statuitur; quod spatium, vix stellarum corporibus vacuum, cum Doctissimo Philolao Redivivo credo, uti nec mihi hoc persuasum est, quòd omnes stellæ fixæ in pari distantia à Sole sint remotæ, quanquam alii hoc penitus sibi persuasere, unicæ nempe Sphæræ illas esse affixas, sicut stellulæ depictæ in globo illo artificiali. Huic opinioni & Veterum permulti fuerunt addicti, quod liquet ex Gemino, inquitente: *Suprema igitur est omnium hæc Sphæra, quæ stellarum fixarum dicitur, quæ in se continet omnium fixarum constellationum, sive signorum effigiem. Non est autem cogitandum, omnes stellas sub eadem esse positas superficie, sed alias esse sublimiores, alias humiliores. Cum enim visus noster ad æqualem longitudinem à Terrâ in Cælum se se extendat: redditur insensibilis altitudinis differentia.* Hæc ille in Vranologio Petavii pag. 4.

Stellas fixas non omnes à Sole æqualiter esse remotas.

Totam distantiam Solis & Terræ ad Sphæram Fixarum planè evanescere.

In hac hypothesi, non solum statuitur, Semidiametrum Terræ, sed & totam Semidiametrum Orbis magni, ad Semidiametrum Sphæræ Fixarum, instar puncti esse; & totam distantiam Solis & Terræ (quæ circiter 1200. Semidiani. Terræ equat) ad Sphæram Fixarum planè insensibilem esse, ita ut parallelæ, quæ à Terrâ & Sole ad Fixas ducuntur, ferè in unum eundemq; punctum coincidunt; propterea & tam vastum spatium supra Saturnum relinquunt. Proportio totius Systematis Planetarii, se se habet ad Semidiametrum Firmamenti, ut Pisum ad pedes quindecim Gedanenses, quemadmodum Doctissimus idemq; jam beatus & longè supra æthera evehctus M. Petrus Crügerus Præceptor olim meus plurimum colendus Mathematicus Dantiscanus (ad cujus diligentiam & eruditionem in rebus Mathemati-

Quenam sit proportio globi Systematis Planetarii, ad semidiametrum firmamenti?

maticis pro dignitate deprædicandam verba mihi deesse fateor) in Astronomiâ suâ Dantiscanâ lib. 1. cap. 2. quæ ab illo quidem fuit incepta, sed non penitus ad umbilicum perducta, annotavit: & Kepplerus inquit, in Epitome Astronom. lib. 4. pag. 492. *Diameter Saturni extimæ spheræ mobilium, continet in se diametrum Corporis Solaris bis millies circiter: sic etiam diameter spheræ fixarum continet diametrum Saturni in se ferè bis millies. Itaq; diameter fixarum continebit in se circiter quadragies centena millia diametrorum corporis Solaris, diametrum Terræ (secundum proportionem corporum Solis & Terræ à Veteribus creditam) quatuordecuplum & plus.*

Facile hic quispiam secum reputabit, bone DEVS! quàm immensa quàmq; incredibilis & incomprehensibilis distantia, altitudo & amplitudo in hâc hypothesi inculcatur? verùm hoc placitum fit verisimilius, quàm illud Veterum, Sphæram stellarum Fixarum, quatuor millies velociùs circumvolvi, quàm apud Copernicum; maximamq; sphæram velocissimum habere motum: è contrario, minimam scilicet Lunæ, longè tardius moveri: cùm tamen initiò Veteres ipsimet, ex motu velociori & tardiori stellarum, vel sphærarum, distantiam & elongationem eruerint; ita nempe, & concluderint stellam, quæ esset velocior, inferiorem esse tardiore. Ex quo fundamento, ordinem & situm Planetarum vel sphærarum illarum deduxerunt, quod etiam usq; ad Saturnum rectè observarunt; sed circa sphæram stellarum Fixarum, planè hanc rationem, & infallibilem regulam, oblivioni tradiderunt; unde ferè totam suam hypothesein destruxerunt. In hypothesei autem Copernicanâ, omnia ordine & congruenter succedunt: ubi Planetæ, quò est elevatior, eò tardior motus attribuitur, & Sphæræ maximæ, tardissimus. Porro, quemadmodum Sol tanquam centrum Universi constituitur, ita de motu ejus asseritur, quòd is circa axem 27. circiter diebus peragratur, uti jam superiùs dictum: Mercurii revolutio 87. diebus 23. horis, & 45. minutis absolvitur: Venus, quæ paululùm longiùs à centro abest, conficit suam periodum 224. diebus, 17. horis, & 26. minutis: Terra, quæ adhuc remotior à Sole, circulum percurrit 365. diebus, 5. horis & 49. minutis: Mars peragrat suam periodum, Anno nempe uno Ægyptio, diebus 321. horis 22. & minutis 24; hoc est, in uno anno

Natura contrariatur, maxima spheræ velocissimum cōpetere motum.

Tempus revolutionis Planetarum.

anno Iuliano 10. Mens. 17. dieb. 22. hor. min. 21. Iupiter Annis Ægyptiis 11. diebus 315. hor. 17. minutis 14; hoc est, annis Iulianis 11. Mens. 10. diebus, 9. hor. 14. & minut. 10. Saturnus, qui remotissimus omnium reliquorum, cursum suum absolvit Annis 29. Ægyptiis, diebus 162. hor. 3.; hoc est, 29. annis Iulianis, 5. Mens. 4. dieb. 12. minut. Et tantum dicere volui de hypothese Copernicana: nisi quod adhuc, quò res omnis evadat clarior, ejus Schema itidem apponere lubeat.



*Luna motus
est omnium
difficilissimus.*

Accingamur modò secundum propositam rationem instituendæ explicationi Theoriæ, & Motus Lunæ Specialis. Fuisse quidem & copiosè (ut temporis scilicet ratio habeatur) id impræsentiarum fieri non poterit: nam longè lateq; diffusa est materia, de quâ ingens volumen conscripsisse non sufficeret: cum Lunæ motum, præ reliquorum Planetarum motibus esse intricatum, omnes Mathematici fateantur; nihilotamen minùs operam dabo, ut omnia admodum perspicuè & quàm brevissimè, omnibus Astronomiæ Studiosis, proponere possim.

Quam

Quam etiam ob causam mihi proposui, Motum Lunæ non per modum Keppleri, & orbitam Ellipticam explicare; sed modo Tyconico, per orbitas circulares & Epicyclos; non quidem propterea, me quasi hanc hypothefin alteri anteponendam ducam, vel quòd hæc mihi magis arrideat, minimè? Nam, planè in eâ sum opinione, Keppleri hypothefin, præ omnibus reliquis esse amplectendam: quum ea observata, alias rationes ut taceam, motus non solùm Planetarum fiat simplicior, per unam simplicem lineam Ellipticam; sed, quòd insuper tot superflui circuli, sive Epicycli profus removeantur, simulque motus contrarius centrorum evitetur.

Cur Autor motum Luna non per orbitam Ellipticam explicaverit?

Keppleri hypothefis omnibus est præponenda.

Quæris fortè, Benevole Lector, quam igitur ob rem, hanc Keppleri præstabiliorem hypothefin, præ aliis non elegerim ad explicandum Lunæ motum? Respondeo: siquidem Kepplerus multis inusitatis & difficillimis rebus, terminisque, hac in parte utitur, dum nempe peregrinas æquationes usurpat, partim physicas, partim opticas, opus primum foret ista omnia illustrare, atque ita viam complanare. Namque etiam supponit Kepplerus & demonstrare multum satagit in Epitome Astron. Copern. Solem inter & primarios Planetas, similiter Terram inter & Lunam Solemque, arctissimam esse affinitatem, veluti inter alia corpora Magnetica; sic ut corporibus Planetarum insint, fibræ quædam per diametrum hinc inde directæ, Solem attendentes perpetuò; quarum fibrarum diametraliter extensarum extremitas, altera Kepplero dicitur Solipeta, altera Solifuga; & ejusmodi res multæ incognitæ aliæ; quæ necessario essent explicandæ, priusquam id quod volumus aggredi liceret: id quod sanè hac vice, non sine magno dispendio temporis, contra meum propositum, fieret.

Hypothefis Keppleri intellectui difficultis.

Planetis fibræ quædam inesse magneticæ;

Idcirco verò, uti jam memini, per Epicyclos elegi more Tyconico motum Lunæ explicare; eò quòd spero, non Astronomiæ tantùm Cultoribus quibusvis, sed & ipsis adeò tironibus Tyconicum modum meliùs esse cognitum; taceo fore, ut isthac viâ, magis perspicuè, varias & peregrinas illas omnes inæqualitates Lunares, cujuslibet oculis subjicere multò sit commodius. De cætero perinde est, si hanc vel aliam assu-

Y

mamus

mamus hypothefin, res eodem recedit. Rem ipsam igitur demum aggrediamur, mentionemq; faciamus reliquorum quoq; Planetarum, in quibus cum Lunâ conveniunt, nec quicquam prætermittamus, quod proposito huic nostro inservire possit.

1. Quemadmodum Sol (vel potius Terra) solus omnium Planetarum, in Eclipticâ, absq; omni latitudine, in quamcunq; partem, movetur, & rectè loquendo, cursu suo annuo, veram in Cœlo Eclipticam describit: ita omnes reliqui Planetæ unâ cum Lunâ non in Eclipticâ, sed Zodiaco moventur, qui ab utraque parte Eclipticæ suos certos habet terminos, quousque se se extendat; octo nimirum gradus ab unâ parte, & ab alterâ totidem, adeò ut tota ejus latitudo sit sedecim graduum. Quos Limites, Planetæ nunquam excedunt, sed in iis variè cursus suos agunt, non autem uti Sol (Terra) in Eclipticâ, vel in circulo quodam Eclipticæ Parallelo; sed in Eccentrico, seu in Eccentrepicyclis Eclipticam obliquè secantibus, hoc est, super axe ac Polis ab Eclipticæ axe diversis.

2. Proinde, cum in Eccentrico, & non in Concentrico moveantur, idcirco etiam certas suas habent Eccentricitates, quamvis unus majorem habeat altero; quæ Eccentricitas nihil aliud est, quàm linea centro Terræ, vel Solis & centro Eccentrici, intercepta: in Lunâ solummodo est distantia centri Eccentrici à centro Terræ. Hinc, ut & ratione Epicyclorum (sicuti suo loco docebitur) Planetæ cum Lunâ modò velociores, modò tardiores apparent; similiterque modò remotiores, modò propinquiores Terræ existunt. Quod punctum à centro Terræ remotissimum vocatur Apogæum, & centro Terræ vicinissimum Perigæum, nempe in Lunâ: Punctum autem à centro Solis remotissimum, dicitur Aphelium, vicinissimum Perihelium. Vtriusque etiam generis puncta, aliàs dicuntur Apfides, summa scilicet & ima, Arabicis Astronomis Aux & oppositum Augis: Puncta autem ab Apogæo & Perigæo æqualiter remota, dicuntur puncta mediæ distantiæ, vel mediæ remotionis, sive puncta intermedia.

3. Orbitæ Planetarum, ut & Lunæ, Eclipticam obliquè interfecant, in duobus punctis oppositis, quæ puncta, peculiari nomi-

Zodiaci Latitudo.

Planeta præter Solem, habent suas Eccentricitates.

Cur Planeta jam velociores, jam tardiores apparent?

Quid sint Apfides?

De Nodis

nomine, Nodi appellantur; quorum alter evehit Planetam Boream versùs, alter eum devehit Austrum versùs: unde prior evehens, posterior devehens dicitur. In Lunâ hos nodos Astronomi, evehentem quidem, caput; devehentem, Draconis caudam appellant. Hinc ergo sequitur, quando Luna, ut & reliqui Planetæ, in ipsissimis versantur nodis, quòd simul in Eclipticâ existant; quando autem à Nodis nonaginta gradus removentur, quòd tunc ab Eclipticâ quàm longilimè sint remoti; quæ remotio maxima revera Latitudo Planetarum est, seu maxima inclinatio Limitum. Aliàs illi Limites seu Ventres appellantur: quorum duo sunt, Limes nimirum Boreus & Austrinus; illorum maxima Latitudo, nempe in Lunâ, quando est intra copulas, se se extendit ad quinque gradus, extra copulas autem fit 17. minutis major, secundùm Tychonem, verùm ut vult Keplerus, fit ea 18. minutis major.

4. Nodi Lunæ cum centro Terræ, in eandem rectam lineam coincidunt; non semper autem in uno eodemque loco commorantur: quod beneficio Eclipsium, (quæ se se continuè in locis Zodiaci occidentalioribus obtulerunt) elapsis aliquot seculis deprehensum, eos paulatim, in antecedentia signorum, sub Eclipticâ parallelis moveri, iterumque restitui, ad idem punctum Longitudinis Zodiaci, in annis Ægyptiis, secundùm Tychonem 18. diebus 223. horis 6. ita ut singulis diebus retrorsum moveantur $\dot{\iota}$. 10'. 46". 39"^m: secundùm Keplerum autem in Annis Ægyptiis 18. diebus 228. hor. 3. 50': ut igitur motus diurnus Mediocris $\dot{\iota}$. 10'. 38"

5. Apogæum Orbitæ Lunæ Eccentricæ, movetur secundùm signorum consequentiam, restituiturque ad idem punctum longitudinis Zodiaci in Annis Ægyptiis 8. diebus 311. horis 6: diurnus Apogæi sub Zodiaco est $\dot{\iota}$. 4'. & Horarius 12".

De motu Apogei.

6. Moveretur Luna in antè nominato Eccentrico, motu proprio secundùm Eclipticæ ductum sphaeræ fixarum, & quidem irregulariter, respectu centri Mundi, hoc est, modò velociùs, modò tardiùs; qui motus aliàs dicitur longitudinis, seu media Lunæ Longitudo ab Ariete, sive Æquinoctio: interdum etiam hanc longitudinem aliis insigniunt nominibus, prout scilicet

*De longitudi-
dini variis
nominibus.*

licet ratio id efflagitat. Nam, si hic motus ad Nodos, vel Limites referatur, tunc à Kepplero Argumentum, vel Anomalia motus Latitudinis Lunæ nominatur; quæ nihil aliud est, quàm arcus Eclipticæ, interceptus, inter locum Nodi Ascendentis (vel Limitis etiam Borei locum, Copernico) & inter centri corporis Lunæ verum locum Eccentricum ad Eclipticam reductum; completurque diebus 27. horis 5. f. 36". Diurnus igitur mediocris motus Anomaliæ Latitudinis est 13. 46". Horarius 33. f. Keppl. in Epitom. Astron. pag. 788. Sin hic Motus ad Solem referatur, tunc æqualis longitudo, vel Elongatio Lunæ à Sole, dicitur. Estque arcus Eclipticæ à medio loco Solis, ad medium locum Lunæ s. s. s. numeratus. Quando autem ad Apogæum refertur Kepplero hic motus dicitur Anomalia soluta vel inæqualitas orbitæ suæ. Periodum hanc, secundum signorum ordinem motu inæquali absolvit, priusquam iterum ad lineam apsidum revertitur, peractis diebus 27. hor. 13. 18. 35". motu medio; quod similiter variatur propter inæqualitates menstruas. Diurnus ergo mediocris Anomaliæ solutæ est (ut & in Epicyclo primo) 13. 54"; & Horarius 42. 40".

*De Mensesyn-
odico & Pe-
riodico.*

7. Etenim, cum hic motus, à certo quodam puncto Eclipticæ vel à loco Solis, seu ejus puncto opposito numeretur; hinc etiam duo diversi Menses Lunares oriuntur apud Astronomos; primò: Mensis Periodicus, secundò, Mensis Synodicus. Periodicus Mensis est spatium temporis, quo linea motus Lunæ, ab eodem circulo Latitudinis, immobiliter ad certum Eclipticæ punctum affixo, digressa, reditu peracto revertitur ad eundem; quod fit in 27. diebus, horis 7. 43. 5. 8". mensurâ æquabili: Diurnus est 13. 10. 33": Horarius medius 32. 56. 30". Synodicus Mensis est spatium temporis, intra quod linea motus Lunæ à circulo Latitudinis, in quo linea motus Solis (vel ejus puncti oppositi) digressa, circuitu peracto, revertitur ad eundem. Dicitur etiam Lunatio; quia intra hoc tempus, Lunæ orbis & impletur successivè lumine, & vicissim evacuatur. Periodus Mediocris absolvitur diebus 29. horis 12. 44. 3. 11". Separatur Luna à Sole dietim angulo grad. 12. 11. 27. in horâ 36. 26. 37. 1/2 ratione mediâ. Itaque in anno existunt Lunationes 12. & ultra gr.

132.45.min.de tredecima Kepl.in Epit.Astron.pag.789. Hic Mensis autem Synodicus non semper est æqualis : verùm hac de re, impostertum dicetur; ubi quoque de inæqualitatibus Mensuris quædam proferentur. Nunc de motu Lunæ proprio loqui pergamus.

8. Quandoquidem igitur Luna (quemadmodum ex antè dictis patet) non omni tempore in orbitâ suâ, vel Eccentrico, uniformiter movetur, itaque ad salvandam talem irregularitatem, initiò duos excogitaverunt Epicyclos. Primum Epicyclum, nempe Majorem, super Eccentricum collocant, ita ut centrum ejus secundùm ordinem signorum moveatur. In hujus Epicycli primi peripheriâ, iterum quendam minorem Epicyclum, nempe secundum constituerunt, adeò ut, hujus centrum in peripheriâ majori, motu tamen contrario, contra s. s. feratur, ab Apogæo parte superiori incipiendo, & quidem longè velocius, quam centrum Epicycli primi; sicuti ex sequentibus constabit. Tandem primum sequitur corpus Lunæ, in illo Epicyclo secundo, quod iterum in consequentia signorum, à Perigæo Epicycli secundi incipiendo circumvolvitur partem versùs superiorem. Cùm autem nondum sufficiat, ad exprimendum omnem motum Lunæ, idcirco adhuc alium finxerunt circellum (reliqua ut taceam, quæ suo loco referentur) circa Terræ centrum, in quo centrum Eccentrici movetur. Sic, ut perpetuò tempore veræ Conjunctionis & Oppositionis, centrum Eccentrici cum centro Terræ unum idemque sit; postea sursum, dextram versùs secundùm seriem signorum paulatim agitetur; adeò ut tempore Quadraturæ centrum Eccentrici in parte circelli superiori, à centro Terræ maximè remotum existat, & sic deinceps. Denique, ut omnes inæqualitates accuratè explicarentur, Tycho adhuc alium minorem circellum excogitavit in Eccentrico; in cujus diametro centrum Epicycli primi, modò sinistram versùs, modò dextram versùs libratur, motu tamen ad circularem analogo, cujus vel meminisse tantùm hic, satis esto. Melioris cognitionis gratiâ, figuram præsentem ipsam contemplabimur, hosque circulos, Epicyclos, motusque varios unâ exponemus; itemque


Ad salvandam irregularitates Lunares, alii, diversos excogitarunt Epicyclos.

Motus Lunæ proprius explicatur.

verò oculis etiam subjiciemus situm Lunæ tum intra Copulas, hoc est, in Conjunctionibus & Oppositionibus, tum extra Copulas; omnes pariter terminos, quorum facta est mentio, & quicquid adhuc scire magnoperè interest, isthac occasione explicabimus.

Theoria Luna. schemate explicatur.

9. Sensus genuinus hujus Theoriæ hic est: 1. A est centrum Terræ, per quod ex centro B circellus A D C E du-



ditur, in quo movetur centrum Eccentrici F, O, P, T, Q, H, sic, ut in omnibus veris Oppositionibus & conjunctionibus semper in A existat, postmodum per D sursum feratur in C: quo in loco, tempore Quadraturarum perpetuò constituitur.

2. Centrum F Epicycli primi I H G O, initio in diametro R S circuli R S V libratur. tum R versùs, tum S versùs, motu tamen ad cir-

cularem analogo, uti diximus: posthæc, centrum F Epicycli primi, unà cum Epicyclo secundo & corpore Lunæ P versùs, secundùm seriem signorum circumducitur. 3. In peripheriâ Epicycli primi, centrum Epicycli secundi K L M N movetur, hoc modo, quando Luna in Apogæo, centrum in G versatur, postea motu contrario in antecedentia per L H, Perigæum I versùs fertur: utrumque tamen centrum, simili cursu progreditur, & æqualibus temporibus, conficiunt similes arcus, vel æquales, ad centra sui motus angulos. Ad Perigæum autem I veniens, apparet jam secundùm s. s. sursum usq; ad Apogæum

gæum progredi. Itaque centrum Epicycli secundi semper in semicirculo inferiori H I O secundum ordinem signorum progreditur, & in semicirculo superiori O G H contra seriem signorum. 4. In hoc Epicyclo secundo, Luna primum ipsa movetur, & quidem sic; quando centrum Epicycli secundi est in G, Apogæo nempe Epicycli primi, tunc Luna versatur in K, in Perigæo, ut ita dicam, Epicycli secundi, quod in omnibus Conjunctionibus & Oppositionibus contingit. Quando autem centrum Epicycli secundi, ad H & O pervenit, quod fit in omnibus Quadraturis, tunc Luna in Apogæo Epicycli secundi existit. Quod si verò Luna inter Conjunctionem, vel Oppositionem, & Quadraturas sita sit, aliter se se res habet, quemadmodum ex figurâ sequenti clariùs elucescet; ut & hoc, Lunam nunquam à Terrâ elongari intervallo toto A M. Cùm autem Luna in Perigæo extat, centrum Epicycli secundi G in I situm est, tanquam in Perigæo Epicycli primi, & Luna respectu Terræ centri A, in Epicycli superiori parte secundi M; quod benè notetur. Motus igitur Lunæ in hoc Epicyclo secundo, ad centrum Epicycli primi duplus est; hic motus qui in illo Epicyclo primo conficitur, à quibusdam nominatur Anomalia Eccentrici, ab Alphonsinis centrum Lunæ, & duplex longitudo, vel duplicata distantia Lunæ à Sole; quæ nihil aliud est, quàm mensura arcus secundi Epicycli, inita ab ejus Perigæo K, ad Lunare corpus per L secundum sign. sequelam. Idcirco cùm motus Epicycli secundi, duplus sit ad motum Epicycli primi, propterea etiam Luna hunc Epicyclum bis percurrere potest, priusquam centrum Epicycli secundi & primi semel tantum circumferatur, ad lineam medii motus Solis. Hinc fit, uti jam dictum, quòd Luna semper in omnibus mediis Conjunctionibus & Oppositionibus in Perigæo Epicycli secundi conspiciatur, in Quadraturis verò in Apogæo, illius Epicycli, à centro Epicycli primi, puncto remotissimo, ubi etiam majores inæqualitates, & apparentiæ differentias efficit, quàm in mediis Conjunctionibus, & Oppositionibus. Proportio Radiorum Epicyclorum, & Eccentrici Lunæ hæc est: qualium partium Semidiameter Orbitæ Lunæ A F est 100000. talium est radius Epicycli primi

Proportio Epicyclorum & Eccentrici.

mi


mi FG 5800. & Radius Epicycli secundi, GM 2900. Radius circelli AB est partium 2174. ,R F autem radius nimirum minoris circelli tantum 40¹ minut. Secundum hanc proportionem orbium, angulus primæ inæqualitatis non major existit in omnibus Pleniluniis & Noviluniis grad. 4. 18. 30. , at in Quadraturis grad. 7. 28.

Cir Luna
Apogæa tard-
da?

10. Ex hac Theoriâ, & illis, quæ jam dicta sunt, ferè omnes inæqualitates & Variationes Lunares intelligi & demonstrari possunt; unde nimirum Luna in Apogæo tardior appareat, quàm in Perigæo? Id quod inde oritur, quia centrum Epicycli secundi in Antecedentia, hoc est quasi retrorsum fertur, uti notum, ut & Luna ipsa, infimam Epicycli partem percurrens; quod fit circa Apogæum, vel Perigæum Epicycli secundi. E contrario Luna existente in Perigæo; & centro Epicycli secundi G, in inferiori parte Epicycli primi I, centrum Epicycli secundi G, non solum in consequentia movetur, sed & Luna ipsa simul, centrumq; Epicycli primi, adeò ut tres velocitates concurrant: necesse igitur est Lunam in Perigæo multò velociorem apparere, quàm in Apogæo. In punctis mediæ remotionis, motus videtur mediocris, quia inibi circulatio in Epicyclis, nec adversatur, nec juvat, motum centri Epicycli primi F, extra autem hæc loca, motus aut crescit aut decrescit proportionaliter, prout in hac figurâ majori conspicitur. Secundò, facile etiam hinc colligitur, quare Lunæ diameter in Apogæo minor, quàm in Perigæo appareat? eò nempe, quòd longiùs tunc ab oculo nostro sit remota. Quantæ autem sit magnitudinis diameter tum temporis, circa finem hujus Capituli indicabitur.

11. Rem, ut eò clarior (cùm per se satis sit obscura) evadat, adhuc alio declarabo Schemate, ex quo non modò Lunæ constitutio in Apogæo, scilicet apud b, sed & in Perigæo in inferiori parte apud i cernitur: insuperque, quænam sit ratio, motus centrorum Epicyclorum & duplicatæ distantie nimirum m > & hujuscemodi? Omnes quidem variationes, casus, & inæqualitates, in hanc unicam figuram compingere haud

haud potui, propter linearum confusionem : quamobrem circellum Eccentricitatis omisi, & A tantum, tanquam centrum Terræ retinui, neq; circellum librationis in Eccentrico depinxi.



Aut. Sulp.

Linea, quæ transit per centrum Epicycli primi b, ut in hac figurâ i A b, lineam indicat Apogæam, omnes lineæ minores omnium figurarum, quæ ex centro Epicycli primi, per centrum Epicycli secundi feruntur, itidem sunt lineæ Apogæi. Omnes autem Lineæ ex centro A, per corpus Lunæ transeuntes, verum locum Lunæ in Eclipticâ monstrant : Angulus c A, vel d A, (ut & reliqui) est Prosthaphæresis Epicyclica; Prosthaphæresin Eccentricitatis hac vice delineare haud potui, cum illâ etiam opus hoc tempore non habeamus.

12. Denique plura alia dicenda restarent, si omnia & singula,

Z

la,

Mensis Synodici unde varietur?

la, quæ ad motum Lunæ spectant, & ex hoc oriuntur, plenè pertractare nobis propositum esset; sed id adversatur impræsentiarum, uti jam sæpius memini, instituto meo: siquidem etiam opinor, hæc quæ breviter dicta sunt, huic Selenographiæ sufficere. Attamen de inæqualitate Mensis Synodici, de quo jam ex parte facta est mentio, pauca adhuc addam: impossibile enim est, absque Mensis hujus cognitione, Phases sequentes rectè intelligere. Proinde si hi Menses Synodici ab omni parte sibi ipsis essent æquales, utique & Phases cujuslibet Lunationis forent consimiles; atqui has maximè variare, sequentes observationes satis superque demonstrabunt. Causa hujus variationis, est inæqualitas utriusque Sideris, tam Solis, quam Lunæ, ut Keplerus loquitur. Nam quod Solem attinet, ab eo ætate, cum est tardus, & ejus motus circa suum Apogæum, Menses proveniunt breviores, quia Luna Solem citius assequitur: hyeme circa Solis Perigæum menses sunt longiores, quia tardius Luna Solem velocem assequitur. Rursum altera causa est Luna, tarda cum sit in Apogæo suo, velox in Perigæo: tardius igitur illic, quam hîc, cæteris paribus, conficit residuum illud, quod illi superest ad Solem, supra confectum reditum Anomalicum. Compositis igitur in unum causis, cum Sol est Perigæus, Luna Apogæa, mensis est ferè 30. solidorum dierum, (deficiunt enim horæ tantum 4. min. 23.) vicissim, cum Sol Apogæus, Luna Perigæa, mensis habet dies tantum 29. horas 6. min. 42. Quod si à Quadrâ numeremus ad quadram: major esse poterit Mensium inæqualitas. Potest enim semissis Mensis à quadrâ ad quadram excurrere proximè ad dies sedecim: semissis alter contrahi ad dies tredecim cum dimidio, paulò plus. Apogæa verò Luminaria faciunt Mensem D. 29, Hor. 15. min. 7. longum; Perigæa D. 29. Hor. 10. min. 24. longum.

Quanta horum Mensium sit differentia?

Quid sit Mensis Synodici?

13. Cæterum, cum hoc loco de Mense Synodico dictum sit, qui nil nisi Lunatio ipsa est, vel tempus illud, in quo omnes Lunationes, vel Lunæ Illuminationes, & luminis vicissitudines, ab unâ Conjunctione usque ad alteram, fiunt: idcirco haud absolum opinor, eadem operâ etiam diagrammate quodam decla-

declarare, unde tam variæ luminis Lunæ vicissitudines, & phases orientur, & quænam hujus rei sit ratio? quandoquidem per se satis abundè constat, Solem tanquam fontem luminis, perpetuò, dimidiam partem corporis Lunæ circiter, illuminare, & nihilominus, teste experientiâ, nec phases semper uniformes, nec perpetuum Plenilunium nobis in conspectum venit; ratio verò est, quòd nobis non semper, pars illa dimidia Lunæ illustrata obvertatur, excepto tempore veræ oppositionis, quo totum Lunæ hemisphærium illuminatum conspiciamus; alio autem tempore, nunquam: idque ex Schemate sequenti liquidò constabit.

Unde Phasium vicissitudines oriuntur?

In quo A Solem repræsentat, B Terram, vel potiùs locum verum oculi nostri; C, D, E, F, G, H &c. Lunam. Etenim, certissimum quidem, Solem omni tempore, partem dimidiam Corporis Lunaris circiter, radiis suis illuminare, illud nempe hemisphærium, quod Solem respicit, hoc est, partem illam, quæ istis duabus lineis T P, & V R Solem versùs comprehenditur: rursum, pars illa Lunæ averfa, scilicet P, S, R semper obscura & caliginosa conspicitur, quia radii eò perungere nequeunt.

Quomodo Luna crescat & decrescat? schemate representatur.

Sine ullâ contradictione, etiam verissimum est, quòd ex terrâ B, æque circiter dimidiam Lunæ partem (si tum temporis fuerit illustrata) spectemus, scilicet S, R, Q, vel illud, quod angulo nostro visionis S, B, Q comprehenditur. Cùm autem pars illa, quam angulus prædictus complectitur, tantummodo semel, menstruo spatio, tota illuminetur à Sole, idcirco nec unquam tota, nisi in ipso Plenilunio cernitur, tum nimirum, quando Lineæ visionis B Q, & B S, cum duabus illis illuminationis T P, & V R, rectè antrorsum versùs procedentes, corpus Lunare, circiter in similibus punctis tangunt, sicuti videre est in figurâ I. In figurâ enim oppositâ C, hæ dictæ lineæ, ferè simili modo Lunam tangunt; hoc tamen discrimine, quòd Lineæ visionis B Q, B S contra Solem procedant, dum faciem nostram Solem versùs dirigere sit necesse, quod fit in omnibus conjunctionibus, utpote in figurâ C; quo tempore de hemisphærio Lunæ illuminato, nihil quicquam spectatur, cùm totum planè respectu nostri sit aversum. Z 2 In

In figurâ secundâ signorum seriem versûs, quando Luna jam paululùm à Conjunctione est progressa, tunc pars aliqua hemisphærii illuminati se se detegit, quæ non major est particulâ R Q Angulo R B Q, vel lineâ illuminationis VR & visionis B Q comprehensâ. Pars quidem P Q, etiam à Sole illuminatur; sed non sufficienter nobis obvertitur, quò in conspectum venire possit: quamobrem & simplicibus tantùm lineis, in omnibus Lunæ figuris, est expressa, ut eò citiùs animadvertatur, quicquid à Sole illustratur, & à nobis minimè conspicit possit; pars autem illa lineis nudata, semper cernitur.


Pars luna illustrata crescit vel decrescit, pro majori vel minori elongatione Lunæ à Sole.

Quantò igitur longiùs Luna digreditur à Sole, tantò majus apparet incrementum luminis, oculo nostro, quia angulus R B Q, magis magisque se dilatat; sicuti videre licet in figurâ E & omnibus sequentibus, usque ad Plenilunium I: postmodum in eâdem proportione hic angulus decrescit, uti antea creverat; quod manifestè in K, L, M, N, O, deprehenditur. Circa F & M, Quadraturæ se se offerunt; Luna namque ibidem 90. gradus à Sole elongatur: pars quidem illuminata conspicua, in utraqûe figurâ paululùm major, quàm revera esse debeat, apparet: ratio autem est, quòd in hoc Schemate, veræ proportionales Solis & Lunæ, ut & distantiarum Terræ, Lunæ, & Solis minimè fuerint observatæ. Non est igitur, quòd hæ Phases in minimis particulis considerentur, nec multùm interest, dummodo in hac figurâ incrementum, & decrementum clarè satis sit explicatum.

Res ut eò manifestior evadat, aliam adhuc apponere libuit figuram, ad repræsentandum verum, tam Lunæ crescentis, quàm decrescientis aspectum, qualis ejus nempe in Cælo sit positus, & quomodo in suo Eccentrico crescat & decrescat? Vbi & apparet, Lunam modò sinistram versûs cornua extendere; cum videlicet Sol ad dextram est situs; modò dextram versûs cornua vertere, Lunâ nimirum decrescente & Sole ad sinistram existente. Nam Luna semper cornibus à Sole averfis splendet.

Cornua Lunæ tum orientium, tum occidentium respiciunt.

Quem-



Quemadmodum igitur diversissimæ Phases Lunares dantur, pro variâ Lunæ à Sole elongatione, ita & Astronomi, diversa nomina melioris distinctionis causâ ipsis imposuerunt. E. g. Quando Luna in verâ conjunctione Solis apud C, versatur, tunc appellatur, Luna Silens, Nova, Vacua, Sitiens, Luna extincta, Novilunium, Neomenia, Interlunium, Nox illunis. Quamprimum autem crescere incipit, Accensio luminis Lunæ vocatur; postea Corniculata, Novacularis, Falcata, Curvata in Cornua. Quando dimidiâ parte illuminata existit, Dimidia, Secta bifariam, Dimidiata, Bifida, Bisecta, Quadra, Quadrata, Quadratura, Semiplena, Dividua, Æquâ portione divisa, dissecta. Posthac, Gibba, Gibbera, Gibbosa, Gibberosa, utrinque Gibbosa, utrinque Curva, utrinque Prætumida. Pleno cum imbuitur lumine, Luna Plena, Luna pernox, Plenilunium, Immenâ pleno orbe nominatur &c.


Phases Lunares variæ sortuntur nomina.

Pariter: verò, cum Selenographiâ hæc meâ, variis etiam multisque abundet Phasibus, ideo & necessarium duxi, quamlibet peculiari insignire nomine, eò, ut melius distinguerentur omnisque confusio evitaretur.

Phasis, quæ primo statim post conjunctionem die conspicitur, Luna prima ac novissima à me nominatur; Secunda, Luna Corniculata; Tertia, Luna falcata; Quarta, Luna Cornigera; Quinta, Luna curvata vel cornuta aut concava; Sexta, Luna Lunata, quæ plerumque quando quinque dierum est, hoc nomine appellatur; Septima, plusquam Lunata; Octava, Luna Adolescens; Nona, Luna juvenis; Decima, Prima Quadratura; Undecima, Luna plusquam Bisecta, seu à Quadraturâ recens; Duodecima, Luna Gibbosa; Decima tertia, Luna in orbem insinuata, tempore nimirum Trigoni Solis; Decima quarta Luna incurvata; Decima quinta, Luna Gibberosa; Decima sexta, Luna adulta, cum Luna circa hanc phasin ferè lumine plena nudo oculo semper appareat; Decima septima, Luna ad oppositionem vergens; Decima octava, Plenilunium. Hæc sunt nomina omnium Phasium crescentium;

Quibus nominibus Autor phases suas appellaverit?

tium; Phases Lunæ decrefcentis, iisdem distinguuntur nominibus, ordine duntaxat retrogrado, exceptis paucis quibusdam, uti suo loco videre erit.



Phasium Luna decrefcentis nomina.
 Prima Phasis post Oppositionem, nominatur Luna ab Oppositione recens; Secunda, Luna Decrefcens, quia nudo visui jam primùm decrescere videtur; Tertia, Luna Gibberosa; Quarta, Phasis Lunæ incurvatæ decrefcentis; Quinta, Luna in Orbem insinuata decrefcentis; Sexta, Luna Gibbosa; Septima, Luna Gibba; Octava, Luna ad Quadraturam properans; Nona, ultima Quadratura; Decima, Luna à Quadraturâ recens; Undecima, Luna plusquam Lunata; Duodecima, Luna Luna-

Ante Scilicet

Lunata; Decima tertia, Luna senescens seu curvata; Decima quarta, Luna cornigera; Decima quinta, Luna Falcata; Decima sexta, Luna Corniculata; Decima septima, Luna Senex in Conjunctionem propendens; Decima octava, Novilunium seu Interlunium est. Hæ sunt Lunæ, tam Crescentis quàm Decrescentis Phases, quæ ex diversâ Elongatione à Sole, suam ducunt originem.

Aspectus Lunæ, & Solis, quod attinet, pariter ex prædictâ Elongatione oriuntur; suntque certus stellarum inter se positus ac situs in Zodiaco; alias dicuntur configurationes: horum aspectuum Veteribus quinque tantummodo fuerunt: Conjunctio nimirum, Oppositio, Quadratus, Trigonus & Sextilis. Quotuplicia sunt Aspectuum genera? Keplerus verò adhuc alios excogitavit octo, ita ut, secundum ejus sententiam, Aspectuum sint tredecim, qui in tres distinguuntur Classes seu Ordines, in primum nempe, secundum, & tertium ordinem. Primi Ordinis Aspectus reliquis sunt potiores ac fortiores, quales habentur: Conjunctio, Oppositio, Quadratus, Sextilis, Semisextus & Trigonus. Secundi ordinis: Quintilis, Biquintilis, Quincunx, Decilis, Tridecilis, seu sesquintilis. Tertii Ordinis: Octilis, & Sesquadrus, vel Trioctilis. Aspectuum distinctiones.

1. Conjunctio est Aspectus, quo stellæ ex Terrâ conspiciuntur, in eodem Zodiaci loco & gradu conveniunt; notatur hoc signo σ . Quid sit Conjunctio?

2. Oppositio est Aspectus, quo stellæ, è diametro positæ, interveniente Terrâ, integrâ Zodiaci medietate, distant, hoc est, 180. gradibus. Nota ejus est ρ . Hæ Conjunctiones & Oppositiones, Solis & Lunæ, plerunquæ etiam Syzigia appellantur: reliqui Aspectus autem configurationes. Oppositio.

3. Quadratus, est Aspectus, quo stellæ, quadrante Zodiaci, sive arcu grad. 90. ab invicem removentur: cujus nota est \square . Quadratus.

4. Sextilis, est Aspectus, quo stella, sextâ Zodiaci parte, sive arcu grad. 60. distant; notatur hoc signo \ast . Sextilis.

5. Semisextus est Aspectus, quo stellæ duodecimâ Zodiaci parte, sive arcu 30. grad. ab invicem distant; quem hoc signo μ notare placuit. Semisextus.

6. Tri-

- Trigonus.* 6. Trigonus, seu Trinus, est Aspectus, quo stellæ trientis Zodiaci, sive arcus graduum 120. intervallo, inter se distant; cujus nota est Δ .
- Quintiliv.* 7. Quintilis est Aspectus, quo stellæ, quintâ Zodiaci parte, sive arcu grad. 72. distant: quem hoc signo \circ notare placuit, cum tot sint latera Pentagoni.
- Biquintiliv.* 8. Biquintilis est Aspectus, quo stellæ, arcu grad. 144. ab invicem removentur: qui latera Pentagoni bis æquat, hoc est, quæ stellæ duplo interstitio, quàm in aspectu Quintili ab invicem distant: propterea & hoc signo distinguere volui hunc aspectum $\overset{\circ}{\circ}$.
- Quincuncx.* 9. Quincuncx est Aspectus, quo stellæ 150. gradibus ab invicem sunt remotæ, quinque nimirum unciis Zodiaci: vel qui Aspectus quinque Semisextos æquat. Idcirco quàm optimè ipsi hoc signum convenit \perp .
- Deciliv.* 10. Decilis seu semiquintilis est Aspectus, quo stellæ decimâ Zodiaci parte, sive arcu grad. 36. ab invicem removentur; qui tantum dimidiam requirit distantiam Aspectus Quintilis, eam ob causam optimè quadrat hæc nota $\overset{\circ}{\circ}$.
- Trideciliv.* 11. Tridecilis, seu Sesquintilis, est Aspectus, quo stellæ arcu graduum 108. inter se distant, vel qui Aspectus tres exæquat Deciles, aut, quæ stellæ ab invicem tribus decimis Zodiaci removentur. Hunc ergo sic nota $\overset{\circ}{\circ}$.
- Octiliv.* 12. Octilis est Aspectus, quo octavâ Zodiaci parte, sive arcu grad. 45. ab invicem distant, notatur hoc signo $*$.
- Sesquadrus.* 13. Sesquadrus, seu Trioctilis, est Aspectus, quo stellæ 135. gra. distant; quod spatium æquale est, tribus interstitiis Aspectus Octilis, vel uno & dimidio quadrato; hunc sic notabis $\frac{1}{2}$ vel $\overset{\circ}{\square}$.
- Alia Aspectuum divisio* Hi antè nominati tredecim Aspectus, ab acutissimo Keplero adhuc aliter distinguuntur, in Harmoniâ Mundi lib. 4. in quinque scilicet gradus efficacitatis. Primus & fortissimus gradus efficacitatis ipsi est, Conjunctionis σ , & Oppositionis ρ . Secundus gradus in Aspectuum efficacitate, est Quadrati \square . Tertius efficacitatis est Trini Δ , Sextilis $*$, & Semisexti \perp . Quartus in efficacitate configurationum gradus est Quintilis \circ , Biquintilis $\overset{\circ}{\circ}$, & Quincuncis \perp Quintus, ultimus & imbecillissimus

simus Aspectuum gradus est Decilis $\frac{1}{10}$, Tridecilis $\frac{1}{30}$, Octilis *, & Trioctilis *. De quibus in antè dictâ Harmoniâ Kepleri plura habentur.

Hactenus breviter diximus, de illuminatione Lunæ, illius variis Phasibus, Phasiumque nominibus, ut & de diversis illius Aspectibus, quæ ex motu Lunæ & situ vario, respectu Eclipticæ oriuntur: nunc in gratiam etiam Astrophilorum, quemadmodum in Schemate antecedenti, diversas illas Phases Lunæ quoad apparentiam repræsentare libuit; ita diversa Phasium nomina, & Aspectuum signa, & arcus in eodem quoque apponere placuit, ut eò feliciter, mediante certâ quâdam tabellâ; intelligantur, memoriæque tradantur. Equidem multæ hîc quæstiones de Illuminatione Lunæ, & quæ ad hanc pertinent, moveri possent, imprimis; cur Luna nunquam minùs illuminetur, quàm cum est plena? & aliæ hujus generis plures; sed has quæstiones in eum locum rejiciendas puto, ubi in specie de Phasibus Lunaribus impostertum agetur.

Sequitur, ut ea ulteriùs persequar, quæ ad Lunam necessariò spectant, quorumque adminiculo Motus Lunæ ille varius, de quo huc usque diximus, clarior adeoque perspicuus Astronomiæ Tironibus redditur, ut etiam à minùs perspicacibus intelligi queat: quæ non postremum obtinent locum P A R A L L A X I V M Doctrina, particula Astronomiæ omnium ingeniosissima. Quanquam non inficior, esse eam Astronomiæ partem omnium etiam difficillimam: quia Parallaxes Astronomis non parùm facessunt negotii, præsertim in Eclipsibus Solis, ita, ut nequicquam mirum videatur, multos, ob magnum & operosum hunc laborem, studium Astronomicum planè deseruisse. Quamvis ante Parallaxium calculus initiato Astronomiæ studio perdifficilis possit videri, tamen ipsi est summoperè necessarius, utpote sine quo non motus Lunæ rectè intelligi, nec Eclipses Solis computari, nec Motus & sedes Cometarum explorari, vel luminarium distantiarum magnitudinesque veræ investigari queunt, quod aliàs, his mediantibus, facillimo negotio, & modo infallibili præstatur; si quædam sensibilis tantùm proportio inter distantiam Phænomeni alicujus, & distantiam à

De Parallaxibus,

*Corpora quæ
altiora, eò
minor existit
Parallaxis.*

centro Terræ ad superficiem, vel inter centrum Terræ & locum observantis animadvertatur : tunc enim semper verus à viso loco differt, ut in Lunâ omni tempore fit, & illis corporibus, quæ nunquam ipso corpore Solis altiores evadunt. Quodcunque autem corpus Sole altius existit, (sicut isti duo Planetæ superiores) in illo nulla est differentia veri & visi loci, cum nullam habeat parallaxin, vel si aliqua adhuc detur, certè tam exigua erit, ut vix ac ne vix deprehendi possit. In Saturno, vix minuti unius trientem exæquat, secundùm calculum Tychonis; prout meminit lib. Progyimn. Cap. 6. pag. 414. In Lunâ Parallaxis omnium maxima animadvertitur, cum Terræ omnium reliquorum æthereorum Corporum sit vicinissima, & haud exiguam remotionis proportionem, ad diametrum Terrenam habeat; adeò ut Parallaxis ejus interdum major 60. minutis esse possit.

Quid Parallaxis sit?


Parallaxis autem, seu diversitas aspectus, aliis Evariatio, Permutatio, Aberratio visus, Copernico Commutatio, est veri & visi seu apparentis loci differentia. Vel quò magis perspicuè describatur : est visi loci, à vero distantia, quæ nascitur à lineâ à centro Terræ usque ad Phænomenon in sublimi conspectum, & lineâ ab oculo vel superficie Terræ, ad idem Phænomenon producta. Quâ definitione, jam ex parte liquet, quid Parallaxis sit, & unde nascatur? inde nimirum, quòd corpora cœlestia, non ex centro, sed à superficie Terræ spectentur. Proinde in illis corporibus cœlestibus, (quorum situs non adeò est sublimis, ut diameter Terrena ad distantiam ejus profus evanescere possit) perpetuò Parallaxis deprehenditur: hoc est, corpora ejusmodi & Phænomena, semper in alio loco sphaeræ stellarum fixarum nobis apparere, quàm si ex centro Terræ observarentur. Hinc sequitur, aliam esse lineam veri loci, & lineam visi, seu apparentis loci alicujus Phænomeni. Linea veri loci est, quæ ex centro Terræ, per aliquod Phænomenon usque ad sphaeram Fixarum protenditur. Linea visi loci est, quæ ab oculo prospicientis, per Phænomenon usque in sphaeram stellatam extenditur, quod ex figurâ mox subsequenti clariùs innotescet.

*Linea veri &
visi loci des-
fert.*

Pr-

Primò autem, hiſce Parallaxibus ita eſt comparatum; ut quò propius eſt aliquod Phœnomenon centro Terræ, eò majorem inferat Parallaxin, remotius minorem, remotiſſimum nullam. Hoc non ſolùm ex Schemate ipſo fit maniſteſtum; ſed ex quibuſcunq̄e objectis terrenis, ſatis ſuperq̄; confirmatur. Porrò, Parallaxes circa horizontem ſunt maximæ, elevato ſidere minores, & ad verticem nullæ: nam, cùm aliquid in puncto Zenith eſt conſtitutum, nulla fit differentia lineæ veri & viſi loci, quo ſimul penitus Parallaxis evaneſcit. Primò autem Schematiſimo hoc declarabimus, priuſquam nos ad diverſa Parallaxium genera conferamus.

In remotiſſimo corporibus Parallaxis evaneſcit



Ecce in figurâ præſenti, infimus circellus Terram repræſentat, A centrum ejus, & D ſuperficiem; circulus extimus C B C hemiſphærium Stellarum Fixarum, E exempli gratiâ Solem, F verò Lunam. Quod ſi poſſibile eſſet, ex centro Terræ corpora illa aſpici, in unâ planè eâdemq̄ue lineâ, ac in Conjunctiõne, viderentur, & quidem in G ſphæræ Fixarum, qui locus, ſimul illorum verus eſſet; quia linea viſionis ex centro Terræ protenditur. Quandoquidem autem horum corporum, ex centro Terræ nullus datur aſpectus, verùm ex ſuperficie duntaxat Terræ D, idcirco tam Sol, quàm Luna, prorfus in alio à priore diverſo loco, apud Fixas nobis apparent: Sol nempe E, tanquam corpus remotius in H, & Luna F, in I.

Linea veri & visi loci, Parallaxis comprehenditur.

Quarum utraq̃ue, Linea loci visibilis appellatur: namq̃ue à superficie Terræ scilicet ab oculo per locum Phœnomeni, usq̃ue ad sphæram Fixarum ducitur. Quicquid igitur inter lineam veri & visi loci interjacet, Parallaxis nominatur. Exempli gratiâ, in hoc Schemate, Solis altioris corporis est G H, & Lunæ F, G I. Cæterùm apparet, verum locum semper esse altiozem viso, seu apparente alicujus stellæ, seu Phœnomeni, ita ut stellæ omnes, ratione Parallaxeos Altitudinis, semper plus justò deprimantur, quemadmodum refractiones plus justò illas elevant, ut apud G vero loco, & H, I, loco viso palàm est.

Parallaxis Phœnomena plus justò attollit.

Secundò, citra exceptionem etiam verum est; quò altiùs corpus quoddam in Cœlo detur, eò minorem inferre Parallaxin, quò autem humiliùs, eò majorem. Exempli gratiâ, Solis E, Parallaxis tantùm est G H, Lunæ verò G I, quæ longè major.

Ex Parallaxi, fit verum Cometarum cognoscitur.

Quo invictò argumento, Aristotelicis demonstratur, Cometas in æthere, & quidem multò altiores, ipsâ Lunâ existere. Idq̃; argumentum nullo pacto unquam refutabunt, ut ut summo-perè contentur. Tertiò, quò ejusmodi corpora horizonti sunt viciniora, eò major etiam fit Parallaxis; quò autem remotiora punctum Zenith versùs sunt Phœnomena, eò Parallaxis minor evadit, donec tandem in lineâ verticali, ut hîc in B, omnino exspiret.

In corporibus declinatoribus parallaxis existit major.

Quartò, quemadmodum Parallaxes, in quadrante orientali ascendendo, magis magisque decrescunt, minoresq̃; fiunt; ita rursùm in tali proportione in quadrante occidentali crescunt descendendo. Quintò, videre hic etiam licet, sicut & revera est certissimum, Parallaxes Planetarum & Luminarium in Apogæo minores, in Perigæo autem multò majores, pro ratione suæ à Terrâ distantiæ, existere.

In Perigæo minima deprehenditur Parallaxis.

Itaq̃ue cùm in Astronomiâ diversa sint Parallaxium genera, propterea planè est opus, differentiam illorum ut attingamus. Primò genera Parallaxium sunt sex: Parallaxis nimirum Altitudinis seu verticalis; Parallaxis longitudinis; Parallaxis latitudinis; Parallaxis declinationis; Parallaxis Ascensionis Rectæ; & Parallaxis distantiæ, sive diversorum horizontum.

Parallaxium differentia.

Parallaxis Altitudinis quid sit?

Parallaxis Altitudinis seu verticalis, est arcus circuli verticalis, per locum verum centri corporis Lunæ, seu alicujus Phœnomeni.

nomen ducti, interceptus inter hunc & locum visibilem; vel est angulus contentus à lineis veri & visi loci Phænomeni.

Parallaxis longitudinis, est arcus Eclipticæ seu ejus paralleli, interjacens inter duos circulos latitudinum, quorum unus per polos Zodiaci, & verum Planetæ locum, alter per eosdem polos & apparentem ducitur: hæc prædicta Parallaxis semper fit in circulo longitudinis, sive cursus stellæ.

*Parallaxis
longitudinis.*

Parallaxis Latitudinis, est differentia veræ & visæ latitudinis, numerata in circulo magno ad priorem perpendiculari, per polos Eclipticæ ducto, inclusa inter duos circulos ad Eclipticam parallelos.

*Parallaxis
latitudinis.*

Parallaxis declinationis, est differentia inter arcus veræ & visæ declinationis.


*Parallaxis
declinationis.*

Parallaxis Ascensionis Rectæ, est differentia, veræ & visæ Ascensionis, sive arcus æquinoctialis, inter arcus veræ & visæ declinationis.

*Parallaxis
Ascensionis
Rectæ.*

Parallaxis distantiæ, seu diversorum horizonum, vel duorum situum, est differentia duorum locorum spheræ stellatæ, in quibus aliquod Phænomenon, ex duabus remotis regionibus, seu certis urbibus apparet; vel potius est differentia, inter duo loca visa, quam metitur angulus in centro atri constitutus.

*Parallaxis
distantiæ.*



Has Parallaxes, ut eò melius intelligas, præsertim illas tres priores, Schemate declarabo. Sit itaq; circulus B G F E C D circulus nonagesimi gradus, B A C horizon, D A E Ecliptica, F H K L circulus verticalis seu altitudinis, F Zenith, G Polus Eclipticæ, G H I ut & G K circuli Latitudinem; primus

ductus est per H, locum Lunæ verum, alter in K terminat, in loco scilicet Lunæ visibili. Est itaque H I, in hac figurâ Parallaxis Altitudinis, quæ differentia est in circulo verticali, veri

& visi loci. Hic bene notetur, hanc Parallaxin altitudinis interdum horizontalem appellari in illo nempe loco, ubi maxima evadit. KI particula Eclipticę parallela, quę duobus circulis includitur latitudinum, est Parallaxis longitudinis, & IH Parallaxis latitudinis. Hę tres Parallaxes triangulum rectangulum constituunt KHI , cujus hypothenusa KH , uti jam dictum, est Parallaxis altitudinis: hęcquę interdum, cum duabus reliquis, & Parallaxis composita, seu commixta nominatur.

*Theoremata
Parallaxium
Lunarium.*

Theoremata specialia, præfertim Parallaxium Lunarium, ex quibus magis ac magis natura & proprietas ejus elucescet, hęc sunt.

1. Lunã Nonagesimum Eclipticę ab oriente gradum occupante, Parallaxis longitudinis ejus nulla est, sed tota in latitudinem extenditur; circulus enim latitudinis tum est verticalis, & dicitur nonagesimus.

2. Luna Zenith capitis permeante, Parallaxis nulla est: verum hoc tantum in Zonã torridã contingit; extra hanc Ecliptica nunquam fit verticalis.

3. Extra Zenith & nonagesimum, utramquę admittit Luna Parallaxin.

4. In Latitudine Terrę Septentrionali ultra tricesimum elevati Poli gradum habitantibus, Parallaxes Latitudinis Lunę semper sunt Australes; contrã fit in plagã Meridionali. Hinc evenit, ut Latitudo Lunę Borealis visibilis, semper fit verã minor, Austrina verò, semper verã major, cum Parallaxis eam perpetuò Austrum versus deprimat. Igitur in Calculo latitudinis Lunę in hisce Regionibus, si latitudo Lunę fit Borealis, & minor Parallaxi latitudinis; è Boreali latitudine verã, fit Austrina visa, tanta scilicet, quantum Parallaxis veram latitudinem superat.

5. In quadrante Zodiaci orientali, inter punctum oriens & nonagesimum ab eo gradum, Parallaxis longitudinis est orientalis, in quadrante verò occidentali, est occidentalis. Ideoque illic longitudinem Lunę visibilem, facit verã majorem, hęc minorem; quia scilicet series signorum sive longitudo Planetarum, procedit ab occasu per meridiem in ortum.

6. Ma-


6. Maxima longitudinis Parallaxis, in signis Meridionalibus, est sub horizonte, in punctis æquinoctialibus, in ipso horizonte, & in septentrionalibus, supra horizontem.

7. Longitudinis Parallaxis, Lunâ versante in quadrante orientali, adhibetur loco Lunæ verò ad Eclipticam reducto; in occidentali aufertur, & sic constituitur apparens seu visa longitudo.

8. In occiduo quadrante sequitur visibilis copula, in ortivo præcedit; cujus discriminis quantitas à Parallaxium varietate est petenda.

9. Parallaxis altitudinis, semper major est Parallaxi declinationis & latitudinis, quæ ex ipsâ nascitur.

Ultimam denique speciem Parallaxeos distantæ, seu diverforum horizontum, ut declaremus, esto in apposito Sche-



mate infimus circellus Terra, A ejus centrum, B certi alicujus loci, vel urbis situs, C itidem statio alicujus longè diffiti loci. Ex quibus stationibus, duo diversi observatores certum quoddam Phænomenon observarent, dico itaq; observatori in B, Phænomenon hoc D, in F apud Fixas alteri verò C in E appariturum. Differentia igitur E F est Parallaxis duorum situum, seu diverforum horizontum, vel potius angulus D B C, cui

*Parallaxis
distantia, in
vertice est o-
mnium ma-
xima,*

cui alter verticalis $E D F$ est æqualis. Cum his igitur Parallaxibus ferè aliter est comparatum, quàm cum Parallaxi altitudinis; nam circa verticem multò sunt majores, quàm circa horizontem, & quò Phænomenon vicinius est horizonti, eò Parallaxis est minor, ut ex iconifimo patet: at contrarium accidit cum Parallaxibus altitudinis; tum enim quoque visa distantia Phænomeni à vertice semper verà est major.

Quomodo autem hæ modò dictæ Parallaxes, ex doctrinâ Triangulorum, diversimodè computari queant, non est hujus loci, ut doceatur; qui tamen rebus hisce delectatur, iisque cognoscendi plus temporis impendere vult, legat Keppleri Astron. Part. Optic. Cap. 9. (ubi multa notatu digna infert, tabulamque etiam parallaxicam, quam per omnes Parallaxes altitudinis, à 66. minutis usque ad unum, hoc est à Lunâ usque ad Solem deduxit) lib. 2. cap. 10. Astron. Danicæ, Crügeri Vranodromum Cometicum, in quo & egregiam tabulam Parallaxicam protulit, altitudine Phænomeni & distantia ejus cognitâ &c. Progymnasmata item Tychonis; quamvis præter nominatos adhuc permulti alii ejusmodi Tabulas Parallaxicas construxerint, sicuti in Ptolemæo, Copernico, Reinholdo, & aliis, videre est.

Luna Parallaxibus est involuta,

Enimvero, quoniam Luna, uti percepimus Parallaxibus perpetuò est involuta; hinc fit manifestum, motum Lunæ verum, ut & aspectum, à viso admodum differre, adeò ut alia sit e. g. Conjunctio seu Oppositio vera Lunæ, alia visa, quæ & tempore non parùm differunt; interdum visa Conjunctio veram antecedit, interdum subsequitur; quemadmodum diximus.

*Quanta sint
Parallaxes
altitudinis
Lunares?*

Reliquum est de Parallaxibus, ut etiam indicetur quantæ parallaxes altitudinis sint, præsertim circa horizontem, tum quando Apogæa, tum quando Perigæa, tempore Oppositionis, Conjunctionis, vel Quadraturarum, existat. Tempore Oppositionis, & Conjunctionis, quando in Apogæo versatur, & 58. semid. Terræ 8. min. à nobis elongatur, tunc Parallaxis ejus horizontalis est 59. min. 9. sec. In Perigæo, quando 54. semid. Terræ 52. min. à nobis removetur, parallaxis est 61. min. 39. sec. At tempore Quadraturæ, Lunâ existente in Apo-
gæo,

gæo, cùm distantia ejus 60. semid. Terræ 36. min. parallaxis est 56. min. 44. sec. In perigæo autem, quando tantum à nobis removetur 52. semid. Terræ, 14. min. parallaxis existit 65. min. 36. sec. hoc est ferè 66. min. : differentia itaque maximè & minimè parallaxeos est 8. min. 52. sec. In Sole, differentia parallaxeos horizontalis non excedit 13. sec. : quia in maximâ remotione parallaxis solummodo 2. min. 54. sec. deprehenditur; in mediâ 3. min. 0. sec. in minimâ 3. min. 7. sec. Qui autem insuper parallaxes illas ad omnes gradus altitudinis, & ad plures diversas distantias à Terrâ extensas scire desiderat, adeat Tabulam parallaxium Tychonis, quàm Progymn. lib. 1. exhibet, ac Solis quidem pag. 80. Lunæ verò fol. 120. Ad propositum nostrum, quæ dicta fuère, sufficere abundè videntur.

*Parallaxis
Solis.*

Nunc ad Refractiones nos conferamus, de quibus etiam pauca dicenda erunt; res hæc itidem maximè est necessaria, ad observationes Lunares rectè instituendas, præsertim verò Altitudines explorandas. Neque mea tamen mens est, Dioptricam hoc loco plenariè explicare; quæ inter alia eximia, nos docet, res parvas longè dilatas, viciniore & majores visui repræsentare, per varii nimirum generis lentes; cujus quoque dioptricæ adminiculo multa alia præclara circa ustionis, picturæ, ac visionis occupationem animadvertenda exhibentur, de his autem omnibus, modò agere, præter viam foret; tametsi capite secundo quædam de refractione lentium dicta sint, quò Lectorem ablego. Nunc verò animus est, tantummodo de Refractionibus Astronomicis stellarum & Planetarum, aliorumq; Cœlestium corporum, aliquid & quidem breviter dicere : de quibus jam olim Veteres verba fecisse legitur, testantibus Alhaseno lib. 7. cap. 3. & Vitellione lib. 10. A nullis tamen Astronomiæ retro-Cultoribus, refractiones ad verum necessariumque usum Astronomicum fuerunt translata, quàm ab illo Nobilissimo Tycho Braheo, & Clarissimo Bernhardo Valtero, quo Astronomiam supra quàm dici potest illustrarunt. Quemadmodum enim absque Parallaxibus, ita nec Refractionibus remotis, ulla vera cognitio motuum corporum

*De Refractionibus,
quarum propositum
nunciat.*

*Tycho &
Waltherus,
Refractiones
Astronomia
applicarunt.*

*Ratione
Refractionis
in corpora plus
jussu elevan-
tur.*

cœlestium, inprimis Lunæ, acquiritur. Parallaxes universa phænomena deprimunt, contra Refractiones illa plus justò in circulo verticali elevant; cum hoc tamen discrimine, quòd maxima pars stellarum à Parallaxibus sit libera; Refractionibus verò, omnia corpora cœlestia & Phænomena afficiantur, nisi puncto verticali sint vicinissima, ut brevi post pluribus dicetur.

Quò autem & hanc doctrinam magis perspicuam reddam; idcirco theoremata & axiomata quædam Optica, & Dioptrica summè necessaria præmittenda duco, (quorum partim etiam jam supra capite secundo, facta est mentio) utpote sine quibus illa, quæ intendo, non intelligi possunt.

*Axioma Op-
ticum pri-
mum.*

1. Omnes radii, per medium aliquod diaphanum sive firarius, sive densius, perpendiculariter, hoc est, ad angulos rectos pertranseutes, irrefracti permanent; contra, si ad angulos obliquos & inæquales incidant, franguntur: &, quò obliquius incidunt, eò sub majori angulo refringuntur: Vitell. lib.

2. propof. 42. 43. & Maurolyc. lib. 1. pag. 36.

*Axioma se-
cundum.*

2. Et quidem ad perpendicularum, radii, si ex medio rariori in densius incidant; sin verò, ex densiori transeant in rarius, à perpendicularo refringuntur. Vitell. lib. 2. prop. 45. & 47. Alhaf. lib. 7. n. 8. Kepl. in Diopt. Axiom. 2. Aguil. lib. 2. prop. 8. fol. 120.

*Linea refra-
ctionis in di-
versis dia-
phanis diver-
simodè re-
fringitur.*


Vnde sequitur, in quod diversis diaphanis linea refractionis terminatur, tot diversis etiam modis fieri refractionem: ita ut nunquam per ejusmodi diversas diaphanitates, quicquam lineam rectam, sed refractam cernere possimus.

Hæc se se ita habere, non solum in Opticis satis superque demonstratur; sed & ocularis testatur experientia: quemadmodum id quoque melioris intellectus causam, tironi Astronomiæ & Opticæ iconismo declarare, haud grave erit.

Circulus $HKLG$ sit quidam verticalis, illud, quod hoc & proximo circulo MBN comprehenditur, medium rarius; spatium punctis undique repletum, medium densius; rursus, quicquid circulo DCO & A interjacet, medium rarius. Porro, linea ABI est perpendicularis, sive radius ad angulos rectos in illa diversa media incidens, irrefractusque permanens.

Radius

Radius autem obliquus LB , per punctum incidentiæ B , in medium densius ex rariori transiens, nisi refringeretur, jure in lineâ rectâ ad F deferretur; verum, cum in puncto B , tanquam



in densiori diaphano ad perpendicularum refringatur PA versus, in C incidit, fitque linea refractionis LCB , & angulus refractionis ad perpendicularum CBF , vel ejus verticalis KBL . Postquam igitur hic radius refractus LCB , iterum in aliud medium, & quidem rarius, descendit, secundâ vice refringitur, & secundum Theorema alterum, à perpendicularo CA (quod itidem perpendicularum est puncti incidentiæ C) quippe ex densiori in rarius transit, estque linea CD , angulus refractionis DCE , angulus GBL , est angulus elevationis alicujus rei supra planum horizontale, vel horizonti parallelum GBH . Ex quibus omnibus apparet, si alicui stanti in C , phænomenon quoddam L , in conspectum veniret, illud non in vero illo loco appariturum; sed in K , loco refracto, qui pariter & visus est. Vera itaque refractionis erit KL , quâ ratione plus justò aliquid elevatur, quando nimirum radii, ex rariori medio venientes, in densius incidunt: ut in adjuncto schemate patet.

*Nunquam,
propter re-
fractiones,
Phænomena
in vero loco
apparent.*

Ad hunc modum cum Stellarum & Planetarum refractionibus est comparatum. Nam, cum extra omnem dubitationis aleam sit positum, Terram nostram aëre impuriori & ma-

*Aër quò re-
motior eò pu-
rior.*

*Tres sunt aë-
ris regiones.*

*Aër modò
crassior, mo-
dò tenuior e-
vadit.*


*Anguli re-
fractionis non
semper in
proportione
sunt aequales.*

*Linea refra-
ctionis Coni-
cam acquirit
figuram.*

teriâ densiori æthere esse stipatam, ratione variarum exhalationum & vaporum ex Terrâ de die in diem prodeuntium. Adhæc verò, quò aër magis à Terrâ removetur, eò purior, quò autem vicinior Terræ, eò crassior & densior, unde necessariò refractionem stellarum subsequi est opus. Aër scilicet convenienter in tres dividitur regiones: 1. nempe in supremam æthere paulò densiorem. 2. In mediam, quæ priorem densitate antecellit. 3. In infimam, omnium reliquarum densissimam. Cæterum, hæ diversæ aëris regiones, non semper etiam erga se invicem æqualem servant proportionem; sed, pro ratione constitutionis, & ascendendum exhalationum, modò talem, modò aliam acquirunt proportionem, hoc est: media aëris regio, hoc tempore crassior & densior esse poterit, alio, ratione scilicet superioris aëris: & media ad infimam omnino etiam aliter se se habere poterit; adeò ut stellarum refractionis non semper sit æqualis, licet in simili distantia vel altitudine horizontali stellæ observentur: nec verò anguli refractionis omni tempore sunt similes, proportioneq; ipsa æquales; quia nempe à diversis istis regionibus aëris procreantur: hinc linea illa curvata refractionis non semper similiter curvatur, nec perpetuò eandem retinet circuli sectionem: sed, ex jam dictis causis, fit potius linea Conica aut Parabolica, aut Hyperbolica, pro refractionis incremento; quod equidem Vir rarâ eruditione Clarissimus M. Albertus Linemannus, Professor Mathematicum Academiae Regiomontanæ, in disputatione de Refractionibus Vranicis, unà cum Eximio Mathematico Iohan. Graves Londinensi, haud præter rem statuit.

Sit in schemate sequenti A Terra, B superficies ejus, à B usque ad C infima aëris regio, à C usque D media, & inter D & E suprema, inter E & F æther, F stella aliqua, cujus vera altitudo circiter H F. Dico stellam illam F, non in ejus vero loco posse conspici, sed in G loco nempe refracto, propter aërem vaporosum terram ambientem, qui in tres regiones (quamvis pro constitutione aëris adhuc longè plura puncta incidentiæ dentur) divisus est. Primò radius ex F E versus per ætherem nimirum irrefractè procedit, in superficie au-
tem

tem supremæ aëris regionis E refringitur, & quidem ad perpendicularum, usq; ad D; deinde, simili modo in superficie mediæ aëris regionis, usque in C; pariter à C ad D. Si itaque



oculus meus in B foret constitutus, stella illa non in vero loco F, sed in G, altiori, spectaretur. Notandum, locum refractum à vero loco in hoc diagrammate nimis esse remotum: quòd autem sic fuerit delineatum, ob faciliorem intellectum factum est. Ex his autem denuo perspicitur, quòd, propter refractiones, omnia phænomena in circulo verticali plus justò altiora appareant, nec ullum Astrum in vero loco apprehendatur; verum potius Astra supra horizontem nobis attolluntur, quæ revera infra latent, quod certè non rarò observatur. Nonnunquam etiam stellam aliquam, per quartam horæ partem, supra horizontem immotam aspiciendam præbent, quale notabile exemplum Illustrissimus Princeps Hassiæ suis ipsismet aspexit oculis, cujus meminit in Epistolâ quadam ad Tychonem: (Epist. Tychon. pag. 22.) Ea stella fuit Veneris, quæ duobus supra horizontem elevata gradibus, videbatur & insuper per 15. min. prorsus stationaria; postmodum autem in momento penitus evanuit: cùm tamen revera, secundùm calculum per duos integros gradus tum temporis sub horizonte latuit. Simili ratione sæpenumero accidit, ut in verâ Luminarium oppositione, tempore Eclipsæ, utrumque luminare sibi ipsi oppositum, & supra finitorem elevatum, conspiciamus, mediantibus videlicet Refractionibus, quod aliàs foret impossibile: eorumque

Medianterefractione, astra sub horizonte latentia aspiciuntur.

Notabilis observatio Veneris.

Interdum, in ipso Oppositionis articulo, tam Sol, quam Luna, conspiciuntur

Exempla nota digna.

spectaculorum exempla passim, tam apud Veteres, quàm Recentés Autores inveniuntur. Exemplum geminum annotavit Plinius libro 2. cap. 13. Aliud Præclarissimus Mæstlinus observavit Anno 1590, die 7. Iulii. Quemadmodum quoque Viro summæ eruditionis Præstantissimo D. Laurentio nostro Eichstadio ejusmodi exemplum paucis ab hinc annis Stetini Pomeranorum Anno 1642. die 15. Aprilis se obtulit, cujus in parvâ suâ Ephemeride ad Annum 1644. his verbis meminit: *Oriente Sole horâ quintâ & unciâ horæ, Luna ad huc plena suo lumine supra horizontem occiduum, etiamsi in diametrali esset oppositione Solis, conspiciebatur, & demum post duo minuta horæ vel circiter occidebat: Hæc ille.* Hoc jucundissimum spectaculum, & nos hîc Dantisci eodem tempore simul præsentibus egregiis aliquot viris, oculis usurpavimus: quod fortassis, etsi id compertum non habeam, alibi aliorum quoque conspectum non effugit.

Refractiones in vertice nulla.

Verùm, ut pergamus viam nostram, notètur adhæc; Refractiones tam Solis, Lunæque, quàm aliarum stellarum, nullo tempore se se usque ad verticem extendere; sed paulatim in vigesimo, trigésimo vel summum, in quadragesimo quinto gradu penitus evanescere; siquidem vapores & exhalationes altius ascendere nequeunt. Quò autem stellæ horizonti viciniores, eò major est refraçtio; postea sensim ascendendo decrescit: enimverò non perpetuò in simili proportione; propter varios ascendentes nimirum vapores. Deinde sicut circa horizontem refractiones velocissimè mutantur, in altiori verò situ pedetentim; sic Parallaxes contrà, circa finitorem, diu similes permanent, ad verticem verò tendendo celeriores mutationem acquirunt. Etiamsi autem refractiones circa verticem planè evanescant, non exinde oritur, quòd nulli prorsus ibidem dentur vapores, sed ex hoc potius argumento colligitur, quòd eo in loco radii per mediâ illa diaphana rectius, imò planè irrefractè, penetrent, & ita nullum angulum refractionis efficere possint.

Cur refractiones circa verticem evanescant?

Insuper etiam nec hæc affectio refractionum in stellis est prætereunda silentio. Etsi altitudo alicujus Phænomeni est æqualis, nihilominus tamen, non ubique locorum, nec omnitem-

tempore, refractionis itidem est æqualis, nec esse potest, propter varias exhalationes. Hanc igitur ob causam, non semper in uno eodemque horizonte, nedum in diversis, similes refractiones existunt; confirmari poterit exemplo; quod vide in Epistolâ Tychonis, pag. 82. & pag. 112. Certo enim certius est, multas dari Regiones, in quibus longè minor deprehenditur refractionis, quàm in his oris Septentrionalibus; utpote in Oriente, circa Alexandriam, ubi spatio aliquot Mensium, nebula vix animadvertitur. Præterea & hoc in stellarum refractione animadversione dignum se offert: quando stellæ refractionibus sunt obnoxia, distantia latitudinis remotiores esse videntur, quàm altitudinis, siquidem inferior duarum stellarum, quocumque tempore magis elevatur, quàm superior; quia in priori angulus refractionis etiam major est. Amplitudo equidem ortiva, & occidua, hanc ob causam major redditur: hinc & dies longiores ratione refractionis Solis habemus, quàm revera esse possunt: mediante enim refractione, Sol tempore matutino citius oriri, vespertino tempore contra seriùs occidere videtur, ita ut calculo nunquam respondeat; nec brevissima nox cum die longissimâ, licet in uno eodemque horizonte, ullo tempore comparari potest. Ex quo item fundamento non minus sequitur, nos verum Æquinoctium & Solstitium nusquam habere, eo nempe tempore, quo id Ephemerides vel Calendaria indicant: nam, secundùm calculum, tum temporis, dies jam plus justò longiores, ratione refractionis, existunt. Si itaq; hac in parte, non tam diligenter & accuratè Refractiones attenderentur, facile verum legitimumque anni spatium nobis perturbaretur. Cæterùm, refractionis Ascensionem & latitudinem in ortu, declinationem & latitudinem meridianas, minuit; contra descensionem & longitudinem in occasu, declinationem & latitudinem Septentrionales, auget. Denique ratione refractionis, Sol præsertim horizontalis, figuram ovalem repræsentat, sic ut, hujus diameter altitudinis, diametro Longitudinis brevior videatur: rationem quispiam haud difficulter ex antè dictis colligere poterit, inprimis ex illis, quæ de Latitudinis & altitudinis Parallaxi commemorata sunt.

*In diversis
horiz. conti-
bus, diversæ
etiam oriun-
tur refractiones.*

*Refractionis
dies reddit
longiores.*

*Ex refractione
Sol induit
speciem ovali
figuræ.*

Tan-

Diversa Astrorum à Tycho elongatio, nullam efficit mutationem.

Tandem etiam necesse est, ut mentio fiat, quantæ veræ stellarum Fixarum refractiones sint, præsertim horizontales: & : utrùm Solis & Lunæ sit eadem, sive an diversa distantia Siderum (ut in Parallaxibus) diversam possit creare Refractionem? Non solum verò Tycho, uti superius memini, primus fuit, qui Refractiones ad usum Astronomicum transtulit, sed insuper magnâ industriâ & curâ hanc rem egit, dum eximiorum instrumentorum adminiculo, per diuturnas assiduas observationes, Refractiones tam in Sole, Lunaque, quàm Fixis, indagavit, & annotavit, Tabulamq; postea construxit, ad singulos gradus altitudinis, quatenus refractione se se extenderet, cœlo sereno & aère defæcatissimo, & quidem Vraniburgi. Invenit itaque maximam Solis horizontalem refractionem 34. min. 0. sec. : Sole autem 15. gradibus altiore, 7. minut. 30. sec. : Sole existente in gradu 30. 1. min. 25. sec. : cùm autem altitudo ejus esset grad. 45. tantùm 5. sec. depræhendit, postmodum verò proflus evanuit. Eodem autore refractione Lunæ horizontalis est 33. min. 0. sec. : in gradu decimo quinto est 8. min. 0. sec. : in trigesimo gra. 1. min. 4. sec. & in gradu quadragesimo quinto, in nihilum plane redigitur. Stellarum refractione est circiter 4. min. minor : horizontalis namque refractione est minut. 30. : circa decimum quintum grad. 3. min. & in vigesimo omnino evanescit. Quæ Refractione convenienter etiam Planetis, uti vult Tycho, sine magno discrimine, applicare poterit. Qui verò ad singulos grad. refractionibus hisopus habet, adeat Tychonis Tabulas Refractionis lib. 1. Progymnasium. Post cujus accuratam tabulæ inspectionem animadvertes, refractiones non dependere à stellarum distantis; aliàs inter Solis & Lunæ, ut & stellarum, major esset differentia. Vnde autem illa prædicta differentia refractionum derivetur, & num alia etiam proportio alibi dari possit? super hoc non inter omnes Astronomos bene convenit.


An diversa sint refractionum species?

Hac occasione quæres : num etiam plura sint genera Refractionis? maximè. Nam in diversas equidem classes, instar Parallaxium distingui possunt. Primò : in Refractionem Verticalem, de quâ abundè satis dictum. Secundò : in Refractionem

nem

nem Ascensionis Rectæ. Tertio : in Refractionem declinationis. Quarto : in Refractionem Longitudinis. Quinto : in Refractionem Latitudinis. Sexto : & Refractionem diverforum horizontum : quæ ex diagrammate apposito clariora reddentur omnia.

Circulus $BELMCD$ repræsentat Meridianum BAC horizontem, $EFGAD$ Æquatorem, LHI circulum verticalem, MHF circulum declinationis per locum refractum



Tab. 3.

Lunæ in H ; MG verò circulum declinationis per locum stellæ I verum, sic ut HI sit refractione declinationis. Hæ tres refractiones, æque tale Triangulum Rectangulum constituunt; uti Parallaxes, cujus hypotenusa semper est Refractio verticalis. Quod si verò segmentum circuli $EFGAD$ pro Eclipticâ assumas, & MF , & MG

pro circulis Latitudinum, tum iterum HI sit refractione verticalis, HK verò Longitudinis & KI Latitudinis. Vltimam quod attinet speciem Refractionis, nempe diverforum horizontum; est differentia illa Refractionis in duobus diversis horizontibus, eodem tempore, Cælo sereno, in æquali altitudine deprehensa. Et tantum etiam de Refractionibus; si autem cuiquam nimis proluxa videantur, quæ de hac materiâ dicta fuerunt, sciat, me tamen vix minimam hujus materiæ partem attigisse. Quod si quis insuper manu ductionem desideret, ad Refractiones quocunq; locorum diversimodè capiendas, tamq; in aëre quàm in aquâ determinandas, & calculo subjiendas, hunc ire jubeo ad cap. 4. Paralipom. Kepl. in Vitellionem. Progym. I. II. & III. & Apiarium VIII. Marii Bettini, &c.

Restat, ut circa finem hujus Capitis, pro ut pollicitus sum, quædam etiam, & quidem breviter, de distantia Lunæ à Terrâ,

C c

ejusq;

ejusq; corpulentia, magnitudine, diametro vera & visibili proferantur; quod summe quidem necessarium duco, tum ad res omnes Astronomicas, tum ad Phases sequentes Lunares, recte & perspicue intelligendas: hanc enim unicam ob causam magna Phasium varietas deprehenditur, de quibus suo loco fufius agendum.

*De distantia
Lunæ.*

Lunam quidem omnium Planetarum, ut & reliquarum stellarum, esse infimam, Terræque vicinissimam, nullus est, qui amplius ignorat; distantiam autem ejus veram, non omnibus esse notam suspicor, cum omni tempore, non unam eandemq; fervet; modo Terræ est vicinior, modo remotior, propter ejus excentricitatem & Epicyclos, ex quibus, Apogæum & Perigæum suam duxit originem. Hanc varietatem distantiarum Lunæ, per assiduas Parallaxium observationes Lunæ Eclipsium, Umbrarum tam Terræ, quam Lunæ, indubitata Cœli contemplatores investigarunt; in primis autem Celebrerrimus Tycho Braheus, hic palmam omnibus fecit ambiguam, uti ex Progymnasmi. liquet; quippe qui tandem invenit, Lunam Apogæam, tempore Conjunctionis & Oppositionis, à Terrâ elongatam esse Semidiam. terræ 58. min. 8. Perigæam similibus temporibus tantum semidiam. Terræ 54. min. 52. Apogæam verò tempore Quadraturæ semidiam. Terræ 60. min. 36. Perigæam, pariterque in ipsis Quadraturis, semid. Terræ 52. min. 14. Sic ut differentia deprehendatur, inter maximam nimirum & minimam à Terrâ distantiam, semid. ter. 8. 12. min. Veteres quidem Tychone superiores, ut Ptolemæus, deinde Copernicus, longè aliam statuerunt differentiam; & ille quidem 15. hic verò 30. semid. terr. Sed, quia id omnibus observationibus & genuinis contemplationibus planè adversatur, idcirco plura de his verba facere intermittam, Tychonis nix sententiâ, cujus distantia observationibus respondent optimè. Fit itaq; ex opinione Tychonis, Luna Terræ nunquam 52. semid. terr. propior, & nunquam 60. semid. remotior.

*Diameter
Lunæ visibi-
lem variari.*

Ex quâ diversâ Elongatione, sive distantia Lunæ à Terrâ & diameter Lunæ apparens, seu visibilis, variatur. Tempore Quadraturæ in distantia remotissimâ apparet diameter ejus visibilis

sibilis minorum 32. min. 32. sec. : tempore Quadraturæ in distantia vicinissimâ 36. min. 0. sec. In conjunctione vel oppositione, Lunâ existente in Apogæo, diameter ejus est 33. min. 9. sec. & in proximâ distantia 34. min. 48. sec. secundum sententiam Tychonis, differentia diametrorum ad min. 4. se se extendit. Quâ viâ autem Diameter Lunæ visibilis sit exploranda, non est hujus loci ut persequar, cum satis abundè hanc materiam pertractaverit, non tantùm Kepplerus, in Astron. Optic. cap. 9. sed & Præclarissimus Gassendus, in Tractatu de Apparente Magnitudinis Solis humilis & sublimis, qui novum planè diametrum Lunarem observandi excogitavit modum; estque hac in opinione, diametrum Lunæ visibilem, existentis in Apogæo, tantùm esse 26. minut. 36. sec. & in Perigæo 31 min. 6. sec. quæ differentia certè à Tychonis multùm discrepat : idque laudatus Gassendus non solum in Epistolâ secundâ pag. 41. ejusdem tractat, sed & in Vitâ Pèreiskii pag. 307. asseveratum ivit.

Iam quod veram Lunæ diametrum, circumferentiam, soliditatem, Terræ & Solis, ut & proportionem Terram inter Solem & Lunam spectat. 1. Si distantiam Lunæ à Terrâ assumas, 60. semid. terr., & ejus diametrum visibilem 33. minut., sequitur, diametrum Terræ (quæ in se continet 1720. milliarum germanica) Lunæ diametro quater vicibus esse majorem, vel accuratius 3³ partibus, in proportione ut 2. ad 7., vel 5. ad 17. Lunæ veræ diametro milliarum germanica 494¹ competunt, quorum quindecim unum gradum terrestrem efficiunt. Datâ autem Lunæ diametro, facillè etiam Geometricè cognoscitur circumferentia ejus, quæ est nempe mill. germ. 1555¹, Superficies convexa 767264, & Soliditas 63171485, milliarum nimirum cubic. Hinc apparet, Lunam revera vicibus 42. esse Terrâ nostrâ minorem, contra Solem vicibus 5848 Lunâ majorem, & Terrâ 140; verùm, ut vult Kepplerus, diameter Solis ad terræ diametrum se habet ut 15. ad 1. Similis quoque proportio inter semidiametrum Terræ, & distantiam Solis à terrâ intercedit, qualis inter corpus, seu amplitudinem terræ, & corpus Solis. Præterea, quemadmodum se

*Diameter
Lunæ in m.
liariis de-
terminata.*

*Circumfe-
rentia & So-
litas Luna
quanta?*

*Proportio
Terram in-
ter & Lunam*

habet corpus terræ, ad corpus Lunæ, ita & distantia Lunæ, à terrâ ad terræ semidiametrum, secundum opinionem Kepplerianam; & quòd diameter orbitæ Lunæ medium sit proportionale, inter semidiametrum orbitæ Solis vel Telluris, & semidiametrum Terræ, lege hac de re Keppl. Epitom. Astron. Copernic. lib. 4. pag. 482. & 491. Sed de his satis.

CAPUT VIII.

DE PHASIUM LUNÆ OBSERVATIONIBUS: de Maculis in specie, & illarum nominibus:

Motu Lunæ Librationis Disci, ejusque Centri, hætenus incognito, & quamplurimis aliis scitu dignissimis.

DE diversis opinionibus, tam Veterum quam recentiorum Philosophorum, quæ Maculas in facie Lunæ, satis prolixè, quantumque requisivit necessitas, capite præcedente sexto, verba fecimus: circaque finem ejusdem, prægnantibus etiam rationibus demonstravimus, quantum maxime eâ occasione fieri potuit; Maculas Lunares, non nisi Maria, Lacus, Insulas, Montes & Valles &c. esse, quemadmodum ibidem videre est. Progrediamur itaque hæc ulterius speculari, minime dubitantes omnibus & singulis Astronomiæ generosè indolis Cultoribus, porro haud fore ingratum, de observationibus ipsarum Phasium, Macularumque ac hujuscemodi rebus plura insuper percipere: namque hac occasione alia notatu digna, utilissimaque, & hætenus incognita, dicentur, disputabuntur ac resolventur; ex quibus certè meo judicio, non parùm utilitatis per universam Sideralem disciplinam manabit.

*Veteres, ad
excolendam
Astronomiã,
omnem mo-
verunt lepi-
dem.*

Majores equidem nostri nihil in se desiderari passi sunt, quin potiùs viribus omnibus sunt annexi, ut nostrâ, posterorumque gratiâ, Regiam scientiarum omnium Astronomiam amplificarent auferentque; sicuti ex superiori capite sexto, satis superque constat: quàm solliciti fuerint, in verâ Lunæ facie, Maculisque explorandis. Verùm enimvero, quamcunque eò impen-

impenderint operam, fuit ea frustra : quippe mediis destituti, nudis duntaxat oculis, cœlestia phænomena aspicere, observare ac contemplari conati sunt : quòd sanè ad tam longè distita corpora distinctè cognoscenda, haud sufficit; & ideò, quod nobis tradiderunt ac reliquerunt, multis partibus est imperfectum incertumque. Cum autem Magnus ille de Galilæis Galilæus, paucos ante annos, Telescopium recens inventum Cœlo applicuisset, oculoque ita armato, hoc negotium tentasset, longè multoque feliciter labor omnis successit, teste Nuncio ejus Sidereo : quandoquidem, reliqua ut taceam, Lunam non solum probè, distinctèque oculis perspexit, sed & quinque diversas delineationes, Macularum Lunarium, ejus beneficio, adumbrare potuit, quas brevi post, in prædicto illo Nuncio Sidereo, cum universo Orbe Terrarum communicare haud detrectavit. Vltrò quidem fateor, Galilæum hunc plura in Lunâ deprehendisse, ac designasse, quàm omnes ejus Antecessores, Veteres nimirum Astronomos quoscumque: interea tamen omnes & singuli, qui Lunæ itidem non sunt hodie ignari, rectèque judicare, hac de re volunt, nihil à me divertum statuent, quàm quòd is ipse verè Lynceus (quod tamen pace magni istius Viri dictum esto) nonnisi aliquam verè genuinè Lunæ faciem cognoverit; maximam autem partem Macularum, rerumque ibi existentium, nequaquam animadverterit; id quod ex iconismis nostris, opinor, tam fiet manifestum, quàm id quòd videtur Sole, ut potest maxime, lucente. Hinc verò planè colligitur, Galilæum, aut satis idoneo Perspicillo caruisse, aut iisdem observationibus suis non satis vacare potuisse, aut quod potissimum, artem pictoriam & delineatoriam ignorasse; quæ aliàs huic operi admodum inservit, uti non minus visus acutus, Patientia & Labor. Tale enim est hoc opus, quod non unico Mense aut Anno; sed vix plurimis annorum periodis, perfici potest. Præterea autem non sufficit, certam aliquam phasim, semel tantum delineare; sed est certè aliquoties necesse, ut eadem delineatio repetatur, si quid certi & emendati, hac in parte præstare animus sit.

Vtinam tamen Galilæus, cæteri que Siderum Scrutatores,

Galilæum, beneficio Perspicilli certiora indagavit.

Galilæum, nondum nativam Lunæ faciem delinendo assequutus est.

certa quædam hujus generis, statim ab initio edidissent, in magnum sanè ea res universæ Astronomiæ & Geographiæ successisset emolumentum; sed nullus adhuc existit, quantum hoc tempore mihi est compertum, qui vel unicum accuratè delineatum Plenilunium, ne dicam diversas Phases, & Pleniorum Selenographiam, in apertum protulit. Quanquam enim, Anno Christi 1643. Matthias Hirschgarter, in Detectione suâ Dioptricâ, aliqualem Lunæ effigiem conspiciendam nobis exhibuit; quam Nobilis quidam Neapolitanus, præstantioris notæ Tubo usus, delineavit: vix tamen adumbratio ista alicui satisfacere potest: imò & magnopere à Lunæ genuinâ formâ eam dissidere, satis, opinor, ex meis apparebit iconismis, quibus omnes amussitati Tubi, benè scio, fidem certò facient.

*Hactenus
nulla adhuc
prodiit Sele-
nographia.*

*Autor, quibus
rationibus ad
delineandas
Lunæ Phases,
commotus sit*

Quod cum animadverti, parùm profectò, hoc in negotio hæcenus esse præstitum, & vel cumprimis quod attinet Eclipses & occultationes stellarum; dum omnes istæ observationes, (quæ permultùm tamen cum ad Astronomiæ, tum ad Geographiæ perfectionem faciunt) nondum, ut aut deberet aut possiet etiam fieri, sunt institutæ, aliùs rem istam mecum perpendere cepi. Vero enim accurateque delineato Plenilunio cum destituimur; destituimur profectò solido illo harum observationum fundamento, sine quo, sive vera itineris Lunaris linea, circa stellarum occultationes, sive vera quantitas Eclipsium Lunarium, nedum justa proportio Semidiametrorum Lunæ & Vimbæ, aliæque ad Astronomiam excolendam summè necessaria, debite explorari, & determinari, nullâ omnino possunt ratione. Quod cum ita sit, planè mecum statui, genuinam hemisphærii Lunæ visibilis faciem, seu Plenilunium integrum delineatum ire, idque non rudi Minervâ, ut aliqualem tantùm Lunæ speciem haberemus; sed summâ potiùs diligentia atque operâ, & in quantum istud vires meæ ferrent, ne non & proportiones Macularum, distantiasque, ut & illarum magnitudines, ac proprios omnium istarum colores diligentissimè attentos & observatos, conspectui objicerem omnium: siquidè, si vel quicquam horum prætermitteretur, omnis labor figurarum nostrarum parùm fructuosus esset, nec multum laudis

*Abis, vixit
delineatione
Plenilunii
nulla accurate
observa-
tiones Luna-
res institutum-
ur.*

dis mereretur, non minùs ac ille, quisquis superiori tempore, talibus crassis Lunæ schematibus, qualia extare diximus, fuit impensus.

Cæterùm, ad hoc opus alaciùs etiam subeundum, multò magis me excitarunt illa, quæ longè celeberrimus, summæque Eruditionis Vir, P. Gassendus, in vitâ Pereiscii, de Lunâ protulit; ubi inter reliqua meminit : quòd sibi cum illustri Viro Nicolao Fabricio de Peiresc, Senatore Aquifextienti, omnigenâ itidem eruditione clarissimo, animus fuerit, Phases quasdam Lunares observandi; quarum utilitatem vix verbis exprimi posse ait, si ad optatum perducantur finem; ut pluribus, in modò dictâ vitâ Pereiscii, pag. 300. legitur. Hæc, inquam, maximâ ex parte, calcaria mihi addiderunt; præsertim, cum nihil animadvertissem, eo tempore, vel unicam phasin, ab illo fuisse depictam, ne dum æri incisam. Itaque initiò animo admodum flagrante, ad Plenilunium accuratissimè, quoad fieri potuit, observandum me accinxi, verùm haud utique eum in finem, ut illud publici facerem juris; sed ut inde privatim oblectationem aliquam caperem, & reliquarum mearum observationum, quæ consecuturæ essent, fundamentum quasi isthac ratione ponerem.

Enimvero antequam ulteriùs rem omnem explicare progredior, penè necessarium duco, palàm facere, quâ viâ observationes nostræ Lunares adornatæ fuerint. Fortassis enim sibi quispiam imaginatur, partim cum Kepplero, partim cum Scheinero persuasus, hujus generis observationes, mediante tubo, vel vitro quodam convexo, in camerâ quâdam obscuratâ, foramini applicato, ad instar scilicet observationum Macularum Solarium feliciter peragi posse. Ego verò non inficior, si hæc ita succederent, modum istum, quem diximus, hac in re fore facillimum, convenientissimum & exoptatissimum omnium, qui ab ingenio humano excogitari posset : hoc namque modo, Macularum formæ & figuræ omnes, in debitâ proportione & distantîâ, suisque coloribus, spontè se se nobis in Tabulâ chartaceâ oculis subjicerent, ita ut illas absque magnâ difficultate adumbrare possemus, quemadmodum cap. 5. Maculas Solares, depingere docuimus;

Quis Aster sit incitatus, ad opus Selenographicum suscipiendū?

Quomodo observationes Lunares fuerint institutæ?

*Macula Lu-
nares in ca-
merâ obscu-
ratâ depingi
non possunt.*

cuimus; magnumque foret, laborem immensum, molestiamque supra quam dici potest, tædiosam, effugiendi adminiculum. Est verò modus iste, crede, omnino falsus: & qui hac viâ opus nostrum aggreditur, spe certò excidet. Quandoquidem, Luna planè non est lumine adeò vibrante prædita, sicuti Sol est, ut videlicet omnem corporis sui speciem, in conclave obscuratum inferre atque ingerere possit; nisi, quod aliquâ tantum ex parte, in chartâ animadvertatur, inque tantum duntaxat, ut figura ejus solùm, utrùm nempè bisecta sit, an corniculata, vel gibbosa, aliquatenus distingui queat: cum de cætero Maculæ, tum majores, tum minores, itemque confinium lucis & umbræ, sic nullo modo discerni possint, verùm tanquam chaos aliquod potius appareant, aut confusa materia, quam distinctè neutiquam cognoscere datur.

Quæritur verò nunc hîc meritissimè, quâ viâ ergò hoc negotium adire maximè sit commodum? Nullum equidem est dubium, quin ad observationes has instituendas, Telescopium satis longum, notæque præstantissimæ, requiratur: & quò hoc melius & præstantius, eò felicius, & perfectius, hæc perfici possint omnia. Etenim si hac nostrâ tempestate, illo nunc destitueremur, adeoque non nisi nudo visu univèrsa atque singula complecti deberemus, parùm quidem hac in parte antecessoribus antecelleremus, & vix adeò multum sanè ultrà præstaremus. Ideoque certum est, Tubospicillo omnino hîc opus esse: hoc nullo alio utimur modo, quam quò simpliciter, per illud Lunam spectemus, veluti reliqua astra & Ioviales, per Tubum observare consuevimus, aut manu liberâ id tenentes, aut fulcro sustentatâ. Facile quidem institui poterit, sed contrâ, res difficilis & operosa est, certas quasdam, & probè fundatas observationes, prænarrato modo, ad finem exoptatum perducere: quia nullo singulari adminiculo seu compendio, quam oculo, Telescopio armato, ejusque mensurâ adjutamur. Quando enim Lunam ita contemplamur, eo quidem fine, ut visa depingatur; discum Lunæ totum, ab initio unâ vice, Telescopio immoto, cernere planè nequimus, si egregium & eximium sit perspicillum: imò quò hoc præstantius, eò minor parti-

*Per Tubospi-
cillū optimū,
totâ lunâ fa-
cies unâ vice
non spectatur*

particula, de facie Lunæ, per illud nobis offertur, adeò ut tantum partem Lunæ, & Maculas ejus isthac ratione considerare detur. Tum verò à certo quodam puncto, initium capitur, deinde partes circumvicinæ, imaginatione probè comprehensæ, in chartam huic rei destinatam, confestim referuntur, sicq; ordine, reliqua puncta, Sinus, Montes, Vallesq; in debitâ distantia, & proportione depinges, donec omnia & singula, Lunæ superficiei inhærentia, perlustrentur, observentur, typoq; mandentur.

Videantur autem hæc, cum ita dicuntur minimè gravia; sunt tamen certò certius, de quo non est, quod quispiam dubitet, profectò longè difficillima, ita ut revera hic dici possit, *Hic labor hoc opus!* Potest equidem id nemo homo intelligere, quantus ad eam rem labor, & diligentia qualis requiratur, nisi quis suismet oculis manibusq; experimentum fecerit, vel unius tantum phæcos, nullo adhibito alicujus prævii exempli adminiculo: cum opera hæc, non imaginationem tantum multò fortissimam, ut & memoriam pertinacem, sed & Patientiam singularem, animumq; observationum amore ardentissimum, sibi deposcat. Imaginationem & impressionem, hanc quidem ob causam, ut illa semel oculis perspecta, menti firmiter inhæreant, usq; dum singula adumbrata fuerint. *Quamvis* ad hoc efficiendum, brevissimum duntaxat temporis spatium, sit necessarium; nihilo tamen minùs, hic ea nobis obveniunt, quæ obtingere solent iis, qui in speculo sive suam sive aliarum rerum faciem contemplantur. Dum enim speculo oculis immorantur, videntur sibi, se omnia accuratè esse complexos, quum oculis à speculo remotis, vix leviter & ruditer in animo versari imagines visas, sentiunt. Hoc certè pariter accidit, circa observationes Iconisimorum Lunarium. *Quam diu* Lunam Tubospicillo intuemur, planè sic existimamus, nos omnia longè accuratissimè & exquisitissimè, quæ videmus, lineis expressuros: verùm in ipso eodem momenti articulo, cum faciem delineamus, & ad picturam nos accingimus, pleraq; ne dicam cuncta memoriâ excidisse, nimis quam manifestè experimur. Neesse itaq; ut quodlibet punctulum decies vel vi-

Phæsi Lunares correctè delineare, est opus difficilissimum.

cies de novo aspiciatur, priusquam verè proprius situs alicujus Maculæ, figura atque forma, rectè & accuratè in chartam referri possit. Denique cum confidimus, omnia esse debitè observata, nihilominus in secundâ & tertiâ observatione vel falsa, vel non plenè nos comprehendisse, & nonnihil specie esse delusos, intelligimus.

*Qualis esse
debeat Pha-
sium Lunari-
um obser-
vator.*

Ex quibus insuper per se fluit, Selenographicam hanc occupationem exigere non solum quidem & diligentem, & patientem, laborem nihil reformidantem, validâ imaginatione polentem observatorem, de quo rectè sic Poëtæ verbis immutatis cecineris :

*Qui studet ætheream hanc visu contingere metam,
Multâ tulit fecitq; vir, is vigilavit & alfit ;*

sed & hominem cum delineandi, tum pingendi non vulgari-ter peritum; ita si absq; alterutro horum sit observator, penè actum sit de ejus observatione, & ipse parùm eximii effectum dederit. Namque ut velit aliquis, operâ pictoriâ cujusdam excellentis vicariâ uti, cui dictitet, quæ sibi in corpore Lunari spectanda obviam veniunt, non carebit id multis difficultatibus. Primò namq; vix cogitationes & impressiones proprias, eò usque retinere valemus, quò omnia & singula delineando in tabulam fuerint relata : ut taceam dum pictori omnia inculcantur, multa posse è memoriâ elabi, nec satis fideliter tradi. Præterea vix quisquam alius præconcepta nostra visa assequetur, quantumvis licet ea multis verbis depingere conati fuerimus. Adde, si observator animadvertat pictoris penicillum aberrasse, nec rem dictam bene expressisse, etsi à tædio & fermento procul fuerit, qui ipse, artis pictoriæ rudis, modum rationemque indicabit errata emendandi, aut meliora reponendi? Iam quantam ipsam pictoris attentionem, industriam, & tolerantiam esse oporteat, cogites. Iuratò etiam assevero, ab exercitissimò & doctissimò pictore primâ vice nullam phasin debitè repræsentatum iri : sed alterâ etiam vice retractandum erit opus, fortean etiam decies ad unguem castigandum. Sic, quod quivis me tacente, intelligit, lente omnia valde procedent. Constat verò etiam quamlibet phasin nonnisi semel

*Cur non alte-
rius operâ in
his observa-
tionibus uti
possimus?*

mente

menſe quolibet, adeoque duodecies, ſingulis annis apparere : quarum una alteraque non ſemel adhuc ſuo quoque tempore conſpicitur, cum Cœlum ſcilicet eſt nebulofum. Itaque ſingulis noctibus eſt vigilandum, & ſerenâ nullâ quieſcendum : cum unicâ neglectâ, phaſis non animadverſa, vix ac ne vix quidem aliquando intra anni unius, aut plurium ſpatium, ſe conſpiciendam iterum det. Numquid igitur pictor cum obſervatore æquè perniox erit, aut nonne potiùs ſomniculoſus aliquando ad opus vocabitur, dummodo adhuc in promptu & procinctu ſit, qui ideo ſerè alendus erit iis in ædibus, in quibus obſervator aſtris intentus excubat ? Conſidera verò, quàm multa hæc ſint, & pictori & multò maximè obſervatori ſexcentas moleſtias allatura. Et ſi pictoris emenda eſt opera, quanti ſuntus in aliquot annos eò ſufficientes exigentur ? Si verò ætherei ingenii Vir aliquis & induſtrius Aſtronomiæ cultor ipſe noverit non oculis tantùm ſuis uti, ſed & manibus, ut, quæ illis vidit, his in tabulâ exprimat, præ animi ardore nobili, nihil ſentit moleſtiarum, & omnia peragit alacriter, animo ſuo non minùs quàm oculis ſatisfaciens, dum aſtra, quæ DEI manus finxit omnipotentis, ille manu ſuâ lætus pingit. Eſt igitur hoc opus nonniſi ab obſervatore, qui ſimul delineator ſit, ſuſcipiendum, aut res vel omnino infecta erit, vel ægerrimè conſiet.

Redeo ad meas, nimirum de quibus ſuprà dicere cœpi, obſervationes, quibus de tamen earumque progreſſu pauca tantummodo commemorare pergam. Cum igitur initiò, Plenilunium obſervare, & adumbrare inciperem, mox animadverti, res permultas, miramque & incredibilem Macularum varietatem eſſe notandam, unde proſectò non modò vix leviter ſum perterrefactus; ſed & penè de totius operis mei ſucceſſu deſperaviſſem; eò præſertim, quòd omnia tantùm ſecundùm oculorum menſuram, judiciumque eſſent depingenda, & rerum inſuper tanta ſe offerret copia, ut quòd me verterem, neſcirem, ſive à quâ Maculâ incipiendum eſſet, ſive in quâ deſinendum; accedente hoc, quòd monſtra iſthæc mihi eſſent proriſus peregrina, & hæcenus incognita : inprimis, cum nullæ omnino quomodocunquæ delineatæ phaſeos eſſem particeps, quæ quaſi

Singulis noctibus obſervationibus Luna invigilare oportet.

In principio Anter de ſeliciori obſervationū progreſſu, admodum dubitavi.

viam mihi, ad proportionem majorum duntaxat Macularum sterneret. Namque ut verum fatear, tam in periculorum meorum ingressu, quàm extremo conatu, ne unicam quidem imaginis Lunaris adumbrationem unquam vidi, nedum possedi, exceptis tamen illis, quarum jam memini, Galilæum scilicet Longomontanum & Hirschgarterum autores habentium. Et ut hujus Hirschgarteri reliquis videbatur emendatior: multò magis tamen eâ sum seductus, quàm promotus: quod me imposterum, non minori cum detrimento quàm fastidio docuit, usus atque experientia. Vtinam schema illud Lunare, priusquam phasibus meis omnibus supremam addidissem manum, à Præstantissimo Viro, eodemque amico meo plurimum observando Petro Gassendo accipere mihi feliciter contigisset! multùm profectò inde ad me commodi redundasset, inò laboribus haud exiguis (ne dicam de temporis lucro) superfedere potuissem.

*Genuinam
Macularum
proportionem
delineare,
hoc artu est.*

Etenim, initio maxima se se offerebat difficultas, in vero situ & nativâ proportionem, majorum Macularum, locorumque insigniorum, præ aliis in Lunâ emicantium, delineandis; cum eo tempore, nulla alia media in promptu essent, quibus isthac dignoscere daretur, sed sola oculi omnia dimetientis judicio standum esset (quamvis postmodum longè præclarissima adminicula quædam atque compendia (ut suo loco dicitur atque tempore) adinveniri, quorum ope admodum sanè accuratè animadvertendorum proportio constitui possit. Et sic tum primò omnium qualitercunque delineatum est Plenilunium. Postea autem valde bene animadverti, nonnisi impossibile esse, ut unâ observationis institutæ vice, correctæ & omnibus numeris absoluta aliqua repræsentetur alicujus Plenilunii figura: quin quòd potius necesse sit, ut observationes hæ aliquoties reperantur, quo antecedentes per subsequentes reformari, corrigi, in melioremque formam redigi possint: siquidem isthac ratione, de die in diem, observator fit exercitior, semper plura animadvertere & detegere valet. Verùm enimvero, cum iterum atque iterum, ob turbidum nimis ærem (qualis his Regionibus esse solet nimis quàm frequenter, cum dies sunt admodum

modum multi, inò tempore Autumnali, Brumali, & Vernali, menses quidam integri valde nebulosi) Plenilunium sui conspectum negabat, non modicum inde temporis effluebat spatium, priusquam alium Lunæ Plenæ iconismum delineare poteram. His accessit, quòd circa quodlibet Plenilunium, haud exigua differentia & dissimilitudo, ratione antecedentium nunquam non deprehendebatur, cujus rei unicam esse causam initiò rebar, quòd fortassis in delineatis prioribus iconismis indiligentior fuisset, quàm decuerat. Itaque delineationes priores semper correxi, & licet quàm diligentissimè calamo jam essent depictæ, penitus rejeci, aliasque confeci: nunquam enim mihi persuasissem, aliud hic quidpiam latere, & à motu librationis certo, qui eò non fuit primò animadversus, quòd veterum Philosophorum nullus aliud unquam statuerit, quàm Lunam perpetuò unam eandemque nobis obvertere faciem (quod deinceps demum est compertum) pendere omnia.

Cùm autem tandem aliquando principis istius, quæ circa Lunam vel maximè observari meretur, vicissitudinis abundè satis essem factus certior, cœpi id mente & cogitatione agitare, quomodo res hæc tam summè necessària investiganda; hoc est, termini librationis, ejusque periodi ecquì essent deprehendendæ: ad quod studium (fateor) singulari quâdam cupiditate, desiderio, impetuque animi me ferri, sensi, idque eò multò magis, quia hæc omnia nunquam antea explorata, nedum determinata fuère. Principiò autem sic conjectabam, impossibile fore, per sola Plenilunia (quorum minima pars, in anno, conspicua esset) nisi quamplurimorum annorum serie devolutâ, hoc negotii confectum dare. Itaque planè decrevi, omnes & singulas Lunæ phasès, uti accuratè contemplari, ita quàm exquisitissimè, quantum quidem in me foret, non minus utique quàm ipsummet Plenilunium delineare ac depingere; quò videlicet penitus simul cognoscerem, diversas omnium phasium variationes, tamque Macularum quantitates, quàm confinia lucis & umbræ concernentes: spe indubiâ fretus, quin ita se mihi offerret occasio, maximumque & optimum medium, mul-

Motum Librationis Lunæ ante explorandum statuit.

ta quæ hæctenus circa Lunæ Phænomena nos fugerunt, explorandi atque detegendi; quæ sanè profectò spes me nihil fefellit.

Diametrum autem phasium Lunæ delineandarum, non majorem quatuor circiter digitis Rhyndandicis, assumere cogitabam, ne nimium laboris, inde mihi crearetur, qui eò major foret, quò figurarum forma, esset amplior, ut facilè est conjectare : sed deprehendens autem, in tam exiguâ formâ, omnia & singula, depingi haud posse, ideoque ampliorem diametrum ad delineandas phases elegi, quæ se in proportione habet ad pedem Rhyndandicum Fortificatorium, seu Romanum Antiquum, ut 628. ad 1200. sive ad Parisiensem Regium, ut 628. ad 1266. sive, ad Gedanensem, ut 628. ad 1096½. Neque est quòd mireris Benevole Lector, si, proportionem hanc examinaturus, omnes figuras seu illarum diametros, paulò minores deprehenderis : scias enim, papyrum, cùm ad imprimendum humectatur, se, propter humiditatem, dilatari, postmodumque quando siccescit, se se iterum constringere, & quidem non semper in proportione æquali, sive quâ longitudinem, sive quâ latitudinem; cùm unius generis papyrus, majori dilatationi, & compressioni sit obnoxia, quàm alterius generis. Nostri quidem papyrus, in quâ figuræ æneæ sunt excusæ, decem particulis in latum, ratione pedis Rhyndandici, in longum verò, tantummodo sex part. est constricta; quòd plerumque omnis generis papyro accidit, ut magis in latum, quàm longum coeat. Hinc igitur omnes figuræ, quæ in ipsis laminis æreis, exquisitissimè sunt rotundæ, ratione impressionis fiunt figuræ ovalis; secundùm quam proportionem, omnes res aliæ, quæ circulo comprehenduntur, figuram impetrant. Optandum equidem esset, ut aliter se se res haberet; verùm cum variatio ista sit perquam exigua, ac parùm observabilis, vix quicquam detrimenti affert. Cæterùm, si figuræ nostræ alterâ adhæc vice, à quopiam adumbrari ærique incidi deberent, certè multum corrumperentur; eò quòd simplex illud vitium antecedens, ex constrictione ortum, duplicaretur : adeò ut proportio Macularum & distantiarum prorsus perturbaretur, vitiosaque redde.

Diametrum phasium, quâta magnitudine Autor assumpserit.

Papyrus humectata, se se dilatata, & siccata se se constringit.

Ratione constrictiōis papyri, phasium forma rotunda existit ovalis.

redderetur : licet enim, extremus Lunę Limbus iterum rotundus duci possët, non sequitur inde tamen, & eo comprehensa, in debitam formam esse redacta. Quę propterea refero, ne quis forsitan putet, in delineatione, ab observatore, errorem esse commissum, sed quòd semper hoc vitium, si tamen ita appellari meretur, ex naturâ papyri proficiscatur,

Verùm, mittamus jam hæc, ad observationes Phasium revertamur. Vt antè memini, observationes non solum Pleniluniorum, sed & Phasium reliquarum, singulis diebus existentium instituebam; quę cum tempore, etiam feliciter sunt ad finem perductę. Eram quidem in eâ opinione, hoc opus tribus vel summùm, quatuor mensibus, absolvi posse; spes verò longè me fefellit: tot enim circiter annos impendere oportuit.

Quandoquidem primùm noctes aliquot nubilosę, & minüs serenę fuerunt in causã, quò minüs quamplurimę, imò maxima pars phasium, haud observari potuerit; sic, ut in prioribus tribus, vel quatuor mensibus, certè paucissimas delineaverim. Postmodum, cùm jam non paucas collectas haberem phases, easque singulis ordine succedentibus mensibus, examini subicerem, iterum atque iterum deprehendebam, hinc inde aliquid esse omissum, quod necessariò correctione egeret. Quia verò rarò omni ex parte, sibi similis occurrebat phasium facies, sed multò magis magna varietas, atque mira vicissitudo se objiceret aspectui : ea me ferè, sicut & ipsa Plenilunia, perturbatum reddebant. Nam etsi probè animadverterem, hæc omnia, ex motu illo novo Libratorio oriri; nihilominus non confestim innotuit, unde, quomodo, & quo tempore, Luna, modò in antecedentia, modò in consequentia signorum, tum à parte superiori, hoc est à Septentrione in Austrum, tum ab Austro in Boream moveretur : causa erat, quòd propter cælum nebulis frequentissimè obvelatum, Lunam debitè observare non liceret : quamvis una vel altera phasis esset jam adumbrata, mox tamen evenit, ut non rarò alio tempore essent inconspicuę : ita ut, priusquam alia rediret Lunatio, ex motu illo phases essent mutatę : & ideo non est concessum, tam subitò menstruam, vel annuam aliquam Lunę variationem con-

continuum, ob interruptam earum seriem, ac præsertim corniculatis multum negotii mihi facessentibus, deprehendere. Quo impulsus sum, ut item & has phases quomodocumq; delineatas (etsi operæ in earum primâ elaboratione nullatenus peperci) partim magis magisque indies corrigerem, partim omnino rejicerem, aliis earum in locum substitutis: sic ut omnium numerus alio atque alio tempore delineatarum figurarum centesimum excederet: quod nisi fecissem, nec quicquam profectò correcti & certi (quod proportionem distantiamque tam majorum quàm minorum Macularum, ut & ipsismet Plenilunium atinet) consecutus fuisset.

Mediantibus autem tam crebris istis, ac planè etiam continuis observationibus uti reliquas, ita inprimis duas primarias, five generales figuras Pleniluniorum multò felicissimè perficere obtigit. Prima videlicet, ut phasibus, Lunationibus, aliisq; observationibus, altera ut Pleniluniis & Eclipsibus imposteriorum inserviret. In his prædictis primariis delineationibus quas capite 44. figurâ T exhibebo, vera proportio, & distantia Macularum omnium, in Lunâ aspectabilium, accuratissimè & diligentissimè est observata, nudisq; solummodo lineis, non attentâ umbrâ, est constructa. Quod certè, nî fallor, egregium est inventum, maximumque compendium, ad Plenilunia, & phases quasvis delineandas, examinandas atq; corrigendas; quod reipsa etiam comperi: nisi enim tales excogitassetem figuras, multò plus adhuc temporis, in hoc opus infumere, laboremque longè majorem suscipere necesse fuisset. Cæterum cum primariæ hæ figuræ ita essent constructæ, è vestigio phases reliquas expensum correctumq; ivi, & quæ non ferebant omne punctum, penitus profligavi, aliis, ut supra dictum, semper tentatis.

*Delineatio
Phasium Ge-
neralium, ad
observatio-
nes perquam
est necessaria*

*Observatio
& delineatio
quomodo sit
inflituenda?*

Vt autem cuilibet item Astrophilo, unam atque alteram phasin, si velit, sibimet depingere liceat; idcirco hoc loco simul indicare nullus gravabor, quomodo ipse ego id operis aggressus fuerim. Primò, Primariam Phasium delineationem, habui in promptu, non quidem illam laminæ æreæ impressam, quæ cap. 44. adjuncta habetur (hæc enim propter papyri dilatio-

latatio-

latationem & coarctationem, minùs est idonea) sed similem quandam, calamo accuratissimè depictam, secundumq; hanc, plumbagine descripsi, & hac quidem compendiori viâ: lineam circularem circino duxi, æqualem lineæ circulari, delineationis primariæ; cui delineandam figurâ vacuum chartam imposui, centraque acu infixâ firmavi, ut & universa charta aciculis fuit fibulata, ne ullâ parte dimoveretur. Postea duas istas sic connexas, vitro cuidam benè polito imposui, luminisq; Solis vel candelæ obverti, quo factò omnia distinctè & excellenter, ad faciem inferiorem galenæ ductu, depingi poterant. Quâ accuratè delineatâ figurâ, ad observationes instituendas sum usus, cujus scilicet beneficio, situs, proportio, distantia, & formæ Macularum, jam erant expressæ, ita ut primùm confinium lucis & umbræ, ducere tantùm esset necesse, quod faciliè ex Maculis ipsis factu erat; secundoq; colores Macularum, solummodo attendere opus esset, & quid circa illas addendum corrigendumque foret. Deinde verò, cùm observatio ejuscemodi secundum ipsam Lunæ faciem fuit adumbrata, hanc iterum, eâdem prorsus ratione modò significatâ, in aliam transderivavi chartam, quò videlicet phasis jam observata accuratius denuò calami ope depingeretur: quem planè modum circa observationes phasesque quascunq; semper impostero frequentavi. Qui quantusque fuerit labor, cùm non solum

*Ingeni labor
phases deli-
neare corre-
ctas.*

singulis noctibus invigilatum est observationibus, horæq; aliquot illis impertitæ; sed & tam diversæ, & tantùm non innumerabiles phases, aliquot centenæ profectò fuère, manu penâque sunt ita accuratè delineatæ, ut excusis nihil cederent, judicandum omnibus relinquo; præsertim cùm phasium quædam quinque, sex vel septem horarum spatium requirerent. Sic experienciâ edoctus, faciliè hoc do Christophoro Scheinero, qui in Rosâ Vrfinâ commemorat incredibilem se molestiam superasse in observationibus suis Solaribus adornandis. Verùm enimvero, ut opera illa Scheineri & valde difficilis & molesta fuerit: attamen in comparatione ad Selenographicam nostram, nihil vereor eam fuisse & tolerabiliorem & faciliorem: quandoquidem decem, vel plures etiam periodos Ma-

cularum Solarium notare, inq; ordinem redigere malo, quàm unicam solummodo phasin Lunarem describere: attento, quòd quælibet observatio Macularum Solarium, in primâ statim delineatione, debitam suam constitutionem & propòrtionem acquirat; illæ verò Lunares, innumeris vicibus, singulisque continuè mensibus delineandæ, examinandæ, corrigendæ, & novæ multò frequentissimè exædificandæ sint. Ut taceam maximum istum laborem, cum omnes & singulas phases, reliquasque figuras, & observationes omnes (exceptis tantum quatuor vel quinque) meâ manu incidi, idque non aquâ forti usus, sed cælo: quâ gratiâ quid temporis, & patientiæ, ac virium corporis, & maximè oculorum exhaustum fuerit, non dicam, ne videar (qui minimè esse velim) gloriosolus rerum mearum jactator: sed artificii ejusmodi peritis explicandum comitto. Utcunq; autem initio optassem, Sculptorem mihi quendam exercitatissimum, & experientissimum, ad hoc opus suscipiendum, ad manus fuisse, quò operatione istâ mechanicâ subsedere potuissim: attamen eam tantò minùs defugere volui, quantò magis non tantùm à consciis mei instituti, & rerum Astronomicarum scientissimis Viris sum commonefactus, ne cælatori ulli, phases à me observatas æri insculpendas facillè committerem; etiamsi enim arte suâ multum valeret, tamen vix ac ne vix quidem oculorum mentisque meæ conceptum sibi à me verbis descriptum, aut lineis præductum, intelligere; ne dicam manu assequi posset, ex quo fieret, ut in adumbratione modò ita, modò aliter prævaricaretur, aut proportionem negligeret, aut aliud quicquam committeret, quod eliminare aut in ordinem redigere non liceret commodè; addebant & hoc, neminem iis rebus magis intentè incubiturum, quàm me, earum autorem promotoremque, cui maximè sint cordi curæque. Insuper & ipse colligere potui, à nullo mihi facillè satisfactum iri, cui hæc (absit dicto jactantia) essent cognitissimæ, & figuræ ex oculorum mentisque apprehensione transferendæ, ex plurimis ipsius Lunæ contemplationibus, & observationibus familiarissimæ.

Partim igitur sic persuasus, partim meâ sponte ductus & com-

*Autem, uti
phas'es sp'e-
met delineavit,
& singulas
suâ quosq; manu
avi à ci-
dit.*

commotus decrevi tandem, omnes & singulas phases, uti in hoc libro conspiciuntur, meâ manu sculperè; quamvis non diffitear, si operis limine prævidissem, hoc oneris mihi soli portandum esse, nec facilè potuissem admittere manum sociam, aut penitus abstinuissem factò, aut majori cum horrore, me ad id accinxissem. Cælatura profectò tantò mihi ferè constitit fudore, quanto contemplatio Sideralis. Quid? quod & mihi uni tantò labore confecta potuissem privatim recondita servare. Sed instinctus quidam atq; consideratio tanti negotii aliò me pertraxit: dum mihi persuadeo hac Lunæ historiôlâ cum orbe communicatâ, Philosophiam universalem (attestante summo illo & ingeniosissimo Heroë Francisco de Verulamio, qui suam in Novo scientiarum organo sententiam eo de egregiè proditum ivit) sive ex toto, sive ex parte, quâ Lunæ Cœliq; doctrinam, eximie auctum exornatumq; iri: ut & non infrequens aut vulgaris fuit quamplurimorum & doctrinâ, & auctoritate multum apud me valentium hortatus & stimulus, ut ad Astronomiæ majus emolumentum, multorumq; oblectamentum, cum observationibus meis figurisque non nollem in publicum prodire. Iacta igitur esto alea & (licet aliis satis sim distentus negotiis tam publicis quàm privatis) ostensum dabo, quomodo, pro tenuitate meâ, Lunæ Cœliq; universi spectatoribus admiratoribusq; inservire sim paratissimus. Namq; & illud diligenter animo reputavi meo, homines esse omnes obstrictos, talentum suum (ut parabolâ Salvatoris cœlestis Magistri docemur) quod DEVS sine certo concessit, apud alios, & præsentem posteramq; ætatem elocare: imprimis istas quod res concernit, quibus animi ad contemplationem admirandorum DEI operum magis magisque elevantur, atq; incitantur, creatoremq; harum rerum plus plusq; ad laudandum, celebrandum, adorandumq; ansa datur.

Sed, ut illuc unde abii, iterum redeam; scias me delineatione harum 40. Phasium, & facierum Lunæ, pariterq; earum sculpturâ, talem elegisse adumbrandi & obumbrandi modum, quò omnes multò diversissimos colores, in Lunâ conspicuos, tum quatenus à Paludibus, Aquis, tum quatenus à diversâ alti-

Autor qualem elegerit modum cælandi.

titudinis Montibus oriuntur, sufficienter exprimere, singulaque bene imitari possem. Quocirca Maculas majores, aquarum speciem referentes, duplicibus lineis transversis umbrosis, æri incidi; Montes & Valles lineis circumdedi; cacumina & vertices Montium, circulis sunt comprehensi, eo videlicet fine, ut meliùs exprimerentur & luminosiùs. Minore quidem labore hæc omnia, & absque lineis circumcirca ductis, tantùmque simplicibus lineis umbrosis, delineari potuissent; sed, ut dixi, hac viâ accuratiùs, diligentiusque omnibus Astro-nomiæ cultoribus univèrsa atque singula repræsentari posse videbatur; atque ideo eâ in sententiâ perstiti.

Ne autem quispiam sibi imaginetur, me viâ alterâ id exequi haud potuisse, en tibi Plenilunium nudis duntaxat lineis æri incisum, cujus generis alia majora, jam jam sequentur, ut aspectu jucundissima, ita accuratone vix destituta; de quibus paulò etiam post dicetur uberiùs.

Licet primâ fronte vbas vacillare sapiam videantur, non tamen confisim Autor indiligentia accusandus; sed necesse est, ut omnia priùs probe examinentur.

Quod verò in Iconisimis, vallis ad vallem, non eandem servet proportionem, æqualemque rotunditatis figuram præ se ferat, aut similiter adumbrata, vel simili umbrâ depicta, non casu evenit, sed summâ, crede, diligentia atque curâ, secundùm nativam scilicet Lunæ faciem, cuncta sic sunt effigiata. Quare autem quædam Valles, jam se se dilatate, jam se se contracte, idque ratione umbræ: jamque obscuriores, jam clariores, videantur? Deinde, cur Maculæ majores non perpetuò unam eandemque speciem, tum quoad figuram, tum quoad colorem retineant, opportuniore loco expediam. Ausim sponsonem facere, qui primo accessu adspiciat, omnes Maculas, in nostris Phasium figuris, non similiter esse descriptas, id incuriæ & indiligentiæ observatoris atque Sculptoris adscribat; sed qui ita cogitat certè præcipit se præcoci judicio suo; legat enim priùs quid hac de re & dictum nobis est, & dicetur impostertum; tum fas erit, non modò hæc nostra carpere, sed & Tubum Cœlumque in manus capere, & periculum facere, num utrumque melius tractare, & oculis accuratiora observare, manique rectiora exprimere nobisq; impertire possit. Fortean autem plures surgent, quibus hæc nostra non placeant, nec al-
labora-

Est levius dicere quam facere, laudabilia carere, quam laude digna parare.

PLANTARUM.

Circa Aruaccinum.

Officinarum.

GEDANG.



fig 0

Arum Salant

laboraturos tamen, ut nobis magis placere possint, periculis & operibus suis editis correctioribus. Nam & largior præstantiora meis nunc dari posse; postquam per avia hæc penetravi, salubris multis superatis, & viam stravi commodiorem. Ego phasibus sum destitutus olim: à nobis has habebit, qui nos superare voluerit.

Partem quod attinet obscuram & umbrosam, tam Lunæ crescentis, quàm decrescantis faciem, cur non penitus nigrantem exhibuerim? ratio est, quòd ejusmodi lineæ nigriores, illa clarè illuminata puncta, planè absorberent, & suffocarent, quò minus distinctè & accuratè viderentur: idcirco datâ operâ, totum illud spatium, quod Solis radiis non exponitur, nullis lineis adumbravi, ne quicquam turbare possit. Exiguæ quidem illæ magnitudinis punctula, semicirculi seu semilunulæ, extra terminum illustratæ partis, conspicua, sunt, uti jam suprâ diximus, juga vertexque Montium; qui cùm alteriores sint cæteris partibus, eò citiùs à Solis radiis illuminantur: Sinus verò, & loca illa anfractuosa, quæ sparsim in partem Lunæ clariorem, se se extendunt, etiamsi sunt prorsus alba in his nostris phasibus relicta; nihilominus revera sunt nigra, luminisq; penitus expertia, ad partemque exteram minus illustratam pertinentia, uti facile colligitur: hæc ideò submoneo, ne quisquam forsitan contrarium sibi fingat.

Et hæcenus de observationibus Phasium Lunæ in genere diximus, sequitur, ut in specie quædam de Maculis, & earum proprietatibus, motuque librationis ipso, pro ut hoc ordine facere constitui, porrò persequamur. Atque eâ gratiâ in ipso statim aditu, Astrosophis, quoddam in formâ ampliori, rectè proportionatum, proprièque coloratum & Ichnographicè delineatum Plenilunium sistam, ut hac mediante figurâ, faciliùs & feliciùs, ideam quandam initiò concipere, conceptumque sufficientem de Lunâ comparare sibi possint, ad res sequentes promtiùs assequendas, atque intelligendas. Circa quod Plenilunium hoc tamen priùs monendum duco, quòd loca illa omnia planè alba, sive lineis subtilissimis colorata, Montes, Valles, aut Planities sint; quæ, quemadmodum capite præcedenti sexto,

*Loca Lunæ
clariora, Valles
sunt.*

ex parte demonstratum, & imposterum etiam suo tempore pluribus demonstrabitur, ibidem omnino sunt; loca verò illa, quæ lineis nigricantioribus æqualiter vides adumbrata, majorum Marium, Paludum, Lacuumq; Lunarium speciem referunt. Reliqua autem, quæ de his porrò dici debent; necessario profectò differenda, quoad cunctis Lunæ quasi partibus, Maribus scilicet Sinubus, Insulis, Continentibus, Chersonesibus, Promontoriis, Lacubus, Paludibus, Montibus & Vallibus sua priùs nomina fuerint imposita, quibus distinguantur; quò in descriptione rerum tam variarum, jam jam consecuturà, omnia distinctius explicari non nequeant. Quæ ratio etiam satis videtur prægnans, cur loca hæc univèrsa peculiaribus suis nominibus appellare voluimus, & debuimus, quàm præter tamen adhuc alia est in promptu.

Quare Macula Lunares nominibus fuerint donata?

Namque ex superioribus jam constat, nos eo quoque observationibus his nostris in lucem protractis, & cum primis Lunæ plenæ facie sub aspectum omnium posita, collineare atq; tendere, quò nimirum quælibet cunq; observationes tam Eclipsium Lunarium, quàm omnes aliæ ad Lunam spectantes (quarum rei literariæ causâ multum sanè interest) accuratius, expeditiusque imposterum, quàm hæctenus, institui, perficiq;, ab omnibus Astronomiæ cultoribus possint. Quæ itaque observationes, si in emolumentum incrementumque non Astronomiæ minùs, quàm Geographiæ, vergere debent, utiq; prorsus est necesse, ut passim à multis, iisque diverso loco sitis observatoribus, simul instituantur, & conferantur, ne non alteri res à se notatas, & circa Lunæ considerationem deprehensas aperiat, & patefaciat: quod admodum sanè erit difficile, ac tantum non penitus impossibile, nisi loca Lunæ omnia, suam aliquam nomenclaturam habuerint: secus in descriptione locorum designandorum, quàm in eorum animadversione factum, plus collocandum erit temporis, & tamen fusissimo sermone usus, ægrè intelligeretur, vix ulli satisfaciens: quid? quod inde facili negotio sexcenti errores propullarent.

Etenim, quemadmodum univèrsa etiam Geographia, cum omnibus suis amplissimis descriptionibus, & commentariis, absq;



Fig. P

absque nominibus Regionum, Urbium, Pagorum, Marium, Fluviorum, Montium & Vallium, nemini usui foret, nec à quopiam licet peritissimo, describi vel intelligi posset; sic planè quoque cum nostrâ hac Selenographiâ est comparatum. Idque probè veteres Astronomi considerarunt, qui ut observationes suas Astronomicas cum posteritate communicarent, incrementum cum tempore & annis sumpturas, pro captu suo & seculi sui genio, tam Planetis, quàm Asterismis generalibus, ut & stellis specialibus, nomina indidère, quibus singula appellerent distinctè, ut consequentibus ætatibus ab Astrosophis intelligerentur, qui eadem cœlestium luminum nomenclaturâ uti possent, si ita videretur. Nam, quid quæso omnis esset Astrorum scientia, nisi ipsa Astra ritè separare, & discernere possemus, quod unicè à nominibus proficiscitur? omnes omnium observationes, tum Antiquorum, tum Neotericorum nemini essent commodo, librique eas nobis exhibentes, potiùs ænigmata quàm descriptiones atq; explicationes esse viderentur. Quid? quòd cuncta atque singula, quæ Mundanæ hujus Machinæ ambitu comprehenduntur, sive sint corpora animata, sive inanimata, statim à rerum conditarum principio, nominibus suis distinguerentur, & ipsi DEO creatori Vniversi, & Adamo protoplasto, hæc res curæ fuit in Hebraico idioma: quos secuti sunt aliarum gentium Onomatothetæ sapientes, qui, arcano DEI instinctu, alia rerum nomina suis in linguis finxère: absque quâ operâ hic mundus visibilis etiamnum esset, aliquâ ex parte confusum chaos, hoc est, hominibus inperceptibilis incomprehensibilisque.

Quas quidem consimilesque rationes, cum accuratè mentis trutinâ ponderassem, illicò consultum duxi, omnibus & singulis Lunæ regionibus, qualia qualia, sed distincta indere nomina: ultrò equidem fateor, arduum me opus suscepisse, siquidem inauditum, adeò remoti corporis ætherei partes, certis nominibus discernere, & à nemine, hunc usque in diem, quantum mihi hæctenus constat, vel tentatum, nedum feliciter absolutum. Interea tamen, cum ratio operis nostri, hoc necessariò deposceret (quod bene vertat cum exoptatissimo Astro-

nomiæ

Quemadmodum Geographia absque nominibus, nemini perceptibilis, sic & hæc nostra Selenographia.

nomiæ & Geographiæ emolumento!) DEO OPTIMO MAXIMO proauctore, id periculi sum aggressus, spe certissimâ fretus, neminem sanæ bonæque mentis, animi boni conatum, malè interpretaturum.

*Autori initio
animus erat,
Præclarorum
Virorum nomi-
na Masu-
li Lunariis
imponere.*

Ad loca Lunæ, certis nominibus distinguenda, initio statim duæ rationes se se offerebant. Primò quidem, non absolum fore rebar, ut exemplo Veterum Astronomorum, qui, viro- rum virtute excellentissimorum, id præ aliis optimè de orbe meritorum (quibus memoriam apud posteros sempiternam conciliare animus erat) nomina, astris imponebant; hoc enim pacto viri illi magno sunt decorati honore, ut inde in omne ævum inclaruerint, veluti: Hercules, Cassiopeia, Andromeda, Cepheus, Perseus cum capite Medusæ, Bootes &c. & alii.

Hac inquam ratione, mihi quoque proposueram, universa Lunæ territoria hodie præclarorum Doctissimorumque Viro- rum nominibus afficere, & præsertim verò illorum, qui nostrâ tempestate, studia Mathematica egregiè amplificatum ivère, indeque nomen meritissimò sunt adepti amplissimum: ut ita magis adhuc fama eorum extenderetur, & ipsi in Cælo cum astris collocarentur, recordatione prosperâ prosequendi, quàm diu æther & sidera sunt duratura; decreto factò, in hanc ve- ram Terram ætheream transferre Oceanum Coperniceum, Oceanum Tyronicum, Mare Kepplerianum, Lacum Galilæi, Paludem Mæstlini, Insulam Scheinerianam, Peninsulam Gassendi, Montem Merfenni, Vallem Bullialdi, Sinum Ven- delini, Promontorium Crügerianum, Fretum Eichstadianum, Desertum Linnemanni, & sic deinceps.

*Cur Autor
sententiam
mutaverit?*

Idque vix inconveniënter esset factum; sicuti in eâ re mul- tis mecum convenire puto: cùm autem nonnihil pensacula- tius, de toto hoc negotio apud animum meum cogitassem, vi- debar mihi videre, istud cum discrimine aliquo conjunctum esse, & faciliè fieri posse, ut cùm nomenclaturâ istâ modò de- signatâ, gratiam colligere aliquam vellem, invidiam atque ini- micitiam mihi fortè conflarem. Nam attento, multa in Lunæ orbe existere loca, & alia aliis eminentiora, quædam etiam si- ve situs, sive claritatis ergo, minùs notabilia, quibus omnibus tamen

tamen suæ assignandæ essent appellationes; intelligebam, posse accidere, ut huic alterive Virorum eximiorum, locum aliquem, vel cuiusque suâ vel aliorum opinione, inferiorem indigniorve fortè tribuerem : ex quo nullo negotio bilis concieretur, suspicantibus nonnullis id eo factum, quia minùs benignè honorificeque, vel de quorundam meritis in rem literariam, vel de alicujus gente, religionis professione sentirem, ac forsitan, notos conjunctosque, vel amicitiaë, vel fidei nexu, aliquâ indecenti stimulatione huic illive antehabuissem. Ut ita certus planè evaderem, me non posse non ita offendere, ut ut animus ab offensæ studio esset remotissimus. Quamobrem istum Maculas Lunares nuncupandi modum potiùs missum facere volui, aliumque eligere visum, qui & tutus omnino est, & ut verum fatear, instituto nostro & publicæ utilitati convenientior. Citra dubium quidem Lunam jure Antichtona appellari posse, cum nostræ huic Terræ, in multis partibus, prorsus sit similis; (ut debito loco monebitur imò docebitur) respectu nimirum Oceanorum, Insularum, Paludum, Camporum, Montium & Vallium &c. Proinde apprimè conducere duxi, si Geographica tantùm nomina, eaque jam multùm cognitissima, locis Lunaribus attribuantur : dummodo (quod primò investigandum erat) hemisphærium Lunæ patens, certæ cuidam globi Terreni parti, quoad locorum scilicet situm, congruenter & appositè ordinari posset.

Autor Maculas Lunarilium nomina Geographica imposit.

Cùm verò extemplò ad eam indagandi operam, animum adjecissem, & totam probè Geographiam contemplatus essem, inveni summâ cum animi oblectatione, aliquam Globi terreni partem, & loca ibi indicata terrestria, cum superficie Lunæ visibili, ejusque regionibus oppidò accommodatissimè comparari, & ideo inde huc transferri posse nomina, nullo negotio multoque convenientissimè : puta nempe, partem Europæ, Asiæ, & Africæ, quæ Mare Mediterraneum, Pontum Euxinum, Mare Caspium comprehendit; ac omnes reliquas Regiones illis inclusas & adjacentes, quæ sunt : Italia, Græcia, Nætolia, Palæstina, Persia, Sarmatiæ & Tartariæ pars, Ægyptus, Mauritania &c. quæ loca, scilicet à decimo gradu usq; ad no-

Certa pars Globi Terreni, cum hemisphærio lunæ patenti aptè omnino comparari potest.

nagesimum longitudinis, & à vigesimo quinto, ad sexagesimum latitudinis gradum, se se extendunt.

Quam nomina locorum autem legem?

Comparatos sic igitur Lunæ oceanos, Regiones, si sic appellare liceat, cum his terrenis, insignivi nominibus communibus, quæ sequuntur, in denominatione istâ, debite observatis. Primò quidem locorum situm præcipue attendi, ne non spatia Lunaria cum Terrestribus egregie inter se convenirent: Secundò, primariæ notæ maximeque nobis perspecta nomina elegi, inprimis quæ Veteribus fuerint usitata, & Historicis ac nobis familiaria. Locorum enim terrestrium nomina nostro seculo admodum variare, & aliter atque aliter hæc vel illa à diversis populis nominari loca, quem fugit? Vbi verò quod dictum servare non licuit (quemadmodum interdum id fuit impossibile) illa amplexus sum nomina nobis inservitura, quæ arridebant, & non omnino inepta erant. Interim mirari nunquam satis potui, tam omnia se bene dedisse, ut initiò nunquam putavi: id quod Astrophus quisque jam jam perceptum, opinor, mecum vix leviter mirabitur demirabiturque. Interim tamen non est quod quisquam sibi persuadeat, loca Lunæ terrestribus nostris, etiam quæ formam, quæque amplitudinem, & omnem denique proportionem planè respondere (id enim ita esse aut scisse, quod ita se habeat, ut facile sapientes colligunt, nil adeò in præsens refert) sufficit qualem qualem situm locorum regionumque utrinque æqualium primò deprehendisse. Fictitiis nominibus, vix semel atque iterum sum usus, & non nisi eo in loco, ubi Geographica nomenclatura nos destituebat: ideoque pauca talia inveniuntur, nec nisi Boream versus, cum reliquis in partibus, nomina verè Geographica commodè in promptu essent.

Cæterum minimè oportuit solum oras Lunares, nominibus afficere; sed requirebatur etiam, ut ita eadem repræsentarentur, quò facile quilibet memoriæ illa mandare, feliciterque retinere posset. Per numeros quidem nomina inventa extra Lunæ faciem seorsim indicare, non videbatur conducibile: nam propter multos illos diversos numeros, varietatemque nominum, vix quicquam inveniri potuisset, & ita ob confusio-

nem

nem istam, opus hoc fuisset molestissimum atque tædiofissimum. Aliam proinde rationem inveni, Tabulam Selenographicam Orthographicè & Geographicè delineatam construendi, cujus beneficio & totum hoc negotium bene successurū prævidebar, & facile fore ut Selenographiæ Studiosi, multò majori cum voluptate, minori autem labore, nomina omnia hîc adhibita cognoscant, mandentque memoriæ: & quod maximum, proposito meo valde posthac inferviret; verumque esset medium, totam hanc Selenographiam, rectè illustrandi atque intelligendi.

Nomina locorum Luna, in Tabulâ quâdam Selenographicâ Geographicè delineata, Autor repræsentavit.

Quam ego Tabulam Selenographicam simili modo construxi, ac sub aspectum publicum posui, ut Mappæ solent, Geographicæque Tabulæ: nempe duobus eo necessariis benè animadvertis. Primò, ut Regiones & Insulæ, cum omnibus finibus & angulis &c. secundùm veram mensuram, proportionemque tam longitudinis quàm Latitudinis accuratissimè delinearentur: Secundò verò etiam est observatum, ut Maria itidem Lacus, Fluvii & Paludes, cum Sinubus, Promontoriis Scopulisque &c. accuratâ operâ, in debitâ servatâ proportione adumbrarentur. In quâ & ipsa, Oceanorum littora, mœris Geographis usitato, lineis certis distinxî, Paludes item, ut sœtum, Montes & Valles: ne non ipsi tirones, primo intuitu, continentes à Paludibus, Stagnis, Maribusque discernere non nequeant. Nam ex priori Tabulâ Ichnographicâ, ut & reliquis phasibus, non tam commodè, nec tam citò omnia percipiuntur. Montes re ipsa minores & majores Lunares, in hac Tabulâ, ratione altitudinis, pariter sunt distincti, ut differentia, haud difficulter deprehendi possit. Vnde autem, tam accurate scire potuerim, locorum situm, Montiumque differentias, inferius dicetur. Porrò etiam omnium locorum collecta nomina, Tabulæ huic addidi, quò & situs locorum, & ipsa nomina simul, ob oculos ponerentur. Quâ quidem viâ, ut diximus, haud ægrè sibi rerum harum omnium cognitionem acquirere Astronomiæ cultores: cum nomina quæ ordine hîc introducuntur, non Historicis tantùm, sed & Poëtis, imò ac omnibus ferè literarum Peritis sine familiarissîma. Et ne discre-

Selenographica Tabula, instar Geographicæ est constructa.

pantia nominum priscorum hodiernorumque quendam offenderet, utraque junctim afferentur.

Sed nomina in Tabulâ Selenographicâ expressa, majusculis literis notavimus, reliqua minoribus, melioris scilicet distinctio- nis gratiâ, additis insuper & pluribus, quæ ad meliorem intel- lectum conducere putavimus. Demum nomina omnia, ut ci- tius reperiri possent, secundum ordinem Alphabeticum dispo- suimus. Quod autem Tabulam Selenographicam attinet, eam omnibus observationibus, admodum conducibilem, & utilem fore judico, tam ad observationes, rectè instituendas, quàm has ipsas probè intelligendas: idque inferius, suo tempore & loco fusiùs demonstrabitur.

Tabulæ Selenographicæ nomina, eaq; propria Marium, Sinuum, Insularum, Continentium, Promonteriorum, Cherfoneforum, Lacuum, Paludum, Fluminum, Planitierum, Mon- tium, & Vallium.

A

ABarim Mons, *Nebo* & *Pha-
 lga* nominatur, in quo Moyses mor-
 tuus.

Acabe, Mons Ægypti, ad Sinum Ara-
 bicum.

Aconitus, Collis, ubi & Archerusia
 Specus.

Adriaticum Mare, Hodie, *Golfo
 di Venetia*; A Vitruvio *Gallicæ Pa-
 ludes* vocantur; Intimus Maris Adriati-
 cirecessus, in quo Venetiz sitæ sunt,
 hodie *Lagune di Venetia*.

Aca, Insula, ni fallor, hodie *Satabella*.

Ægyptus, Africæ Regio celeberrima,
 quondam *Æria*, *Ætia*, *Ogygia*,
Hophestia. *Chemia* quoque dicta, teste
 Herodoto; Hebræis dicitur *Chus*;
 Turcis *Elchebitz*; & in lingua Ægy-
 pticâ *Cam*.

Ægyptiacum Mare.

Africæ Pars.

Æmus Mons, vel *Hemus*, mons
 Thraciæ; ab Italis *Catena Mundi*,
 & *Monte Argentario* appellatur;
 Turcis *Balkan*.

Ærii Montes Siciliæ, & olim sic ap-
 pellari.

Ætna Mons Siciliæ; *Cælestis Co-
 lumna* Pindaro; *Tiphæus* Mons, Si-
 lio Italico; hodie *Mongibello*, aut
Monte Gibello; olim *Inesia* appellat-
 us, uti meminit Volaterranus.

Æthusa, Insula non procul Sicilia. Aliis
Ægusa, *Limoza*, *Ægates*.

Ajax, Mons Ægypti.

Agarum, Promontorium Sar-
 matiz Europææ.

Alabastrinus Mons Africæ.

Alani

Alani, sive *Roxolani Montes*, juxta Tanaim fluvium & Mæotidem Paludè.

Alopecia, Insula, Paludis Mæotidis, quæ & *Tanais*, item *Calarus* & *Alopece* nominatur. Hinc Socrates oriundus: testibus Lærtio in hujus vitâ, & Platone in Gorgiâ; vocatur etiam à quibusdam *Iste de Renards*.

Alaunus Mons.

Alpes, Montium longissimi tractus, qui Italiâ à Germaniâ & Galliâ, ranquam muro nativo, separant; *Albia* & *Alpionia* olim dictos fuisse, tradit Strabo. A diversis Autoribus etiam variis nominibus distinguuntur. vide Ortel.

Amaræ Paludes.

Amari fontes Ægypti.

Amadoca, Palus.

Amanus Mons, aliâs *Cedrenus*, vel *Monte nigro*.

Ambenus Mons, circa Istri ostia in Sarmatiâ Europæâ, aliâs etiam *Ambolus* & *Embolus* vocatur.

Anemusa, Insula, inter Leopadusam & Æthusam interjacens, quæ etiam *Pelagiæ* dicuntur Insulæ, & *Tariciniæ* in Africæ tabulâ, appellantur.

Annæ Mons, Arabiæ desertæ

Antilbanus, Mons.

Antitaurus, Mons.

Apenninus Mons; pro locorum varietate, varia illi in Italiâ attribuantur nomina.

Apollinis Promontorium, in Mauritiâ Cæsariensi, hodie *Cabo de Tenes*, vel *Cabo de tres forcas*.

Apollonia Insula, quæ & *Thynias*.

Apollonia minor, Insula Ponti Euxini.

Arabia, hodie *Aden*, nonnullis *Atman* dicitur, Saracenis verò *Mamotta*.

Arabia Paludes.

Archerusia Palus, vel *Anthemoisis* ad Pontum Euxinum.

Archerusia Promontorium, ad Insulam Apollinis in Ponto Euxino.

Arcea Palus, vel *Arjena*, *Arctubusa* in Armeniâ Majori.

Argentarius Mons, Peninsula, sive Promontorium Tusciæ; hodie *Monte Argentaro*, in quo olim fuit Portus Herculis.

Arietis frons seu Promontorium, quondam *Brixaba* vel *Acroma*, Tauricæ Chersonesi Promontorium.

Armeniæ Montes vel *Gordici*.

Arrhentiâs, Insula circa Pontum Cappadocicum.

Asiæ Pars, à Sacris Scriptoribus dicitur *Semia*, à Populis verò Asiaticis *Siana*.

Atheniensis Sinus; Athenarum Cappadociæ, non Græciæ; aliâs *Themis* & *Cyrium* appellatur, hodie *Cacari*.

Athos Mons Græciæ, hodie *Monte Sancto*; Turcis *Monastir*.

Atlas minor, Mons in Africa.

Atlas major, eisdem mons in Africa.

Audus, mons Africæ.

Aureus Mons in Mœsiâ; hujus nominis & alii in diversis Regionibus inveniuntur.

B

Baronius, Mons Regni Fessæ, & Marrocci in Africâ.

Besbicus, Insula Propontidis, hodie *Calonio*, vel *Calolino* appellatur.

Berosus, Mons, in eo tres sunt fontes, sine dolore, sine remedio mortiferi. Plinius.

Bodinus, Mons.

Bontas, Mons, seu *Tabas*, circa Serrorum montes, situs.

Borysthenes, Lacus, circa Pontum Euxinum, in quem fluvius Borysthenes se se exonerat.

Byces, Palus; est quidem aliàs pars Paludis Mæotidis; hic autem pars Ponti Euxini: cum enim in Geographià nullus alius occurreret Sinus; idcirco hoc nomen retinere placuit.

Byzantium, hodie *Constantinopolis*

C

Cadmus, Mons Asiæ.

Calabraria, Insulæ Maris Balearici; hodie *Montcolibre*.

Calathe, Insula maris Africi, non procul à Sardinia.

Calchistan, Mons Persiæ.

Capraria, Insula, hodie *Cabrao*.

Carpates, Mons Sarmatiæ Europææ Ptolomæ Germani hunc, *Den Wäsch / Bätter / Wurpgarten / vnd Schneberg* vocant: vide Orteliū.

Carpathos, Insula, olim & *Crapathus, Porphyris* & *Tetrapolis*, hodie *Scarpanta* dicta.

Caput de Tornefe, Peloponnesi.

Carcinites, Sinus, qui & *Tamyra-cæ* hodie, *Golfo di Nigropoli*.

Castiotis, Regio, in Ægypto vel Syria.

Casius, Mons Ægypti, hodie *Larissa*, in quo Pompeji Magni Tumulus.

Caspium Mare, sive Hyrcanum, Albanicum & Tartaricum appellatur, hodie *Abachu, Sala, Cunsjar* &c.

Cataractes, Mons Ægypti, non procul à Nilo.

Caucasius Sinus Ponti Euxini.

Caucasus, vel Caucasii Montes, Pars Tauri Montis, inter Pontum Eu-

xinum & Mare Caspium siti; aliàs *Marpesia Cautes*: hodie *Cochias*.

Celenorum tumulus, Montes Pamphiliz

Cercinna, Insula Africi Maris; hodie *Gamelaria & Querquenes* dicitur.

Chadisia, Promontorium, aliàs *Phadisana*.

Chalcidici Montes, hodie *S. Riti*.

Cilicum, Insula Ponti Euxini.

Cimmerius, Mons in Tauricâ Cherfoneſo.

Cimmeriæ Paludes.

Cimæus, Mons Asiæ.

Circæum, Promontorium, hodie *Monte Circello*.

Cirna, Mons Africæ.

Climax, Mons Ægypti.

Coibacarani, Montes in Persiâ.

Colchis.

Corax, Mons Sarmatiæ Asiaticæ.

Corocondamētis Lacus ad Pontum Euxinum.

Corfica, Insula, quæ & *Cyrnus, Corfis* & *Cerneatis*, in viciniâ Sardiniz sita.

Cosyra, Insula vel *Cossura*, aliàs *Pantalaria* non procul Sicil. & Promont. Mercurii.

Cratas, Mons.

Crathis vel *Gbelidoreus* Mons Peloponnesi; olim, nî fallor, *Stymphalus*.

Cragus, Mons Ciliciæ

Creta, Insula, seu *Candia*, olim *Aeria, Curetis, Macaros & Macaronæſos* dicta.

Creticum Mare.

Cydifes, Mons circa Armeniam.

Cyprus, Insula Maris Mediterrancii, variis fuit appellata nominibus: *Aca-*

mantis.

'mantis, Cerasis, Aspelia, Amathus, Macaria, Cryptus, Colinia, Sphecia, Mejonis, Arofa, Paphus, Chetima, Citica, &c.

Cyanea Europeja, Insula Bosporo Thracio adjacens.

D

Delanguer, Mons, olim *Imaus* ex Radicibus Tauri exoritur: à Ptolemaeo *Chemantini Montes* appellantur.

Didymę, Insulę Maris Mediterranei

Didymus, Mons Afiz Minoris: aliàs quamplurimi reperiuntur hujus nominis montes.

E

Ebiffus, hodie *yrica*, Insula maris Balearici.

Echinades, Insulę sunt maris Ionii; nostrā tempestate *Cozzulari* vocantur.

Eos, Mons Ægypti.

Eoum Mare, seu Orientale.

Erichtini Scopuli, in Ponto Euxino.

Erroris Insula, quę & *Albusama* maris Mediterranei; hodie vocatur *Alboran*.

Eryx Mons, vel *Montes Erycini*, hodie *Trapani & Monte S. Juliano*, in Sicilia

Evila, desertum in Palestina.

F

Ficaria Insula, hodie *Serpentaria*, juxta Sardiniam.

Fontes amari ad Nilum in Ægypto.

Fretum Ponticum.

Fortis, Mons.

G

Gallicus Sinus, dicitur ea pars maris Mediterranei, ubi Rhodanus se in illud effundit; aliàs etiam *Angulus*

Gallicus & Salsus interdum nominatus, ad Aphrodisium Promontorium.

Germanicianus mons, aliàs *Iovis*, in Africā.

H

Hajalon Vallis, in Palestinā, sive Vallis Lunę aliis nominata.

Herculeus Lacus, in Sicilia circa Ætnam situs, quatuor stadiorum fuit in ambitu, in Leontino agro. Diodor. Sic.

Herculis Mons, juxta Promontorium Heracleum.

Hereus, Mons Siciliae, aliàs *Artifino & Tavis*.

Herculeum Promontorium, ad Paludem Męotidis.

Heracleum, Promontorium Ponti Euxini.

Hermo Mons, & *Galaad*, Palęstinae:

Hiera, Insula, juxta Siciliam & *Hieronefos*; vel *Maritima* nominata; hodie *Maretamo*, non procul Promontorio Lylibęo, ubi & alię reperiuntur Insulę.

Hippoci Montes, hodie *Mazarifci*, in Asia, circa Tartariam.

Hippolai Promontorium in Scythiā Europęā ad Boristhenem.

Hipponiates Sinus, aliis *Vibonensis, Terineus, Napetinus, Bruttius, Lameticus*, hodie *Golfo di Taranto*:

Hor, Mons Palestinę.

Horminius Mons, vel *Ormenius*, in Asia ad Pontum.

Horeb, Mons Palestinę.

Hiblęi Montes, Siciliae.

Hyperboreum Mare.

Hyperboreę Paludes.

Hyperborei Montes.

Hyperboreus Lacus Superior.

Hyper-

Hyperboreus Lacus Inferior.
Hyperborei Scopuli.
Hyperborea Regio.

I

Ida, Mons Afiz, in Myfià minori.
Infula Orientalior, Maris Carpat-
ci, five Lybici.
Infula Occidentalior, in eodem
Mari.
Infula, ad Promontorium Arietis, in
Ponto Euxino
Infula Major, Maris Caspii;
Infula Minor, Maris Caspii.
Italia, quondam dicta fuit *Vitalia*, *A-*
pennina, *Argessa*, *Aufania*, *Camefe-*
na, *Hesperia*, *Fanicula*, *Oenotria*,
Salcombrona, *Saturnia*, *Tourina*, &
Vitulia.

L

Lacus major occidentalis,
ad Paludem Mærotidis, vel speciali no-
mine *Odojum*, Lacus, & *Imanow*.
Lacus minor occidentalis,
speciali nomine, Lacus *Ploto*.
Lacus Meridionalis.
Lacus Niger Major.
Lacus Niger minor.
Lathmus, Mons Afiz, minoris.
Lea, Infula ad ripam Barbariz.
Lennos, maris Ægæi Infula, hodie
Stalimene appellatur.
Lesbos, Maris Ægæi Infula; olim et-
jam *Hemerte*, *Lafia*, *Ægira*, *Pela-*
ga, *Æthiops*, *Macaria*, *Mitylena*,
& *Mytaneda*, hodie *Metellino* dicta.
Letoa Infula maris Mediterranei, cir-
ca Cretam; aliis etiam *Christiana*
vocatur.
Leucopetra Promontorium,
hodie Capo de Larme.

Libanus, Mons Sirizæ.
Liguftinus, Mons Italiae.
Lion, Mons in Arabia defertâ.
Lipulus Mons.
Loca Paludofa, in Cercinnâ Infula,
in cujus medio Collis insignis confpi-
citur.
Lunæ Promontorium in Tufciâ, non
procul Sinu Gallico.
Lybicum Mare, vel potius *Ægy-*
ptiacum.
Lychnitis, Palus Armeniæ majoris,
hodie *Exfechia*.
Lybiæ Pars Afriçæ, quam olim &
Olympiam, *Oceaniam*, *Hesperiam*,
Cepbeniam nominarunt.

M

Macra Infula, quæ & *Achillis*,
item *Leuce*; fita est in Carcinite sinu;
Macrocemnii Montes, in Sarmat-
ia Europæâ.
Malta, vel *Melita*, Infula.
Majorica, Infula maris Balearici.
Mampfarus, Mons Afriçæ.
Mantiana Palus, hodie *Gelucha-*
lat vel *Ætamar* vocatur.
Marinus Lacus, in Tufciâ, ad Her-
culis Portum, hodie *Lago d' Orbitello*
Maficytus, Mons Afiz minoris;
Mauritania, Afriçæ Regio; Hebræis
dicitur *Phut*, hodie *Regnum Tre-*
missinum. Hispanis, Gallis & Italis
Barbaria dicitur.
Mediterraneum Mare, Italis &
Hispanis *Mare Levanto*, Turcis
Ætantz id est *Album*, Arabibus *Bo-*
har Rumi appellatur; aliis etiam *Ma-*
re magnum, *Mare internum*, *Mare*
intestinum.

Melos

Melos Insula, variis olim appellata nominibus, vide Ortel. Omnium Insularum in Græciâ fuit Plinius scribit rotundissima.

Menyx Insula, quæ & *Lotophagitis* & *Cyra* vocatur, est Insula Maris Africi, non longè à Syrtibus.

Mercurii Promontorium, Maris Mediterranei ad Afric.

Mefogys, Mons Lydiæ.

Micale, Mons Ioniæ.

Mimas, Mons Ioniæ.

Mingui, desertum, sive *Carmania*, in Asiâ.

Minorica, Insula Maris Balearici.

Miris, vel *Moeris*, stagnum, in quo Mæridis Regis Sepulchrum.

Mons Meridionalis.

Montana Pharan, in Palæstinâ

Montana Seir, in Palæstinâ, hodie *Sardinay*.

Montuniates, Mons in Tusciâ.

Mortuum Mare in Palæstinâ.

Myconius, Mons Siciliæ, circa Messanam.

Mœcia, Regio Europæ, aliis *Servia*, aliis *Bosna* & *Moldavia* dicitur.

Mysius, Mons Asiæ, olim *Saturni Collis* appellatus, à Turcis autem hodie *Geschidage*.

N

Neptunus Mons, hodie *Monte de Namari*, non procul Messanâ, in Siciliâ, ad Fretum Mamortinum.

Nerosus, Mons Tartariæ.

Nilus, vel Fluvius *Triton*.

Nitriæ Mons Ægypti.

O

Olympus, Mons Asiæ, vel *Olympus Mysicus*, hodie *Kischisdag* voca-

tur. Aliàs adhuc duodecim fuerunt Olympi, in Cypro nempe, Macedoniâ Peloponneso & Lyciâ.

Ophiusa, hodie *Fomentera*; Insula Maris Balearici.

P

Paludes, circa Mare Mortuum.

Paludes Palæstinæ.

Paludes Superiores Ponti Euxini.

Paludes Inferiores Ponti.

Palus Maræotis, in Ægypto.

Palus Mæotis vel *Maotica*, hodie *Mar dello Sabacche*, *Mar della Tana*, & *Mar Bianco*.

Pamphylium Mare, seu *Phaselicum*.

Pangæus Mons.

Pæstanus Sinus, sive *Posidoniates*, hodie *Golfo Agropolitano*, vel *Golfo di Salerno*, Maris Mediterranei.

Paropamisus Mons, Pars Tauris ibi in excellentissimam consurgit sublimitatem; ab Aristotele, *Parnassus*, hodie verò, *Pamer* vocatur.

Parthenius, Mons Peloponnesi.

Peloponnesus, hodie *Morca* Peninsula; olim *Apia*, *Pelasgia*, *Argos*, *Pelopia*, *Inachia*, *Ægialia* nominata;

Pentadactylus, Mons Ægypti, ad mare rubrum.

Peronticus, Sinus Ponti Euxini, hodie *Cabo de Manco*.

Persia, Regio Asiæ, hodie *Fars*, *Azamia*, & *Curasan* dicitur.

S. Petro Insula, sita est ad Sardiniam, olim Hercules Insula appellata.

Petra Pyramidalis, seu *Pyramis*, sive Mons *Faronianus*, in Tusciâ.

Petra Sogdiana, ad Mare Hyrcanum.

G g

Peuce,

Peuce, Mons in Sarmatiâ Europæâ.

Phasianus, Sinus Ponti.

Pherme, Mons Ægypti.

Philyra, Insula Ponti Euxini, circa Sinum Phasianum.

Phœnix, Mons è regione Inf. Rhodi.

Pontia, Insula Maris Mediterranei.

Pontus Euxinus, à variis Autoribus varia traxit nomina: *Axenus*, *Amazonus*, *Scythicus*, *Pontus Tauricus*, *Mare Cimmericum*, *Colchicum*, *Caucasum*, *Mare Ponticum*, *Phasianum*, *Sarmaticum*, *Mare Boreale*, *Pontus nigrus*; hodie *Mar de Marmora*, *Mar Majore*, & *Caradenis*, & *Maurothalassa* Turcis.

Porphyrites, Mons, tanquam Minio rubens, ut tradit Agatarchides; & hic in Lunâ ferè ejusmodi est coloris.

Promontorium freti Pontici.

Propontis, Sinus Maris, inter Hellepontum, & Pontum Euxinum; aliàs *Bebrycium Mare*, Thracium, hodie *Mar de Marmora*.

Prophetarum, Mons, Palæstinæ
R

Raphidim, desertum in Palæstinâ.

Rhodus, Insula, olim *Macaronefos* dicta, & aliis variis nominibus appellata.

Riphæi Montes.

Rupes, in sinu Atheniensis.

S

Sacer, Mons Ægypti.

Sagaricus, Sinus, Sarmatiæ Europææ.

Salmydeffus Sinus, hodie *Philia Promontorium*.

Sanctus Mons, ad Paludem Mæotidæ.

Sardinia Insula, quæ & *Sandaliotis* & *Ichnusa* vocatur.

Sarmatiæ Europææ Pars.

Sarmatici Montes, in Sarmatiâ Europæâ, hodie *Scepusiensis*.

Sarmatiæ Asiaticæ Pars.

Scithiæ Pars, hodie *Tartaria*.

Sepher Mons, Palæstinæ; sed & alius hujus nominis in Indiâ invenitur totius Orbis maximus; & hic in Lunâ se se quàm longissime extendit.

Serrorum Mons, Sarmatiæ Europææ.

Sicilia, Insula, quæ & *Sicania*, *Trinacria*, *Triquetra*; teste Plinio.

Sinai Mons, hodie *Catharina*, Turcis *Turla*, & *Gebel Thor*, in Arabia Petræâ.

Sinopium Mons Ægypti, aliàs *Memphidis Mons*.

Sinus Orientalis, Maris Hyperborei.

Sinus inferior, Maris Caspii, in quo rupes insignis videtur: aliàs hic Sinus *Scythicus* dicitur.

Sinus Extremus Ponti Euxini.

Sinus ad Bosporum Thracium, Propontidis.

Sinus ad Hellepontum Propontidis.

Sipylus, Mons Asiæ Minoris: aliàs quamplurimi reperiuntur, hujus nominis Montes.

Sirbonidis Eruptio, vel fretum *Sirbonicum*.

Sirbonis, Sinus, in Africâ non procul à Nilo. Vel *Palus Sirbonis*; In Sacris literis *Torrentis Ægypti*, hodie *Golfodi damiata*.

Sogdiani Montes, inter Mediæ & Asiæ Regionem Limes; hodie *Casbusco*.

Stro-

Strobilus, Mons, Pars Caucaſi.
 Strophades, duæ Inſulæ Maris Ionii.
 Strymonicus, Sinus, hodie *Golfo de Conteffa* in Mari *Ægæo*, ſeu Archipelago.
 Syrticus, Sinus minor, qui & *Lophagitis*, ad Africam.
 Syrticum Mare; Loca ſunt vadoſa; in eorupes quamplurimę ſcilicet, Maris Brevia, locaque arenofa; hodie *Secche de Barbaria*, vel *Braxas de Barbaria*.

T

Tabor Mons Palęſtinę.
 Taigetus, Mons Peloponneſi.
 Tancon, Mons, juxta Mare Caſpium.
 Tarantinus, Sinus maris Mediterranei; hodie *Golfo di Taranto*.
 Taurus, Mons Aſię, totius orbis terrarum maximus, & hic in Lunã omnium maximus.
 Taurica Cherſonneſus, quę & *Cherſonneſus Pontica*, *Taunaim*, *Alopeciam*, *Cherſena*. Noſtrã etate, *Perokopska*, *Geſara*, *Gazaria*, vel *Cazaria*, dicitur.
 Taracinia Inſulæ.

Techifandam Mons Perſiæ.
 Thambes, Mons in Africã Situs.
 Tenarium Promontorium; hodie *Capo Matapan* in Peloponneſo
 Thoſpitis, Lacus.
 Tmolus, Mons, aliàs *Timolus*, in Phrygiã ſitus.
 Trapezus Mons, in Tauricã Cherſonneſo, aliàs *Luftra* hodie *Trebizon-da*; *Tarabosfan* Turcis vocatur.
 Traſimenus, Lacus in Italiã, hodie *Lago de Perugia*.
 Troicus, Mons, ex quo Pyramides *Ægypti*.

V

Vulcania Inſula, aliàs *Vulcani templum*, hodie *Vulcano*, non procul Lipara, Inſula; ſita eſt in mari Mediterraneo, ad dextram Inſulę Sicilię, prope Italiam
 Vxi Montes, in Armeniã majori, unde Tigris originem ſumit.
 Z
 Zacynthus Inſula, prope Peloponneſum, aliquando *Caffiopa*, *Hieruſalem* appellatur, hodie *Zante*.

Hęc habe nomina locorum Lunę omnium, quę itidem Tabulã Selenographicã continentur. Nunc verò adhęc dicitur, de locorum prædictorum vario ſitu, variatione & proprietatibus; ut & paulò fuſiùs, de Tabulã noſtrã Selenographicã, Plenilunio, & omnibus reliquis phaſibus. Ut autem ex voto fluant omnia meliùs: & univerſa lectoribus multo clariora reddantur, propoſui, plenè priùs, de motu Librationis Lunę diſci agere; (qui motus Veteribus proſus fuit incognitus, & in hunc uſque diem, à nemine adhuc exploratus, nẽdum apertè & perſpicuè, per obſervationes fide dignas, demonſtratus) de re nempe ejuſmodi, cujus cognitio maximè re-

Motu Librationis Diſci ab Autore explicatur; qui Veteribus plenè fuit incognitus, nec à Recentioribus adhuc exploratus.

quiritur, tam ad Selenographiam, quàm ad res omnes Lunares, Phasesque rectè intelligendas; imò, absque cujus beneficio, ne minima quidem Lunæ Phænomena, debitè explicari, ac demonstrari possunt.

Satis quidem prolixè, in capite antecedenti, de motu Lunæ vario, cui Luna est obnoxia, pro rei necessitate, dictum; sed hujus motus Librationis, nulla planè facta est mentio: quippe occasio loci non permittebat. Veruntamen, memini cujusdam motus librationis; quomodo scilicet centrum Epicycli primi, in Eccentrico, in minori Epicycli diametro, hinc & inde libretur, motu tamen ad circulem analogo: hic motus autem non est iste, de quo jam dicere constitui, multò minùs quidam Longitudinis & Latitudinis; nisi quòd antè dictus hic motus Librationis, ex motu Lunæ proprio revera oriatur, eique omnimodè se se accommodet, id quod inferiùs evidentissimè demonstrabitur.

Qualiam sit differèntia, inter Lunæ motum proprium & Librationem.

Inter hunc novum Motum Libratorium, & omnes reliquos Lunæ competentes, initiò statim, magna se se offert differèntia. Motus quidem tam Longitudinis, qui secundùm feriem signòrum fertur, quàm Latitudinis, respectu aliarum stellarum; certo certius deprehenditur, ac cognoscitur; rectèque inde à nobis judicatur, ejusmodi motum aliquem circa Lunam existere: quippe, modò illa, hujus stellæ fixæ in vicinià, modò propè aliam cernitur: adeò ut progressum Lunæ tum Longitudinis, tum Latitudinis, ex vario situ ad stellas fixas, uti satis diximus, apertè colligere liceat. Motum verò Librationis disci, quòd attinet, eum minimè ex vario situ, respectu Fixarum cognoscere, nec investigare possumus; sed solummodo ex corpore Lunæ ipso: nec est motus qui à certo loco ad locum, & ex suo vero situ (quod motibus aliàs omnibus est commune) continuè movetur. Nam si Luna motuum illorum prædictorum non esset particeps, certè, motus librationis nullam localem mutationem circa eam procrearet: siquidem hic motus circa axes & Polos proprios fit, instar motus Globi Artificialis Cœlestis vel Terrestris, qui prorsus in orbem circumvolvitur, licet de loco nequaquam moveri possit. Attamen ratione hujus

Luna propter Motum Librationis, non de loco movetur.

Libratio fit circa Polos proprios.

hujus motus, quodlibet punctum, sub meridiano constitutum, ab eodem dimovetur, aliudque admovetur, quemadmodum facile intelligitur. Atque sic cum motu Librationis Lunæ est comparatum. Nam etsi propterea, non omnino de loco deturbetur; nihilominus centrum disci Lunarvisibile, ex hoc fundamento, aut antrorsum, aut retrorsum, sursum vel deorsum fertur; adeò ut centrum ejus, modò circa hanc, modò circa aliam Maculam, necessario supponatur.

Hi Poli, circa quos hæc circumvolutio peragitur, in antecedenti Tabulâ Selenographicâ, in ipsis interfectionibus duorum istorum Limborum animadvertuntur; unus quidem ad sinistram, Hellepontium circiter versus, propè Montem Pentadaetylum; alter verò ad dextram, Africum versus, propè Petram Sogdianam; sic ut motus hic Librationis à Circio ad Euroaustrium, & ab hoc iterum, ad Austroafricum feratur.

Veruntamen, non est hæc Libratio perpetuò equalis, quia Poli neutiquam sunt fixi; sed ex parte mobiles. At non est, quòd tibi persuadeas, Benevole Lector, Lunam beneficio hujus Librationis, planè in orbem circumvolvi, instar Globi Artificialis, qui omni ex parte circumducitur: verùm Luna tantum ex parte, respectu nostri, circumagitur, certamque aliquam solummodo hemisphærii latentis Lunæ particulam, nobis spectandam obvertit, modò scilicet partem superiorem Corum versus sitam, circa Lacus hyperboreos; modò partem inferiorem Africum versus, circa Lacum & Montem Meridionalem. Cæterum Termini, maximæ & minimæ Librationis, hisce duobus Lunæ Limbis monstrantur, interstitiumque interjacens, est maximâ Librationis variatio: quanta autem revera sit, & quid præterea hic sit notandum, paulò post dicetur.

Primò namque indicabo, ne Astrophilum, Scientiæ hujus cupidum, diutiùs morer, unde & quomodo, hic motus suam ducat originem? Id quod nullo negotio cum omnibus jam communicare possum, & ita quidem, ut istud haud ægrè, à quolibet percipi queat, non aliunde hunc motum ortum suum habere, quàm unde eum deduxero: idque faciam tantò libentius, quia non nescio, vix ab aliquo rectè eum deprehensum

*Quam Cæli
plagam Poli
Lunares re-
spiciant?*

*Poli ex parte
moverentur.*

*Luna non
profus cir-
cumvolvitur,
sed ex
parte tan-
tùm.*

iri, in animum revocato, quantum laboris & molestiæ mihi ea res creaverit, præsertim genuinos terminos, verumque Librationis tempus exploranti, usque dum crebrarum nimis, & diuturnarum observationum interventu factum sit, ut hac de re aliquid certi, apud me statuere potuerim.

Motus Librationis, ex motu Luna proprio, oritur.

Motus autem ille Librationis, imprimis ex triplici motu proficiscitur. Primò, ex motu Longitudinis, qui secundum Eclipticæ ductum, per duodecim signa illa cœlestia progreditur. Secundò, ex motu Latitudinis, situ Nodorum & Limitum, & quidem hoc modo: quemadmodum Luna motu proprio suo, secundum longitudinem, indies, imò singulis momentis, in signorum consequentia fertur; sic & certam nobis quoque partem, ratione hujus motus, antrorsum obvertit, hoc est, à Coro ad Euroaustrum, dum in signis nempe Ascendentibus Capricorno, Aquario, Piscibus, Ariete, Tauro & Geminis moratur; retrorsum denuo, ab Euroaustro Corum versus, in Signis descendentibus, Cancro, Leone, Virgine, Librà, Scorpione, & Sagittario. Eo igitur modo, quando Luna versatur in Capricorno, Limbus intimus, qui per Lacus hyperboreos, Montes Amadocos, inter Paludem Mæotidem, & Lacum occidentalem minorem transit (pars superior figuræ præcedentis & sequentis si attendatur) veram & genuinam hemisphærii visibilis Peripheriam denotat. Estque tum temporis, inter ipsum Lunæ marginem, & Paludem Mæotidem, interstitium admodum tenue conspicuum; rursus verò è regione, inter Peripheriam & Paludem Maræotidem, spatium amplissimum cernitur, ut patet ex ipso Plenilunii Iconismo: in parte verò superiori, Aquilonem versus, supra Mare hyperboreum, interstitium illud, ad Peripheriam usque, admodum est coarctatum; è contrario, in parte inferiori, Austrum versus, tantò pars Lunæ major conspicitur. At, cum Luna in principio Cancri est constituta, tunc Limbus Lunæ horizontalis extimus (si Lunæ scilicet partem superiorem consideres) verum & nativum hemisphærium Lunæ visibile, repræsentat; ita ut facies ejus, planè alium præ se ferat aspectum: nam spatium inter Paludem Mæotidem & Peripheriam, eo tempore est

Ratione Librationis, Luna, in uno Latere dilatatur, inq, altero comprimitur.

est latissimum, sic ut duæ longiusculæ Maculæ distinctè cerni possint; è regione rursus, inter Paludem Maræotidem & Lunæ marginem, tantò magis est coarctatum: verùm pars Lunæ superior, id temporis est amplissima, ut non solum Lacus hyperboreos, sed & paludem Amadocam satis à Limbo distantes dilucidè conspiciere non nequeas; (cum tamen Lunâ existente in Capricorno, parum admodum de his lacubus appareat) at circa Austrum, pars Lunæ haud exigua iterum absconditur. Hæc se non aliter habere, in sequentibus affatim, tam ex meis ipsis, quàm Præclarissimorum Virorum Gassendi & Bullialdi observationibus, in nuperâ editâ Astronomiâ Philolaicâ, annotatis, demonstrabitur; quo Lectorem rejicio.

Ut verò Luna singulis Mensibus signa duodecim Cœlestia motu proprio percurrit, ita & hic motus Librationis Disci, menstruo spatio absolvitur; quatuordecim circiter dies, usquequo in Signis Descendentibus commoratur, retrorsum librat contra seriem signorum, ab Austro Corum versus & partem superiorem: rursus, per quatuordecim circiter dies, quum Luna in Signis Ascendentibus subsistit, antrorsum fertur, secundum Eclipticæ ductum à Coro Euroaustrium versus, qui motus hoc modo perennat, motumque Longitudinis in omnibus ferè concomitatur, illique planè se se accommodat. Quod si Luna non simul motui Latitudinis esset subjecta, sed perpetuò secundum Longitudinem in Eclipticâ circumageretur, faciliè & hic motus Libratorius intelligeretur: quia verò Luna, ratione motus Latitudinis, modò Boream, modò Austrum versus exspatiatur, Nodosque variat; similiter accidit, ut hic motus Librationis, eadem ratione, indies varietur, instar motus Longitudinis & Latitudinis; adeò ut sigulis Mensibus diversimodè observetur, & rarissimè, ac non nisi post multos elapsos annos, in simili constitutione spectetur; sicuti paulò post plura hac de re percipies.

Cæterum, quemadmodum Luna, propter motum Latitudinis, tam per aliquot gradus Aquilonem versus, supra Eclipticam ascendit, quàm Austrum versus, infra Eclipticam descendit; ita fit, ut & motus Libratorius, modò Boream versus, modò

Periodus Librationis singulis Mensibus absolvitur.

Libratio intricatior videtur, ratione motus Latitudinis.

Diversa Luna Latitudo, Librationem mutat.

modò Auftrum verſus vergat : hoc eſt, interſtitium Libratorum, inter utrumque limbum interjacens, licet ſatis ſit amplum, Lunâ exiſtente in Cancro; nihilominus illud, pro latitudinis Borealis vel Auſtralis ratione, adhuc magis dilatari aut comprimi poteſt. Et quamvis Luna ſubſiſtat in Capricorno, circulus ſive limbus Librationis Capricorni, nihilo ſecius tamen mutatur atque extenditur, ſive interiorem, ſive exteriorem partem verſus, pro diverſâ Latitudine Lunæ; uti memini. Quæ quidem variatio Librationis non ſolum in Cancro & Capricorno exiſtit; ſed in reliquis omnibus Zodiaci Signis : unde etiam fit, ut centrum Diſci Lunaris viſibile, ſingulis Menſibus, diebus, imò horis, notabiliter ac manifeſtè varietur, ac moveatur; uti præſertim ex Tabulâ Phaſium Generali, & Delineatione primariâ, ut & reliquis omnibus Lunationibus videre licet. In quibus viginti & unum puncta, ſeu octodecim ſpacia, circa centrum animadvertuntur, quæ diverſam Centri Lunarum variationem indicant : Puncta ſcilicet illa tria ſuperiora, in unâ rectâ conſtituta, monſtrant centrum, Lunâ in principio Cancri commorante : Punctum ſiniſtrum ortum verſus, eſt centrum genuinum, cum Luna in primo gradu Cancri, & Limite Auſtrino, vel maximâ Latitudine Auſtrali ſubſiſtit : Punctum dextrum eſt, centrum Lunæ, cum verſatur in eodem ſigno & gradu, ſed latitudine Boreali : Punctum intermedium, eſt locus centri, Lunâ, circa Nodos, in prædicto ſigno graduque exiſtente. Reliqua tria ſequentia puncta, pariter verum Diſci centrum, in utraque Latitudine, Lunâ verſante in Leone & Geminis indicant. Tertia linea, Luna quando moratur in Virgine & Tauro. Media, exiſtente Lunâ in principio Libræ & Arietis. Quinta, Luna cum eſt in Virgine & Piſcibus. Sexta, cum ad initium Sagittarii & Aquarii pervenit. Infima, in ordine & ultima, Lunâ ſubſiſtente in Capricorno, centrum ſuum nobis exhibet : hac tamen lege, uti jam antea dictum; puncta illa ſeptem ſiniſtra, Auſtralem Latitudinem denotant, & dextra, Borealem; media verò linea, quando Luna in Eclipticâ, hoc eſt, circa Nodos verſatur. Verùm hoc jam jam clariùs reddetur, adminiculo ſcilicet figuræ ſequentis, in quâ puncta

*Quid Puncta
illa circa cen-
trum Tabulæ
Phaſium ge-
nerali, deno-
tent?*

puncta illa Signorum & Limitum, in majori distantia repræsentantur; sicque facilè, motus centri Lunæ fiet manifestior.

In sequente schemate, Linea sinistra a d, repræsentat Limitem Austrinum, vel Latitudinem maximam Meridionalem, in lineâ longitudinis; altera opposita parallela dextra b f, Limitem Boreum, sive maximam latitudinem Septentrionalem; intermedia c e, Eclipticam seu lineam Nodorum, in quâ Nodi, in perpetuum moventur. Hæ tres lineæ, in sex interstitia, sive in septem lineas transversas, sunt distinctæ, quæ duodecim signa Cœlestia referunt, simulque Lunæ latitudinem ab utraque parte Eclipticæ. Exempli gratiâ: Linea superior a b, est latitudinis linea Cancris; proximè subsequens, linea latitudinis Leonis; tertia Virginis, quarta Libræ; quinta Scorpii; sexta Sagittarii; & ultima Capricorni; lineæ nimirum Signorum descendantium. Reliqua sex Signa Ascendentia, veluti Aquarius, Pisces, Taurus, Gemini & Cancer, pariique modo in diagrammate iterum ascendunt.


Motus Centri
Disci expli-
catur.

Porro, si Luna perpetuò cursum suum perliceret, aut in Eclipticâ, Limite Austrino, aut Limite Boreo, in lineis scilicet Eclipticæ parallelis; tum & centrum Lunæ, tantummodo in hisce tribus lineis c e, a d, vel b f, similiter moveretur: à Cancro descendendo usque ad Capricornum, & rursus à Capricorno pariter ascendendo, usque ad Cancrum: hinc non solum motus Lunaris, esset simplicior; sed & ejus centri. Cum verò, uti constat ex præcedente capite, latitudo Lunæ quotidie maximè variet singulisque diebus diversè se habeat; (jam enim Luna circa nodos, hoc est in Eclipticâ versatur, jam unius vel alterius gradus latitudinem acquirit, jam maximam, quæ quinque gradus excedit, tam Austrum versus, quàm Aquilonem, jam latitudo ejus iterum decrescit) eò fit, ut lineâ longitudinis centri Lunaris, continuè Eclipticæ non possit esse parallela; sed necesse est, ut constituat cum hac certum angulum, illamque certo tempore interfecet, non quidem semper in uno eodemque loco, ut rectè ex motu Lunæ colligitur, sed in punctis diversis. Quamobrem Libratio centri Disci Lunaris, similem acquirit motum, prout ex figurâ subsequente, res

H h

fiet

fiet manifestior. Atque ut id tantò meliùs comprehendere-
tur, idcirco adhuc plures lineas transversas in eodem schemate
duxi, motum illum Menstruum mixtum, ex motu longitudi-



nis & latitudinis ortum, com-
monstrantes; non tamen in
omnibus & singulis gradi-
bus longitudinis & latitudi-
nis, verùm duntaxat in Si-
gnorum principiis, maxi-
mamque & minimam va-
riationem, seu mutationem
latitudinis, centri Lunæ in-
dicantes: namque quæ sin-
gulos gradus eam rem ex-
primere, in ejusmodi exiguo
diagrammate, est utiq; im-
possibile, aut certè magnam
confusionem linearum hæc
res pareret.

Sciendum igitur est, quòd
principales lineæ reliquarum
transversarum sunt a f, &
b d, quæ se invicem, & si-
mul lineam Nodorum, seu
Eclipticam, in puncto g in-
tersecant. Quando itaque
Luna in Limite Austrino &
Cancro versatur (exempli
gratià in a) tunc centrum

ejus in hac lineâ descendendo, secundùm seriem signorum, per
g Nodum, Capricornum versùs nimirum f libratur, ubi rur-
sum maximam Septentrionalem latitudinem acquirit. Sic
quoque, si Luna in b Cancro & Limite Boreo sit constituta,
tum centrum ejus iterum descendendo per g movetur, ad
Capricornum & Limitem Austrinum d: contrarium accidit,
cùm ex f & d ascendit.

Qui-

Quibus duabus ductis lineis, se invicem interfecantibus, ex omnibus signorum initiis, aliæ sunt ductæ parallelæ; omnes & singulas reliquas variationes, motumque centri ostendentes, in quibuscunque etiam signis, Limites vel Nodi versentur. Exempli gratiâ: Luna si sit in Leone, & quidem in Limite Australi, tunc, eodem temporis puncto, centrum est in h, hincque movetur in signorum consequentiâ, per signa, Virginis, Libræ, Scorpii &c. in lineâ h i k; sic ut linea Nodorum, sive veriùs Ecliptica, tum temporis, non in g (ut quidem antea Limite in Cancro constituto) sed in i, interfecetur; nec ad f lineam Capricorni redit, ut in priorè Lunæ constitutione, sed in k incidit: hinc verò iterum sursum ad l tendit, quo loco linea hæc motus centri, Limitem centri Lunæ Boreum tangit. Vnde colligitur, maximam Lunæ latitudinem borealem, hoc tempore versari in Aquario; postmodum ab hoc puncto contactus, in lineâ l, m, n, se iterum dextrorsum, partem superiorem versùs, ad h, convertere. Nodus autem oppositus in hoc itinere fuit in m, intersectione nempe hujus lineæ & Eclipticæ, uti jam antea memoratum.

Quod si verò Luna sit in Tauro, & quidem in maximâ Australi latitudine, tum centrum ejus existit in o, indeque sursum, secundum ordinem signorum t versùs fertur; deinde verò ad s, Nodum nempe in Leone subsistentem, se convertit: hincque iterum Scorpionem r versùs, in quo loco Limitem borealem assequitur, & sic ulterius, q & p Nodum oppositum versùs, in Aquario hærentem, donec denuo ad locum antea possessum ferè redeat. Ferè inquam ad locum, unde antea decesserat, quod bene notetur; quippe centrum Lunæ nunquam, si rem attentè consideres, post menstruum absolutum cursum, ad illum priorem locum, unde se se moverat, reverti potest. Nodi namque interim simul moventur in signorum antecedentiâ: quo fit ut linea centri itineris, paululum retroagatur, nulloque tempore, Limites suos, eo in loco assequi iterum valeat, ubi Mense præterito eos habuit. Quæ quidem anticipatio vel retrocessio, in figurâ antecedenti, minimè exprimi potuit: sed id etiam non magnopere interest, ut tam exigua hoc in negotio observentur. H h 2 De

De reliquo; Lunâ in Ariete, Limiteque boreali existente, centrum ejus in u invenies, indeque c Cancrum Nodumque versus movetur, postea ad vv Libram, maximamque latitudinem Australem tendit; denique per e Nodum rursus ad priorem circiter locum k, unde digressum fuerat revertitur, sicque deinceps.

Ex quibus utique satis superque apparet, verum locum centri, ejusque lineam itineris, quovis tempore, in omnibus Lunæ Iconis (Limites, vel Nodi, in quibuscunque etiam versentur signis) citra errorem, adminiculo hujus figuræ, facile innotescere: eâ expressâ conditione, dummodo quod planè necessarium est, longitudo & latitudo Lunæ, prius fuerit explorata. Insuper ex superiori schemate, videre quoque licet, quomodo centrum Lunæ visibile, in admirabili sanè lineâ circumducatur, in circumferentiâ scilicet Rhomboidis; quæ tamen non perpetuò, unam eandemque retinet formam; sed illam cum motu proprio, singulis Mensibus variat: modò enim Rhomboides illa diducitur, modò coarctatur, prout Limites Lunæ, diversum Zodiaci signum, vel gradum obtinent. Estque hæc nunquam latior, quàm cum Limites in Ariete, vel Librà commorantur: nam ex Rhomboide, tum Rhombus constituitur, schemate attestante. Præterea, quò Limites, punctis æquinoctialibus viciniore, eò amplior existit Rhomboides; quò verò propinquiores punctis Solstitialibus, eò arctior evadit, usque dum in Cancro nimirum & Capricorno hæc planè evanescat, inque rectam lineam transeat. Hinc verò indubitata sequitur; quia centrum Lunæ Disci, nullo tempore in lineis Eclipticæ parallelis movetur, veluti motus Lunæ proprius; eò & Polos Librationis nunquam in eodem semper Periphæriæ loco hæerere, verum quòd ratione Librationis centri, & longitudinis, ac latitudinis, Lunæ ad Eclipticam relatæ, modò ascendant, modò descendant.

Cæterum, monstrare quoque placet, quâ viâ, verus centri locus, in quocunque Lunæ positu, explorandus; quanquam singuli gradus longitudinis & latitudinis, in hac figurâ non sint expressi. Exempli gratiâ, si scire desideras, ad certum
tempus,

tempus, genuinum Peripheriæ, sive centri disci locum, Lunâ in decimo gradu Leonis, tertioque gradu latitudinis Australis constituta, sic age: initiò, divide signum Leonis, simpliciter ad oculi mensuram (nam accuratori operâ, hic minime opus) in tres partes æquales, secundum longitudinem, & in quinque secundum latitudinem, ab Eclipticâ numerando, sic, ut quodlibet spatium, unum latitudinis gradum referat; quo factò, pedem circini, in punctum latitudini & longitudini respondens, fige, veluti hic in x, ex quo, tanquam genuino centri loco, veram Lunæ Peripheriam, nullo negotio, certo ac desiderato tempore competentem, describes. Id quod equidem in omnibus Iconismis, in quibus centra sunt annotata, pariter observari poterit, præsertim ab illo, qui huic rei, cum industriâ & circumspèctione attentioneque, est deditus. Hoc verò inprimis scire magnopere interest; absque quâ notitiâ, nec Phases Lunares rectè observari, delinearique, nec ullæ unquam Lunationes, vel observationes Eclipsium &c. institui possunt: nam nisi prius debitam in primariâ figurâ Peripheriam delineaveris, in arenâ ædificabis, ut imposterum fusiùs dicetur.

Postquam igitur, motus centri Lunæ, illiusque Librationis, quadantenus fuit explicatus; vix inconvenienter quæres modò, quanta revera sit pars illa quæ mediante hoc motu Librationis, de Lunæ hemisphærio latente, nobis obvertatur; & illa, quæ de hemisphærio patente, certo tempore, ab oculis nostris avertatur? Ex tribus præcedentibus Pleniluniis ex parte illa pars satis cognoscitur; quia spatium illud inter utrumque limbum interjacens, est id quod quæritur. Namque primus limbus horizontalis speciem refert Lunæ, in Cancro & Limite Austrino; secundus, faciem Lunæ in Capricorno & Limite boreali constitutæ, in quo situ, extremi termini Librationis & maxima Lunæ variatio existit: quæ quanta autem sit accurate loquendo, in proportionem ad diametrum in minutis, vel miliaribus Germanicis, jam detegam. Circa nonagesimum ferme gradum ab utroque Polo Lunæ distantem, quo loco, Libratio omnium maxima, prope Montes Sarmaticos; rursus inque Australi parte prope Lacum meridionalem, hæc Lunæ

H h 3

varia-

*Quantum
vera sit
spatium
Libra-
tionis?*


variatio ad unum minutum, & quadraginta quinque circiter secunda se se extendit; si diametrum Lunæ scilicet triginta minuta, hoc est, triginta penè milliaria Germanica, qualium tota diameter, est circiter quingenta, æquare statuas. Circa verò Paludem Mæotidem, Libratio non est tanta, nec unquam fieri potest; quia Polus ab illo loco, non adeò distat: quapropter Libratio illic ad unum tantum minutum; hoc est, quindecim milliaria germanica se se dilatat.

*Verum inter-
stitium Li-
brationis, ap-
parente ma-
jor.*

Rem tamen si penitiùs introspicias, interstitium hoc Libratorum longè majus ampliusque existit, quàm prout nobis appareat: omnibus & singulis observationibus id evincentibus. Idque non solummodo ex Quadraturarum variatione; sed & ex reliquis Phasibus, præsertim falcatis & corniculatis, manifestissimè recteque judicatur. Quandoquidem enim circa primum luminis incrementum, interstitia diurna luminosa, admodum sunt contracta; circa quadraturam verò omnium sunt maximè extensa, cum tamen reapse si omnia bene consideres, Luna singulis diebus & horis, æqualem luminis portionculam à Sole hauriat; namque ab illo recedendo, in æqualibus temporibus, ferè æqualia conficit spatia. Quòd autem Phases, non simili proportione, nobis crescere aut decrescere videantur, tum ex rotunditate Lunæ proficiscitur, tum quòd Phases recentes, per angulum obliquiorem, spectari oporteat. Itaque Luna quoad verum, non autem apparentem aspectum, 60. minimum milliari. Germ. circumvolvitur, unam quidem seu alteram partem versus; quemadmodum suo loco plenius diducetur. Nobis verò, parte dimidià ferè minus, spatium istud apparere, non aliunde oritur, quàm, quòd hanc Librationem Plenilunii tempore, solummodo ex apparentià, exque partibus Peripheriæ vicinissimis æstimare valeamus; ideoque verò cum ejusmodi partes, radiis obliquioribus percipiuntur, quàm illæ, quæ rectius circa medium opponuntur, Libratio hæc (circa limbum tantummodo spectabilis) necessariò minor arctiorque à nobis animadvertitur, quàm, si circa Lunæ medium observaretur: cum tamen hæc interstitia ad invicem collata, reapse inter se prorsus sunt æqualia, teste Francisco Aguil-

guilonio, lib. vi. prop. 12. Optic. inquit: *Linearis projectura partes, quæ ab æqualibus circuli peripheriis proveniunt, minimè inter se æquales, sed minores semper illæ, quæ longius à medio absunt: nam remotiores à centro radii obliquioribus angulis circuli peripheriam interfecant, quare minore intervallo ab invicem distant: sunt igitur prope extremitates minores, æqualium peripheriarum projectura.* Hæc ita adhuc apertius declarari possunt graphicè.

Esto semicirculus $d A d$ hemisphærium Lunæ visibile, in sex partes æquales divisum, sic ut partes $a b$, $b c$, & $c d$, omninò sint ejusdem magnitudinis. E verò, statio sit oculi



mei, ex quâ Lunam intueor. Dico igitur, etiamsi partes illæ, planè inter se sint æquales, nihilo tamen minus unam, alterâ parte, majorem apparere; quæ magnitudo eò magis crescit, quantò hoc spatium remotius distat à limbo d , viciniosque sit lineæ perpendiculari $a E$, quod ex figurâ appositâ fit manifestum. Nam pars $A b$, major est parte $b c$, & hæc iterum amplior, quàm $c d$, quia obliquius, ut jam meminimus, spectatur; idcirco & angulus visionis $d E c$ multò minor, angulo $A E b$ existit; id quod Kepplerus abundè in Paralipom. in Vitell. pag. 184. demonstravit, qui inter cætera

ait: cum ab æqualibus circuli arcibus rectæ ducuntur ad punctum extra circum, inæquales sunt anguli ad punctum, ab æqualibus arcibus subtenfi, & majores, quorum arcus sunt diametro per punctum viciniore.

Ex quo fundamento, Libratio Lunæ ad Peripheriam 30 summum milliaria nobis videtur, tam in superiore, quàm inferiore parte; cum tamen circa centrum illa ipsa minimum sexaginta æquet: sicuti apertè & perspicuè Quadratarum confinia impolsterum testabuntur. Hac occasione, fortassis quidam ex me

percon-

*De centro
vrum Libra-
tionis loco, &
cur aliter cõ-
stitui mini-
mè potue-
rim?*

percontetur, præsertim ille, qui hoc negotium probè secum perpenderit, & animo menteque volverit, non autem per transfennam solummodo aspexerit: quare utrumque extremum Lunæ centrum in Pleniluniis præcedentibus exhibitis (alterum, Lunâ nimirum in Cancro, & limite Austrino constitutâ, alterum, in Capricorno, & limite boreo versante) non magis ab invicem distent, quàm maxima variatio librationis in Septentrione, & Austro, circa Peripheriam; quandoquidem vi demonstrationis prioris, ut & ratione nostræ sententiæ, necessariò sequitur, ut sanè duplo sit major centrorum distantia, tam secundum longitudinem, quàm latitudinem, aliamque prorsus figuram, centra illa constituent? Hæc verò ita se se habere ego minimè diffiteor; sed centra secundum jam dictam proportionem, in Lunâ revera existentem, non fuisse annotata atque exhibita, id non nisi ex certis prægnantibus, & urgentibus rationibus factum. Siquidem vera Lunæ facies, cum omnibus Oceanis, Insulis, & Montibus, non in tali proportione & formâ exprimitur, in Iconisimis Lunaribus, uti ipsa Luna existit, si illum cominus aspicere, vel potius in eâ versari liceret; sed prout tantum eminus à Terrâ, videtur, sicque rerum illarum figurâ, distantia & proportio, secundum apparentiam se se unice offert: quod tantum modò expetere attinet: si aliter enim Lunæ facies esset expressa; observationibus, propositoque nostro, minimè foret utilis & accommodata. Nam, eo loco quod Plenilunii Facies hoc modo jam est adumbrata, sic planè tunc aliter, illam delineare oportuisset; ipsaque omnia ad Peripheriam sita loca, quæ sunt; Palus Mæotis, Lacus hyperborei, Palus Maræotis, Insula major Caspii, &c. ita longè majora & ampliora, secundum distantiam à centro, extitissent, figuramque omnino variassent, propter ante memoratas rationes, ob rotunditatem putà Lunæ, & quòd partes Peripheriæ viciniore sub minori angulo spectentur.

Nobis autem, cum in Selenographicis hisce delineationibus, visibilis Lunæ faciei ratio tantummodo habeatur, quomodo videlicet illa in æthere, aspiciendam se se exhibeat, variatque, (quod hîc attendisse sufficit) ita & motum librationis tantum,

in

in omnibus phasibus apparentem, repræsentare & adumbrare placuit. Nec profectò centra nullo alio ordine, ullàve alià formâ apponenda fuerunt, ne non omnibus temporibus, genuina Lunæ Peripheria visibilis respondens, horum scilicet centrorum beneficio, rectè ob oculos statueretur. Cur autem sectiones luminis & umbræ Quadraturarum, per hæc centra perpetuò non transeant, ut quidem jure deberent; ideo fit, quòd Maculæ tam majores, quàm minores, ratione librationis & distantia à centro vel peripheriâ, se se paulatim, & semper magis magisque dilatent, quo centro viciniore ferantur; ac plus plusq; se se comprimant (secundùm apparentiam inquam) quò peripheriâ, per motum librationis viciniore reddantur. Quod ut ut difficulter admodum è vèstigio percipietur; tamen hac vice, pluribus persequi hoc negotium non permittitur; planè id eò rejiciendum existimo, ubi datâ operâ de Quadraturarum terminis, quantum sufficiat, agetur.

Quemadmodum igitur, motus librationis Lunæque centri, prout audivimus, mirum in modum, secundùm Lunæ motum, in suâ orbitâ variat: sic quoq; cùm circa Pleniluniam, tum Quadraturas, omnesque reliquas phases, varias admirabilesque gignit vicissitudines; adeò ut vix longo temporis intervallo elapso, vel phasis aliqua, vel Plenilunium, alteri ab omni parte simile, redire possit. Faciamus enim esse, ut absoluto anni curriculo, priori similis phasis quoad longitudinem Zodiaci, rationeque temporis ejusdem, contingat; attamen perrarò admodum evenit, ut pariter illa in simili latitudine observetur: ideoq; fit, ut Plenilunium seu phasis aliqua confestim aliam acquirat faciem; estq; Luna modò supra, modò infra, modò Eoum, modò Zephyrum versùs amplior vel arctior, sicuti ex motu libratorio haud difficulter colligitur. Similibus variationibus, & Quadraturæ perpetuò sunt obnoxie, quæcunq; in anno existunt; unde etiam consequitur, ut rarenter, similis quædam sit conspicua, neque eò solùm, quòd ratione librationis, aut in parte superiori, aut inferiori, vel in utroque latere, crescat vel decrescat; sed quòd inprimis sectiones luminis & umbræ, Lunam tempore Quadraturæ, mirificè interfecent: dum sectio illumi-

Rarissime simili observatur phasis.

Et Quadratura admodum varians

Quadraturarum confinia. stato tempore reciprocantur.

nationis modò magis ortum, modò occasum verſùs ſe ſe extendit, modoque Luna ratione Iconiſmi bifariam ſecatur. Interim tamen, hæc variatio & viciffitudo, certos ſuos terminos reſpicit, tempusque, intra quod hæc omnia abſolvuntur. Sicuti enim Quadraturæ, per primum ſemeftrè ſpatium, in ſignis comorantur aſcendentibus, & per alterum ſemeftrè, reliqua ſigna deſcendentia peragrant : (ſiquidem Quadraturæ ſingulis menſibus, in alio atque alio ſigno, in conſequentia, devolvuntur) ſimili ratione, progrediuntur ſectiones Quadraturarum, à menſe Martio numerando (quando circa æquinoctium in Cancro contingunt) ab occaſu in ortum, ſecundùm ſignorum ſequeſam, quoad Septembrem circiter, quum Quadra in Capricorno oritur; eo enim tempore, hæc ſectiones, iterum ſimili modo recurrunt, ad Martium uſque. Quod aliter huc uſque non evenerit, per innumeras obſervationes, certiffimè ſum edoctus, quarum non paucas Aſtronomiæ Cultorum oculis, hoc in tractatu ſimul ſubjicere placuit, quò ſcilicet eò meliùs, quilibet omnia percipere ac intelligere, motusque librationis ſive reciprocationis, magis ſtabiliri poſſit. Idcirco verò conſtitui, ſex delineatis Quadraturis, decimâ nimirum, undecimâ, 12. 30. 31. & 32. figur. maximam variationem repræſentantibus, ſimul diverſas integras Lunationes, ſummâ diligentia, intra menſtruum ſpatium obſervatas, publici facere juris; ut ex iis tam admirabiles illæ progreſſiones, & retrogreſſiones menſtrux, Sectionum Quadraturarum, in quibuſcunque propemodum ſignis exiſtentes, ipſo oculi ſenſu comprehendantur; itemque non Motus tantùm variationis, ſive librationis cuſpidum (de quo plenè infrâ capite 18. agetur) ſed & omnium ipſarum phaſium mutatio & viciffitudo, motusque reciprocationis centri, per integrum penè anni curriculum animadverſus : minime dubitans, quin in Cœlo probè perſpecta & fundata eſſe omnia, quæ retuli ac propoſui, quilibet (dummodo longitudinis latitudinis, Nodorumque Lunæ omni tempore habeatur ratio) ſit deprehenſurus.

Totas Lunationes, peculiaris modo obſervaviſſi.
A: 107.

Quem ſingulas phaſes, ſeu potiùs ſectiones luminis & umbræ, menſtruo ſpatio, quotidie recurrentes, delineationis alij
cujus

Haec observationes plurimum Selenographia ac Astronomia conferunt.

cujus primariae & correctae, huic operi destinatae adminiculo institutum, observandi modum, multum utilitatis allaturum, summeque esse necessarium judico; & non solum quidem ad diversas phaesum vicissitudines, ut judicavi, explorandas; sed etiam ad recte investigandum hoc unico medio (si hoc negotium tantum sedulo continuetur) motum librationis longitudinis, latitudinis, ac cuspidum, sicut & reliqua circa Lunam occurrentia phaenomena, arcuumque diurnorum differentias cognoscendas. Ipse ego nisi hac arte usus fuisset, vix leviter, in tam brevi in hanc rem impenso temporis spatio, Selenographiam affectam dare potuissem: nullusque dubito, si ejusmodi observationes ab aliis continuentur, forsitan adhuc majora inventum iri; certe illos minimum, qui de certitudine motus librationis, vel phaesum variationum sive mutationum, inaeque pendentibus, adhuc quodammodo ambigunt, hac de re certiores futuros, cognito, quod omnia, quae hic a me, primum sunt prolata, solido niti fundamento, nec quicquam fictitii tradi. Quae autem via, ejusmodi Lunationum observationes, recte & commodè institui debeant, cap. 44. docebitur: in quem locum, & figura generalis, sive primaria ad Lunationes, & alias observationes accommodata, cumque omnibus observationibus necessariis, reservatur. Quod vero pleniorum attinet demonstrationem, terminorum in Quadraturis, ut & motus librationis cuspidum, nec non sufficientem expositionem, de Quadraturis ipsis, in descriptionem Iconismorum haec reservabimus: quandoquidem omnia & singula, hoc loco simul explicari, demonstrarique haud potuerunt.

Nominibus itaque Maculas convenienter affectis, motuque Librationis, pro instituti nostri ratione, satis, quantum arbitrator, enodato atque explicato; iterum dicere quaedam aggredior, de Plenilunii delineatione, Macularum genuino commensu proportionis, & constitutionis figuram, coloribus, mutationibus, proprietatibus, Tabulam Selenographicam ipsam, rebusque huc spectantibus. Nam licet Lector harum rerum cupidus, sine manu ductore, ex Tabula majori Ichnographicam Plenilunii delineationem exhibente, quodammodo Macularum, hoc

est Marium, Lacuum, Sinuum, Montium ac Vallium, cæterarumque rerum in Lunæ facie occurrentium, proportionem & symmetriam, summâ curâ & diligentia à me adumbratam, oculis assequi possit: nullo tamen adhuc modo ex præcedentibus mente assequetur, non monitus, quo adminiculo accuratam illam Macularum proportionem, & dispositionem observare mihi licuerit. Qui, nisi totus fallor, forsitan cogitaturus est, vix esse possibile, ut hanc proportionem, definire quiverim: in animum inducto, me solummodo, Tubi beneficio, oculorumque mensurâ, & simplici inspectione has observationes peregrisse: quâ viâ utpote admodum lubricâ, facillè decipi fallique, in phasium delineationibus quispiam possit; ut evidenter & apertè, ex rebus continuè oculis obversantibus, colligere licet. Id quod equidem non diffiteor, maximam esse difficultatem, simplici oculorum dimensione, per Telescopium, debitam & veram formam, proportionemque alicujus objecti in chartam conjicere, quod ipse ego initiò observationum mearum satis superque deprehendi. Eapropter aliam planè eamque tutiorem viam ineundam esse dispexi, quò de oculi mei mensurâ mihi certò constaret, & rebus omnibus bene examinatis, phases omnes, modo infallibili constitutas, ita suppeditarem, ut omnibus, quorum interest, demonstrari posset, eas rectè de lineatas, ut jure nemo repugnare habeat. Sic igitur rem istam sum aggressus.

Primò; circa observationes & delineationes Macularum, summâ diligentia atque industria attendi, beneque notavi, quænam loca eadem rectâ lineâ sita essent; quorum primâ statim fronte, ingens numerus se se detexit, quæ cum tribus, quatuor vel quinque aliis præclaris locis, in simili constitutione deprehenduntur. E. g. ut aliquorum solum mentionem faciam, quò res eò melius percipiatur. 1. In eadem rectâ conspiciuntur Mons Ætna, Insula Besbicus; Insula Cyanea, littusque boreum Paludis Mæotidis. 2. Mons Sinai, Mons Didymus, ac Insula Macra. 3. Sinus Maris Pamphili, Mons Mesogys, Mons Argentarius, & Lacus niger minor. 4. Mons Porphyrites, Insula Corfica & Insula Macra, pars Australis Insulæ Sardi-

Quo modo infallibilis, proportio Macularum, accuratissime investigari possit?

Quanam Macula in lineâ rectâ sita?

Sardinia, & pes Montis Argentarii : quorum loca adhuc plura dantur, quæ simili modo, in rectâ lineâ procedunt, ut paulò post commemorabo. Quod quidem optimum est auxilium, Maculas quascunq̃ exactè ordinandi; sed tamen nondum id prorsus sufficit : siquidem hâc viâ, nullæ adhuc Maculæ, quæ loco fundamenti inservire debeant, in vero atq̃e genuino suo loco, constitui possunt. Idcirco rem sic conficere sum aggressus, ut morem Geographis usitatum sequerem, quum Tabulam Geographicam delineare, & construere tentant : qui inprimis, si non omnium locorum, tamen minimùm præcipuorum longitudes & latitudes explorant, quo factò, res redditur perfacilis; quippe si tantummodo sub normali intersectione, lineæ longitudinis & latitudinis, loca illa constituentur, verus & naturalis situs istorum est inventus : sicq̃e deinceps cum reliquis, quorum longitudo & latitudo innotuit, pergendum. Similem igitur ferè rationem cum Lunæ investigandis oris tenui; quamvis enim (ut haud ægrè intelligis) locorum Lunæ longitudes ac latitudes, non eo penitus modo, quo Geographis, ex cognitâ viarum intercapedine licet, indagari possint, eò quòd in Lunâ non pedibus ad ea, sed oculis duntaxat pateat aditus : nihilo tamen minùs sicut in Geographiâ alii adhuc dantur modi explorandi distantias locorum, quæ adiri nequeunt : ita in Selenographiâ quoq̃e non absimiles sunt viæ, quibus non adeò multo negotio Macularum Lunarum situs, & distantia cognosci queunt, quemadmodum nunc exponam.

Initiò, sedulò investigavi, quænam Lunæ loca intersectioni cuidam, duarum vel trium certarum linearum, subiaceant; sicuti inter reliqua, Insula Besbicus Propontidis notatur, quæ non solum, prout jam memini, cum Monte Ætnâ, Insulâ Cyanæ, & Promontorio Arietis, ipsam rectam constituit; sed & pariter cum Insulâ Corsicâ, Monteque Herculis aliam rectam, & vicissim cum Insulâ Macrâ, & extremâ cuspide Sinus Strymonici, tertiam; adeò, ut planè sub trium linearum se se intersecantium puncto, hæc Insula sit sita. Similiter cum Insulâ hæc Besbicus in schemate meo Lunari sub eadem intersectione

trium dictarum linearum jaceat, perfectissima atque infallibilis est nota, hanc in debito & justo loco collocatam esse, nec non reliquas prædictas oras, rectè constitutas : quod si tamen error quidam inter delineandum irrepserit, illi haud magno labore hac ratione præveniri poterit.

Secundò; Montem quoque Didymum Asiæ, sub tali interfectione duarum linearum deprehendi : hoc est, tam cum extremâ cuspide Sinus Strymonici, Monte Sipylo, & Lacu Thospide, in eadem reperi rectâ, quàm cum Insulâ Macrà, & Monte Sinai. Cujus generis loca, in Lunâ hoc modo se se habentia, adhuc quamplurima dantur, quibus tamen recensendis lubens supersedeo, ne longum faciam : sufficit enim indicasse, quam semitam triverim, ut Lunæ oras accuratè proprièque in Iconismis meis collocare, unamq; alteri Maculæ adstringere, erroresque subinde irrepentes corrigere, mihi licuerit. Cujus negotii ad finem rectiùs perducendi causâ, omnia loca eodem modo jacentia, quæ unquam reperire potuerim, in auxilium adhibui : quæ verò aliter essent sita, aut per rectas lineas, vel accuratâ oculi mensurâ, ad priora cognita & rectè constituta, annexi.

Tertiò, si duæ, tres, vel plures lineæ, in uno puncto in Lunâ concurrant, & id æque in phasibus delineatis appareat, certissimum quoque & infallibile est indicium, loca illa rectè esse ordinata : quorum utique locorum itidem haud exiguus reperitur numerus, talem omnino obtinentia situm, ut sunt inter alia; Insula Macra, Mons Ætna, Mons Sinai &c.

*Alvaratio,
Lunæ locorū
distantiar, di-
metiendū.*

Quartò, singulare insuper compendium reperi, ad hæc omnia eò feliciùs, & accuratiùs promovenda : quo quasi instrumento, diverforum Lunæ locorum distantias non possumus non dimetiri, indagare atque dijudicare; non quidem Radio Astronomico, Astrolabio, Sextante, & hujus generis aliis organis; sed solummodo probo Telescopio rectèque adornato; & id in modum sequentem : cum Tubi omnes ut ut prælongi & præstantes, nunquam totam Lunæ dimetientem, unâ vice comprehendant; sed quò fortiores & præclariore, eò minorem Lunæ particulam nobis exhibeant : idcirco diligentissimè confi-

consideravi, illa Lunæ loca, quæ sub eâdem Tubi aperturâ essent sita, tanquam ejusmodi, quæ æqualiter ab invicem removebantur, & prorsus distantia essent similia. Postmodum exploravi, num etiam meæ delineatæ figuræ, eandem præ se ferrent speciem? Quo quidem modo, per diversas Tubi apertiones, plures observationes institui; eo facto, phases meas delineare, delineatas corrigere, correctasque examinare potui; sic ut jam ampliùs nullus, de illarum verâ symmetriâ, dubitationi detur locus.

Ut autem Astronomiæ Cultoribus, Siderumq; observatoribus, etiam clariùs demonstretur, tam Plenilunia à me depicta, quàm omnes reliquas phases in hoc opere exhibitas, accuratissimè esse adumbratas; ipsique simul strictè admodum, beneficio Tubospicilli optimi, secundùm veram figuram primariam, sive Faciem Lunæ nativam ipsam, expendere non nequeant: eapropter & hoc loco (cùm Iconisim Lunares quàm maximè his imitantur columnis) reliqua quoque Lunæ loca recensabo, quæ lineis rectis subjacent; tùm enim quilibet suo Marte, quascunq; figuras delineatas, regulâ quâdam rectâ examinare, & comparationem instituere, cum Lunâ ipsâ haud difficulter poterit: haud dubiè deprehensurus, me perquam sollicitum accuratumque (absit tamen vana gloria) hoc in negotio fuisse, omnesque vires ac nervos pro virili intendisse, quò minùs nihil quicquam intermitterem, quod huic operi inservire posset. Sed nec exiguum commodum, ad observatores hinc redundabit, quia sic edocti, oblatas sibi phases aliorum, rectè examinare noverint: cùm, si omnia non fuerint sub rectis suis constituta, longè certissimum illis evadet, & vitiosam esse observationem, & in delineatione ejusdem haud parùm esse aberratum.

Præter loca verò illa antè memorata, & hæc sequentia, lineam constituunt rectam. 1. Lacus niger major, Insula Marcra, & cuspis Paludis Mæotidis, Corum versùs spectans. 2. Serrorum Mons, Promontorium Lunæ, & Insula Corsica 3. Medium Insulæ Cercinnæ, Mons Ætna, & Archerusia Palus ad Pontum. 4. Cuspis extrema Sinus Strymonici, Mons Sipy-


*Quenam
Macula lineâ
constituunt
rectam?*

Sipylus, Mons Didymus, & Lacus Thospidis. 5. Mons Horminius trium superior, M. Olympus, M. Sipylus, Infula Lesbos, Infula Creta, Paludes Arabiæ, & M. Casius. 6. Infula Melos, Infula Rhodus, Mons superior Libanus, M. Antilibanus & Mons Armenius in Plenilunii Ichnographici delineatione spectabilis. 7. Mons Sinai, M. Cataractes & Palus Maræotis. 8. Palus Maræotis, Sinus Syrticus, & M. Ætna. 9. Promont. Apollinis, Promont. Lunæ, & Infula Cyanea &c. quarum tamen adhuc multæ aliæ Maculæ, in Lunâ reperiuntur, quas Astropholus diligens & laboribus affvetus, cujus hæc scire interest, ipsemet investigabit.

Maria, Paludes, Montes & Valles, differunt, ratione coloru.

Cæterum, ut ad descriptionem Lunæ ipsius redeam, denuo illa repeto, de quibus jam capite sexto commemoravi; magnas nempe Maculas in Plenilunio, & absque Tubo conspicuas, Oceanos esse, locaque illa albicantia magisque splendentia, Montes, Valles & Planities: ex quibus verò de causis, id colligatur, affatim dicto loco explicatum videtur. Paludes quod attinet, non tam nigricantes in Lunâ se se offerunt, quàm Maria & Lacus, neque tam luminosæ, quàm Montes, Valles, & Planities: ratio est in promptu, quia radios Solis fortius reddere valent, quàm Maria; non autem æque benè ac terra Lunæ; propter scilicet opacitatem majorem & minorem. Valles verò in Plenilunio, admodum esse albicantes, atque splendentis, secus autem, Lunâ crescente, vel decrescente; hinc oritur, quòd Sol eo tempore rectà radios suos effundat, sic ut undique ad circumjacentes Montes, radii reflectantur: qui cum, ratione variarum inclinationum, rursus in Vallem transferantur, propterea & majus fortiusque hæc Valles lumen spargant necesse est, quàm loca reliqua complanata, minusque scabrosa. At enimvero, quòd Valles, Lunâ crescente, à dextrâ maximè umbrosæ appareant, & decrescente Lunâ, à sinistrâ, potissimum ab umbrâ sublimiorum Montium proficiscitur; qui Solis luci, eo in loco, transitum denegant, ut in Vallem pertingere queat. Quemadmodum ex apposito diagrammate, fit manifestum: in quo A, Solem refert, B, C, D tres sunt Vallès, altissimis Montibus circumdatæ: Vallem B, Sol à dextris illustrat,

strat, instar omnium Vallium, Lunæ decreſcentis : Vallis ſive Montes C, modo contrario illuminantur, quia plagam alteram verſus, ratione Solis, ſiti, ut omnes Montes Lunæ decreſcentis; ideo & umbra ſe prorfus obvertit. D Vallem repræſentat, quam Sol, quaſi ex puncto Zenith illuminat, vel, ut rectius loquar, quæ cum Sole & oculo noſtro, in rectâ ſita eſt lineâ : quapropter, illo tempore, veluti in Pleniluniis,



nulla penitus umbra ibidem deprehenditur; ſed neceſſariò omnino luminofe ſplendentes; atque albicantes apparent. Hoc equidem ex omnium phaſium Montibus & Vallibus perſpicuè colligitur, ita ut hi Montes & Valles, ratione umbræ majori mutationi quoad apparentiâ ſint obnoxia, quàm Maria & Stagna, quæ ferè eundem ſemper retinent colorem. Ferè inquam (quod bene noſtetur) Maria, Lacus & Paludes colorem conſervant; nihilominus tamèn, non prorfus, nec omni tempore. Primò namque quantò vicinioreſ ſunt, confinio luminofæ & umbroſæ partis, tantò magis, reſpectu coloris, variantur, & plerunq; tum debiliores videntur. Idemque evenit, ſi Maculæ illæ Peripheriæ ſint viciniſſimæ : radii enim Solares, id temporis, magis oblique in illas incidunt, ut in Phaſibus corniculatis & falcatis animadvertitur. Secundò id fit, quòd pariter per obliquiores angulos ſpectantur; unde quidem adeò fortè lumen, nobis communicare nequeunt, quàm ſi rectius aſpicerentur; vi Axiomatis Optici : *Omne viſibile minus videtur oblique, quàm directe ſpectatum* : & : *quòd directius opponitur, eò perfectius videtur*. Merſen. Theor. 8. pag. 496. ut & illius, cujus meminit idem in Balliſticâ paginâ 78. *Oblique illuminata, debilius illuſtrantur*. Quod adhuc apertius atque clariùs, ex adjuncto ſchemate redditur. E. g. A B, ſit quoddam planum, in quod omnes radii E, F,

Maria, Lacus & Paludes, aliquantulum diverſu temporibus, mutant colorem.

Quò quid obliquius, eò debilius illuſtratur.

K k

inci-

incidunt; B C aliud iterum planum, ad quod autem radii perpendiculariter haud appellere possunt, cum sit obliquius illis expositum; hancq; ob causam, nec omnes radii in illud incidunt: quamvis hoc cum priori A B, uti videre est, planè sit ejusdem longitudinis. Insuper adhuc pauciores, in planum B D sparguntur, quia ad angulum obliquiorem est positum; quocirca A B omnium perfectius atq; clarius illustratur: cum omnes radii perpendiculariter ad illud tendant. Manifestè itaque hinc colligere licet, quare Maria & Paludes, circa Peripheriam sitæ, vel



translatæ per motum librationis, non tam nigricantes & distinctè nobis videantur?

Hocque Phænomenon, apertè, in Palude Mæotide deprehenditur. Nam Lunâ existente in Cancro, quando maximè à limbo distat occidentali, ratione librationis, tunc nigricantior, notabilior, magisque est conspicua, quàm si ea in Capricorno versetur; prout ex omnibus ferè figuris clarè patet, nisi fortè sub prælo casu nimis nigricantes sint excusæ. Quod autem non æq; talis differentia, & notabilis debilitas, se se exserat in Montibus, & Vallibus, quando circa Peripheriam, vel medium reperiuntur, (siquidem omni loco, æque semper umbrosæ conspiciuntur) inde oritur: quòd Montes & Valles, ex superficie constent valde asperâ, atque scabrosâ; quæ ex innumeris planis est composita, secundùm innumerabilem diversitatem inclinationum, uti suprâ jam dictum cap. sexto: ideo enim fit, ut, beneficio hujus asperitatis, radios suos, æque bene ad nos transferre possint, sive obliquiores, sive rectiores, respectu nostri incedant; quod fieri in magnis illis Maculis est impossibile, propter Planitiem scilicet, & æquabilitatem magnam.

Porrò, non solùm circa Lunæ marginem, Maculæ majores (sive Maria) sunt debiliores, sed & multò compressiores apparent, quàm, cum aliquantò remotiores sunt à limbo, ratione librationis, omnibus observationibus id comprobantibus. Lunâ enim versante in Cancro, Palus Mæotis longè latior obtusiorq;

tum

Cur non continens Luna, æq; ac Maria & Paludes, colorem mutant?

tum circa superiorem, tum inferiorem partem, spectatur, quam Lunâ commorante in Capricorno : quod præsertim dilucidè in Plenilunio Æstivo & Brumali cernitur. Nec verò solummodo in Palude Mæotide tale quid animadvertitur; sed & in reliquis Maculis, limbo proximis, palude scilicet Maræotide, Lacubus hyperboreis &c. Præterea & talis mutatio formæ & figuræ, in Montibus & Vallibus, ex motu libratorio orta; deprehenditur; sic, ut Montes Vallesque Peripheriæ propinquiores, magis in figuram Ellipticam inclinare videantur, quam circa Lunæ medium, quod ex omnibus phasibus & Pleniluniis clarè constat; inprimis autem ex Insulâ Maris Caspiæ, Montibus Paropamisæ, Monte Meridionali, M. Troico, M. Techisandam, Monte dalanguer & aliis. Alias circa Lunæ medium, Valles plerunq; rotundæ apparent, ut: Insula Besbicus, M. Sipyus, M. Didymus, M. Olympus, nec non reliquæ Valles, ac Insulæ: ratio facilè peti poterit ex figurâ pag. 247. Nam, quò quid viciniùs est Peripheriæ, eò obliquiùs in corpore rotundo, scilicet Lunæ, à nobis aspicitur, ita, ut omnia illa, ad limbum existentia, quæcunq; in obtutum veniunt, necessariò oblongiora, & graciliora appareant, licet revera sint omnino rotundissima. *Circulus enim obliquè aspectus, ut Ellipsis, & Ellipsis, quodam oculi situ, ut circulus apparet: quod est Theorema Opticum.*

*Macula quæ
tò sunt vicini-
ores limbo,
tanto magis
comprimun-
tur.*

Hac occasione, notabilis quæstio se se offert: quare nimirum omnes propemodum Valles, ac Insulæ, circa medium Lunæ, figuræ rotundæ, spectentur? Primò verò citra omne dubium esse potest, Lunam Terræ nostræ, magnâ affinitate esse conjunctam, præsertim ratione Montium, Vallium atque Insularum; quapropter & jure illi Montes &c. his nostris terrenis similem, procreare deberent effectum: verùm, Valles & Insulæ terrestres, rarò rotundæ, quoad figuram repertiuntur, sed plerunq; sunt angulosæ, multisque anfractibus, Promontoriisque conspicuæ, ipsâ experienciâ teste. Hæc autem ut ita esse, non diffiteor: ita totus sum in eâ opinione, Valles Insulasque Lunares, æque magnis anfractibus, angulis, Promontoriis, ac nostræ terrenæ sunt, esse refertas, imò o-

*Quare Valles
ac Insulæ Lu-
nares, circa
illius mediū,
plerunq; ro-
tunda appa-
reant?*

Tam in superficie Luna, quam Terra, Valles formâ rotundâ existunt.

mnes ferè irregularis figuræ : quòd autem tam distinctè talia discernere nequeamus, ex magnâ illâ & incredibili distantia, oculorum debilitate, & Telescopiorum imperfectione, proficiscitur. Luna quandoquidem, si multò terræ esset vicinior, Tubi que fortiores ac perfectiores; non hæsito, quin & ejusmodi minutissima à nobis animadverterentur. Adhæc, quò longius abest figura irregularis, eò magis ad rotunditatem accedit : hincq; fit, ut Valles Lunares, maximâ ex parte rotundæ, absque angulis, & anfractibus videantur. Interea tamen non planè negatur, hinc inde in Lunâ Valles, specie rotundas, affatim dari posse; sicuti in globo hoc nostro terreno, quarum certè non pauca inveniuntur, quæ mirandæ altitudinis Montibus undique sunt circumseptæ; adeò ut ferè similem referant faciem rotundam, ac illæ in phasibus Lunaribus, Tabulæque Selenographicâ conspicuæ: quod ex globo terrestri, multisque Tabulis specialibus Geographicis, abundè fit manifestum. Hujus generis Valles, figuræ circularis, maximè notabiles, tam in Persiâ, quàm in aliis regionibus, inveniuntur. 1. Desertum nempe Turbet. 2. Desertum Mingui. 3. In Germaniâ, Regnum Bohemiæ 4. Regnum Berdoa, Regnumque Zanfara in Africâ. 5. In Tartariâ desertum Belgim. 6. In Americâ, & quidem in Regno Peruvienfi, vastissima Vallis propè Quito & Cuenca; quarum longè adhuc plures nominatenus indicari possent, inprimis si Helvetiam, Pedemontium, Tirolis comitatum, Stiriam, Transilvaniam peragrarè atque perlustrare animus esset.

Porro, quòd Tabulam Selenographicam, & Montes excelsos, in hâc orthographico & geographico more expressos, attinet, de his inprimis hoc notandum occurrit, quòd non equidem, quoad certum definitumq; numerum, Montes ibidem videndi, sint delineati, atque adeò, ac si nec plures, nec pauciores in Lunæ globo reperiantur; quippe quia id non solum circa Montes Lunares factum est impossibile; sed & in Terrenis, nemo homo id præstare potest. Sic utique Tabula nulla Geographica unquam est exhibita, quâ in omnes & singuli Montes, sint notati. Siquidem omnes quoscunque Montes in superficie terrenâ

renâ numerare, aut depingere, est ex eò genere, quod fieri nequit : sufficit, ut vel notabiliores, & omnium præcipui, vel Montium tractus, Valliumve formæ, figuræque adumbrentur. Id quod hîc in Lunâ quoque est factum; in cujus delineationibus, præfertimque Tabulâ illâ Selenographicâ, Vallium figura, tam minorum, quàm majorum, accuratissimè summâque cum diligentia, est observata atque effigiata; nec ullo aliquo in loco, Montes quidam sunt delineati, ubi non reapse illi reperiantur. Quod si verò quæras, unde hæc depromserim omnia? scire te velim, quòd ista unicè, beneficio istarum sequentium quadraginta phasium correctissimè sim assequutus. Plenilunia nihil certè quicquam ad hoc negotium contulerunt : nam illo tempore Valles æque luminosæ, ac Montes existunt, sic, ut vix à Montibus, Valles discerni queant; sed uti jam memini, circa luminis & umbræ confinia, reliquarum phasium, quando Valles umbrarum plenæ se se exhibent, confestim Montium vestigia, manifestè apparent, tam altiorum, quàm depressiorum, quique magnam, aut parvam Vallem circundant. Quod si hoc modo sedulò omnes phases perlustraveris, accuratè perpenderis, cumque Lunâ ipsâ comparaveris, feliciter Tabulam ejusmodi Selenographicam construere poteris.

Quò autem feliciùs Sideralis Scientiæ Cultor intelligat & percipiat, num etiam hi diversi innumerique Montes Vallesque debite collocata, & omnia priori illi Tabulæ Selenographicæ fuerint inserta (ut quidem nihil, quod sciam, lubens omisi) idcirco hoc loco subjiciam, Tabulam Generalem omnium phasium : in quâ omnes Montes & Valles, diètim conspicuæ, tali modo repræsentantur, quali aliàs in reliquis phasibus, circa Sectiones luminis & umbræ spectantur; quo tempore Vallium vera magnitudo amplitudinis, quam circa Vertices Montium exhibent, deprehenditur; & tum maximè etiam sunt notabiles: cum nullo unquam tempore, majori umbrâ perfundantur. Impossibile quidem est, Lunam tali vultu se unquam conspiciendam præbere posse; quia rotunda, & minimè corpus planum : verùm Tabula hæc nostra sic datur adornata, ac si he-


Tabula Selenographicæ Phasium generalis, quomodo, & in quem finem fuerit constructa?


misphærium Lunæ, corpus quoddam esset planissimum, quod à Sole oriente, hoc modo (ut sic loqui liceat) illustrari, & obumbrari possit. Estque planè, eum in finem composita; primò, ut genuinam formam ac figuram, omnium Vallium, Montiumque, in Lunæ hemisphærio patente existentium, unâ vice simul contemplari liceat, inque tali quidem formâ, sicuti paulatim de die in diem, ut in phasibus, circa terminos lucis & umbræ, fieri solet, se se offerunt. Secundò, quò Iconisimum quendam habeamus omnium phasium, & propriè loquendo, figuram quandam primariam, seu fundamentalem Ichnographicam singulorum Montium Valliumque; prout revera in Cœlo apparent, quando maximè sunt obumbratæ. Tertiò, ut primo statim aspectu, cuilibet pateat, unde Montes illi, eorumque tractus, in Tabulâ priori Selenographicâ fuerint derivati, & deducti: pariterque, ex quonam fundamento, altera illa figura primaria (quâ aliàs ad observationes & lunationes utimur, sicut cap 44. uberius dicitur) fuerit constructa. Quæ omnia, hæc figura Generalis unicuique accuratè hæc consideranti ac ponderanti, sufficienter commonstrat. Denique erit etiam eadem perquam utilis & necessaria, ut aliæ phasæ, ad hanc examinentur, nominaque Montibus eò dexterius assignentur, faciliusque memoriæ dentur: cum non tam magnam, afferat confusionem, quam Tabula Selenographica prior.

Facies Tabula Generalis, speciem quasi Luna decrefcenti refert

Præterea sciant Astrofophi, me hanc Tabulam summâ curiositate, ac industriâ construxisse, ac nihil quicquam scienter omisisse, quod in Lunâ esset notabile, vel Tubo optimo reperiri, ac perspicari potuit. Umbra quidem Vallium, à sinistrâ, in hac figurâ procedit; ita ut revera Lunam, vel veriùs phasæ decrefcentes referat: quòd si verò umbram tibi à dextrâ imaginæris, Lunam habebis crescentem, ut facilè colligis. Per utrumque circulum (quemadmodum in duabus præcedentibus figuris) similiter maximam, & minimam librationem expressi, limbus pariter in suos gradus, secundum ordinem signorû est divisus. Primum gradum locavi, circa medium Lacus hyperboræ superioris, & Paludis Amadocæ (cum in primis Lacus prædictus valde sit notabilis, ac Peripheriæ proximus, perpetuæque
 appa-







MAGNA OPERA
IERHOVE.
EXPOSITA QUIBUS
OPT. SELECTANTVR. HIS.
Gal. cor. 1. 2.

Fig. R.

Digiti Eclipticæ et æquæ segmenta

apparitionis aliæ verò Maculæ ad limbum sitæ sæpissimè occultentur) sic ut ex centro, tam per lacum hyperboreum, quàm Paludem Amadocam, linea recta duci possit. Quamvis eodem res recidisset, etiamsi ab alio quodam puncto, gradus numerare incepissem, dummodo Maculæ certo affigantur loco. Postremò omnium, duas scalas in hac Tabulâ delineatas tibi sisto, partim, ut distantias locorum, pro lubitu dimetiri, partim verò, ut Eclipsium, & aliarum observationum magnitudines &c. eò accuratiùs determinare non nequeas.

Nunc tamen pergamus ulteriùs, quæstionemque aliquam scitu dignissimam decidamus: unde nimirum, tam certas, accuratasque magnitudines Vallium, tam in hac, quàm Selenographicâ Tabulâ, colligere potuerimus? siquidem etiam ex phasibus quotidianis, satis superque compertum est, Valles non perpetuò, nec quotidie, unam eandemque magnitudinem, formamque conservare; sed, Lunâ crescente, magis magisque decrescere, & decrescente iterum crescere, secundum scilicet auctiorem & diminutionem umbræ; id quod planè luculenter in decimâ, undecimâ, duodecimâ, decimâ tertîâ, decimâ quartâ, decimâ quintâ, ut & vigesimâ quintâ & sexâ figurâ deprehenditur, cum primis in Vallibus Uxiis, Coibacaranis, Dalangueris, Techisandaris &c. Respondeo: hæc Valles, aliæque permultæ, quò viciniore confinio luminosæ & umbrosæ partis existunt, eò majores, quoad circumferentiam superiorem, circa Montium videlicet cacumina conspicuam, spectantur; quò verò magis elongantur à termino lucis, eò magis decrescunt, usque dum, circa Plenilunia, ferè prorsus evanescant. In tali igitur proportione, quemadmodum crescente lumine decrescunt, sic rursus, lumine decrescente, perpetuò crescunt. Quæ res certè admodum est admirabilis; proque certo planè habeo, rationem ejus, non cuilibet esse perspectam, atque cognitam. Ego verò hæc omnia observans perpendensque exactiùs, causam aliam, animo assequi potui nullam, quam illicò proferendam. Scilicet, cum Montes omnino omnes, præsertim arenosi, in metam fastigiati sint (quò enim magis in altum assurgunt, eò evadunt acutiores) hincque fit, quando Valles, sectionibus

Latitudines Vallium, in hac Tabulâ exhibentur, uti circa Montium vertices terminantur.

Quamvis ratio, quòd Valles Lunares, crescere, & decrescere, videantur?

bus luminis & umbræ sunt proximæ, ubi Sol illas primùm circa vertices Montium illustrare incipit, ut tum temporis videantur spatiosissimæ, veluti in Iconifimo præcedente videre est; quò autem plus à confinio removentur, eò magis Sol supra ipsos ascendit, profundiusque illas illuminat: quapropter, Valles, secundùm apparentiam, quasi comprimuntur, sic ut necessariò minores videantur: ad quam apparentiam producendam, & Montium situs figuraque non parùm confert. At Plenilunii tempore, quando hæ Valles omni ex parte Solis lumine collustrantur (hoc est quando Solipsis quasi verticalis existit) tum, cum reliquis locis elevatioribus, similem acquirunt lucem: ut nil mirum sit, quòd difficulter admodum videantur, & à modo dictis locis altioribus, discernantur. Id quod idem circa Valles, Lunà decrescente animadvertitur; sed modo tamen contrario.

*Et Rupes in
Lunâ exister
re præsumen
tur.*

Verùm enimvero, non in omnibus Vallibus, tale quid apparere, hinc fortean oritur; quia non omnes & singulos Montes, in similem acuminatum surgunt verticem; sed quòd fortassis, permulti sunt ejusdem generis, ut apud nos Rupes, Petræ vel Montes Petrosi, qui propemodum rectà in altum plerumque ascendunt, sic ut interdum summâ sui parte parùm acutiùs, quàm imâ reperiantur: itaque circa hujus figuræ Montes, non tam magna indies oritur mutatio, quàm circa Montes arenosos, qui in modum metæ, inque acutum cacumen, fundo fatis lato, sunt fastigiati.

*Beneficio
Geometria,
& Lunarium
Montium al
titudines, viâ
infallibili,
mensurari
possunt.*

Quamvis autem multa adhuc dicenda restent, tam de his Montibus & Vallibus, quàm inde dependentibus rebus aliis: ea tamen reservabimus capitibus sequentibus, pertractanda: in quibus non solum phæses ipsæ, oculis subjicientur; sed & reliqua omnia, de quibus nondum sufficienter dictum, magis magisque explicabuntur. Sed priusquam præsentī etiam tractationi finis imponatur, non abs re ducimus, hac occasione commodâ inducti, mentionem pariter facere, quantæ altitudinis, antedicti Montes Lunares, Rupesque & Petræ illæ esse possunt? & insuper etiam modos diversos indicare, quorum adminiculo, tam Opticè, quàm Geometricè, absque ullo aberandi

randi periculo, veram & genuinam illorum altitudinem dimetiri, & assequi possimus, & ita quidem correctè & accuratè, ac si in superficie terrenâ essent siti, cominusque à nobis aspicerentur.

Qui noster conatus, non paucis, iisque præsertim, qui rerum Geometricarum, & Astronomicarum parum sunt periti, non tantùm difficilis videbitur, sed & prorsus irritus; attento, quòd Montes, quorum altitudinem dare volumus, ne oculis quidem, nedum pedibus, satis contingere detur. Verùm enimvero, non est hæc res factu omnino impossibilis, quemadmodum Mathematici peritiores intelligunt: cùm, auxilio Geometriæ longè præstantissimæ, ad hæc quoque remota à sensibus corporeque nostro, animo perveniendi, via pateat; dummodo scilicet certa sint data, quæ Geometræ poscunt.

Primò, Celsissimos Montes Rupesque in superficie Lunari affatim extare, id verò est extra dubium; quemadmodum istud etiam oculo, inprimis ex illis claris & luminosis areolis, extra confinium lucis, in parte tenebricosâ Lunæ crescentis, vel decrescantis, conspicuis, se satis probat: velut etiam capite sexto, abundè est declaratum. Quæ quidem luminosæ cuspides, non nisi vertices, & cacumina sunt erectorum Montium; & quoniam altiores sunt reliquâ parte Lunæ, idcirco necessario, citius etiam à Sole illuminantur, quàm Valles, & adjacentia loca depressiora, vel magis complanata. Insuper, quò Montes elevatioribus existunt, eò citius radiis Solaribus perstringuntur; ratione ipsâ id confirmante. Sequitur itaque Montes Lunæ excelsiores, non solum citius lumine perfundi; sed & remotiores reliquis, à lucis umbræque termino spectari, atque observari; quod absque ullâ contradictione est verissimum.

Proinde, quando innotuit, quo usque à confinio lucis & umbræ, remota sint Montium fastigia, sive in miliaribus, sive in proportionem erga Lunæ diametrum: simul quoque certum datum est cognitum, quo tuto inniti, atque stare possumus. Id verò accuratè admodum ex phasibus, ac præsertim Quadraturis cognoscitur: vera autem distantia Montium verticum, sive cuspidum illuminatarum, solummodo circa Quadras rectè cer-

L I

nitur;

*Luminosæ
cuspides ex-
tra confiniū
conspicuae,
Montium sunt
vertices.*

*Montes, qui
sunt altiores,
eò citius lu-
mine Soli
fruantur.*

nitur; siquidem eo tempore rectius oculis objiciuntur, quàm in aliis phasibus crescentibus, sive decrescentibus: idcirco & in his, distantia necessariò minor apparet; quia obliquius, & sub minori angulo visionis, spectatur.


*Quanta sit
distantia cus-
pidum illu-
minatarum
maxima, à
termino lu-
cis?*

Vera distantia illustratarum cuspidum, à confinio luminis & umbræ, præsertim tempore Quadraturæ, invenitur, unâ vigesimâ sextâ parte, totius Lunæ dimetientis constare; quando nimirum sunt remotissimæ: quemadmodum hoc ex phasi, trigesimâ secundâ, Monteque Apennino; ex phasi trigesimâ primâ, Monteque Didymo; & trigesimâ phasi, Monteque Tauro & Antitauro, manifestissimè demonstratur. Quæ diametri pars, novemdecim confecit mill. Germanica, quorum tota Lunæ diameter 494. comprehendit; quando nimirum areolæ illæ, omnium maximè à termino lucis distant. Interim tamen & aliæ reperiuntur, quæ non ita longè removentur; sed tantùm unâ trigesimâ parte diametri: aliæ tantummodo unâ trigesimâ quartâ parte: imò aliæ, duntaxat, unâ quadragesimâ parte, dimetientis Lunæ; interdum & minùs elongantur. Ratione ergo hujus distantia, alii Montes, aliis sunt excelsiores, instar Terræ Montium. Quanquam cum Eximius Galilæus de Galilæis, tum alii, qui ipsum sunt secuti, ut Blancanus & Bettinus, mecum hac in parte non consentiant; uti videre licet ex Nuncio Galilæi Sidereo, pag. 24: dum asseverat antè dictam illam distantiam Verticum Montanorum, à lucis tenebrarumque confinio, ad unam vigesimam diametri Lunarum partem se extendere. Verùm ajo, distantiam illam, quæ omnium maximè à confinio remota conspicitur, non excedere unam vigesimam sextam partem diametri: quod indubitatè & apertè, ex omnibus Lunæ observationibus, ad oculum demonstrare possumus, nec alii revera, aliter unquam deprehendent. Quamobrem, cum distantia à nobis designata, paululùm sint minores, idcirco & Montes aliquantulùm depressiores inveniuntur, quàm Galilæus æstimavit: neque tamen illi terrenis nostris Montibus, quoad altitudinem, non solùm æquiparari possunt meritissimo; sed & multò certè sunt excelsiores, quàm nostri omnium maximi; prout confestim, ex adjecto diagrammate patebit.

Unde

Unde etiam diversimodè demonstrare est in proclivi, quomodo altitudines Montium Lunarum investigare non nequeamus. Quantæ nimirum sint in lineâ perpendiculari: quemadmodum ista quidem semper attendi debet, cum de Montium altitudinibus loquimur. Ecce circulus B F E G,

Quomodo
altitudines
Montium Lu-
nae supputen-
tur?



A. S.

superficiem denotat convexam globi Lunarum; D Solem, à quo radii in rectâ lineâ prodeuntes, locum Lunæ depressiorem, in B tangunt, proceduntque ab hoc, usque ad C Montem præaltum, in parte obscurâ, extra confinium, situm: qui, cum sit excelsæ altitudinis, idcirco nihilominus, & in umbrosâ parte, à

radiis Solaribus illuminatur, quod aliàs fieri impossibile esset. Iam sit distantia Montis B C, à confinio luminis & tenebrarum B A E, una vigesima sexta pars totius diametri, tanta scilicet, quanta inquam esse possit maxima, observationibus id attestantibus; hoc est constet novemdecim miliaribus Germanicis, quorum unum, quatuor conficit miliaria Italica; B A femidiameter Lunæ, est 247. mill. Germ: tota enim diameter B E, in capite præcedente septimo, est 494 circiter mill. inventa. Hæc inquam duo data, sufficiunt proposito meo; quippe Triangulum est rectangulum, quod resolvi debet; in quo duo illa latera, angulum rectum comprehendentia, sunt cognita, ut B C, distantia maxima verticis alicujus Montis, à parte Lunæ illuminata, & B A femidiameter Lunæ: ex quibus si indagetur hypotenusa, tum ipsam habebis Montis altitudinem. Nam si B A, id est A H, radius Lunæ ab hypotenusa A C subtrahatur, restabit vera altitudo Montis H C. Hæc autem hypotenusa A C, diversimodè investigatur, prout rerum Geometricarum periti norunt. E. g. 1. Si latus

L 1 2

A B

A B quadratur, itidem B C, hæcque duo quadrata addantur, extrahaturque radix; quæ est hypotenusâ illa quæsitâ: vel, ex Tabulâ Sinuum, mediantibus illis duobus lateribus, quærarur angulus B A C; deinde beneficio hujus anguli, & unius lateris, hypotenusâ A C; quod haud difficulter modo sequente perficitur. Secundum formam præcedentem, quadratum B A semidiametri Lunæ, quæ, uti dixi, est 247. mill. hoc est, 1976. partes octavæ unius milliariis, vel tot semimill. Italica, cujus quadratum est 3904576: B C est 19. milliar. vel 152. partes octavæ unius milliariis, hujusq; quadratum 23104; summa quadratorum existit 3927680, cujus radix quadrata est 1982. ferè, & hæc simul est hypotenusâ A C quæsitâ, in octavis scilicet particulis, vel semimill, Italicis: Semidiameter Lunæ B A, vel A H erit 1976. octav. part. Si igitur hæc à totâ hypotenusâ auferetur, restabunt adhuc sex, hoc est, sex octavæ unius milliariis, vel tres quartæ unius milliariis Germanici, sive tria milliaria Italica: quæ est vera, & genuina altitudo istius Montis.

*Altera ratio
supputandi
Montes Lu-
nares.*

Altera ratio altitudines Montium supputandi hæc est: 1. Angulus B A C investigatur hoc modo: quemadmodum se habet semidiameter Lunæ A B 247. milliaria, ad distantiam B C 19. milliar. sic se habet Sinus totus 100000. ad Tangentem anguli B A C, quo, per regulam de tribus, ritè peracto, provenit tangens 7692. ita ut angulus ex Tabulâ Tangentium sit 4. grad. 24. min. Per hunc inventum angulum, quæro ex Tabulâ secantium, illius secantem, quæ invenitur 100296. Pergo itaq; sicut se habet Sinus totus 100000. ad Secantem anguli B A C 100296: sic se habet semidiameter Lunæ B A 1976. partes nempe ejusmodi, quarum octo, unum conficiunt milliare Germanicum, vel quatuor, unum milliare Italicum, ad totam hypotenusam A C, in ejusmodi particulis; relinquitur itaque ritè absoluto calculo 1982. Ab hac hypotenusâ, si semidiameter Lunæ subtrahatur, restabunt itidem sex, id est sex partes octavæ, vel tres quartæ, unius milliariis Germanici. Hanc igitur altitudinem, Montes Lunares non excedunt, etiam omnium altissimi: quamvis Venerabilis

rabilis Galilæus, illos integro milliari Germanico æquet, sive quatuor Italicis : quæ differentia, ex nullo alio fundamento oritur, quàm quòd distantiam puncti illuminati, à Sectione luminis & umbræ, plus justò majorem præsupponit, quemadmodum ex superioribus perceptum.

Altitudo Montium Lunarum maxima.

Tertia demum ratio investigandi Montes Lunares hæc est: construe Triangulum rectangulum in chartâ, secundum certam aliquam scalam: A B æquet radium Lunæ 294, B C distantiam puncti illuminati. Deinde à C, usque A, duc lineam rectam, nempe hypotenusam; quo facto, attende, mediante illâ scalâ, quanta fuerit differentia hypotenusæ, & semidiametri Lunæ; quæ differentia, est altitudo Montis quæsitâ. Quamvis verò, beneficio primæ & secundæ rationis, multò accuratiùs hoc opus perficitur; hunc tamen modò indicatum modum, eorum gratiâ exponere fuit visum, qui calculo Geometrico parùm sunt assueti.

Tertiatio mechanica.

Isti verò Montes, quorum vertices non citiùs illustrantur, quàm, cum demum unâ treagesimâ parte, à lineâ luminis & umbræ absunt, hoc est 16½ milliari. Germ: hi inquam aliquantò humiliores sunt, nimirum dimidium milliare circiter, aut paulò plus, secundum calculum illum suprâ indicatum. In quibus Montibus autem, hæc prædicta distantia adhuc minor, nimirum tantùm 14½ part. hoc est, 14½ mill. Germ. (quorum ingens invenitur numerus) illi Montes non excedunt 12 part. unius milliari Germanici. Postremò, si hæc distantia duntaxat 12½ part. vel 12½ mill. detur; tunc Montes vix 12 part. unius mill. superant; hoc est, eorum altitudo, paulò plus, quàm milliari Italici, invenitur. Isthoc autem pacto, & Valles Lunares mensurari possunt, quæ circa confinium lucis, omni ex parte sunt obscuratæ, &, læpissimè in partem Lunæ luminosam satis se se extendunt, veluti Montes, qui perpetuò, in parte Lunæ obscurâ, se se contemplandos offerunt.

Hic fortassis quispiam cogitabit: putassem Montes Lunares, multò esse altiorem, quàm ut jam intelligo: siquidem etiam penitus pro persuaso habeo, Montes nostros Terrestres, longè excelsiores existere. Quo autem cuilibet fiat perspicuum

Montes Lunæ, non solum nostris quoad altitudinem esse similes; sed & sublimiores: propterea altissimorum Montium terrestrium, veram investigabo altitudinem, interque illos & Lunares, comparationem, occasione tam opportunâ, instituiam.

*Diversorum
Montium ter-
restrium al-
titudines.*

*Veterum hac
de re opinio.*

Quamvis verò diversi in superficie terrenâ inveniuntur Montes summæ altitudinis; utpote quorum fastigia partim nubes penetrant, prout illis innotuit, qui ejusmodi loca visiterunt, eosque suis sunt vel oculis contemplati, vel pedibus emensis; quos inter sunt, Mons Atlas, Pyrenei, Alpes, Athos, Olympus &c. attamen refert Theon, Eratosthenem ipsum, adminiculo Geometricorum Instrumentorum explorasse, Montes omnium altissimos, non decem excedere stadia, in lineâ nempe perpendiculari, quæ altitudo, nondum tertiam partem unius miliaris Germanici æquat: nam 32. stadia, unum tantum mediocre conficiunt milliare, & 8. stadia unum milliare Italicum constituunt, id est 5000 pedes. Pariter & Plinius lib. 2. cap. 65. meminit, Dicæarchum Siculum, Aristotelis Auditorem, Geometram Clarissimum, sumtibus Regum Ægyptiorum, altissimos diversorum locorum Montes quoque mensurasse; interque alios Pelion, Montem Græciæ, omnium maximum deprehendisse, qui tamen non altior 1250. passibus, sive decem stadiis existit; veluti Eratosthenes animadverberat. Ejusdem ferè altitudinis, & Xenagoras, Eumeli filius, accuratâ adhibitâ investigatione, Olympum invenit: quem decem tantummodo stadiorum, & 96. pedum Græcorum, sive 100. Romanorum esse, testis est Plutarchus, in Æmilio Paulo, fol. 479. Ubi idem Autor in hunc sensum scribere perrexit: Geometras certis ex fundamentis statuisse, nec Montes esse altiores, nec Mare profundius, decem stadiis. Neque Cleomedes Montium, neque Marium altitudinem 15. stadiis majorem, in lineâ perpendiculari, definivit; quæ altitudo, propemodum dimidium æquat milliare Germanicum. Vide hac de re Eratosthenem Batavum, & quidem caput 17. Similiter & Geminus refert, in suis Elementis Astronomiæ cap. 14, in Uranolog. Petavii fol. 55: Altitudinem Cyllenes, Montis altissimi Arcadici, nondum 15. stadiorum fuisse; & Satabyrii vel potius Atabyrii

Mon-

Montis, in Rhodo Insulâ fiti, perpendicularum esse minus etiam stadiis quatuordecim.

Veteribus, Recentiores nostrique seculi Mathematici, astipulantur, pro certo habentes, Montes terrestres adhuc esse decliviores; id quod ex Nuncio Sidereo patet, dum Galilæus sic de altitudinibus Montium terrestrium differit: *Intellure nulli extant Montes, qui vix ad unius milliarii Italici altitudinem perpendicularem accedunt*; id est, ad quartam partem, unius milliarii Germanici. Cui calculum suum addit Bettinus, in Apiario 8. Progymn. 6. propos. 3. Josephus Blancanus, interque alios etiam Celeberrimus Dionysius Petavius, in Uranologio lib. 7. cap. 10. sic inquit: *Sanè nonnullis Geometriæ Consultissimis placet, modum altitudinis Montium maximæ, sesquimilliare esse, quod est stadiorum 12. vel 4. unius milliarii Germanici.*

Recentiores quid de altitudinibus Montium terrestrium sentiant?

Quamquam iterum alii, tam Veterum, quam Neoterico-
rum Scriptorum inveniantur, qui certis Montibus, mirandam adscribunt altitudinem; ut Caucaſo, Atlanti, quorum utrumque ferè ad Lunam usque ascendere putant, ut & Monti Atho, in Græciâ sito (hodie Monte Sancto appellato) nec non Monti El Pico, in Insulâ Tenariffâ Canariarum: verùm illi ipsi in descriptione, sibi ipsis variè contrariantur; unde rei impossibilitas confestim apparet: quod equidem optimè VVillebrordus Snellius in antedicto Erateſthene Batavo, & Petrus Crügerus, in Cupediis Astrosophicis, animadverterunt. Si namque esset possibile, ut Montium aliquis daretur, qui 6. milliaria tantum Germanica, in altum perpendiculariter attolleretur; certè, vertex ejus à loco quopiam 100. mill. distante, cerneretur, calculo id approbante: quod sanè impossibile, atque inauditum: imò verò nec à loco 50. mill. remoto, ullus Mons conspicitur. Demus Montem Athon, umbram suam usque in Insulam Lemnos sparsisse, referente Plinio, lib. 4. cap. 12. Solino, & aliis; ex quo ejus admirandam altitudinem concludere voluerint. Scribit tamen Bellonius, qui regionem circumcirca omnem perlustravit, Montis Atho transitu, & eo quidem transversâ viâ facto, nonnisi duodecim horas insumi: ex quo sanè apertè conficitur, illum non adeò esse excelsum, ut quidem
aliqui

Alii quidem immensam Montibus assignant altitudinem, sed sine ratione.

aliqui tradidère. Manet itaque omnino verissimum, uti prius, & præclarissimorum Philosophorum autoritate est comprobatum, quòd Montes nostri terrestres, qui inter altissimos quosque primas tenent, non dimidium superent milliare Germanicum, sive duo miliaria Italica, in lineâ nimirum perpendiculari; imò si adhuc aliqui tantæ magnitudinis ullibi reperiuntur.

Montium Luna & Terra differentia, & quanam sint altiores?

Ex quibus utique jam tandem clarè apparet, Montes Lunares, non esse profectò exiguæ, sed planè immensæ altitudinis; non solum in proportionem ad corpus Lunæ, quod 42. vicibus est Terrâ minus; verùm, & Montes terrestres longè excedere: quippe, qui ad tres quartas mill. Germ. sive 3. mill. Italica in altum assurgunt, uti jam memini, calculoque rectè posito demonstravi: terrestres verò, vix ad dimidium milliare, in lineâ perpendiculari, elevantur.

Et in Lunâ, maximi Montium tractus, sicut hic in Terrâ dantur

Insuper autem & maximi Montium sunt tractus, quoad longitudinem in Lunâ, qui instar Montium terrestrium latè extenduntur, ita ut Taurus Lunaris continuâ serie ad 170. miliaria Germ. excurrat; Mons Sepher Lunæ ad 150. mill. Germ. Apenninus Lunæ, supra 100. mill. Germ. Iure igitur affirmari potest, Montes in Lunâ celsissimos, Vallesque profundissimas spatiosissimas extare; de quibus hac vice dixisse sufficiat. Atque eapropter caput præfens tandem aliquando concludimus, nosque ad explicationem ipsarum phasium convertimus: quâ occasione quidem statuimus, tum omnia illa, quæ ad veram illarum explicationem spectant, proponere, tum circa quamlibet, particulatim, diversas jucundas, ac necessarias aliquot quæstiones, ratione materiæ & instituti, movere, atque explicare: postremò verò etiam in phasium aspectu, omnia illa, quæ hæctenus nondum sufficienter explicata, atque enodata, sed superficietenus quasi dicta videntur, magis magisque elucidabo; quod & modò multò accuratius, faciliusque fieri posse censeo, cum ipsa omnium optima demonstratio, ex oculari contemplatione figurarum

adjectarum, peti possit.

CAPUT

CAPUT IX.

DE LUNAE PRIMAE AC NOVISSIMAE
Phasi, nec non aliis nonnullis, quæ circa
hanc observationem, notatu digna
occurrunt.

Postquam Luna per certum aliquod tem-
pus abdita manet, & nusquam in Cœlo apparet; non tantùm
ob viciniam Solis; sed & quòd partem illuminatam sui hemi-
sphærii à nobis avertat; fit tandem, ut nobis terræ Incolis
se præbeat jucundissimè conspiciendam. Hincque accedit, ut
Luna, post coitum, vel citiùs vel tardiùs appareat. A me qui-
dem incumbente intermestris Lunæ observationi, statim pri-
mâ die post conjunctionem cum Sole, fuit visa: ideoque ope-
ræ pretium me facturum arbitror, si ab eâ primâ phasi ordiar,
& sic cæteras sequentes omnes ordine numerem. Quandoquid-
em omnes illæ gentes, quæ anno Lunari sunt usæ, non solum hanc
primam Lunæ apparitionem diligenter attenderunt, sed etiam
numerum principiumque cujuslibet mensis ab eâ inierunt;
quemadmodum ex Gemini libro de Elementis Astronomiæ
cap. 6. de Mensibus apparet; dum ait: *Propositum fuit Veteribus
Menses quidem agere secundum Lunam.* Et paulò post: *A Lunæ illu-
minationibus appellationes dierum sunt denominatæ.* Hæc in primis Men-
sium ac dierum numeratio, à Iudæis more fuit recepta, ut, quan-
quam suum computum Lunarem habuerint; nihilominus ta-
men, adducti antiquâ Majorum suorum consuetudine, festos
suos dies ac Neomenias, non à verâ Luminarium Synodo, so-
lenniter celebraverunt; verùm à primâ & novissimâ phasi, si-
ve Lunæ apparitione, ubi scilicet primum in Cœlo post con-
junctionem cum Sole aspectu percipitur. Quomodo verò
hæc observatio fuerit instituta, Rabbini eorum, & ex iis recen-
tiores Chronologi, abundè tradunt. Quòd autem primus Lu-
næ exortus plerumque non primâ die post interlunium; sed al-
terâ demum, sæpe etiam tertiâ & quartâ, contingat, id omni-

*Luna statim
in sequente
die post coi-
tum visa fuit*

*Populi com-
plices Men-
ses suos à Lu-
nâ primum
visâ, inchoâ-
runt.*

*Judæi licet
suum compu-
tum lunarem
habuerint:
tamen pri-
mam phasin
Lunæ cujus-
libet Mensis,
diligenter ob-
servarunt.*

M m

bus

bus eam observantibus patet. At, utrùm hæc diversa primæ Lunæ apparitio, jam tardior, jam celerior, tam penes Iudæos, quàm alias gentes rationem anni Lunaris, quem à primâ phasi, seu exortu Lunæ inchoarunt, conturbare, festosque dies facillè confundere potuerit, nec ne? id Chronologis considerandum disputandumque relinquo. Nos modò, circa primam & novissimam Lunæ phasin, hanc quæstionem, in gratiam Astrophilorum, ventilabimus: quare videlicet non primus Lunæ vespertinus exortus, singulis Mensibus, mox, primâ die post conjunctionem cum Sole, fiat; & : num sit possibile primam phasin Lunæ, elapsis aliquot tantùm horis, post Neomeniam, observare & videre? Causæ autem primam Lunæ visionem, vel retardantes vel provehentes, tres potissimùm in Astronomiâ redduntur. Prima est obliquitas spheræ, longos vel breves occasus adducens: in signis namque longarum descensionum, nempe in Piscibus, Ariete & Tauro fieri potest, ut prima phasis Lunæ paulò post conjunctionem conspiciatur. Altera causa est, tempus conjunctionis Lunæ cum Sole circa limitem Boreum. Tertia denique, si Luna sit motu velox, qualis est circa Perigæum. Potest autem retardari prima Phasis Lunæ apparitio, ita ut primùm, elapsis aliquot diebus, post interlunium, vesperi Luna cernatur, si conjunctio accidat in signis breviorum descensionum, qualia sunt Virgo, Libra, Scorpius, in quibus nova Luna circa æquinoctium autumnale hæret, atque si insuper obtineat latitudinem Austrinam, vel versetur circa limitem Austrinum, motuque tarda in Apogæo incedat. Itaque, dum ante nominati tres casus, circa Sinodum Solis & Lunæ concurrunt, fieri omnino potest, ut prima phasis Lunæ, non solum subsequente die post Neomeniam animadvertatur; sed & vesperi, eo ipso, quo Syzygia Solis & Lunæ ante meridiem contingit; sicut Erasmus Reinholdus in Commentario in Theorias Purbachii pag. 155. id demonstravit. Imò ex iisdem principiis sequitur, quòd Lunam *inchoans*, novissimam & primam, unâ die videre liceat, crepusculis imprimis circa verum tempus brevioribus existentibus, utpote quæ hanc Lunæ apparitionem non parùm promovere possunt. Quod si verò jam

*Quæ sint
causæ, cur
nova Luna,
non statim
primâ die
post interlu-
nium, conspi-
ci queat?*

*Quando Lu-
na die eorum
spectari pos-
sit?*

jam memoratæ causæ celeriore Lunæ exortum promoventes, non semper conspirant, sed una tantum deficit, tunc sequente die post interlunium, prima hæc phasis demum se offert: at desideratis duobus requisitis fieri potest, ut tertiâ tandem die, prima phasis Lunæ sub aspectum cadat. Deficientibus autem omnibus tribus conditionibus, exortum Lunæ accelerantibus, ita, ut Luna versetur in signis breviorum descensionum, in limite Austrino, & Apogæo, tum hæc prima Lunæ apparitio, quartâ denique die post coitum cum Sole, contingit; quemadmodum indicatam hanc varietatem, non tantummodo præsentem Phasi, sed & mox aliis multò compluribus, demonstrabo & declarabo.

Existimant quidem Theon Alexandrinus, Alfraganus, Albategnius, & Mesfahala, antiquis assiduis, ac diuturnis observationibus compertum esse, novam Lunam videri posse, elapsis à coitu 12. temporibus æquatoris; hoc est, quatuor quintis partibus unius horæ. At verò hosce veteres Astronomos, hinc utique hallucinari puto: siquidem causæ, quas antè tetigi, remorantes exortum Lunæ, tot concurrere queunt, ut is vix ante tertium, vel quartum diem post interlunium ingruat. Imò etiamsi omnes tres jam dictæ causæ, maturiorem Lunæ apparitionem promoventes, quandoque conveniant; tamen addubito, num novissima & prima Luna, uno eodemque die (præsertim in hisce septentrionalibus locis, ubi elevatio Poli est Bo-realior, atque excelsi Montium vertices, ad primam visionem Lunæ deprehendendam, defunt) conspici possit; sicut etiam rarissima adsunt exempla, visæ ultimæ, & primæ Phasis Lunæ, eâdem die, in plano horizonte. Veteres quidem Astronomi hujusmodi exemplorum meminerunt, & quando illa acciderunt, diem ex eo *id est non nisi* veterem & novam vocârunt. Itemque refert Franciscus Patritius lib. 20. Pancosm. pag. 114. simile exemplum de Vesputio, qui observavit, unâ eâdemque die, veterem & novam Lunam; verum, ut addit, ultra æquinoctialem: ubi & hæc verba subjungit: *Id autem non videtur aliter fieri potuisse, quàm aëre multò, quàm apud nos, à vaporibus libero.* Quod & ego libenter concedo, verumque esse credo.

Quando secunda vel tertiâ quartæ die, Luna prima consistatur?

Veterum Astronomorum error, circa primum exortum Luna.

Rarissima datur exempla, visæ novissimæ, & primæ Luna, die Synodi.

Vesputius ultra æquinoctialem, veterem & novam Lunam, unâ die, spectavit.

M m 2

Quod

*Observatio
prima phasis
Lunæ statim
post diem in-
terlunij, An-
no 1644.
die 8. Aprilii
S. N.*


Quod autem attinet, primam phasin Lunæ à me observa-
tam, sequente scilicet statim die post Synodum Luminarium,
Anno nimirum 1644. die 8. Aprilis S. N. feriâ 6. quæ conti-
gerat pridie, non quidem vespertino, sed matutino tempore,
circa quartam: ejusmodi observatio, nostro in loco, rarum est
contingens, quemadmodum illi nôrunt, qui huic observandi
curæ invigilarunt. Quandoquidem perrarò Luna nova, ante
tertium diem, post coitum, conspici solet. Quòd autem hæc
prima phasis, tam citò, paulò post conjunctionem visa fuerit,
hoc ideo factum est; quia duæ conditiones jam dictæ, & causæ
velocioris apparitionis Lunæ, hic, aderant. Primùm namque
fuit tempus vernæ conjunctionis in 18. vel circiter, gradu Arie-
tis, Lunaque tempore suæ apparitionis in 13. gradu Tauri extitit,
in signis scilicet longarum descensionum, & quidem, post
piscis, in primariis nempe in Ariete & Tauro. Deinde quoque
erat Luna circa Perigæum velox. Inde igitur factum, quòd
elapsis 40. horis, post veram Lunæ conjunctionem, Luna spe-
ctata fuerit; & quidem satis adhuc elevata supra horizontem.
Imò, licet verò ad tres, quatuorve gradus Soli propior extitis-
set, nihilominus fuisset visa: hoc est; etiamsi vera conjunctio
pridie, non ante, sed post meridiem contigisset, prima hæc
phasis insequente die apparuisset. Præterea, si Luna, id tem-
poris, non circa Limitem Austrinum; (quippe latitudo ejus
fuit Austrina 4; grad. ferè) sed circa Limitem Boreum hæsis-
set, prima phasis Lunæ intra 24. horas, post conjunctionem
cum Sole, videri potuisset. Hæc tria verò requisita conjun-
ctim (ut jam dictum est) ita ut Luna sit in signis longarum
descensionum, in Perigæo, & in limite Boreo, tempore vide-
licet conjunctionis, seu apparitionis, rarissimè concurrunt: si-
quidem, modò unum, modò alterum desideratur, quod appa-
ritionem ejus remoratur ac impedit, quò minus Luna, primâ
post interlunium die, cerni possit, tamen illo tempore (quod
non impossibile) Cælum datur serenum, nec deest observato-
ris diligentia. Etenim intra novennium, hæc tria requisita vix
unà ingruent, etiamsi omnes Neomeniæ perlustrentur, nisi
circa annum Christi 1654. mense Aprilii & Majo, ubi Lunæ
prima

*Cur Luna
prima jam
dicto tempo-
re, tam citò
sit visa?*

*Tres condi-
tiones velo-
cioris appa-
ritionis Lunæ,
rarissimè cò-
currunt.*

*Anno 1654.
mensibus A-
prili & Majo,
prima phasis
Lunæ tempo-
rius ingruet.*

Præcis Luna Prima et Novissima
Observata in 13 Gradu 8, circa Perigæum et Limit A.
G. E. D. A. M.
Anno Christi 1677, Die 8 Aprilis, hora 8 à meridie numerata, à
Conjunctione vâs 15, Diei 2 Currentis.



d

Jo. van Waer

prima phasis sat citò, & quidem ipsâ die post conjunctionem cum Sole, conspici poterit, modò sudum affullerit Cœlum. Equidem duo requisita, sæpiùs in coitu Lunæ simul queunt concurrere, velut etiam in observatione jam allatâ factum, ita ut Luna in signis Ascendentibus, & Perigæo, vel etiam circa Limitem Boreum, & in signis Ascendentibus versetur: unde Luna tunc maturiùs, præteritis 24. horis, vel etiam pluribus, prout Synodus Luminarium accidit, supra horizontem elevata videtur; quanquam & hoc rariùs, nec sanè singulis annis accidit. Fieri id autem poterit Anno 1646. circa æquinoctium vernum, si tunc clarus fuerit aër: quin, & Anno 1652. mense Martio & Aprili, prima phasis Lunæ temporariùs eveniet: duo namq; requisita, tempore intermestris Lunæ adesse deprehenduntur, ut & hîc factum. At enim in præcedentibus annis, conjunctio Lunæ & Solis, non fiet circa Perigæum, neque circa Limitem Boreum, etiam si in signis ascendentibus contigerit; id quod quotannis fieri necesse est.

*Circa Anno
1646. Cir
1652. cir-
ca, ac post æ-
quinoctium
vernum, pri-
mam phasin
Lunæ citius
videre dabi-
tur?*

Ex quibus colligi potest, quòd ejusmodi phasis, qualis hîc observata fuit, visu sit rarior. Quamvis enim accidat, duo requisita adesse: tamen non semper purus datur vesper; & ita Lunæ aspectus, intercurrentibus nubibus impeditur; sicut id frequenter expertus sum.

Ut autem eò magis ea, quæ de causis celerioris, ac tardioris primæ apparitionis, seu accensionis luminis Lunæ, in medium attuli, stabiliantur; idcirco hoc loco diversas observationes adducam, quo tempore hanc primam phasin Lunæ, confestim sequente die post conjunctionem cum Sole, sudo existente Cœlo, quidem quæsi, verùm exceptâ unicâ vice, hætenus nondum animadvertere potui. Hinc namque satis apparebunt causæ, quæ velociorem primum Lunæ exortum, alio tempore remoratae sint. Equidem ex die octavâ Aprilis, Anni 1644. quâ primam Lunæ phasin, mox insequente post coitum die conspexi, identidem vigiles oculos erexi, ad Cœlique aspectum excitatus sum, nunquid recentissimæ Lunæ faciem alio quoque tempore, altero post Neomeniam diè, pervidere possem? At, quo successu? audi: primum diè 5. Junii anni 1644.

*Cur Lunam,
sequente post
coitum die,
non licuerit
cernere?*

Lunæ cornu vesperi haud potui cernere : erat quidem in Geminis, sed præterea in Limite Austrino, & ultra Perigæum commorabatur. Sic & die 5. Julii ejusdem anni primam phasin Lunæ, altero post conjunctionem die, non potui deprehendere. Neque id mirum : nullum quippe requisitum maturioris apparitionis Lunæ planè aderat. Unde nec sequente die sextâ Julii, prima Lunæ cornua conspicari fas erat, ita ut non ante tertium post Synodum diem, die septimâ videlicet Julii, Lunam primam, & quidem horizonti occiduo proximam, videre tum contingeret. Quin etiam, cæteris intermenstruis Lunis hujus anni, primam phasin, sequente die (quemadmodum quilibet rationum Cœlestium non imperitus; faciliè intelligit) frustra ivi quæsitum : quia conjunctio Luminarium, jam in signis breviorum descensionum accidit.

*Observatio
abstrusa.*

Similiter Anno 1645. die 28. Martii, feriâ 3, elapsis 23. horis post Synodum Luminarium, vesperi diligenter quidem primam Lunam quæsi, sed non inventa; quoniam ne inpe unicum tantum præsto erat requisitum, nimirum motus Lunæ in Ariete, signo longarum descensionum : contra obtinebat latitudinem Australem, supra quatuor gradus, & insuper incedebat Apogæa, hoc est remotissima à terrâ. Quod si verò illa duo non obtitissent impedimenta, utique commodum ipsam phasin, etiam hoc tempore aspectu percipere potuissem.

*Observatio
prima phasos
Lunæ, altero
post conjunctionem
Solis & Lunæ,
die.*

Anno 1645. die 27. Aprilis feriâ 5, iterum horâ octavâ vespertinâ, operam dedi observationi primæ apparitionis Lunæ, quæ demum non meam spem sefellit : siquidem eam, statim alterâ die post conjunctionem, eâ formâ deprehendi, quâ hîc cernitur appicta, atque anno præterito est observata. Causa verò maturioris istius exortus gemina est. Altera, quòd extiterit Luna in Tauro, signo longarum descensionum; altera, quòd fuerit in Perigæo. Accedit & hoc, quòd vera conjunctio Solis & Lunæ, die 26. Aprilis satis mane ingruerit, ita, ut id temporis, quo à me visa est, jam 42. horæ præterierint ex Synodo Luminarium. At verò citius fieri nequivit : Luna namque in maximâ latitudine Austrinâ, fuit constituta.

Conclusionis loco unum adhuc monebo, nixus fundamentis

tis præsentis phæos Lunæ, de Montibus Lunæ, quorum etiam supra capite sexto facta est mentio: siquidem isti definitis temporibus etiam in ipsâ Peripheriâ Lunæ, fiunt planè conspicui, ut intelligant tandem Peripatetici & vim nostrarum demonstrationum, quibus rem seriam defendimus, & contra imbecillitatem suorum argumentorum, quibus sententiam nostram oppugnant.

Primum, nemo ex Peripateticis, qui modò ejusmodi nascentem primamque phasim Lunæ conspexit, ibi inficias, confinium lucis ac umbræ esse dissimile, asperum & inæquale. Deinde, ex superiori capite septimo abundè satis patet, spatium inter insignem illam Maculam Lunæ, circa Peripheriam non procul à limbo ejus occidentali (quam melioris intellectus gratiâ Paludem Mæotidem appellamus) & inter extremam oram situm, esse, ob librationis motum, quandoque latius, quandoque etiam arctius. Omnium verò latissimum est illud spatium, Lunâ (ut antè quoque dictum) in signo Cancri versante, & quidem circa limitem Austrinum: arctissimum verò, cùm existit in Capricorno circa limitem Boreum, ita ut satis evidens detur differentia, inter maximam & minimam librationem Lunæ, nimirum $\frac{1}{8}$ pars totius diametri Lunæ, sicut id ex motu centri Lunæ colligere licet. Insuper, postquam hæc apposita phasis Lunæ, non procul à signo solstitiali æstivo, nempe principio Cancri contigit, utpote in 13. gradu Tauri, circa limitem Austrinum, sequitur spatium illud inter Peripheriam, & Paludem Mæotidem, tum quoque propemodum fuisse latissimum. Hæc phasis etiam in medio, ubi maximè diversa conspicitur, censetur tricesima sexta pars Lunæ. Ex quibus apparet, quòd in hoc Iconisino, confinium luminis & umbræ nondum eò perveniat, quo aliàs interdum, Lunâ in Capricorno circa limitem Boreum existente, Peripheriam terminari oportet, quodque ideo hæc phasis ad sensum arctior fuerit, sicut antè memorata proportio haud obscure innuit. Et licet concedamus, phasim hanc Lunæ tunc æquè fuisse latam, atque est maxima & minima libratio, inter jam memoratam Paludem & Peripheriam, Lunâ versante in Cancro: tamen inde quoque

*De Montibus
Lunæ in Peripheriâ ejus,
& de causâ
spatii isthuc
modò contractioris,
modò
latioris.*

*Differentia
inter maximam
& minimam
librationem
Lunæ:
est $\frac{1}{8}$ pars
totius diametri
Lunæ.*

quoq; sequitur, hoc confinium eo ipso quoque tempore isthuc fuisse, ubi aliàs vera & genuina Lunæ Peripheria, eà existente in Capricorno, conspiciebatur.

Ratio manifesta Montium in Peripheria.

Quocircà, quum hæc ita revera se se habeant, veluti quilibet bono Tubo instructus, & hanc phasin probè lustrans, non difitebitur; irrefragabili ratione sequitur, quòd etiam in Peripherià, quæ interdum & quidem maximam partem æqualis & lævis apparet, magni alti que Montes ac Valles profundæ adsint, quemadmodum in aliis Lunæ partibus, & quòd Luna in aduersâ quoque medietate, sit æque densa, scabra & gibbera, atq; existit in aspectabili hemisphærio; sicut ex sectione luminis & umbræ, velut antè dictum, manifestè deprehenditur; quodque insuper Montes circa Peripheriam, si non altiores, nec certè depressores sint, quàm qui circa dimidiatam Lunam tempore Quadraturæ animadvertuntur. Distantia quidem illuminatorum verticum Montium, non tanta hîc videtur, quanta sub finem capitis præcedentis fuit determinata: at verò hujus rei quidnam causæ putas esse? Nihil scilicet aliud, quàm quòd hæc sectio, quæ Peripheriæ vicina, obliquiùs à nobis spectetur, quàm reliquæ centro propinquiores. Sed tamen non caret admiratione, quòd confinium illud, ob formam Lunæ mirè rotundam, adhuc tam asperum videatur. Nam nullus Peripateticorum, quin hæc scabra, & inæqualis facies, & superficies

Lunæ, reapse sic se se habeat, eo minùs dubitabit, quò meliori Tubo Optico munitus, ejusmodi phases diligenter fuerit contemplatus.



CAPUT

Luna secundam, sive corniculatam, praesente Sole, visam.

Quod phaes Luna corniculata, atq; a conjunctione recentis, citius luminoso die, quam de nocte queant deprehendi.

Cuius verisimile sit, recentissimam Luna phaesin de die conjunctionis, quam nocte melius conspici posse?


minum vegeta & incorrupta: quemadmodum ipse ego distinctis temporibus ita Lunam vidi, & eandem quoque alius ostendi. Etenim, Anno 1644. die 6. Julii, Lunam secundam sive corniculatam, horis pomeridianis claro affulgente Solis lumine, cernere bene potui, ubi tamen, sequente vesperâ, post occasum Solis, nondum ejus videndæ dabatur facultas: ut alia taceam exempla. Ex adductis satis liquidò judicare licet, quòd sæpè, imò ferè semper, hujusmodi phaes, melius luminosis diebus, quam vesperi, post occubitum Solis, non nequeant conspici. Hoc tamen manet discrimen, inter primò visam Lunam de die, & de nocte, quòd phaes Lunæ de die, vel illustri visu, vel Tubo Optico conspectas, non tam accuratè possimus delineare, ob circumstantans scilicet majus lumen, & vicinitatem Solis, quod minus Lunæ lumen nonnihilo obscurius reddit: siquidem & hic trito illi locus est: *Majus lumen offuscat minus.*

Unde prorsus fit mihi verisimile, etiam primam ac recentissimam Lunæ phaesin, priùs, & frequentius interdiu, à diligentissimo observatore visus acuti notari posse, quam noctu: imò existimo, veterem, vel novissimam & primam Lunam, unâ die, in his etiam Septentrionalibus locis, animadverti posse. Neminem enim fulgor Solis deterreat, quò minus omni occasione immineat: hoc namque pacto à nocumento visus tutus esse potest, si duo colorata vitra, quorum suprâ capite 2. memini, vel potius optimum Helioscopium adhibeat, quo securè, sine læsione oculorum, ipsum Solem licet intueri, ut jam dicto loco indicavi. Inprimis autem hæc observatio potest institui, quando conjunctio Solis & Lunæ, circa meridiem accidit: nam, quin potestas veteris Lunæ, ante meridiem, & novæ Lunæ videndæ, ante obitum Solis detur, apud me non est dubium, nisi crassi vapores aëris obstiterint. Quandoquidem, si, sicut in Cœlo, Veneris omnes phaes, quantumvis Soli valde vicinæ, licet Telescopio dignoscere, sicuti capite 1v. ejusmodi observationes adduxi; utique & Lunam, quæ Venere longè major apparet, cernere facultas dabitur. Et, licet statuamus ejusmodi phaesin admodum esse angustam: tamen ea haudquaquam poterit esse magis exilis, quam Veneris facies corniculata. Præterea

Plagus Lunae Corniculatae Craterum
Observata in 14 Pieda 7, circa Limit. Anti. et Regnum.

G. EDWARDS

Anno Civili 1675 Die 28 Febuar. hora 7, à meridie numerate,
à Constantinæ 7 die 9, Diei 3 Currentis.



2.

Acta Scien.

terea ad lumen Lunæ primarium, accedit etiam secundarium, quòd tempore Plenilunii, præ reliquo corpore, solet esse lucidissimum, & maximum; sicut de hoc, capite 12. pluribus agitur: proinde utriusque beneficio, Luna eò citius poterit deprehendi. Omnium autem optimè hæc res speculatori veteris ac novæ Lunæ succederet, si se se in jugum excelsioris Montis reciperet, ubi foret extra inferiorem aëris regionem, quæ radios Solares plurimum intercipit, & oculos nostros nonnihil obscurat, constitutus: quippe Kepplerus etiam in Astronomiæ Parte Opticâ cap. 6. sect. 11. nihil prohibere scribit, Lunam in ipso conjunctionis articulo, juxta Solem in Cœli medio cerni, cum limitem alterum peragrat.

Luna juxta Solem in Cœli medio conspicitur potest.

Nunc autem ad ipsam effigiem phæos corniculatæ accedam, & quæ circa eam sunt animadversione digna, monebo. In priori phasi, magna quidem asperitas, tam in illuminatâ parte, quàm sectione umbræ, deprehendebatur, nondum tamen aliquam pervulgatam Maculam, Montes vel Maria, licebat videre, quum esset valde tenuis pars luminosa, præterea limbo Lunæ maximè vicina. In hac posteriori verò observatione Lunæ secundæ, jam aliquot Montes non ignoti, projicientes in Valles, circa latus occidentale Montium, sat nigricantem umbram, conspiciabantur; quales sunt, Mons Nerosus, Insula major Caspii, Montes Hippoci, Mons Sanctus, Montes Alani, M. Alauni & alii. Inter cætera hîc consideratione aliqua digna occurrit etiam hoc, Montes Alanos, Paludem cingentes Mæotidem, non esse reliquorum Montium infimos; verum satis editos: idque ex eo colligitur; quoniam cacumina eorum, in illuminatâ parte Lunæ insigniter prominebant, etiamsi tum temporis à Peripheriâ nondum longè abessent. Deinde quoque notabile est, quòd adeò æquale segmentum Paludem Mæotidis transeat, unde certè stabiliri potest minimùm aliqua convenientia, inter illam partem & nostrates aquas, respectu materiæ, si non revera naturales aquæ esse debeant: quia horizon isthic (qui confinium luminis & umbræ repræsentat) lævis & æqualis spectatur. Adhæc autem memorandum à nobis est, quòd Palus jam sæpiùs dicta, quum primùm in conspectum veniret,

Notabilia nonnulla circa phasim Lunæ corniculatam.

Montes Alanos admodum sunt excelsi.

colore tam debili esset, ut in subsequētib; phasibus obscurior evaderet, & magis magisque ad nigritiem tenderet. Ratio hujus mutationis, jam aliquoties tacta, & aspectus obliquitati tributa est. Nigras autem Maculas in occidentali latere Paludis se ingerentes, existimo esse umbras à diversis editis Montibus Alani, Mæotidem circumdantibus, projectas & profectas.

Probabilis ratio, non coherens umbra in Lunâ.

Quod autem umbra non cohæreat, forsan hæc causâ potest esse, vel, quòd unus altero Monte sit declivior, vel, quòd singuli sua habeant distincta spatia.

De hujus phasios libratione.

Jam tria illa nitida parva puncta, in inferiori cuspide Lunæ, & in ipsâ fermè Peripheriâ; haud dubiè sunt peculiaris quædam cacumina Montium altiorum, præ reliquis inprimis conspicua; quæ argumento sunt, in ipsâ Lunæ circumferentiâ dari Montes planè insignes. Denique & spatium illud inter Paludem Mæotidem & Peripheriam, quoad latitudinem est considerandum: illud enim, uti jam suprâ dictum fuit, quotidie vel latius vel angustius fit, ad normam videlicet motus librationis Lunæ. Postquam igitur hæc phasis Lunæ in 14. gradu Arietis, latitudinem obtinet Australem quatuor propemodum graduum, ideo hoc spatium ita est comparatum, ut ex eo lacum minorem occidentalem æstimare liceat: in ceteris sequentibus phasibus, id spatii longè sequius affectum deprehendimus, quod ipsæ oculis usurpatæ luculenter ostendent.

CAPUT XI.

DE LUNAE FALCATAE CRESCENTIS PHASI.



Quòd Cornua five Cuspides, nascentis & recentis, vel veteris & decrepentes Lunæ, magis uno tempore sint acutiores, vel obtusiores, quàm alio, etiam vulgo notum est, ita ut ruris alumni, ex formâ cornuum Lunæ statum aëris in sequentem diem colligant & præfagiant. Cùm, namque cornua sunt probè acuminata, tum bonam claramque auram sibi pollicentur: sin autem contrâ sunt valde obtusa, tunc Cœlum

Præfagium statum aëris futuri ex cornuum Lunæ figurâ, qualis nitatur fundamentum?

lum nubilum, turbidum, ventosum & pluviam prædicant : idque omen, vix adeò est lubricum & incertum. Siquidem visâ à nobis cornua Lunæ obtusa, arguunt aërem plenum crâsforum vaporum, & humorum. Alioquin eadem cornua Lunæ eâdem ætate Lunæ æqualiter illuminatæ, & serenâ existente aurâ, æque sunt acuta, nudo visu arbitro : at verò per generosum Tubum Opticum inspecta, cornua ista multò puriora, subtiliora, & acutiora apparent, ut etiam revera se se habent : quia Telescopium, superfluos, & adventitios radios, qui cuspides Lunæ magis magisque dilatant, & obtusiores reddunt, detrahunt. Idque non tantummodo præstat in cornibus; sed etiam in reliquis omnibus illuminatis partibus crescentis, vel decrecentis Lunæ : illæ namque phasæ, semper, etiamque clarissimâ affulgente aurâ, nudo visui majores & latiores apparent, quàm revera sunt, & Perspicillum repræsentat : quippe, prout una phasis alterâ est recentior, vel adultior, ita quoque lux illa ascititia, respectu propriæ & germanæ lucis, conspicitur vel laxior, vel angustior. Et quantum omnes phasæ curvatae in cornua, post novam Lunam crescunt & augentur, tantum hoc luminis augmentum, de die in diem certâ proportionè diminuitur; contrarium autem accidit in phasibus falcatis, & corniculatis Lunæ decrecentis. Quò namque magis illæ quotidie minuuntur, & illuminata pars contractior fit, eò magis hoc ascititium Luminis augmentum ingravescit. Ex multiplicibus autem, & diuturnis observationibus compertum habeo, quòd phasis, tertio die post conjunctionem, (quando Luna primo post coitum die inspecta est) apparuit, ut & ante conjunctionem, quando adhuc semel die interlunium præcedente cernitur, nudo visu percepta, dimidio ferè amplior appareat, quàm Tubo visorio considerata. Phasis autem secunda Lunæ, quæ alterâ die post conjunctionem accidit, sine Tubo Optico duplo major videtur, quàm cum Tubo, & prima nascensque phasis ferè triplo latior, quàm revera est, quum per se satis sit angusta. Quæ omnia forsàn valde mira Lectori videbuntur.

Hanc autem aspectus diversitatem, non nisi radii adventitii, & circumfusum lumen, quod alterum illud magis dilatat, ma-

*Telescopium,
Luna adventitios radios
admit.*

*Quò phasæ
crescent Lunæ
crescente,
eò luminis
augmentum
phasium de-
crescit.*

*Cur phasæ
recentiores
Lunæ, solo vi-
su considera-
te, ampliores
appareant,
quàm Tubo
Optico?*

gisq; visui nostro exhibet, efficiunt. Quomodo verò hoc fiat, & quæ sit hujus rei ratio, in sequentibus succinctè exponetur.

Primum quidem hoc oritur, partim ex hallucinatione visus, partim ab aëre nostro crassiusculo, qui Lunam proximè circumstat. Nam, quòd utrumque fiat, perspicuè possumus deprehendere, quando Luna adhuc prope turrim, murum, vel infumibulum versatur, & aër circa Lunam quaquàversus purus, & clarus conspicitur, ubi quòd vicinius Lunæ, eò clarius, & quòd fit adultior, eò minus hoc lumen apparet, tandemque expirat: hincque fit, ut limbi, tam Lunæ, quàm aëris, ob nimiam lucis tenebrarumque oppositionem, in retinâ tunicâ oculi quasi confundantur. Quando verò Lunam per parvum foramen, præsertim in crepusculo, vel, quod præstat, per Tubum Opticum intuemur, tunc lumen illud tam validè, & copiosè in foramen pupillæ incidere nequit; unde nec in oculis nostris tam fortem facit impressionem, neque tantopere se dilatat. Unde causâ etiam cernitur, cur Eclipses Solis nudo visu, vel parvo foramine, sine vitris convexis, aut coloratis, vel sine Tubo Optico observatæ, semper minores conspiciantur, quàm revera sint: prout autem aër purior, vel impurior est, sic hæc Lunæ lux nostris oculis apparet minor, vel major. Hicq; ipse aër etiam tam potens & valens est, circa dilatandam lucem in oculis nostris, ita, ut & margines corporis alicujus obscuri, candidissimi, & quasi pellucidi appareant, quemadmodum id semper in quolibet atro corpore, aëri lucido exposito, fit conspicuum: imprimisque, si vesperi aliquem baculum oblique positum, ante candelam accensam, in aliquâ distantia statueris, tum animadvertes, baculum eâ parte, quâ lumen lucernæ respicit, longè tenuiorem conspici, quasi in superiori, & inferiori margine esset translucidus, & excavatus: lucis enim natura est, se undiquaque diffundere & amplificare. Dum igitur hoc fit, necessariò sequitur, opaca continua nonnihil mutari, & præcidi.


Cur Eclipses Solis in Camera obscuratâ, per foramen nudis oculis inspicitæ, semper minores evadant, quam revera sint?

Quare prima phasis Lunæ omnium maximè se se diffundat?

Quòd autem minima phasis Lunæ, omnium maximè se se diffundere videatur, præ cæteris adultioribus, hæc procul dubio causâ est, quòd in ejusmodi phasi, lux quasi magis comprimitur.

Planus Lunæ Fulcituræ Gregoriana.
Observata in 1 Grada N. circa Praxiam u. V.
GEDRUKT.

Anno Christi 1677, Die 12 Januarii, hora 5^h à meridie romulana.
à Coniunctione vero 20, Dies 3 Currentis.



matur. Quò verò magis coarctatur, eò fortiorem impressionem & confusionem, in oculis nostris facit, magisque videtur dilatari. Opticum enim est axioma: *Lux compressa, fortior est luce disgregatâ.* Enimvero idem non solum in Lunæ, sed etiam in phasibus Veneris falcatis, & corniculatis deprehenditur, quarum eadem ferè est ratio. Quò namque minores, & arctiores in eâ fiunt phasès, eò magis in proportione se se videntur dilatari: semper tamen multò plus ante crepusculum, quàm in crepusculo: minùs verò, exorto Sole, quàm in crepusculo, sicut etiam suprâ hujus feci mentionem cap. iv.

Ex iis, quæ jam in medium breviter allata sunt, causa etiam quodammodo colligitur, cur nimirum phasès Lunæ curvatæ in cornua, tam crescentes, quàm decrecentes, majores quoad diametrum appareant, & non illuminatam partem excedere videantur (quæ pars tenebricosa, illo tempore, ob lumen illud secundarium à Terrâ reflexum, satis est conspicua) ita ut aliquis solo oculorum testimonio fretus, juramento confirmare auderet, hemisphærium non illuminatum esse longè minus illuminato. Verùm hoc ex alio nullo principio oritur, quàm ex radiis adventitiis, sicut Tubus Opticus id manifestè probat: siquidem per hunc phasès considerata, nulla major, vel minor apparet, quàm esse debet, respectu non illuminatæ Lunæ partis.

Quare phasès Lunæ in cornua curvatæ, solito majores apparent?

De hac autem præsentè Phasi falcatâ, sequentia adhuc sub finem hujus capituli notari possunt.

Nota utilis, de phasi Lunæ falcatâ.

I. Primùm, quòd forma, figura, & color Paludis Mæotidis, à sequente phasi nonnihil differat: figura namque est hîc angustior, & color dilutior. Sic & Montes Riphæi, hîc videntur arctiores, & magis compressi, quàm in sequente figurâ. Ratio ex capite octavo peti potest, utpote ex quo perspicitur, id ex motu librationis imprimis proficisci: etenim, quia Montes unâ cum Palude, hîc peripheriæ sunt viciniore, quàm in alterâ mox secuturâ figurâ, ideoque non alia queunt existere phænomena.

II. Deinde, quatuor hîc adsunt, & spectantur notabilia quædam, & rotunda quasi capitella clavorum lucidissima, in inferio-

feriori Lunæ orâ, seu in infimo ejus cornu; sed hæc communiter in tali Lunæ phasi, semper conspiciuntur.

III. Denique ex clarè illuminato vertice editorum Montium, utpote hic Montis Paropanisi, infallibili ratione colligitur, quòd in vicinîâ marginum Lunæ, æque multi ejusmodi præalti Montes dentur, quàm circa centrum; quippe ex observatione hac patet, culminum distantiam in his Paropanisi Montibus, à confinio lucis, quadragesimam circiter partem diametri Lunarîs æquare.

CAPUT XII.

DE LUNÆ CORNIGENÆ CRESCENTIS PHASI.

QUOD Luna sit corpus opacum, imò opacissimum, quodque omne suum lumen unicè à Sole mutuò accipiat, & illud ad nos in terram per radios reflexos transmittat, nemo sapientum amplius negabit, & nos istud, capite sexto Selenographiæ, validissimis argumentis demonstravimus. Ex quo etiam sequitur, corpus Lunæ globosum, minimè esse undique æquale, læve & glabrum, sed inæquale, scabrum & durum: sic namque reflexio radiorum Solis, in Lunâ eò fieri potest valentior. Hinc quoque fit, quòd Tellus nostra, quæ non minùs est corpus opacissimum, & planè asperum, inæquale, eminens & depressum, lumen Solis receptum, per radios reflexos, certis temporibus, usque ad sphæram Lunæ projicere non nequeat, quod lumen eò est nobilius, majus & fortius, quò Terra major est Lunâ.

Luna non tantùm est corpus opacum; sed & inæquale, asperum & crassum.

Unde lumen illud subobscurum & secundarium, ante & post interlunium existat.

Per quam reflexionem radiorum Solarium, in globo Telluris, producitur lumen subobscurum, & secundarium, quod semper paulò, ante, vel post conjunctionem Solis ac Lunæ, in majori parte residuâ, & non illuminatâ Lunæ, attentis scilicet clarè illustratis cornibus, & confinio lucis conspicitur. De hoc namque lumine Lunæ secundo, hæctenus variæ fuerunt opiniones. Nonnulli volunt esse hoc insitum, congenitum, & natu-

naturale parvum Lunæ lumen, quod non solum circa hoc tempus; sed etiam tempore Eclipsium Lunarium, deprehenditur: alii contendunt, esse reflexionem ex Æthere. Sunt, qui dicunt, Lunam esse corpus semidiaphanum, & hinc, tempore conjunctionis, cum Sol Lunam à tergo illustrat, respectu videlicet nostri, lumen Solis ex parte penetrare, atque translucere; unde lumen illud debilius existat.

Sed omnibus his opinionationibus, veram causam nondum exprimi, paulò antè, capite sexto, multis rationibus probatum est. Quamobrem, brevitatis studio, non amplius antithesi immorabor; verùm in confirmatione, & explicatione veræ sententiæ pergam, genuinamque causam luminis secundarii, & quæ hic animadversione digna sint, ulteriùs exponam. Primò igitur sciendum est, quòd hæc lux secundaria, in phasibus Lunæ in cornua curvatis, eò sit fortior, clarior & evidentior, quò phasis est minor & angustior, ipsique conjunctioni Solis & Lunæ propinquior. Nam, quantò majora Luna quotidie sumit incrementa, ipsæque phasæ auctiores fiunt, tantò minus, debilius & obscurius, de die in diem hoc evadit lumen, donec tandem, tempore primæ Quadraturæ, planè evanescat, nec ab acerrimi visus homine amplius agnosci queat. Memini tamen, me artificioso Tubo Optico adjutum, lumen illud secundarium postridie primæ Quadraturæ Lunæ etiam vidisse, & integrum discum ejus haud obscurè potuisse apprehendere. Eandem quoque proportionem observat decrescens Luna. Mox enim, post ultimam Quadraturam, hæc secundaria lucula se se primùm exferit; dehinc autem magis magisque crescit, & quotidie fit evidentior & robustior, ita, ut hoc parvum lumen, ab ultimâ usque ad primam Quadraturam cerni possit. Atqui à primâ Quadraturâ usque ad ultimam, & in phasibus utrinque prætumidis, hoc lumen, neque Telescopio, neque nudo visu, percipi potest.

Proinde non immeritò hîc quæritur: ecquid causæ sit, cur paulò post, vel ante conjunctionem Solis & Lunæ, hæc lux secundaria adeò sit valida, maximeque perspicua? Ad hanc quæstionem solvendam istud principium supponendum est; nostræ

Quantò Luna de die in diem crescit, tantò lumen secundarium claritate decrescit.

Vera causa secundarii luminis in Lunâ ante & post synodum cum Sole.

scilicet telluri maximam intercedere cognationem (sicut etiam infra pluribus dicitur) cum Lunâ (quæ ut cætera nunc taceam) in eo quoque consistit, ut altera alteri, Solis lumen per reflexionem communicet, non quidem uno tempore, sed diversis, vicibusque distinctis. Quod enim ad Lunam attinet, illa noctu, post occasum ac discessum Solis, suum lumen mutuatum per radios reflexos ad nos defert, & suo debili lumine quadantenus, inprimis autem tempore Plenilunii, absentiam Solis supplere satagit, quemadmodum etiam à DEO ad hoc ministerium, ut nocti præsit, condita est. Quocirca Terra, quasi debitam gratiam Lunæ vult referre mutuo officio, dum vicissim aliquod Solis lumen, ad Lunam projicit per reflexionem, non quidem tempore Plenilunii, ubi Luna maximè à Sole illustratur, & penes illam, quasi meridies (præsertim penes illos, qui circa medium respectu nostri inter Pontum Euxinum, & Mare Mediterraneum degunt) animadvertitur, nec majori lumine opus habet; sed illo tempore, quando Sol incipit ad occasum propendere, nec hemisphærium Lunæ nobis objectum & conspicuum, à Sole jam occidente potest illuminari, noxque inminet, quod fit tempore interlunii. Tunc namque Terra validissimè Solis lumen, per reflexionem ad Lunam transmittit, ita, ut id temporis sit in Lunâ Pleniterrium. Id quod eo tempore commodissimè fieri potest: etenim Lunâ Plenâ, Terra, in lineâ rectâ, inter Solem & Lunam interjecta est, ita, ut medietate, Soli oppositâ & illuminatâ, Luna etiam Terram respiciat. Tunc verò Terra, quâ unum latus illustratur, quamquam non id, quod Lunæ objectum est: siquidem illud tunc tenebris planè involutum latet, ita, ut tum Terra respectu Lunæ sit obscura & caliginosa, sitque in Lunâ conjunctio Solis, sive Noviterrium.

*Pleniterrium
Lunæ.*

*Noviterrium
Lunæ.*

Quando verò Luna versatur, respectu nostri, in conjunctione Solis, tunc respectu Lunæ hemisphærii patentis, Terra nostra ei est opposita, & hemisphærium superius Lunæ obversum, totum illuminatur: contra inferius Lunæ hemisphærium Terræ oppositum, & planè obscurum est, eò quòd sit in conjunctione Solis. Hoc autem pacto collustratum à Sole hemisphæ-

misphærium Terræ efficaciter satisque clarè hoc lumen Lunæ potest impertire, nimirum per radios rectos: siquidem hæc globosa corpora, rectâ lineâ ad se invicem inclinant. Lunâ verò, ob velocem suum motum, quotidie à rectâ Solis Terræque lineâ magis magisque recedente, tum, secundùm istam proportionem, Pleniterrium decrescit, phasesque fiunt contractiores, ita, ut progressu temporis, tanta portio Terræ à Lunâ collustrata conspici nequeat: unde & in dies deinceps debilius lumen ad Lunam transmittit. Atque hoc lumen eò magis singulis diebus deficit, fitque obscurius, quoniam Terra quotidie radios Solares obliquius in Lunam projicit, ob majorem ejus recessum à Sole. Et hæc causa est, cur tempore primæ Quadraturæ istud lumen secundarium Lunæ à Terrâ reflexum, propter pauciores & obliquiores radios, fiat minùs aspectabile, & demum se planè subtrahat aspectui: contra verò, circa & post ultimam quadraturam, se se primò conspiciendum præbeat?

Cur hoc lumen Lunæ secundarium, post primam quadraturam, penitus tandem evanescat, & post ultimam quadraturam redeat?

Verùm, ut hæcenus dicta fiant eò clariora, tu Lector adjectam, quæso, figuram expende, in quâ non solum sunt expressæ illuminationes, ac phasæ Lunæ, respectu nostri; sed etiam illuminationes ac phasæ Terræ respectu Lunæ, ut & lumen secundarium Lunæ, quod à quaque certâ phasi proficiscitur. In hac figurâ A Sol est, B Terrâ, C, K, D, E, F, G, H, I, Luna. Nigriores lineæ, quæ respectu positus Lunæ ad Solem ductæ, sunt lineæ illuminationis. Quicquid inter has interjectum, & ad Solem conversum est, hoc segmentum etiam à Sole potest illuminari. Reliquum verò, quod lineis vel simplicibus, vel geminis, est quasi obumbratum, id Sol nequit collustrare, & ideo manet obscurum. Cæteræ lineæ punctis notatæ, quæ à Terrâ B, ceu parte illuminatâ, ad non illuminatam Lunæ tendunt, sunt lineæ visionis. Et quicquid de Terræ portione inter has situm est, id magnitudinem phasæ Terræ refert: quæcunque autem Lunam respiciunt, utpote segmentum simplicibus lineis umbriferis consignatum, exiguam ejus partem, in quam incidunt radii Solis à Terrâ reflexi, exprimunt. At enim omnium maxima hæc illuminatio Terræ nobis appareret, si eam ex statione F, in quâ Luna est in ipsâ


Graphicè declaratur.

Lineæ visionis & obscurationis in Lunâ, quomodo à Sole & Terrâ fluant?

Pleniterrium in Lunâ verum quando?

Lumen secundarium
in Luna quando
valentissimum?

conjunctione, conspicere liceret: quandoquidem id temporis, Terra in oppositione Solis versatur, & ideo tum verum est Pleniterrium. Propterea verò etiam accidit, ut, juxta F, semper lumen secundarium fit fortissimum & evidentissimum, ob radios nempe rectos reflexos, quemadmodum etiam ex lineis



Aut. Sc.

Lumen secundarium
Lunæ, quando
debilius
appareat?

punctatim descriptis colligere licet. Quamprimum autem Luna aliquantum progreditur, & à conjunctione, vel lineâ A F B C recedit, & falcata evadit, sicut E & G hanc faciem designant; tunc lumen secundarium Lunæ eò factum est minus, quò plùs phasis Lunæ accrevit, & lineæ interpunctionibus occupatæ angustioribus spatiis concurrunt: unde simul illud lumen debilius apparet: siquidem id ætatis Lunæ & Terræ, lumen aliquantum decrevit, & respectu Lunæ gibbosum evadit. Eam namque ob causam, non tam validos radios in illumina-

minatam partem Lunæ potest projicere, utpote qui etiam ob situm Lunæ sunt obliquiores.

Penes D & H verò, circa quadraturam Lunæ, terra etiam fermè ad Lunam apparet bifida; unde lumen secundarium vix sensu oculorum percipitur, propter pauciores & obliquissimos radios, sicut ex interpunctionibus linearum ad D & H patet. In facie Lunæ gibbâ K & I, Terra est falcata, & utraqûe linea visionis propemodum concurrat: quæ causa est, cur lumen secundarium, se ex conspectu nostro auferat, ut ut aliquid adhuc luminis in Terrâ remaneat, quod in Lunam reflectitur, quod tamen adeò exiguum est, ut visum nostrum non incurrat.

Quando lumen secundarium Lunæ evanescit?

Quando verò Luna ad oppositionem perveniens, ut penes C², plenum lumen obtinet, tunc Terra respectu Lunæ est in conjunctione, & suo hemisphærio ad Lunam converso, planè tenebrosa & obscura est: contrâ verò totum Terræ hemisphærium, à Lunâ eò pleniùs & fortiùs potest illuminari, quemadmodum fit in omnibus oppositionibus, nocturno tempore, ubi Luna oritur, Sole ex adversâ plagâ occumbente.

Noviterrium in Lunâ quâdo?

Igitur, ex hac figurâ, ut & ex reliquis adjunctis, iterum fit abundè manifestum, ut, in Terrâ distinctas menstruas Lunæ illuminationes oculis deprehendimus, eodem simili modo, si in spherâ Lunæ degeremus, menstruas quoque Phases Terræ conspiceremus, etiam si Terra quotidie circa suum axem convertatur, sicut infrâ quoque hac de re pluribus agetur. Rursus, quemadmodum in Terrâ lux Solis à Lunâ reflexâ, partes ejus per se densas, ac obscuras collustrat: sic econtrariò lux Solis à Terrâ reflexâ, Lunam noctu potest illuminare.

Si essemus in Lunâ, menstruas Phases Terræ animadvertemus.

Veruntamen cum die ac nocte Lunari, longè aliter comparatum est, quàm cum nostrâ die ac nocte: siquidem hujus vicissitudo diei ac noctis in maximâ parte Terræ, 24. horarum spatio absolvitur: at in Lunâ mensis intervallo primum variatur; ita, ut unus dies ferè 14. nostrates dies, & una nox totidem etiam dies æquet. Causa verò tam longissimarum dierum ac noctium in Lunâ hæc est, quòd Luna non circa suum axem, sicut Terra convertatur; sed ex proprio motu, quem

Dierum & noctium, vicissitudinû in Lunâ, ratio.

per duodecim signa cœlestia in propriâ perficit orbitâ, sibi diem ac noctem acquirit. Atque hinc fit, quod nos Incolæ Terræ, semper unum duntaxat hemisphærium Lunæ, & uniusmodi Maculas, eo uno in loco persistentes conspiciamus, eò quod Luna nunquam prorsus circa suum axem circumvolvatur. Terra verò, quoniam motum diurnum 24. horis absolvit, non tantum inde, 24. horarum intervallo, vicissitudines diei ac noctis consequitur; verum etiam integrum suum globum, non ex parte solum dimidiatâ, hemisphærio Lunæ ad terram converso, ostentat, & suas phases ac illuminationes præsentat.

*In hemisphæ-
rium Lunæ à
nobis aversû,
Terra radios
Solis reflecte-
re sequit.*

Alterum hemisphærium Lunæ, quod neque nos, neque ceteri Terræ Incolæ cernere possunt, à nostrâ terrâ nihil accipit luminis, neque eam omnino aspectu percipit, exceptâ tantum illâ particulâ hemisphærii latentis Lunæ, quam etiam nobis motus librationis Lunæ, aliquando visendam exhibet. Ex quibus quoque haud difficulter cognoscitur, quod si in Lunâ dentur res creatæ viventes, quod illæ, quæ habitant in hemisphærio Lunæ patente, & aperto Terræ, ratione luminis, sint melioris conditionis, quàm illæ, quæ colunt hemisphærium Lunæ nobis absconditum ac latens. Etsi namque longitudo noctis, tam in unâ, quàm alterâ medietate Lunæ est 14. dierum: tamen non tantæ sunt tenebræ in patente hemisphærio, quàm in latente Lunæ: quippe, loco non lucentis Solis, Terra lucem Solis reflexam ad Lunam transmittit. Incolæ verò superioris hemisphærii, lumine secundario Terræ destituuntur, unde & majori caligine tectas noctes habent, quàm habitatores in inferiori hemisphærio, qui nos respiciunt.

*Si dantur vi-
ventes crea-
tura in Lunâ,
eatum me-
lior est ratio,
quæ colunt
inferius Lu-
na hemisphæ-
rium, quàm
quæ superius.*

Postquam autem hac occasione in contemplationem Lunæ incidimus, placet in eâ ambulatione adhuc unum conficere spatium alterumque, & dispicere, quæ animadversione digna in Lunâ amplius occurrant, quomodo videlicet cum Terrâ queat comparari, quibusque in partibus cum eâ conveniat, & in quibus discrepet, insuper, si in eâ versaremur, quæ nobis evenire possent.

Primum autem hîc incidit quæstio: annon Ecliptica & via regia Solis, ex Lunâ observata, consimili formâ, & declinatione

ne

ne ab æquatore nobis appareret, quemadmodum hîc in Terris spectatur? Respondeo, quòd non. Etenim Incolis Lunæ (ut ita docendi causâ loquar) Ecliptica nostra, quasi Æquatorem exhibet, sub quo Luna moveri apparet, & orbita Lunæ est via & orbita Solis. Hi autem duo circuli in oppositis locis se se interfecant, veluti penes nos Ecliptica & Æquator. Neque non tamen notabile discrimen hic invenitur: I. siquidem Ecliptica, Lunæ Incolis tantummodo videtur ab Æquatore discedere, tam Austrum versùs, quàm Boream, ad quinque gradus & 17. minuta, qualis est aliàs maxima latitudo Lunæ; quæ declinatio penes nos 23; gradus efficit. Unde & illis duo Tropici solùm distant decem gradibus & 34. minutis, quorum intervallum apud nos 47. gradus, vel circiter, æquat. Hinc maxima & minima altitudo Solis, in Luna animadversa, non multùm variat, neque dierum noctiumque vicissitudines sunt sensibiles. Commutationes autem hyemis & æstatis, decremента & incrementa dierum, ut & integra Periodus ascendentis ac descendentis Solis, vertente anno apud nos absolvuntur: penes Incolas autem Lunæ, multò breviori tempore consunt, nimirum ipso menstruo spatio.

II. Deinde, quia jam constat, Eclipticam Lunæ cum suo Æquatore se se interfecare, ideoque ex eo facillè colligi potest, quòd inhabitatores Lunæ, consimili modo sua Solstitia & Æquinoctia definito tempore habeant. Nihilominus tamen in hisce quoque magna occurrit inter nos, & illos differentia. Æquinoctium namque in Lunâ longè citiùs isthîc variatur, quàm apud nos: siquidem singulis novendecim annis, vel circiter (quum Nodorum motus sit retrogradus) Æquinoctium omnia signa percurrit. Insuper Æquinoctia in Lunâ non tantùm multò magis, multoque prius mutantur, quàm hîc penes nos; sed & Solstitia: non quidem hanc ob causam, quia Æquinoctia transferuntur; sed; quia Sol uno tempore illis altior quàm alio apparet, & ideo Ecliptica non æque est immobilis, quàm apud nos; verùm singulis mensibus vel (ut rectiùs loquar) singulis annis apud Selenitas (qui Lunares anni, quatuor ferè septimanas non excedunt) semper variant. Ex quibus necessariò sequi-

Variatio Ecliptica & Æquatoris, si ex Lunâ uterq; circulus conspicietur.

Distancia Tropi corum Lunæ.

Selenite habent sua Æquinoctia & Solstitia, sicut nos, cum notabili tamen differentia.

Anno Lunaru determinatur.

sequitur, quòd sæpe unus annus ab altero, apud Selenitas, hoc respectu non parùm immutetur, & alias aliasque differentias fortiat. Nam & evidens deprehenditur discrimen in longitudine: longissimus enim Selenitarum annus, est 30. dierum, minùs horis 4. & 23. minutis, & brevissimus 29. dierum, 6. horarum 46. minutorum &c.

Selenita habent suas Eclipses Terræ & Solis, quæ à nostris sunt paulò diversa.

3. Adhæc ulteriùs quæri potest: postquam orbita Terræ viam Lunarem, vel potiùs Solarem (eò quòd Selenitæ non aliter existimare possunt, quàm Lunam stare) in certis punctis, utpote penes Nodos, intersecat; nunquid etiam Eclipses in Lunâ queant conspici? Quod ego quidem liquidò affirmo: quandoquidem eodem modo, quo apud nos duplex genus Eclipsium Solis & Terræ, ibi est conspicuum: quemadmodum apud nos, Solis & Lunæ defectiones, iisdem de causis, accidunt, quando nimirum Syzygiæ Terræ, Solis & Lunæ, circa Nodos, intra terminos Eclipticæ, contingunt. Hoc tamen intercedit discrimen, quòd Eclipsis Terræ (quæ apud nos vocatur Eclipsis Solis) semper penes Incolas Lunæ eveniat, tempore conjunctionis Lunæ & Solis, ut nos loquimur, ubi tum Terra in Oppositione versatur, & Luna inter Solem Terramque intercipitur: unde necessariò sequitur, Terram ab umbrâ Lunæ obscurari: quoniam autem Luna multò minor est, quàm Terra, idcirco umbra Lunæ longè brevior, & in orbitâ Terræ tenuior fit: ob quam causam fieri nequit, ut totalis Eclipsis, multò minùs cum morâ, in Lunâ possit accidere, sed semper oporteat esse tantummodo partialem, & cum brevi morâ. Maxima autem Eclipsis Terræ vix ultra 67. milliaria Germanica, respectu nostri globi terreni, se se potest extendere, quod spatium vigesimam tantum disci telluris partem efficit: quia scilicet tam Conus umbræ Lunarum, quàm distantia Lunæ & Terræ minima est. Quæ causæ concurrentes, miram faciem, Eclipsis Terræ, Incolis Lunæ, haud dubiè præbebunt, præsertim cum ejusmodi Eclipsis, tempore visibilis oppositionis sit centralis: sic namque in medio Disci terreni, exigua & rotunda obscurata particula apparet: circa quam ambiens major Terræ portio clara & perspicua evadit. Hæc tamen obscurationis exiguitas in medio Terræ

Maxima Eclipsis Terræ in Lunâ quomodo se extendat?

Terræ non diu persistit, sed pedetentim contrahitur, tandemq; evanescit. Eclipsis Solis autem in Lunâ fit, ut nos loquimur, tempore oppositionis, ubi isthîc in Lunâ est tempus conjunctionis Terræ, quæ inter Solem & Lunam interjicitur. Et quia notum est, quòd umbra terrena, etiam sub orbitâ Lunæ multò crassior, ac amplior sit, quam diameter Lunæ, undè quoq; penes nos Eclipses Lunæ cum morâ frequentes sunt. Sed & ideo Eclipses Solis in Lunâ non tantùm possunt evenire totales, ut ut apud nos sint rarissimæ: verùm etiam totales cum morâ. Etenim hoc in positu, Selenitis non solùm diameter Solis apparens fit contractior; sed & diameter Terræ, quæ est longè major, quàm Lunæ, ob viciniam distantiam ad Lunam latius patet, grandiorque est, quàm nobis diameter Lunæ visibilis apparet. Hancq; ob causam sæpius hujuscemodi Eclipses Solis cum morâ in Lunâ eveniunt. Ex quibus etiam intelligere licet, quòd Veteres Philosophi, utpote Oecetes Pythagoreus, & Philolaus (veluti Plutarchus lib. 3. de Placitis Philosophorum cap. 11. meminit) & alii non adeò absurdè Lunam appellaverint Antichtona, quasi Terræ nostræ oppositam dixeris: quemadmodum etiam Franciscus Patritius lib. 20. Pancosm. non absônâ ratione scribit: *Luna ergò Terra esto, & Terra nostra esto Luna, neq; duæ hæ Terræ, sive duæ hæ Lunæ, à conditore frustra sunt conditæ: similitudine enim mutuâ, altera alteram fovet, & sibi invicem favent, & influxus, quibus & ipse, & utriusq; partes, tum vivant, tum conserventur, altera ab alterâ suscipiunt.*

*Quando fiat
Eclipsis Solis
in Lunâ, &
quanta?*

*Cur Veteres
Lunam Anti-
chtona cre-
diderint?*

4. Porrò, quia hæc speculatio per se adeò fœcunda est, ut se se latè diffundat, idcirco non dubito, quin B. Lector, perceptâ unius quæstionis solutione, mihi statim aliam sit propositurus. Quandoquidem enim asserui, Terram nostram in Lunam posse Eclipses quandoque inducere, interdum autem lumine plenam, interdum diversis phasibus distingvi eandem Terram: quamobrem forsân etiam lubebit scire, quid igitur de hac sentiam quæstione: utrùm Selenitæ, consimili modo in Terrâ nostrâ illuminatâ à Sole, Maculas deprehendant, ut nos in Lunâ, nec ne? Ad hanc iterum liquidò affirmando respondeo. Sicut enim nos in Lunâ diversas conspiciamus Maculas, quarum aliæ sunt clariores, aliæ obscuriores, aliæ magis elevatæ,

*Selenitæ in
terrâ eaq; Ma-
culas & qui-
dem multò
plures & grâ-
diores, quàm
nos in Lunâ
possunt nu-
merare.*

P p

aliæ

aliæ planiores, imò multis in partibus à se invicem distinctæ : ita quoque sine dubio Terra diversas in Lunâ præsentat Maculas : Terra continens, unà cum Montibus ac Vallibus, Maculas evidenciores exhibet : Lacus autem sylvæ, Paludes, ad aliquam nigredinem vergunt : Maria verò magnique fluvii omnium maximè circa Plenilunium nigrescunt : at in reliquis partibus, Valles ob umbram majorem, nigricantem colorem referunt. Adhæc planè mihi persuasum habeo, quòd Maculæ Terræ in globo Lunæ magis sint perspicuæ, & cum admiratione spectandæ, non solummodo, ob multitudinem Montium editorum, verùm etiam complures maximas Urbes, Flumina & Maria (quæ hîc longè quantitate Maculas Lunæ excedunt) & ob multas Insulas magnas & parvas: eò quòd Terra sit quadragies, & bis major Lunâ. Quocircà Maculæ istæ Terræ, non aliter se se in Lunâ, tum quoad speciem & formam earum, tum etiam, quoad confinium lucis & umbræ, nec non reliquas apparentias, quàm Maculæ Lunares, præsentant.


Quâ sequentia tamen permagnum occurrit discrimen, Maculæ terrenæ non diu uno in loco persistunt, & ideo non sunt apparitionis perpetuæ, quemadmodum nobis Maculæ Lunæ fermè incommutabiles permanent : Terra namque, ob suum motum diurnum, quem 24. horis perficit, semper aliam atq; aliam faciem singulis horis, imò momentis, Selenitis exhibet : imò non aliter illis videtur, quàm si Maculæ ab occasu in ortum moveantur, utpòte quæ periodum suam spatio 24. horarum absolvunt : hinc enim magnæ & repentinae mutationes existunt. Jam certa Macula in finitore occidentali conspicitur : elapsis aliquot horis cernitur in medio disci Terræ; dehinc circa ortum. Circa finitorem istæ Maculæ contractiores, & obscuriores apparent, quàm circa medium : quin & singulis elapsis 12. horis in Plenilunio Terræ, sive Pleniterrio, aliæ Maculæ, aliæque facies se se exferit. Insuper Terra quoque Lunæ Incolis alio tempore clarior, quàm alio affulget : illustriorque apparet, si hemisphærium Terræ, in quo Europa, Asia & Africa sitæ sunt, se se ad Selenitas convertat, quoniam in illis partibus Orbis Terrarum plures Montes, Valles & Urbes adsunt :
con-

Grades opinata mutationes Macularum in Terrâ apud Selenitas un de ?

Petrus Leonē Comynonā Gregentis.
Obzervata in 12 Gradū II. circa Limes. B.

G. S. D. A. K. I.

Anno Christi 1644. Die 10 Aprilis hora 8 i meridie nomen.
i Coniunctione vltio 16. Diei + Curcul.



4

Aut. Scalper.

contrà multò debilius est terræ lumen, si circumvolvatur alterum hemisphærium, in quo est America: siquidem in occasu reperitur Mare Pacificum, in Oriente Oceanus Atlanticus & Æthiopicus, ita, ut tunc plùs aquæ, quàm Terræ sit conspicuum. Cum primis autem Terræ facies apparet admodum debili lumine prædita, quum Mare Pacificum ad centrum disci terreni deferretur: tunc enim non nisi aquæ maximam partem sunt conspiciendæ, præsertim in quadrante occidentali. Ex his igitur patet, quòd longè major varietas in phasibus Terræ sit animadvertenda, quàm apud nos in phasibus Lunæ: siquidem non tantùm omnes vicissitudines Lunæ licet observare, in phasibus terrenis; sed etiam hæc adeò citò variant, ut nulla phasis tractu diuturnioris temporis, consimili confinio lucis & umbre, & quoad situm, Lunaribus phasibus per omnia respondeat, præcipuè exferentibus se se phasibus Terræ corniculatæ, & falcatae, quæ modò lumine satis appareant conspicuæ, eò quòd illuminatæ partes de continente participant; mox lumine satis obscuro conspiciuntur, quia mera Maria Selenitis sint obversa.

Phases vicissitudines phasium in Terrâ penes Selenitas, quàm apud nos in Lunâ contingant, necesse est.

§. Adhæc, quum in præsentî materiâ nihil non sit, quod non possit ambigi, ideo ad ideales quæstiones etiam hæc accedat: annon hæc continua variatio, & perpetuus motus diurnus Macularum terrenarum, Selenitis hemisphærii patentis, necessarium aliquem insignem, & illustrem usum sit allatura? Ad quam etiam affirmando respondeo. Quis enim, qualis & quantus hujus rei usus sit, ex sequentibus patebit. Nam, postquam Lunæ cives, ut ex superioribus quoque constat, singulis mensibus unicam duntaxat diem, ac noctem experiuntur, vel, ut Selenographico more & stilo loquar, unoquoque anno, quo Sol apud illòs 12. signa cœlestia perambulat, vel videtur perambulare, non plures dies & noctes, quàm unum omnino diem, unamque noctem habent, ita, ut longitudo diei istius, dimidio constet mense: idcirco licet inde judicare, quòd suum diem non in tam breves, sicut nos hîc in terris dividant horas, eò quòd illis Sol non singulis 24. horis appareat oriri, & occidere; sed procul dubio aliam ineunt dividendi horas rationem, ita quidem ut una penes illos diem integrum, vel dimidium

Qualis usus repetita mutationis Macularum in Terrâ penes Selenitas possit esse?

Primum fructus motus Macularum Terra, facit ad cognoscendum diurnum spatium 24. horarum.

Quomodo lunicola tempus horarum commodè possint distribuere?

diem æquet : singulæ verò rursus in minora segmenta secantur, quemadmodum isthac ratione, ex motu Solis apparente, sciotherica quoque horologia construi possent, quæ illorum horas ab ortu ad usque occasum monstrarent. Proinde, sicut id jam est invictum : ita contrà quæritur, quomodo Selenitæ longissimas suas noctes rectè distribuunt, ut non nesciant, quantum temporis jam effluerit, & quantum adhuc restet transigendum ? Ad hoc respondeo, quod durationem noctis, ex phasibus terrenis, illis quodammodo liceat colligere. Quando namque illis Sol in Oriente (qui nobis est occidens) planè occidit, tunc è regione illis Pleniterrium in occasu illucescit. Postquam autem hæc phasis progressu temporis in gibbosam est commutata, adhuc argumento est, tempus esse ante mediam noctem, usque ad Quadraturam Terræ : curvatâ verò existente, certum habent indicium, mediam noctem jam esse elapsam; ubi verò corniculata & senex conspicitur, respectu Lunæ, tum crepusculum penes illos ingruit, Terraq; nova occumbit, & Sol illis lucere rursus incipit.

At verò & illud hîc observare fas est, quòd, quemadmodum apud Selenitas, noctu semper Terra decrescens cernitur, & quàm diu ea est decremento suo conspicua, dies non imminet, nec expectanda : ita quoque ingruente die, statim Sol, & nova phasis prima Terræ, aspectu percipiuntur, donec hæc duo corpora longiùs pedetentim à se digrediantur, & ad oppositionem perveniant. Ex quibus rectè confit, quòd Lunicolæ de nocte Terram decrescentem, & de die semper crescentem videant. Hoc igitur pacto in Lunâ, horæ nocturnæ satis discerni possunt.

Unde Selenita integram revolutionem 12. horarum colligere queant?

Longè verò commodiùs idem fiat, ex motu Macularum terrestrium. Etenim quum revolutio earum contingat intra 24. horas, in qualibet Maculâ certò deprehendere possunt, viginti quatuor horas jam elapsas esse. Exempli gratiâ : ponamus certam maximeque conspicuam Maculam in horizonte occidentali, respectu nostri, reperiri : eâ ergò perveniente ad Meridianum disci terreni, indubitanter colligetur, sex horas præteruisse : simul ac autem eadem Macula ad horizontem orien-

orientalem est delata, manifestum adest signum, jam duodecim horas effluxisse. Postquam autem ea rursus in occidente emerfit, infallibilis existit index, denuo 24. horas abiisse. Quocirca hic modus opportunus foret, de nocte in Lunâ horas investigandi: cum vix illis quantum meo possum assequi iudicio, melius & convenientius suppetat medium, in quantitatem temporis nocturni pernosendam. Si enim cogitationes nostras ad altitudines Stellarum, vel situm circumpolarium convertamus, ut hîc apud nos fit, frustra hoc facimus: quia apud Selenitas, nullus motus diurnus apparens datur; sed tantum tardus illarum motus proprius, qui huic instituto non deservit. Atque, si vel maximè, ex sententiâ Peripateticorum, concedamus motum diurnum sphæræ decimæ: tamen is hîc nihil proficere posset: siquidem & in Lunam hic motus caderet, & propterea simul illa circumvolveretur. Quocirca, quum nemo Peripateticorum hoc jure possit impugnare, ideoque nullus motus diurnus stellarum, ex Lunâ, ceu globoso corpore, quod æquali celeritate in eandem plagam fertur, animadverti potest, sicut id quoque per se est manifestum, ita ut de his nihil ampliùs addere sit opus.

Atque hæc prima est singularis utilitas, quam Selenitis motus Macularum terrestrium præbet. Altera vix istâ minor est, dum Lunicolæ, ex motu & positu Macularum, quâvis horâ noctis, & quotiescunque placeat, sui loci longitudinem facillè possint adinvenire, si certa quædam Macula, à diversis, distinctis in locis, in hemisphærio patente, observetur: Incolis enim latentis hemisphærii, hæc commoditas non suppetit. Nobis equidem optandum esset, ut quotidie & qualibet horâ, ejusmodi opportunitate longitudinis locorum explorandi, gaudere possemus, quæ nobis instar multorum modorum sufficeret. Idem verò apud nos quoque fieret, si Luna, sicut Terra, circa axes proprios, spatio 24. horarum, semper circumvolveretur. Quia autem tale quid non fit in Lunâ, ideo cogitationes nostras in gyrum rationis oportet cogere, & facere periculum diversis in locis, quousque motu Lunæ circa fixas, & positu Macularum ejus, alio atque alio, distinctis temporibus, in indagandâ longi-

In Lunâ nullus motus apparens diurnus deprehenditur.

Secundus fructus motus Macularum terrestrium, est cognitio longitudinum locorum.

Optimus modus investigandi longitudines terrestres daretur, si Luna esset circa proprios axes circumvolvibili.

tudine locorum, progredi queamus: quippe, quin, procedente ætate, jactis nunc hujus rei fundamentis, Astronomi hoc negotium, ad suam perfectionem demum redacturi sint, nullus dubito

Postquam ergò hætenus noster animus totus in contemplatione naturæ, situs, motus, formæ, & circumscriptionis Lunæ, & quasi Incolarum ejus, defixus fuit, ac satis in spherâ Lunari, mentis nostræ (ut sic dicam) pedibus deambulatum est, agedum revertamur ad sedes nobis proprias, patriamque nostram, Terram: id quod ut fiat brevitatis studio admonemur. Quocirca erigamus iterum sursum oculos, ut è Terræ domicilio fundoque, quanquam ex bene remoto loco, præsentem Lunæ phasim intueamur, & quæ adhuc ibi notabilia sunt, moniti advertamus: cætera sequenti capiti, vel alii occasione commendabitur.

*De quibus
pos præsentis
phasim Luna
usuper ad-
monet.*

Quæ igitur hic adhuc observari merentur, hæc sunt; quòd nempe spatium inter Paludem Mæotidis, & inter Peripheriam latiùs pateat, majorique intervallo à se invicem disjunctum sit, quàm in antecedente figurâ, & quòd jam uterque ille lacus occidentalis sit conspicuus. Causa est, quòd Luna jam in Geminis, & in maximâ circiter latitudine Australi versetur. Præterea Palus hæc latiùs diffusa est, & nigricantior apparet; sicut hoc etiam superiori demonstratione evictum dedimus. Distinctæ autem illæ, & valde nigræ Maculæ, inter confinium lucis & umbræ, ac Paludem Mæoticam, nihil aliud sunt, quàm profundiores Valliculæ, vel potiùs atræ umbræ, quas Montes Alani procreant. In hac & consimili phasi, umbra in Vallibus conspicua, omnibus suis partibus, incipit deficere & attenuari, quia scilicet illis Incolis Climatis hujusce, Sol quotidie altior apparet. Propriè tamen loquendo, iisdem ex hoc tempore Sol primùm oritur, & quando nobis est prima Lunæ Quadratura, tunc accolis Paludis Mæotidis est ipsa Meridies. Rursus affulgente nobis Lunâ plenâ, tunc illis ingruit vespera, ubi Sol vult occumbere: & ratione situs reliquorum locorum in Lunâ, Sol, respectu eorum, etiam, vel aliquantò maturiùs, vel seriùs oritur, aut occidit; sicut nempe etiam apud nos ob
diffe-

differentiam locorum accidit. Eodem autem modo Meridies quoque apud ipsos variatur. Nisi quod in hoc discrimen hujus variationis consistat, quod illis, qui respectu nostri videntur esse occidentiores, Sol citius oriatur, quam, qui sunt orientiores. Contrarium autem apud nos in Terrâ contingit: siquidem Orientalioribus Sol prius oritur, & ad Meridiem pervenit, quam Occidentalioribus.

Deniq; talis hîc quoq; suboritur quæstio: num etiam singulis mensibus in Lunâ sit ejusmodi phasis conspicua, qualem jam habuimus? Ad quam respondeo, quod singulis quidem mensibus phasis æq; lata, quoad digitos, imò etiam quandoq; latior, quam præsens possit recurrere: at enim impossibile est, idem quoque planè omnibus in partibus confinium, eandem latitudinem Paulidis Mæoticæ, idemque insuper spatium inter hanc, & Peripheriam reverti posse, propter motum scilicet Librationis Lunæ. Propterea igitur quotannis tantum semel eadem, quam proximè redire potest phasis Lunæ, nimirum circa Vernalis tempus, putà, in Martio, Aprili vel Majo, quando simul concurrat, ut eodem tempore Luna eodem in signo & gradu Eclipticæ versetur, & eandem habeat latitudinem: ita namq; hæc facies Lunæ priori admodum consona erit: & licet non semper eadem sit latitudo (propter retrocessionem nimirum Nodorum): nihilominus tamen hæc phasis à priori non multum abibit. Idemque circa omnes phases hujus Selenographiæ notandum, quæ in signo Cancræ, vel Capricorni observantur: siquidem cujuscemodi phasis nullo tempore revertetur, nisi præsentem illo annuo tempore, ubi phasis ista in eodem signo iterum contingit: talis namque phaseos reditus est tantum anniversarius. Quod si verò etiam eandem expeteremus latitudinem, tunc adhuc longè diuturnius ista reversio phaseos Lunaræ nobis esset expectanda. Etenim, si planè ejusdem phaseos, quam antè animadvertimus, restitutionem desideremus, tum in hanc occasionem nobis imminendum est, ubi Luna eundem locum longitudinis, ac latitudinis, situmq; eundem recuperavit, quæ tempore prioris observationis obtinuit. Cum enim hoc factum fuerit, tunc reversa phasis Lunæ, omnibus suis partibus, antè obser-

*Cur eadem
phasîs Lunæ,
in uno anno
nunquam re-
deat?*

*Anniversaria
ejusdem pha-
seos Lunæ re-
stitutio, undè
pendeat?*

Phasium earundem reditus quando expectandus?

observatæ respondebit, & utraq̃ue in summâ æqualitate erit posita. Phases autem Lunæ, quæ circa Arietem & Libram observantur, sibi quam maximè similes bis uno in anno queunt occurrere, præsertim, quando Limites in Cancro & Capricorno reperiuntur, quemadmodum dies nocti bis in anno æqualis existit: Solstitium autem Æstivum & Brumale duntaxat semel in anno evenit. Quo etiam modo, cum reliquis phasibus omnibus comparatum est, ita, ut frustra tempore alieno, reversionem similis phaseos Lunæ præstolari simus, nisi omnes jam dictæ circumstantiæ concurrerint, sicut idem quoque supra memoratum est, ac vix obscure, suo autem loco adhuc planius & plenius à nobis commemorabitur.

CAPUT XIII.

DE LUNAE CURVATAE CRESCENTIS PHASI.

Ssi præcedente capite de lumine Lunæ secundo subobsuro, quod paulò ante, vel paulò post conjunctionem Lunæ cum Sole, conspicitur, actum est: tamen, quia nondum omnia de illo sunt pertractata, & quædam adhuc restant, ulteriori explicatione digna; ideo constitui de illis, circa præsentem figuram, ubi quoque consimilis apparitio potest accidere, nonnulla plenius monere, & defectum priorum supplere.

Cur secundarium Luna lumen, nõ undiq̃, sui simile?

Primum igitur ejusmodi quæstio hic institui potest: quare lumen secundarium, quod à Terrâ per radios Solis reflexos, ut antè dictum; ad Lunam transmittitur, non undiq̃ue versum in superficie Lunæ æque clarum appareat? Et, unde dilucidus ille circulus, qui semper est in ambitu obscuro lumini conjunctus, & è regione phaseos, Lunæ à Sole illuminatæ, juxta Peripheriam, conspicitur, existat? In quâ bimembri quæstione, initiò, ratio, cur in lumine subobsuro Lunæ, una pars magis conspicua & explicata, quàm altera (tametsi hæc differentia prope modum est insensibilis) videatur, facile reddi potest. Etenim,

hic

hîc nulla alia subest causâ, quàm inæquabilis Lunæ ambitus, quem efficiunt partim flumina, lacus & Paludes, partim Montes, Valles & Continens. Quum enim ex hac varietate inæqualis nascatur superficies, non aliter fieri potest, quàm quòd lumen secundarium Lunæ aliquam aspectus diversitatem constituat: siquidem radii, ex unâ parte fortiùs, quàm ab alterâ, ad nos reflecti possunt. Quod autem alterum hujus quæstionis membrum, nimirum clarum illum circulum in Lunæ arcu, collustratâ ejusdem parti à Sole obversâ, attinet, dubitari potest, utrùm hujus rei ratio à reflexione Terræ petenda, an verò rectiùs cum Aguilonio & aliis, à corpore Lunæ semidiaphano desumenda? Si namque sphaera Lunæ statuitur semidiaphana, tunc lumen Solis circa Peripheriam, quàm circa medium, illustriùs & evidentiùs se se poterit exserere, eò quòd ex illâ parte corpus Lunæ tenuius, quàm circa centrum. Quæ quidem ratio non solùm foret valde plausibilis & probabilis; sed etiam urgens ac necessaria, si revera apparitio circuli luminosi in parte Lunæ subobscurâ daretur, quemadmodum oculis nostris quidem videtur: sed enim Tubus Opticus meram esse hallucinationem visus manifestè ostendit, ejusque rei causam detegit, quæ oritur ex diversitate confinium terminantium discum Lunarem, luce illâ secundariâ perfusum. Etenim, quando Tubum adhibemus, nullum clari circuli vestigium, circa Peripheriam Lunæ, deprehendimus; sed lumen illud planè uniforme apparet, exceptis tamen Maculis Lunaribus. Ex quibus colligere licet, hanc apparentem Lunæ speciem, circa circumferentiam, esse duntaxat visus nostri deceptionem. Quandoquidem enim lux secundaria, quæ ab uno latere contermina est confinio lucidiorum cornuum parvæ phaseos Lunariorum, ab altero autem unâ cum obscuro aëre Lunam cingit, ea efficit, ut candor disci Lunariorum, in adversâ parte, ob admodum clarum lumen illustratâ phaseos Lunæ, se se tam evidenter in oculos ingerat, & circulum luminosum exhibeat. Quin imò hanc speciem lucidi circuli Lunæ, visus tantùm esse fallaciam, etiam sine Telescopio in hunc modum nudo visu tuo poteris cognoscere, si tantùm juxta turrinam murum vel parietem ca-

*Sitne clarus
ille in Lunâ
circulus reale
aliquod Pha-
nomenon?*

Qq

mini


mini stans, cùm lumen subobscurum, tum lucem secundariam Lunæ adspexeris, ita, ut propter interjectum solidi corporis primum lumen, ipsaque phasis Lunæ occultata maneat: sic enim nusquam, hac in parte Lunæ subobscurâ, lucidus ille circulus antè conspectus apparebit. Quam primum autem emergentem phasim Lunæ videris, tunc quoque statim circulus in Lunâ erit conspicuus.

Cur Lumen secundarium Lunæ, non omni anni tempore idem aspectu, & quam sit ejus rei ratio?

Deinde hîc quærere licet: nunquid lux Lunæ secundaria, eodem tempore, vel ante, vel post conjunctionem Solis, & eadem existente aëris constitutione, æque magna sit? Hic per inficiationem respondeo: diversæ quippe causæ occurrentes, hanc lucem hebitare, vel intendere queunt. Quas ad causas eò meliùs intelligendas, ex Opticis hoc theorema repetendum est, quòd omne corpus lucidum tantò clariùs appareat, quanto ambiens est obscurius. Ex quo sic infero: quanto plus Luna post conjunctionem à Sole discedit, tantò diutiùs supra horizontem commoratur: quanto autem diutiùs Luna supra finitorem conspicitur, eò magis ex crepusculo vespertino emergit. Postquam autem durante adhuc crepusculo, aër nondum valde tenebrosus est; sed, eo evanescente (vespertino scilicet tempore post conjunctionem) demum fit obscurior; sequitur, quòd lumen Lunæ secundarium extra crepusculum clariùs appareat, quàm circa illud, eo quòd tunc in medio magis opaco versetur. Hoc autem quòd hîc profero, de distantia Solis & Lunæ rectè accipiendum est: at, si quis in eum vellet sensum mea verba detorqueere, quasi hic docerem, lumen Lunæ secundarium eò magis crescere, quò adultior esset ætas Lunæ, is aliquid mihi, quòd in mentem nunquam venit, affingeret. Contrarium namque in superiori capite fuit à me demonstratum; nempe hoc Lunæ lumen secundarium, tantò majus apparere, quanto minor est phasis Lunæ. Quocirca id tantum intendo comprobare, & ratione perspicuâ evincere, Lunam quandoque intra 24. horas se posse ex radiis Solis expedire, nec integro biduo, vel triduo, ad hanc rem semper indigere; sicut supra, ubi de primâ phasi egi, cap. 9. hoc pluribus ostendi, nimirum, cùm Luna perigræa & velox existit, nec non in signis

Pleas Land Corvati Crepenti.
Observata in 16. gradu N. prope Londam et V.
E. E. D. A. F.

Ann. Christi 1677. Die 13 Januarii, hora 6^{ta} à merid. observata.
in Conventione vno 21. Die + Current.



5

Aut. Ortelius

gnis longarum descensionum, inque latitudine Boreali versatur. Quamobrem necessario eo tempore ita cum Lunâ comparatum est, ut ea incedat altior, tardior occidat, & citius per crepusculum eluctetur, quàm quando fit contrarium. Idcirco: quò recentior est phasis Lunæ, & quò Luna est sublimior, eò clarius lumen secundarium Lunæ apparere necesse est. Id autem vix alio tempore melius & apertius poterit observari, vesperi post conjunctionem, quàm tempore Æquinoctii Verni, quando est perigæa, latitudinem septentrionalem obtinet, & in Ariete, Tauro, vel Geminis reperitur, ut jam aliquoties inculcavi: neque id temporis crepuscula valde magna sunt, adeò ut vix opportunius tempus in anno ullum concedatur.

Non dissimilis est ratio phasium Lunæ senescentium, ac luminis secundarii circa eas conspicui: utrobique enim par dari potest causa, cur lumen illud uno tempore clarius appareat, quàm alio. Tunc namque evidentiùs se se exferit, cum Luna in signis longarum ascensionum (qualia sunt Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius) versatur, perigæa est, adque limitem Boreum excurrit, nec procul abest ab Æquinoctio Autumnali. Hoc quippe modo phasès Lunæ tam crescentis, quàm senescentis possunt ferè facere paria. Non tamen hoc semper fit; sed quandoque notabilis hinc occurrit differentia. Fac enim, te vidisse, eodem tempore à conjunctione Solis, phasim aliquam corniculatam Lunæ crescentis, quæ perigæa fuerit, latitudinis Septentrionalis, & in opportuno signo: rursus fac, te quoque vidisse consimili tempore, & datis iisdem affectionibus phasim Lunæ decrescens, tunc pronuncio, experientiâ suffragante, lumen Lunæ decrescens secundarium, quod mane, ante auroram ingruentem, & in oriente, conspicatus es, evidentiùs & clarius extitisse, si rectè animadvertisti, quàm Lunæ crescentis, quod vesperi post crepusculum in occidente vidisti. Nec id ratione caret: quia scilicet hemisphærium terrestre, quod orientali plagæ Lunæ est obversum, plus terræ firmæ in se continet, nempe Europam, Asiam & Africam, & minus Maris & aquæ, quàm occidentali Lunæ situi, cui è regione plus Maris, ex altero hemisphærio Terræ, utpote Oceanus Atlanti-

*Luna phasis
crescens & se-
nescens, ra-
tione tempo-
ris ac quâ lu-
men variat.*

cus & Æthiopicus, qui ad Americam usque porrigitur, objicitur. Quocirca, quum certum sit, Mare & aquam non æque validè lumen reflectere & revibrare, atque continentem, ideo planè consequens est, lumen secundarium Lunæ, circa phases Lunæ crescentis multò debiliùs conspici, quàm circa phases Lunæ senescentis. Accedit insuper alia causa, quare in Lunâ hi gradus luminis secundarii dentur, quæ iis proponetur expendenda capite 38, quibus jam memorata causa nondum facit satis.

*Differentia
inter duas
phasas Lunæ
eas, distantes
ferè à Sole e-
videns. Cum
de ea?*

Denique placet hîc etiam aliam subungere phasim Lunæ, quæ quinque duntaxat horis, attento tempus veræ conjunctionis, adultior est priori, sicut consignatum tempus abundè docet. Evidens tamen inter utramque reperitur differentia, non solùm quoad diversitatem arcus, & spatii, ratione confinium luminis & umbræ; sed etiam respectu distantiae à Palude Mæotidis, orientem versùs, quæ major hîc occurrit, quàm in priori schemate, ita ut major pars Lacus Corocondametis unâ cum evidentiori colliculo in ipso fuerit satis conspicuus, de quo tamen in phasi præcedente nihil cerni poterat. Sic & deprehenditur magna differentia, ratione situs Paludis Mæoticæ, & distantiae ejus à Peripheriâ. Quod autem hujuscemodi differentia, hîc locum queat habere, ex collatione longitudinis ac latitudinis Lunæ, quam hîc & illic obtinuit, colligere licet: siquidem prior phasis Lunæ, in 12. gradu Geminorum circa limitem Austrinum observata est: hæc posterior verò in 16. gradu Piscium, in ipso Nodo, vel Eclipticâ, ubi fuit expers omnis latitudinis. Itaque, quum in hac Lunæ facie, intervallum inter Paludem & Peripheriam angustius sit, quàm in priori, deprehensum, utique alterum intervallum in sinistro latere, & orâ Lunæ oportuit esse laxius, & latius. Hoc geminum exemplum eò deservit, ut quilibet inde intelligat, evidens omnino dari posse discrimen, inter duas Lunæ phases, etiamsi æquali tempore, ante, vel post conjunctionem fuerint observatæ: nunquam verò alteram alteri per omnia posse examussim congruere, nisi scilicet Luna iterum eandem longitudinem, latitudinem & Anamoliâ habeat: aliâs enim est impossibile. *Quam*
ob

ob causam, differentia inter duas phases Lunæ satis notabilis, sæpius observabitur, licet etiam ætas Lunæ sit eadem : sicut id compluribus exemplis alibi comprobabitur.

Tandem hic inter alios multos excelsos vertices insigniter illuminatos, adfurgentium Montium, extra confinium, maxime notabilis est ille Mons, qui instar globuli in extremo cacumine inferioris cornu, præ reliquis se se exseruit : quippe non solum claritate reliquis antecellebat; sed etiam singulari colore fuit præditus, ita ut igni, vel auro ignito, non fuerit absimilis. Causam hujusce apparitionis, in aliud tempus discutiendam rejiciam.

CAPUT XIV.

DE LUNÆ LUNATAE CRESCENTIS PHASI.



Quare cornua Lunæ Falcatae & curvatae crescentis, semper oporteat esse à Sole averfa, & ortum versus tendant : quare etiam cornua Lunæ curvatae decrefcentis, in occasum porrigantur : juxta scilicet exceptione majorem experientiam, & nostras observationes; id à Mathematicis, tam in Opticâ, quàm Astronomiâ demonstratur. Interim nihilo secius quoque experientiæ consentaneum est, quòd isthæc Lunæ cornua non semper eundem situm, respectu nostri, & perpendiculari obtineant. Quæ namque partes in mucronem desinunt, aliquâ inclinatione, hac vel illac, vergunt : siquidem jam superior vertex nonnihil deorsum tendit, & inferior quadrantenus sursum : jam superior apex quotidie magis adfurgit ad perpendicularum : jam utrumque cornu perpendiculariter, & ad angulos rectos incedit; modò deorsum versus flectuntur termini confinii luminis & umbræ (cùm Luna videlicet sit gibbosa) quemadmodum post interlunium sursum versus elevati sunt, quæ omnia ex nostris phasium delineationibus liquidò satis apparêt. Hæc verò inclinatio à nullâ aliâ causâ, quàm ex vario situ, & distantia Lunæ à Sole, proficiscitur. Etenim

*Quanam sit
causa diver-
sa inclinatio-
nis cornuum
in Lunâ?*

Q 93

quò

quò vicinior est Luna Soli, & phasis recentior, eò magis cornua attolluntur : &, quò auctius sit lumen Lunæ, & distantia Lunæ à Sole major, eò magis superius cornu, ad perpendicularum tendit, sicut faciliè quilibet perspiciet, si id ad centrum Lunæ revocet; ita quidem, ut phasis Lunæ curvatæ, quàm diu intra quadrantem occidentalem, respectu Eclipticæ, observabitur, de die in diem altiorem paulò se se præbitura sit conspiciendam, prout distantia Lunæ à Sole major, vel minor fuerit.

Quando verò contingit, ut Luna à Sole tanto absit intervallo respectu Eclipticæ, quò nonagesimum gradum adsequatur, tum partes Lunæ, in mucronem fastigiatæ, sunt exactè in lineâ perpendiculari : quod si verò Luna quoq; longiùs à Sole discesserit, sicut post neomeniam fit quotidie, nihilo tamen minùs, motu diurno, ad circulum nonagesimum fertur, ubi similiter cornua ad angulum normalem insistant. Quando verò phasies Lunæ crescentes, in orientali quadrante observantur, tunc cornua Lunæ declivia conspiciuntur : contrarium verò accidit in phasibus Lunæ senescentibus. Quæ diversæ cornuum Lunarium inclinationes, si debito modo attendantur, hunc primò præbent usum, quòd ex horum inspectione liceat colligere, sit ne Luna in nonagesimo gradu, an verò nondum hunc circulum attigerit, vel etiam jam præterierit? Deinde, semper nobis lineam per acuminatam Lunam ductam, & ad septentrionem vergentem commonstrât, ex quâ, locus Poli Eclipticæ conjicitur. Insuper verò, quando ad hanc lineam mihi aliam, quæ se se mutuo transmissu & decussatim secat, imaginor, tunc etiam locus Eclipticæ in Cœlo circiter verus innotescit.

Præterea circa observationes phasium Lunarium, etiam hoc dignum est animadversione, quòd, quò propiores sunt phasies crescentes occasui, & horizonti, aut decrecentes ortui, vel quò remotiores sunt à circulo nonagesimo, eò accliviora stent cornua : quò viciniores autem phasies crescentes horizonti ortivo, & senescentes occiduo, eò magis cornua videantur devexa. Postquam enim vertices, vel cornua Lunæ, in omnibus his enumeratis phasibus, non eundem situm, nec eandem servant inclinationem; hinc diversus ille gignitur positus.


Nam

Quanam utilitas ex verâ inspectione Cornuum inclinationis redundet?

Precis Luna Lunata Crescente.
Offensata in 26° Gradu II circa Limit. R.

G. B. D. A. T.

Anno Claudi 1644. Die 11 Aprilis, hora 9 à meridie roman.
à Coniunctione sibi 17 Dies 5 Constant.



Nam primò, hanc diversitatem efficit diversa elongatio Lunæ à Sole. Deinde, quia non eodem diei tempore ejusmodi phasēs, ob intemperiem videlicet aëris, vel occurrentia negotia, vel etiam ob diversum Lunæ ortum, potuerunt observari. Adhæc, propter situm varium, respectu Nodorum ac limitum, aliqua quoque occurrit differentia, de quâ suo loco, ubi de Quadraturis agetur, copiosius. Denique, quòd etiam alius atque alius Lunæ locus, in hoc vel illo signo, tempore observationis, cornuum situm in Lunâ possit evidenter mutare: idq; cap. 42, ubi de phasi corniculatâ Lunæ decrescente sermo erit, plenius tractabitur. Cæterum omnes quidem figuras eodem modo, quasi in nonagesimo gradu fuissent observatæ, potuissent repræsentare, si id corniculatæ permisissent: sed sic satius esse duxi, effigies Lunæ ita delineare, prout à me sunt animadvertæ. Nihilominus tamen etiam ex Iconisimis nostris expressis, statim colligere licet, quantum Luna, tempore observationis, à nonagesimo gradu distiterit. Quòd autem in plerisq; phasibus corniculatis crescentibus, cornua Lunæ de die in diem, magis atq; magis adfurgere videantur, nec non in Gibbosis magis magisq; ad inferna vergere; quòdq; in decrescantibus phasibus contrarium reperitur; id potissimum (sicut quilibet ex iis, quæ antè dicta sunt, facillè intelligit) ex quotidianâ majori elongatione Lunæ à Sole, & tardiori ortu Lunæ, vel observatione, provenit.

Demum verò in specie hoc loco dicere habeo, quòd circa præsentem phasin Lunæ Lunatæ, nihil ferè singulare & notabile occurrat, nisi quòd confinium luminis & umbræ, (quod hîc loco horizontis est) ubi Pontum Euxinum interfecat, sit admodum planum & æquale, quum istic insignis detur planities; reliquæ verò adjacentes partes sunt asperæ, satis inæquales & confragosæ, quia haud dubiè in iis montosa loca, & convalles abundè insunt. Insuper notes quòd hæc phasis sit ejusmodi, quæ, circa initium Cancræ, & limitem Austrinum, fuit observata, quo tempore maxima libratio Lunæ, in orâ Lunæ occidentali, vel intermedio ferè loco, inter occidentem & septentrionem deprehenditur, nimirum inter Paludem Mæotidis, lacus hyperboreos, & peripheriam Lunæ occidentalem; vel est

Quare non omnes figura phasium Lunæ, in nonagesimo gradu sunt repræsentata?

Quæ circa præpositam phasin Lunæ sunt memorata digna?

est ejusmodi phasis, in quâ Palus Mæotica quasi in limite maximæ fuit digressionis. Quare, quum hoc ipsum, raro in tali phasi occurrat, ideoq; eò majorem considerationem meretur.

CAPUT XV.

DE LUNAE PLUSQUAM LUNATAE PHASI.

HX omnibus quidem Phasibus tam concavis, seu curvatis, quàm etiam utrinque prætumidis & gibberosis, apparet, quòd terminus illuminationis, vel sectio luminis & umbræ, sit linea arcuatim curvata: qualis autem sit species lineæ, non cuius esse cognitum existimo. Siquidem curvarum linearum, variæ planè species in Geometricis numerantur, quemadmodum sunt: cochlides, conchoides, colubrinæ, citroides, arachnoides, flexuosæ, catenatæ, spirales & hujuscemodi aliæ. Primariè verò lineæ curvæ, in quibus maxima latent arcana, sunt hæc quatuor: Circularis, Elliptica, Parabolica & Hyperbolica, quæ omnes à diversâ coni sectione fluunt, sicut omnibus, qui in Geometriâ non nihil sunt versati, perspectum est. Harum verò specierum etiam una est, sectio luminis & umbræ phasium. Quæ verò & qualis illa sit exactè, in eo non omnes consentiunt. Albategnius vult lineas phasium esse circulares. Et verum sanè est, quòd latus Soli oppositum arcus sit circuli visionis: alterum autem latus à Sole aversum nequaquam: quamvis Vitellio lib. 4. prop. 77. illud videatur confirmare, inquit: *Falcatam speciem duobus quasi equalium circularum arcubus contineri*: contrà eodem libro 4. prop. 75. ait: *in genere irregularem esse gibbum*. Verùm nolo ampliùs in veterum Opticorum sententiam, de lineis phasium inquirere: siquidem constat, & à Mathematicis nostræ tempestatis liquidò demonstratum est, has lineas non esse circulares, sed Ellipticas: velut, inter alios, Kepplerus, vir admirandæ sagacitatis, in Opticâ Astronomiæ parte cap. 6. pag. 243. hoc evidentibus docu-

Dantur varia species curvarum linearum in Geometriâ.

Opticorum veterum sententia de figura phasium Luna illuminatarum.

Phases Luna figuram Ellipticam amittuntur quodammodo.

documentis probavit, ut & Franciscus Aguilonius, rarâ eruditione clarissimus, lib. v. Optic. Proposit. 43. 44. & 45: ita ut fieri nequeat, utrumque latus phaseos simul esse posse circulare, nisi in accuratissimâ conjunctione, vel oppositione Lunæ cum Sole; quoniam scilicet extra illud tempus nunquam recta, ex oculo in centrum Lunæ porrecta, circulo illuminationis sit parallela. Quando verò accidit, ut bases partium luminosæ & aspectatæ, se se mutuò normaliter secent, sitque pars illustrata hemisphærio minor; tunc omnino necessarium est, ut in ejusmodi phasi una pars è regione Solis sit circularis; at altera elliptica, & intus cavata, scilicet confinium luminis & umbræ. Contrà, si basis partis sphæricæ illustratæ, basin portionis visæ ad normam secet, sit autem hac illâ major: quod de splendido segmento cernitur, sector est sphæricæ superficiæ: at mixta figura apparet ex circulari ambitu, & ellipseos peripheriâ exteriori curvatâ, sicut fit in omnibus phasibus gibbosis. In utrâque autem Quadraturâ bases hemisphærii illustrati, partisque visæ, se mutuò secundum normam secant. Quocirca univèrsus arcus, totaque superficies, quæ de illuminato hemisphærio conspicitur, non solum tanquam exactus semicirculus appareat; sed etiam terminus illuminationis tunc examuffim lineam rectam repræsentet, planè necesse est; sicuti Vitellio id pluribus demonstrat lib. 4. Prop. 76. Etenim, posito oculo, unâ cum circulo, in eodem plano, quemadmodum in hoc casu accidit; tunc ipsius circuli ambitus, è longinquo recta linea apparebit, velut hoc ex 57. Prop. lib. 4. Optic. Aguilonii manifestum est. *Si in eodem plano, in quo Oculus, circulus positus fuerit, recta linea ipsius circuli ambitus è longinquo apparebit.* Proinde extra Quadraturas, & vera Plenilunia, nec nò Interlunia, sectiones phasium, tam crescentis, quàm decrescens Lunæ, non semper, quoad curvaturam, persistunt eadem; sed quotidie variant: siquidem vel magis recedunt à rotunditate circuli, & fiunt obtusæ, vel magis contrahuntur, fiuntque acutæ, donec revertantur in circularem lineam, prout coni illuminationis & visionis, aliter atque aliter, de die in diem se se interfecant, focique Ellipseos mutantur. In phasibus curvatis, vel concavis Lunæ, à conjunctione usque ad primam Quadraturam, sectiones quotidie, & pedetentim confiunt obtusiores: post

Quando lumen Lunæ evadat circulare?

Quando phasis Lunæ exactam referat semicirculû, quando Ellipseos, & quando circulum?

Quadraturam autem usque ad oppositionem, sectiones in phasibus gibbosis & incurvatis, in singulos dies evadunt acutiores, donec tempore oppositionis, rursus in circulearem lineam convertantur, indeque ab oppositione ad ultimam usque Quadraturam, in dies existunt obtusiores: ab hac verò Quadraturâ, dum tendunt sectiones ad conjunctionem, quotidie cernuntur acutiores &c.

Elliptica figura Luna, non de curvaturis ejus particularibus, sed de ambitu intelligenda est.

Velim hîc insuper observari, quòd, quando de lineis phasium ellipticis loquor, parvas illas curvaturas & flexuras, quæ ratione Montium & Convallium in Lunâ insunt, excludam à confiniis: siquidem lineas istas ita considero, quasi corpus Lunæ sit omnino lævis, & æqualis sphaera: alioquin hæ lineæ ellipticæ non planæ, sed valde flexuosæ, & irregulares evaderent, ita ut hisce phasibus, nulla regularis figura posset tribui, præsertim quum in horas mutantur. Qui verò plura de hisce scire discipit, prolixasque demonstrationes expetit, is antè nominatos autores consulat.

Cur phases Luna in Capricornu sunt observatu difficiles?


Cæterùm in accuratiori hujus figuræ contemplatione, occurrunt nonnullæ res notabiles, quarum sparsim facta est supra mentio. Ita que, qui phasim hanc diligenter intuebitur, is rem omnem eò meliùs adsequetur. Ejusmodi autem phases, quæ circa Capricornum, in Signis Solstitialibus Hybernis, accidunt, difficiliore sunt observatu, quàm quæ fiunt circa Cancrum, in Signis Solstitialibus Æstivis; præsertim, cum simul magnam latitudinem Austrinam obtinent. Primum namque illæ phases paucas horas supra horizontem morantur: deinde humiles repunt, nec se se altiùs in ipso Meridiano constitutæ septem gradibus tollunt. Hinc verò non solum propter obstacula complurium excelsarum ædium; verum etiam ob crepusculorum longiorem durationem, & densas exhalationes, quæ circa finitorem coacervantur, observationes sæpenumero impediuntur, atque turbantur. Nihilominus tamen danda est opera assiduis Cœli contemplatoribus, ut occasionebus, quotiescunque fieri potest, observandi phases Lunæ, etiam circa Capricornum inhient: maximæ siquidem mutationes Lunæ, quæ ad colorem & formam, quæ etiam ad motum librationis, ejusque

termi-

Propter Lunam Plurimum Lunata Crescentis
Observata in 14 Gradibus circa punctum in Remed. et 9.

G E D A N T.

Anno Christi 1644 Die 4 Decemb. hora 6 i merid. omni.
i Coniunctione vbi 7 Dies 6 Currentis.



7.

Peter Seafant.

terminos, circa Capricornum, & circa Cancrum à nobis hucusque animadverse. Etenim, ex ejus generis observationibus crebrioribus, in hujusmodi signis oppositis, & in primis in utraq; maximâ & diversissimâ latitudine, innotuerunt mihi primum termini librationis, & facultas data explorandi differentiam diverforum horizontum, ac limitum hujus librationis: quæ in Lunâ indagare non licuisset, si mihi ejusmodi defuissent occasiones.

Hocque ipsum, præfens Lunæ phasis multò meliùs declarat & ostendet, quam evidens sit discrimen, inter phases Lunæ circa signum Cancri observatas, & reliquas aliis in locis Zodiaci visas: siquidem non tantùm Palus Mæotis & Mare Caspium, unâ cum aliis vicinis locis, utpote Insulâ majori prædicti Maris, Montibusq; Riphæis multò obscuriores, solitoque pallidiores minores ac angustiores conspiciuntur; verùm etiam variat situs harum Macularum respectu distantia à Peripheriâ; quemadmodum hoc manifestum evadit, tum ex Palude Mæoticâ, tum maximè ex gemino Lacu Hyperboreo, qui nunc Peripheriam propiùs contingit, & insuper colore adeò diluto apparet, ut vix etiam Telescopio generoso pateat. Quodcumq; autem aliis in Signis observantur hæ Maculæ, tum non solùm longiùs à Peripheriâ absunt; verùm etiam majores apparent, obscuriore colore sunt præditæ, statimque aspectu percipiuntur; sicut hoc, ex præcedente & proximè sequente figurâ, multisque aliis elucet. Unde verò tanta differentia, & variatio existat; id antè fuit abundè expositum.

Denique etiam fieri quandoque potest in Lunâ, ut ejus Maculæ jam antè nominatæ dilutiores adhuc videantur, & respectu limbi, viciniores. Nam Lacus hyperborei adeò Peripheriæ possunt appropinquare, ut vix eos cernere liceat, præsertim

Lunâ circa principium Capricorni versante, & maximam Latitudinem Borealem occupante;

sicut exempla sequentia hoc docebunt.

Differentia est notabilis, inter phases Lunæ animadversas in Cancro. & inter eas quæ aliis in locis signiferi sunt observata.

Lacus hyperborei, ubi Peripheriæ Lunæ magis, ubi minus appropinquat?

DE LUNÆ ADOLESCENTIS

PHASI.



Uòd Anomalia, seu inæqualitas motus in Luna Menses Synodicos Lunares variet, id ex capite septimo, in quo de motu Lunæ egimus, liquidò patet. Quum igitur motus Lunæ nunquam sit æqualis & uniformis, ideoque nusquam æquale reperitur intervallum, inter conjunctionem Lunæ cum Sole, & Quadraturam. Interdum enim hoc spatium, diebus octo, & quod excurrit; interdum septem, interdum sex cum dimidio, conficitur : ita, ut differentia ad biduum se se propemodum extendat, prout Luna, ætate vel hyeme, circa Perigæum, vel Apogæum observatur. Proinde tot phasies inter conjunctionem, & Quadraturam contingere possunt, quot dies huic intervallo intercurrunt (si nimirum quotidie unam numeres) sicuti Iconisimi Lunares, id satis abundè comprobant. Cum primis præsens figura, inter eas est numeranda, quam Luna circa Perigæum ambulans, solito citiùs acceleravit : siquidem Quadratura sexto mox die post veram Luminarium synodum est subsecuta, ita, ut inter conjunctionem, ipsamq; Quadraturam, quinque duntaxat phasies, etiamsi nulla fuerit neglecta, necessariò collocandæ sint : quemadmodum id 1. 4. 6. hæc ipsa octava, decimaq; probant, quæ omnes in Mensem Aprilem cadunt.

Unde inæqualitas Lunæ, in Mensibus Synodicis?


Sequens autem phasis Lunæ cornutæ inter eas est, quam Luna tardiore suo motu adduxit : etenim id temporis, totos novem dies, paucis deficientibus horis, à conjunctione ad usque Quadraturam numerando insumsit. Luna namque circa Apogæum, & Sol circa Perigæum extiterunt, ita, ut insequens phasis biduum adhuc à primâ Quadraturâ abfuerit, tamen si latior, quoad intersectionem lucis & umbræ, respectu Macularum,prehenditur, quàm proposita hæc octava phasis.

Cur autem sequentem phasin Lunæ nonam, quæ spatio unius

Plena Luna Adolescentis.
Observata in 50 Gradu ϕ . circa maxim. librationem.

G E D A H T

*Annus Christi 1674, Die 12 Aprilis, hora 9 a meridie numerata, i
Constructione hinc 17, Dies 6 Cur.*



8.

J. van Swaen.

unius diei magis abscedit à Quadraturâ, quàm hæc octava, Lunæ dimidiatæ propinquiorem statuerim, quum tamen revera ab eâ remotior extiterit, hæc fuit causa; quòd nunquam constituerim, sequi ordinem phasium, quoad distantiam à Quadraturis; sed hic fuit mihi scopus propositus, observandi tantum ordinem earum phasium, quæ, Macularum respectu, sectionem luminosæ & umbrosæ partis ampliarent: quia scilicet propius ad phasim Quadraturæ accedunt hac in parte, quàm reliquæ præcedentes. Etenim nisi hoc attendissem, mox turbato ordine phasis minor apparens majorem subsecuta fuisset: id autem ob difformem ad aspectum datâ operâ præcavere volui. Quod si fieri potuisset, ut uno mense omnes has figuras mihi consignare licuisset, tunc equidem meliori ordine, secundum externam speciem, se se conspiciendas præbuissent; verum labor iste tamen non æque necessarius, & utilis esset habendus, ac præsens à me servatus ordo. Namque consimiles tantum phasies quoad motum Librationis, ad aspectum patuissent, ex quibus neque motus Librationis, neque diversæ Macularum apparitiones, quæ inde sequuntur, deduci & intelligi potuissent, quemadmodum jam leviori operâ fieri potest: Luna namque distinctis anni temporibus, in distinctis signis & gradibus Zodiaci, jam circa Nodos, mox circa limites; dehinc circa apsides, & denique in intermediis locis, à me fuit observata, & in chartâ delineata, ita, ut ex his Iconisimis, eò commodius variæ phasium Lunarium inæqualitates, progressiones & mutationes deprehendi non nequeant. Id quod fieri neutiquam potuisset, si unius & alterius Lunationis phasibus exprimendis duntaxat inhæsissem.

Exemplum, quod hanc doctrinam abundè confirmet, in præsentè phasi est obvium. Nisi enim ea fuisset observata, & annotata in signo contrario, diversoque anni tempore, neque scire, neque credere potuissemus, tantam dari varietatem inter tam cognatas figuras, quoad luminosam Lunæ partem & confinium. Nam ex hac phasi liquet, quòd spatium inter Paludem & Peripheriam, jam sit latissimum, quoniam Luna est in Cancro, limiteque Australi; &, quòd duæ oblongæ Maculæ,

R r 3

in

Quid in ordine phasium Luna potissimum attendim?

Varietas & inæqualitas phasium unde?

Unde notabile discrimen, inter cognatas figuras, exiit?

in eo scilicet spatio, sint conspicuæ, nempe uterque lacus occidentalis; sicuti etiam Palus ipsa latiuscula, & nigricantior apparet: confines quoque Montes & Valles, magis sunt expansæ, & ad majorem nigredinem tendunt, ut & duo Lacus Hyperborei, qui à Peripheriâ Lunæ longius adhuc distant, sic ut Palus Amadoca distinctè admodum cernatur; contrâ verò accidit, in præcedente figurâ. Præterea etiam Peripheria Lunæ occidentalis, terminum maximum Librationis nobis ostendit: siquidem limes Austrinus, Lunam exexerat, ad latitudinem Meridionalem 4. grad. 42. min. Ubi insuper hoc animadversione dignum, quòd vix liceat nobis occidentalem Lunæ oram unquam patentiore, & in eâ, Pal. Amadocam, tam evidenter conspiciere, quàm in hoc situ Australi: frequentius autem multò minùs, de eâ nobis videre contingit.

Mibi Peripheria Luna maximum Librationis terminum commensuret?

Porrò oblongæ illæ Maculæ circa Paludem Mæoticam, haud dubiè nihil aliud sunt, quàm profundæ, & opacæ colles Montium Alanorum, quæ in hac delineatione maximè enitent. Exiguas illas semilunulas, quæ in Tauricâ Cherfoneſo, ad Pontum Euxinum, interque Insulam Macram Montemque Berosum, apparuerunt, nihil aliud esse censeo, quàm concursum alius quot Collium, Montium & Vallium. Quin & nigricans illud & umbrosus, quod conspicitur infra Montem Dalangver, & omne id quoad colorem simile, existimo profectum à reflexione densarum sylvarum, si nimirum nonnullè ibidem adsunt, vel à reflexione quamplurimorum collium; quæ certè umbra non tam faciliè discernitur, ac quæ ab immensis jugis Montium oritur.

Quadam partes umbrosa in Luna, unde?

Pontus Euxinus qualis sit substantia?

Confinium verò lucis & umbræ, hîc argumento est cum aliis, Pontum Euxinum esse valde amplum, & æqualem planitiem, inque eâ parte Mari nostro nihil absimilem: in quo tamen sparsim perquam multæ comparent Insulæ, Montes & Scopuli.

Cur quadam Maculae die in diem coarctari videntur. majori lumine replentur, atque agrius cognoscuntur?

Denique, in conformi specie Lunæ, Montes Sogdiani, Coibacarani & Dalangueri, vel eorum convalles, maximè jam emicant; quia Sol eas partes nondum ex alto loco illuminat, & ideo tantummodo circa montium culmina, convalles terminat: postea

postea verò, in singulos dies fiunt angustiores; quia Sol pedetentim Selenitis ascendit, sublimiorque fertur, hinc majus lumen hîcse partibus adfert.

CAPUT XVII.

DE LUNAE JUVENIS PHASI.

Selenographiæ Studiosus, qui motum librationis disci Lunæ, bene intellexerit, probeque perpenderit, primâ statim fronte, ex phaseos hujus inscriptione colliget, qualisnam ejus esse possit facies; quantum, & quodnam latus versus, Maculæ Lunares se se libnaverint num interstitium, Peripheriam inter & Paludem, sit dilatatum, vel compressum, Lacusque hyperborei, sive vicini, sive remoti à limbo extiterint? & hujuscemodi alia. Quæ omnia, ex solâ inscriptione & titulo, uti diximus, percipiuntur; cum primis si vera longitudo & latitudo, simul & locus Lunæ respectu Apogæi, vel Perigæi fuerit annotatus: quemadmodum plerumque in figurarum frontispicio à me factum: quæ autem fortè, brevitatis gratiâ, interdum omiâsa fuere, illa in admonitionibus vix intactu reliquimus.

Phasium tituli, & inscriptiones, quibus rebus inserviant?

Quæ inscriptiones perquam etiam sunt utiles, si scire volueris, quando similis phasis hujus, vel alterius alicujus figuræ denuo speranda, quæ, tam quoad motum libratorium, quam confinium prorsus sit eadem. Quâ gratiâ etiam necesse est, ut Ephemerides diligenter pervolvas & perquiras, quoniam tempore similis phasis, omnia scilicet habens requisita, in titulo expressa, sit reditura; non solùm quidem, quando Luna ætate, sed & in motu longitudinis, latitudinis & Anomaliæ solutæ similis futura? Quæ si omnia circa phasim certam iterum contingant (quod tamen rarò sperandum) indubitatè affirmare poteris, illâ in Ephemeridibus, expressâ die, prorsus in omnibus parem apparituram phasim.

Quamvis verò etiam Apogæum vel Perigæum Lunæ, tum temporis adhuc aliquantulum inveniatur à priori diversum; nihilo

hilo tamen minùs futura Lunæ facies, idcirco non multùm erit absimilis; quia videlicet motus Apogæi huc parùm facit; (ut suo tempore & loco dicitur) dummodo enim phasin ætate, longitudine & latitudine parem reperias, simulque supra horizontem conspicuam, certè nullum est dubium, quin eadem Lunæ facies se se denuo repræsentet. Posito verò nullam planè aliam phasin, in Ephemeridibus reperiri posse, quàm, quæ solummodo quâ longitudinem priori respondet (qualis ferè conspicitur quotannis, si aura fuerit defæcata) & hæc, inquam, parùm erit diversa, nisi quòd supra Mare hyperboreum, circa Montes hyperboreos, Paludemque Amadocam, latior vel arctior apparuerit: prout latitudo respectu prioris phasis, cui respondere debet, aut major aut minor, Borealis sive Australis est futura. Sin verò nec in longitudine aliquam parem reperire detur, profectò frustrà erit, simillimam exspectare phasin, illo tamen excepto casu, qui se se offerre potest in ejuscemodi signis, quæ pari gaudent declinatione: E. g. In Ariete & Librà, motus librationis est idem (si nimirum, nec latitudo, nec Nodi attendantur) sic quoque in Tauro & Virgine, Geminis & Leone &c. Ex quibus quidem satis superque apparet, quàm maximè sint necessariae Inscriptions, phasibus adjunctæ.

Circà quadraturæ spatia diurna illuminationis, admodum velociter crescunt, & decrescunt.

Porro, quod attinet præsentem Lunæ faciem, hæc quoque ex illarum crescentium est numero, quæ intus sunt curvatæ, vel concavæ; quamvis omnium sit ultima: proxima sequens, est Quadraturæ facies, in quâ sectio luminis & umbræ, jam in rectam descendit lineam: mirumque profectò, spatio viginti quatuor horarum (sicuti ex octavâ phasi præcedente, tot tantùm horis ante decimam figuram, nempe Quadrantem, observatâ, deprehenditur) sectionem illam tam subito esse variatam. At semper id accidit. Quemadmodum enim circa Quadraturas spatia diurna illuminationis celeriter crescunt, atque decrescunt: sic & velociter admodum sectiones tum temporis mutantur; atque variantur.

Cæterùm, sicuti hæc phasis proximè antecedenti figuræ omnino ferè opponitur, quoad motum librationis: ita rursus, à septimâ in ordine, parùm aut nihil differt; nisi respectu ætatis

tis

Placidus Lunae Jovensis.
 Observata in 22 Gradu F in Diſtant. intermed. inter Limit. B. & C.
GEDANK.
 Anno Christi 1644 Die 5 Novemb. hora 6 i meridie nom.
 i Conjunctione vera 1. Dies 7 Curr.



tis & confinii. Limbus enim Lunæ occidentalis, indicat prope modum verum terminum minimæ librationis, in Lunæ latere Zephyrum respiciente: ita ut lacus hyperborei, limbo valde vicini, quasi in ipsâ Peripheriâ, spectentur, vix ac ne vix quidem dignosci queant. Quænam autem præterea, ex ejusmodi maximè libratâ Peripheriâ oriantur? jam suprâ passim dicta sunt.

Confinium autem parùm quidem admodum differt à duobus præcedentibus, respectu distantiæ, interim tamen ulteriùs Lunam interfecat, quoad Maculas; eamq; ob causam id confinii bene notandum, quòd loca Lunæ præcipua terminet, utpote, Montem Serrorum & Carpatem, quorum Valles omnino sunt umbrosæ: quando in horizonte quasi sunt constitutæ, ubi vertices tantùm Montium à Sole stringuntur. Secundò, confinium illud Montem Æmum, ex parte etiam Sinum Peronticum, Montem Horminium, Amaum, Antitaurum, Taurumq; interfecat, qui omnes mirandæ sunt altitudinis; id quod, ex areolis clarè illuminatis procul à confinio distantibus, colligitur. Cum primis omnium Montium sunt maximi, qui Byzantium non procul à Ponto Euxino, circumvallant, inter hos putà, qui hac quidem vice in termino lucis conspiciuntur: nam cuspis extrema, unâ vigesimâ sextâ parte diametri, à sectione lucis videtur esse remota, cum tamen hæc

Phasis duobus diebus ante veram ex-
titerit quadram.



CAPUT XVIII.

DE QUADRATURIS IN GENERE, UT ET
in specie de hisce tribus delineatio-
nibus Lunæ Bifectæ.

Satis copiosè capite octavo, de motu Lu-
næ Librationis egimus, deque illius origine & proprietate; in-
primis dicto, quòd motus ille maximam variationem in Qua-
draturis procreet, tam Macularum, quàm confinium: ita ut
seccionis luminis & umbræ, modò propiùs Zephyrum, modò
Subsolanum versùs, modò rectà per centrum transeant, indeq;
hujuscemodi alia quamplurima. Quia verò de omnibus hisce,
ac præsertim de progressionibus & retrogressionibus Sectio-
num, itemque Quadraturarum, itemque verò etiam aliarum
phasium, nec non de particulari motu variationis cuspidum, eo
tempore, ob tantam materiæ prolixitatem nondum satis pro
rei necessitate tractare potuimus; idcirco hâc datâ optimâ oc-
casione, aspectu scilicet Quadrarum trium harum occupati,
illa fusiùs atque evidentiùs, exemplisque adeò additis dilucida-
bimus; ut nec non reliqua omnia, circa hanc materiam notan-
da, diligenter monebimus.


*Cur Sectio-
nes Quadra-
turarum non
omni tempo-
re per centrũ
transeant?*

Ex primo autem intuitu figuræ decimæ præsentis, quæ pri-
mæ Quadraturæ est, luculenter patet, lineam luminosâ & um-
brosâ partis, multùm à centro Zephyrum versùs deviare, Lu-
næque partem illuminatam, terminare; quòd cur fiat, fortassè
mirum videtur? siquidem necesse est, ut quælibet Quadratura,
sit dimidia pars hemisphærii Lunæ patentis; vel, quòd idem, ut
confinium ejus, jam dictum hemisphærium bifariam secet: ni-
hilominus verò clarè hîc perspicitur, partem Lunæ illustratam,
multò esse minorem, parte umbrosâ. Rursus in undecimâ fi-
gurâ, confinium centro est longè vicinius: at in duodecimâ
iterum jam lineam centram quasi est transgressum, magisq;
ortum versùs promotum videtur; sic, ut pars luminosa longè
major, obscurâ appareat. Admirabiles certæ hæ sunt apparen-
tiæ,

Primo Quadrante Lond.
Observata in 23^o gradu Φ , circa maxim. libris.

GEDAII.

Anno Christi 1644, Die 13 Aprilis, hora 9^a i merid. numer. i
Conjunctione vobis 17, Diei 7 Carr.



10.

Anton Scalp

tia, quæ circa Quadraturas occurrunt: idcirco convenit (cùm multùm interfit, multaquæ inde oriuntur) quò rectè explorentur, & densâ quâdam exemplorum copiâ demonstrantur, atq; stabiliantur, ne non scilicet constet, omnes has apparentias reipsâ in Lunâ existere, aliterque se se non habere. Id verò hâc vice quoad possum exequar.

Initiò, ex superioribus sparsim dictis, neminem paululùm gnarum Lectorem latere puto, quòd motus librationis, Paludem Mæotidem, ut & alia loca (Montes scilicet & Valles) Peripheriæ adjacentia, modò dilaret, modò maximè comprimatur; prout jam exemplis phasium antecedentium, dilucidè fuit demonstratum. Extenduntur autem quàm maximè, uti perceptum, quando libratio omnium maxima in Lunâ Euroaustrostrum versus existit; hoc est, Lunâ versante, quantum hæcenus colligere licuit, in principio Cancræ: & iterum quàm maximè comprimuntur, Lunâ commorante in Capricorno. Hæc autem dilatatio & compressio Macularum, non tantùm ad Paludem usq; Mæotidem, & reliqua loca limbo vicinissima, se se extendit; sed & ad omnes Maculas in genere, in Lunâ existentes: quæ tamen variatio non perpetuò fit modo eodem, nec in simili proportione, verùm semper, secundùm aliam atq; aliam à limbo, seu centro Macularum distantiam. Magis scilicet appropinquant Maculæ occidentales centro, magisque elongantur à Peripheriâ, in Signis Ascendentibus: è contrario in quadrante orientali, Maculæ paulatim plus plusq; à centro removentur, vicinioreque, beneficio motus librationis, fiunt Peripheriæ: ita, ut eodem tempore, Maculæ occidentales magis dilatatae, rursùm orientales omnes & singulæ multùm compressæ, necessariò spectentur. In Signis verò descendentibus contrarium accidit; quia orientales centro redduntur viciniore, & occidentales Peripheriæ: fit itaque, ut illæ, tum temporis latiores, hæc verò compressiores, sicut facillè intelligitur, appareant.

Enimvero hinc visibile centrum disci Lunæ, nunquam ratione motus librationis, certæ Maculæ adstrictum, & immobile videtur; sed necessariò, per totum anni curriculum, continuò variari oportet. Quando autem Luna in Signis Ascenden-

Quando maxima & minima Macularum dilatatio, & compressio, existat?

Dilatatio & compressio diversis temporibus est diversa.

Visibile centrum disci Lunæ est mobile.

*Et Sectiones
Quadraturarum
variantur.*

tibus versatur, tunc antrorsum, secundum seriem signorum, ab occasu ortum versus fertur : deinde, motu quasi converso, retrorsum, contra seriem Signorum, ab ortu in occasum, Lunâ scilicet versante in Signis descendentibus. Quâ ratione, & sectiones luminis & umbræ variantur Quadraturarum, atque reliquarum phasium; quæ planè hunc centri motum, de quo certè non est, cur quispiam dubitet, concomitantur.

*Quæritur,
cur confinia
Quadraturarum,
non semper
transiant per
Iconismorum
centra?*

Sed hîc quædam occurrit quæstio, ad quam utique est necesse, ut respondeamus. Quare nimirum non omni tempore lineæ luminis & umbræ quadraturarum, per verum transeant Lunæ centrum; cùm tamen sic fieri meritò deberet : quippe quòd pars illustrata, nec minor, nec major, parte obscuratâ esse possit, aliàs enim revera nulla esset quadratura : & tamen ex figurâ decimâ elucet, confinium nondum esse centrum assequutum, sed longissimè adhuc abesse ? Ego verò primò, minimè diffiteor, ingruente quadraturâ, partem illuminatam, semper esse æqualem parti umbrosæ; nisi in re minimâ, de quâ suo loco plenius dicitur. Secundò, perpetuò etiam sectionem illam ita per centrum ferri certum est. Quòd verò in quadraturarum delineationibus hîsce, id non semper contingat, nec à me observatum fuerit; certè incuriæ aut indiligentiæ nostræ neutiquam adscribendum : verùm istud sic prægnantibus multis de causis, atque adeò majoris ad spectatorem redundantis utilitatis gratiâ, aliter ob oculos ponere visum. Namque fieri omnino potuisset, ut quadraturæ confinium omni tempore per centrum duxissem, ita, ut Lunam nunquam non in nostris Iconismis, in duas partes æquales divisisset; si solummodo possibile fuisset, tam majores Maculas, ut, Pontum Euxinum, Mare Mediterraneum, Mare Eoum, quàm, reliquas circa medium extantes, in omnibus & singulis phasibus, perpetuò sive comprimere, sive dilatare, secundum scilicet genuinam proportionem, ex motu librationis ortam : quemadmodum item in Maculis ad Peripheriam sitis, utique nullo non tempore observatum. Verùm enimvero res ista planè est impossibilis : siquidem sive contractio, sive productio majorum Macularum circa medium se offerentium, tam est exigua, ut vix ac ne vix per-

percipi possit; si non in sectionibus luminosæ & umbrosæ partis, tempore veræ quadraturæ.

Præterea verò, etiamsi isthæc factu fuissent possibilia omnia, adeò ea nos non juvissent, ut obstaculo fuissent. Primò namq̄, nunquam constantem aliquam figuram ac delineationem generalem, & primariam phasium construere, exhibere, atque retinere; nec secundò ullo modo ita apertè ac perspicuè variationes linearum, motumque librationis circa Lunæ medium demonstrare potuissimus; sed contrà magna confusio, atque perturbatio figurarum hinc extitisset, ex quâ, vix me ipsum extricasssem: &, quod magis, nullis etiam rebus usui talia fuissent; quia differentia adeò exigua, ut vix in Maculis circa centrum constitutis, animadvertatur.

Quibus quidem prout fieri debuit consideratis, statim principio, certam atque constantem delineationem aliquam primariam, sive generalem construximus, putà secundum faciem Lunæ, in Ariete & Librà, libratione videlicet intermediâ, quoad Maculas centrales conspicuam. Quâ in delineatione, postquam vera & debita proportio Macularum, ab omni parte à me fuit explorata, semper delineationem illam haud mutatam, quoad majores Maculas, dilatationemque illarum, invariabilem retinui. Motum verò centri in hac figurâ, ut & in reliquis omnibus, ita constitui, ut omnimodè, quocunque tempore, veram Lunæ Peripheriam, ratione librationis, accuratè describere, oculisque subjicere possem: quod aliàs factu fuisset impossibile, si Maculas circa centrum semper de loco movissem, illasque minimè fixas esse voluisssem. Insuper, si motum centri, æque latum constituisssem, ut maxima & minima variatio sectionum quadraturarum invenitur, (quemadmodum ex figurâ & decimâ & duodecimâ apparet) motumque per signa ita distribuisssem: nunquam certè vel unicam phasim correctam delineasssem, nedum talem certitudinem motus librationis, per omnia observationibus ipsis consentientem, tibi spectandam exhibuisssem, uti quidem factum vides. Namque si centrum etiam Lunæ, in ipsâ hujus decimæ figure sectione collocasssem, exque illo limbum descripsisssem; profectò Libratio, Paludem

Qualem figuram generalem Autor initio construxerit?

Mæotidem Lacusque hyperboreos inter & Peripheriam, non ut jam conspicitur, ac illo tempore reipsâ in Cœlo exstitit, spectaretur, sed duplo ferè major, quàm reverâ esse deberet. Hinc potissimum oritur, quòd, cum corpus Lunæ sit sphericum; phases verò in plano sit necesse ut exhibeantur: idcirco hujusmodi inire modum minimè convenit. Nam eò utique maxime respiciendum, quòd phases, illarumque motus sic repræsententur, ut quàm fieri poterit exactè observationibus respondeant. Ad quod assequendum, nullum certè aliud medium se se nobis obtulit, quàm quo semper in phasium delineatione usi sumus.

Atq; sic habes præcipuam è rationibus, quare Sectiones Quadraturarum non omni tempore per verum centrum figurarum delineatarum ferantur? & cur certa quædam adumbrata quadratura, modò minor, modò major alterâ appareat? cum tamen semper ad se invicem sint æquales, tam respectu luminosæ, quàm obscuratæ partis.

*Sectiones
Quadraturarum
certos
habent ter-
minos,*

Verùm ut hanc materiam ulteriùs persequar, sciendum: quemadmodum motus Librationis, circa Peripheriam, certos respicit terminos, quod ex duobus Pleniluniorum majorum limbis horizontalibus, Cancrici & Capricorni deprehenditur; sic quoque Sectiones quadraturarum peculiare certosque limites possident: quo in interstitio, respectu scilicet Macularum, suas progressiones, secundum Signorum ordinem, ab ortu occasum versùs, itemque rursùm suas retrogressiones, contra signorum sequelam, absolvunt. Quod quidem spatium, cum illo ad Peripheriam, præsertim circa Paludem conspicuo, ratione latitudinis, minimè convenit; sed quater propemodum majus apparet altero: cum tamen utraq; hæc revera inter se sint æqualia, ut prolixè cap. octavo pag. 247. demonstratum. Nam eo in loco memini, hanc apparentiam inde oriri, quòd intervallum ad Peripheriam longè obliquius à nobis spectetur, quàm illud, circa medium; hinc necessariò & compressius apparet, licet, quod dictum, ambo sint æqualia: propè enim extremitates, minores sunt æqualium Peripheriarum projecturæ.

Qui duo quadraturarum termini, semel quidem quotannis
con-

conspiciuntur, dummodo tempore veræ quadraturæ istius pha- Quando ter-
mini extre-
mi Quadra-
turarum ap-
pareant.
seos concedatur aspectus : occidentalis, Lunâ existente bisectâ,
circa initium Cancrî, verno nimirum tempore: orientalis, Lu-
nâ existente bifidâ, circa initium Capricorni, tempore Autum-
nali, prout ex decimâ & duodecimâ figurâ videre est, quæ cir-
citer illud ipsum tempus, sunt delineatæ.

Primæ quadraturæ, 13. Aprilis Anno 1644. observatæ, con- Termini qui-
busdam ob-
servationibus
stabilisuntur.
finium, Pontum propemodum stringit Euxinum, transgredi-
turque Montes, Catenæ Mundi nomine insignitos, postmo-
dum Propontidem, prope Insulam Besbicam, Montem Didy-
mum & sic consequenter, sicut ex figurâ patet. Propius, Ze-
phyrum versus, hæc sectio inclinare nequit, id quod inferius
permultis observationibus demonstrabitur; adeo, ut hæc o-
mnium sit extrema, quæ unquam in phasibus Lunæ dimidiatis
deprehendatur : quam melioris distinctionis gratiâ, imposte-
rum Sectionem Vernalem, sive Quadraturam Vernalem, ap-
pellabo : quippe ejusmodi, nullo alio tempore, quàm verno,
circâ Æquinoctium, huc usque conspecta.

In duodecimâ figurâ Lunæ dimidiatæ, confinium offertur,
quod omnium ferè maximè ortum versus se se extendit, tamet-
si adhuc paululum ulterius Subsolanum versus procedere pos-
sit : namque hæc quadratura, non in ipso principio Capricor-
ni; sed in 13. jam gradu ejusdem Signi; adhæc horâ septimâ
(quodque maximum) ante veram quadraturam est observata,
ut paulò post, ex sectionibus quadraturarum liquidius consta-
bit. At vera sectio extrema orientalium, per Lacum nigrum
majorem circiter, Insulam videlicet Lesbiam, Montemque Si-
nai trajicitur; quam, in sequentibus, Autumnalem, seu Qua-
draturam Autumnalem nominabo, cum nunquam nisi tempo-
re Autumnali, hætenus nobis obviam venerit. Cujus generis
sectio, à me observata Anno 1644. die 9. Septemb. horâ 9. à
meridie numeratâ; à conjunctione verò 16. diei 9. currentis,
primâ ante veram quadraturam, Lunâ versante in 23. Sagitta-
rii, circiter nempe initium Capricorni, inque latitudinis Borea-
lis 5. gradu, limitemque boreum.

Inter hæc autem duos extremos terminos, omnes quadra-
turæ

In certo intersticio Sectiones Quadraturarum perpetuis reciprocationes peragunt.

turæ earumque sectiones, quæ unquam in Cælo apparent, conspiciuntur. In priori semestri à Vere usque ad Autumnum, sectiones antrorsum, secundum signorum seriem, promoventur, ab occasu in ortum; prout singulis mensibus Quadræ, in aliis atque aliis Zodiaci Signis consequentibus deprehenduntur: postmodum, ab Autumno iterum hæ sectiones recurrunt in antecedentia, ab ortu in occasum, singulisque mensibus sextâ parte ulteriùs promoventur, vel retrorsum feruntur (si illas sectiones tempore veræ quadraturæ observare contingit) usque rursus ad tempus vernum, quando quadratura in Cancro denovo oritur.


Quod si verò ipso Quadraturæ articulo, eas videndi non datur copia (sicut plerumque fit, quando Quadratus de die incidit, sic ut demum sextâ, septimâ, vel etiam octavâ horâ, ante, vel post verum aspectum cernatur) tunc nec sectiones accuratè, & strictè terminos suos observare possunt; eò, ut modò remotiores, modò propiores videantur: quippe Sectionum illuminationis spatia, circa quadram, quàm citissimè variantur.

Sectiones Quadraturarum Mensis, schemate exprimentur.

Hæc ut faciliùs percipiantur, figuram quandam, partem nempe delineationis primariæ, situm, formam, proportionemque Macularum, simplicibus lineis quàm diligentissimè exprimentis subijciam, quâ mediante, non solum Sectio Vernalis, & Autumnalis Quadraturarum, Lunâ commorante in Cancro & Capricorno, respectu Macularum; sed & spatia illa intermedia ostendentur: nec non quomodo Sectiones alio atque alio anni tempore, in diversis Eclipticæ Signis, variantur. Verùm memineris necesse esse, ut omnes hæ Sectiones circa limites contingant; aliàs paululùm, aut hanc aut alteram plagam versùs, se se inclinant: sicut mox fusiùs hac de re dicetur. Linea extrema omnium A occidentalis, monstrat speciem confinii, tempore veræ primæ Quadraturæ, Lunâ existente in Cancro; qualis facies, quemadmodum ex Lunationibus, aliisque permultis observationibus, superioribus annis habitis, clarè patebit, hæcenus semper circa Æquinoctium Vernale à nobis fuit observata. Altera B, ostendit circiter locum sectionis, quo nempe pervenire possit, si vera Lunæ

Qua-

Quadra, circa Leonem, seu Geminos existat. Tertia C, si quando circa initium Virginis, vel Tauri accidat. Quarta & media D, speciem sectionis quadraturæ Æstivalis & Brumalis offert, in Librâ vel Ariete existentis. Quinta linea exhibet locum confiniū circiter, quando Quadra in Scorpione, vel Piscibus observatur. Simile exemplum à me observatum Anno 1644. die 10. Augusti, horâ 7. à merid. num. à conjunct. verò 1. diei 9. currentis, primâque statim horâ post veram Quadraturam, Lunâ commorante in 19. grad. Scorpii, in 5. latitud. Borealis grad. circa limitem Boreum. Sexta, quando quadratura in Sagittario, & Aquario occurrit. Denique ultima est Sectio Autumnalis, quadrâ in Capricorno existente. Ejusmodi sectionem, reliquas ut taceam, ipsemet oculis consexi, Anno 1644. die 9. Septemb. à merid. num. ut paulò antè retuli. Sicque in semestri spatio priori, à Vere usque ad Autumnum, ut modò dicebam, antrorsum secundum Signorum sequelam procedunt, in posteriori, eodem omnino motu retrorsum feruntur.



Quadraturarum Lunæ decreſcentium planè eadem quidem eſt conſtitutio, quoad reciprocaſiones, niſi quòd Sectio, exempli gratiâ A, Lunâ in Cancro verſante, non tempore vernali, ſed autumnali ſpectetur; ſic, ut contrario modo, ab Autumno uſque ad vernum tempus, ſemper in Signis deſcendentibus, ab occaſu in ortum, ſecundùm ordinem Signorum, promoveantur.

T t

tur :

tur : quo fit, ut singulis mensibus quadraturæ compressiores, strictioresque videantur. Postmodum, à Vere usque ad Autumnum procedunt iterum in antecedentia (cùm in Signis scilicet ascendentibus versantur) singulisque mensibus latiores, majoresque respectu Macularum apparent.

*Sectiones
Quadraturarum
observationibus
corroborantur.*

Hac ita esse, observationibus comprobabo; primò quidem Sectionem Vernalem & Autumnalem, decimâ, trigessimâ, duodecimâ & trigessimâ secundâ; quarum quidem observationum multò adhuc plures, cùm de Lunationibus agetur, proponam. Reliqua puncta intermedia optimè etiam respondere, undecimæ & trigessimæ primæ phasi, non minùs illis, ex modò dictis Lunationibus depromtis, animadvertes. Noli autem turbari,

*Quibus de
causis, Sectiones
illa aut promo-
veantur, aut
retardentur.*

Benevole Lector, si primâ fronte sectiones quædam tuo iudicio, quodammodo vacillantes videantur : est enim maxima hujus rei ratio (ut paulò antè retuli) quòd quadraturæ non perpetuò in Signorum principiis nascantur, admodumque raro, verum temporis momentum harum phasium observari possit. Etenim plerumque evenit, quòd horis aliquod, antè, vel post, fuerint observatæ atque delineatæ; quod sanè rei hujus multum interest : nam quatuor horæ, tantam circiter differentiam invehunt, quantum est interstitium inter duo puncta interjacens; & octo vel novem horæ, duplo majorem. Quamvis enim e. g. quadra crescens in Leone accideret, post horam autem octavam primùm observaretur; tunc certè, illius sectio luminis & umbræ, non in B, sive puncto Leonis tibi apparet, sed in D puncto Arietis : quoniam tantum quidem luminis, phasi, in tot horis, accrescere maximè potest. Hocque inde demonstro. Cùm viginti quatuor horarum spatio, sectiones quadraturarum, simile interstitium conficiant, quantum duæ illæ linæ extremæ A & G, hoc est Cancræ & Capricorni comprehendunt, Lunationibus id corroborantibus. Quod si igitur hoc spatii in sex partes dividatur æquales, ut hîc factum, certò deprehendes quatuor horas uni spatio competere. Ex quibus jam nullo negotio colligere possumus, quantum nimirum sectiones hæ quadraturarum differre possint, à punctis exhibitis; si quando illæ phases, non tempore veræ quadraturæ, sed

sed aliquot horis tardiùs, vel citiùs fuerint observatæ: hoc est, quantum retrorsum, vel antrorsum versùs appareant.

Quæ si igitur ut & reliqua omnia, quæ sectiones vel promoveri vel retardare valent, in quadraturarum examine, probè observentur; nullus dubito, quin sectiones Lunæ dimidiatæ, quàm optimè, cum priori librationis divisione conveniant: licet forsitan in primo limine fluctuantes videantur.

Huc usque autem breviter de progressionibus & retrogressionibus sectionum, ex motu simplici, librationis longitudinis ortis, dictum esto. Verùm pauca adhuc restant monenda: motum nempe semestrem sectionum, tam quadraturarum, quàm reliquarum omnium phasium, non continuè, per sex illa signa, esse æqualem, & sibi omni tempore similem: quamvis in priore diagrammate, in sex omnino æquales partes fuerit divisus. Namque motus iste, strictè motum Solis & Lunæ observat, &, ratione luminarium, situs Apogæi vel Perigæi, ubi vel tardiora vel velociora existunt, pariter sectiones, hoc vel illud assequuntur punctum. Spatia verò, secundum talem proportionem, non esse distincta, ratio est: primò, quòd res hæc factu fuerit impossibilis: secundò, quòd in rebus ejusmodi minutissimis meo iudicio, planè supervacaneum sit; siquidem multa alia impedimenta indies occurrunt, quæ majorem procreare possunt differentiam, quàm quæ ex motu anomalix solutæ proficiuntur: utpote; primò, si non omni tempore, verum tempus, vel potius visibile quadraturarum attendatur; secundò, cum Luna plus quàm dimidiâ sui parte, à Sole illuminatur, & quidem adhuc inæqualiter, prout Luminaria vel Apogæa, vel Perigæa, exstiterint, de quibus suo tempore fusiùs; tertio, quia & motus Lunæ latitudinis hæc puncta notabiliter variat, & quidem simili prorsus modo, qui in centri motu deprehensus est. Quæ cum ita sint, idcirco minimè utique esse necessarium duco, in totum hoc negotium accuratiùs inquirere; verùm sufficere videtur, ut variationes Menstruæ quadraturarum, in sex tantummodo partes æquales dividantur.

Atque equidem jam rationes istas, aliquâ ex parte, exposuimus; quare nimirum lineæ quadraturarum Menstruæ

Motus Sectionum Quadraturarum semestris siue annuus, non perpetuo est æqualis.

Quare spatia sectionum Menstruæ, non secundum inæqualitates competentes fuerint annotata.

Linea Quadraturarum Menstrua, ut & aliarum phasium, non continue moventur in lineis parallelis.

modò magis modò minùs variantur? sed omnino meminisse etiam debemus, quomodo, quando, & in quantum scilicet motus Latitudinis Lunæ, has reciprocaiones variare possit? In figurâ quidem præcedente, lineæ menstruæ per omnia signa, perpendiculariter incedunt; interea tamen, non est, quod tibi persuadeas, ac si in perpetuum hoc modo progressio & retrogressio continuetur; sed sciendum, has lineas admodum frequenter haud parùm mutari atque variari, tamque in parte Peripheriæ superiori, quàm inferiori, licet, circa medium, prope modum distantia æquales appareant: hoc est, quòd non semper in lineis ferantur parallelis; verùm sæpissimè, stato tempore, modò occasum versùs, cuspidè superiori, & inferiori ortum versùs, modò cuspidè superiori ortum versùs, & inferiori occasum versùs. Hinc verò evenit, quòd sectio luminis & umbræ, respectu Macularum, nunc sic, nunc aliter se se repræsentet: jamque confinium, Maculam certam in parte Lunæ superiori, vel inferiori ferè stringat, jam satis iterum longè ab illâ distet: etiamsi circa centrum sectionis progressio, ex motu longitudinis orta, planè sit una eademque.

Quis de causa variatio cuspidum oritur?

Hicque motus, qui cuspides, modo antè dicto, dimidiatarum, & aliarum etiam omnium phasium (quod bene notetur) tam mirificè variat atque distorquet, non proficiscitur, ut paulò antè dicebam, ex motu longitudinis Lunæ; sed revera ex motu latitudinis, & ex situ vario Lunæ, respectu Nodorum & Limitum. Quæ ut dictu sint facilia: attamen variationem sectionum quadraturarum, ut & maximam & minimam variationem in gradibus, ex motu Latitudinis descendentem, investigare, explorare, atque ritè determinare, certè artis & laboris est; præsertim cùm particula illa sit admodum exigua & in observatione ægrè notabilis. Et verò (si vera citra jactantiam edicere licet) primus ego sum qui hoc negotium explicare aggredior.

Variationem cuspidum ritè determinare, arduum est.

Cæterùm, nullâ aliâ viâ felicìus hæc confieri possunt omnia, quàm attentis ipsis quadraturis; siquidem ex aliarum phasium sectionibus, res non æque accuratè succedit. Interim verò hanc ad rem inquirendam, non sufficiunt quatuor, quinque vel sex observationes; sed multò plurimis opus est, quæ sint per signa omnia,

omnia, gradus, casusque, tam longitudinis quam latitudinis habitæ. Quales autem admodum difficulter comparantur; quòd ejusmodi observationes in illis minutissimis, rectè animo complecti atque notare, cum difficile sit, tum valde lubricum: quia in superiori Lunæ Peripheriæ parte, pariter & in inferiori, rarò puncta quædam notabilia, se se offerunt: & adhæc observationes ejusmodi, non modicum temporis spatium; sed continuam, & multorum annorum accuratam attentionem sibi deposcunt, si aliàs aliquid certi hac viâ determinari debeat.


Quantum autem, pro hoc tempore, ex meis observationibus, quarum perquam multas in promptu habeo, conijcere possum; hæc lineæ ad quinque circiter gradus, in Peripheriâ Lunæ numeratos, variant, tum in parte superiori, tum inferiori: modò supra prorsum anteriora versùs magis magisque secundùm ordinem Signorum promoventur, modò retrorsum contra feriem signorum feruntur, quod tam in crescentibus, quam decrescentibus evenit, prout Luna, vel in Limitibus, Nodisque, Austrino vel Boreo, fuerit constituta: ita ut ratione diversorum Lunæ situum & Latitudinum, præter illos priores motus Librationis Longitudinis & Latitudinis (quorum capite octavo facta est mentio) adhuc tertius oriatur, quem melioris distinctionis gratiâ in sequentibus, *Motum Librationis Cuspidum, sive Librationem, sive variationem Cuspidum horizontalem* appellabimus.

Quò verò faciliùs motum hunc aliquis percipiat, quæ jam diximus, diversis exemplis observationibusque quadraturarum, diversis scilicet temporibus, ac in vario situ, respectu Nodorum Limitumque, habitis, dilucidabimus. Primumque has quadraturarum Sectiones, ut paulò antè faciebam, in certam referam figuram, utpote, quo eo factò, confestim deprehendes, quomodo hæc cuspidum variatio procedat: nec non verò sic facile demonstrari poterit, modò dictam variationem non esse quinque gradibus majorem, in superiori seu inferiori parte Peripheriæ, hoc est: quòd non supra quinque gradus, unam vel alteram partem versùs, inclinet.

In adjuncto quidem schemate, primariæ scilicet delineationis parte, diversæ lineæ conspiciuntur, quarum aliæ erga se invi-

Quanta sit
variatio cu-
spidum?

cem sunt parallelæ, reliquæ verò inclinatæ; interim tamèn omnes sunt quadraturarum sectiones, quæ diversis temporibus, atque in diverso situ Lunæ, respectu Limitum & Nodorum,



*In quoniam
loco maxima
sectionū exi-
stas inclina-
tio?*

summâ diligentâ à nobis sunt observatæ: qualem scilicet situm & constitutionem obtinuere, ratione Macularum. Quatuor illæ lineæ parallelæ, nempe A, B, C, D, sectiones sunt dimidiatarum phasium, circa & prope Nodum Boreum constitutarum; F & G circa Limitem Boreum; E & L, circa Nodum Austrinum; & I, K, atq; H, circa Limitem Austrinum.

Ex quibus sectionibus, quilibet jam haud difficulter colliget, præsertim is, qui illas diligenter & accuratè considerabit, quomodo, quo loco, & tempore, hæc quadraturarum confinia se se mutant? Maxima verò variatio, sive inclinatio, in Nodo utroque deprehenditur, sic, ut antedictæ sectiones, Quadrâ existente circa Nodum Austrinum, iterumque

circa Nodum Boreum, nunquam parallelæ existant; sed perpetuò certum inclinationis angulum, grad. si ad invicem conferantur, constituent. E contrario omnes lineæ luminosæ & umbrosæ partis Bifectarum phasium, tum circa Limitem Austrinū, tum circa Boreum existentes, non solum perpendiculariter, respectu antecedentium, sunt erectæ; sed & continuè sunt parallelæ: quemadmodum

dum id univēſæ, & ſingulæ obſervationes circa limites habitę, ac in figurâ præcedente annotatę evidenter comprobant: reliquę verò circa Nodos obſervatę, diverſam oftendunt inclinationem; quod imprimis ex lineâ D circa Nodum Boreum, & lineâ E circa Nodum Auſtrinum obſervatâ, videre licet. Quod autem hic angulus quatuor non excedat gradus, ex eo evenit, quòd ſectio E non proſuſ in ipſo Nodo Auſtrino, ſive puncto interſectionis, ſed propemodum duobus gradibus ulterius ſit delineata. Reliquarum ſectionum, nempe D, C, B, & A, inclinationem ita planè ſe habere, ut paulò ſuprà referebam, potiſſimum confirmat, quòd omnes hac in parte ad unam conſentiant; quarum adhuc plures ſuo tempore, & loco producentur. Nec non verò res hæc ex aliarum phaſium omnium confiniis evadet manifeſtior, ſi, quod fieri haud ægrè poteſt, conſiderabuntur diligentius. Vero certè verius eſt, me has ſectiones, non ad placitum meum, nec ex anticipatâ meâ perſuaſione, conſtituiſſe; verùm ſic illas ego annotavi, uti obſervationes mihi dictitavère. Quæ mihi ipſi res videtur perfectò & mira, quòd in ejuſmodi ſubtili negotio, tam accuratè & exquisitè conſentiant omnia.

Ut autem prædictæ hæ obſervationes ſectionum quadratarum, eò majorem mereantur fidem, faciliuſq; cum illis phaſium dimidiatarum confiniis in Lunationibus commemoratis conferri, atque ſimiles ab aliis ex ipſo Cælo depromi poſſint: ideo & hac occasione determinabo, & ipſum temporis momentum harum obſervationum, ut & in quonam longitudinis & latitudinis gradu, hæ quadraturæ fuerint obſervatę.

1. B. Quadratura decreſcens obſervata in 10. grad. Virginiſ propè Nodum Boreum & Apogæum. Anno 1643. die 3. Decembris, horâ 5. à mediâ nocte, ab Oppoſitione verò 12. diei 8, curr. 3. ante veram Quadraturam.

2. D. Quadratura decreſcens, obſervata in 12. grad. Librę, habens latitud. 2. grad. Sept. non procul à Nodo Boreo. Anno 1644. die 2. Januarii, horâ 6. à med. nocte; ab oppoſitione verò 23. diei 8. curr. tempore veræ quadraturæ.

3. K. Quadratura creſcens; obſervata in 1. gradu Cancri, ſimulq;

Diverſa obſervationes ſectionum Quadratarum.

simulq; in ipso Limite Austrino, nempe in 5. latit. grad. & 12. minuto. Anno 1644. die 15. Martii, horâ 7. à merid. numer. à Conjunctione verò completo die septimo, horâ septimâ post veram quadraturam.

4. I. Quadratura crescens; observata in 23. grad. Cancri, circa Limitem Austrinum, in 4. latitudinis grad. Anno 1644. die 13. Apr. hor. 9. à merid. num. à Conjunct. 17. diei 7. curr.

5. C. Quadratura crescens; observata in 26. grad. Leonis, circa Nodum Boreum, tantùm 1. grad. 30. min. latitud. Merid. habente. Anno 1644. die 13. Maji, horâ 8. à merid. num. à Conjunction. 8. diei 8. curr. 5 $\frac{1}{2}$ post veram quadraturam.

6. G. Quadratura crescens observata in 23. grad. Sagittarii circa Limitem Boreum. Anno 1644. die 9. Septemb. horâ 9. à merid. num. à Conjunct. 16. die 9. curr. 1. ante veram quadraturam.

7. F. Quadratura crescens, observata in 13. grad. Capricorni, circa Limitem Boreum. Anno 1644. die 8. Oct. hor. 7. à merid. num. à Conj. 21. d. 8. curr. 7. ante veram quadraturam.

Huic similima, adhuc alia crescens observata, in 19. Scorpii circa Limitem Boreum. Anno 1644. die 10. Augusti, horâ 7. à merid. num. à Conjunct. verò 1. diei 9. curr. 1. statim post veram quadraturam.

8. E. Quadratura crescens; observata in 28. grad. Capricorni latitudinem habens Septent. 2. grad. 20. min. non procul à Nodo Austrino, Anno 1645. die 19. Aprilis, horâ 4. matut. 3. ante veram quadraturam.

9. A. Quadratura crescens; observata in 12. grad. Leonis, uno duntaxat gradu Austrum versùs distans à Nodo Boreo. Anno 1645. die 2. Maji, horâ 8. à merid. num. à Conjunct. 18. diei 7. curr. 2. ante veram quadraturam.

10. H. Quadratura decrescens, observata in 22. grad. Geminorum, in latitud. 4 $\frac{1}{2}$ Austr. circa eundem nimirum Limitem. An. 1645. d. 13. Sept. hor. 2. à med. noct. 4 $\frac{1}{2}$ post veram quadr.


11. L. Quadratura crescens, observata in 5. Aquarii gradu, & primo latit. Sept. non procul à Nodo Austrino. Anno 1645. die 27. Octob. horâ 9. vespertinâ, tempore veræ quadraturæ.

Quæ

Luna Byzella Crecedis.
Observata in 7 Gradu II circa limit. A.

GEDANÆ

Anno Christi 1644 Die 15 Martii, hora 7^a à merid. nume. a
Consect. xxi Die completo 7^a, hora numerum 7, post occasum ☉.



33.

Autor Sculpso

Quæ modò adductæ quadraturæ, in antecedente diagrammate, rectis lineis sunt delineatæ; quarum plures etiam exhibuissim, sed evitandæ confusionis gratiâ id consultò intermissi: namque reliquas, quæ adhuc in promptu sunt, differamus in id temporis, cum delineationes Lunationum in medium proferentur.

Quò verò motus hic Librationis, & Inclinationis Cuspidum Lunæ, clarior evadat, materiam hanc, quæ valde est intricata atque obscura, per præsentem figuram & observationem, adhuc magis perspicuam reddere conabimur. Supponamus enim, sectionem aliquam quadraturæ crescentis esse observatam, quæ Lunæ Peripheriam superiorem circa 25. gradum, inferiùs autem grad. 205. tangeret, Lunâ nimirum existente circa Limitem Austrinum, ut in hac phasi evenit: dico itaque, etiamsi diverso tempore, similis sectio in longitudine ratione variationis Menstruæ rediret, Luna verò existeret circa Nodum Boreum: tunc sectionem ad quinque circiter gradus variaturam, sic quidem, ut supra, 22. Peripheriæ gradum, infra verò 200. circiter grad. sit sectura. Quòd si verò Luna circa Nodum Austrinum tum temporis versaretur, quamvis sectio præpe inferiorem scilicet Lunæ Limbum, easdem pertransiret Maculas (exempli gratiâ, circa modò dictum 200. grad.) tum nihilo tamen minùs hæc sectio in superiori limbo, iterum haud parùm variaretur, respectu antecedentis sectionis: siquidem in ejusmodi Lunæ situ, magis plagam orientalem versùs 2½ grad. inclinaret, sicuti circa Nodum Boreum ulteriùs occasum versùs accidit: adeò, ut eò tempore in limbo superiori 28. circiter gradum assequeretur, licet in inferiori parte, sicut referebam, eundem adhuc 200. gradum obtineret; differentia itaque ad 5. gradus, & paulò ulteriùs, se se extendit. Similis planè variatio, & in inferiori Peripheriâ justo tempore deprehenditur (si fixum scilicet punctum lineæ illuminationis superiùs retinetur) sic ut motus cuspidum variationis, æque ibidem 5. grad. variari possit. Hac tamen differentiâ, Luna si existeret in Nodo Boreo, sectio in inferiori parte non occasum (ut in priori casu, ubi fixum illud punctum infra statuebatur) sed ortum versùs tenderet: rursus

V u

Lunâ

Motus Inclinationis Cuspidum superius declaratur.

Lunâ versante circa Nodum Austrinum, hæc prædicta sectio non ortum, sed occasum versûs se se inclinaret; id quod ex schemate præcedente clarè elucet.


Quænam autem hujus rei potior sit ratio, & quomodo eveniat, quòd confinium luminis & umbræ, respectu Macularum alium perpetuò referat aspectum circa Limites, quàm circa Nodum Boreum, ac demum planè alium circa Nodum Austrinum? Præterea: cur pariter in Lunæ quadraturis, existente scilicet eâ in gradu circiter nonagesimo, non semper iidem gradus Lunæ Peripheriæ culminent; verùm sectiones luminosæ & umbrosæ partis, in superiori limbo, Lunâ versante in Nodo Boreo, ulterius Eurum, & circa Nodum Austrinum Zephyrum versûs, inclinent, quàm circa limites? graphicè jam declarabo.

Primò autem, ex superioribus satis innotuit, orbitam Lunæ nunquam Eclipticæ esse parallelam, verùm continuè in certis oppositis punctis, nempe Nodis, eam interfecare; unde Ecliptica cum Lunæ orbitâ, & angulum semper constituunt, qui gradus quinque plus minùs æquat (angulus enim hic variat, sicuti ex motu Lunæ palàm est) ita, ut una pars dimidiâ orbitæ Lunæ supra Eclipticam, Aquilonem, altera verò Austrum versûs tendant; quemadmodum in adjectâ figurâ apparet: in quâ quidem linea horizonti parallela, Eclipticam refert, A, locum Solis; linea curvata D B C orbitam Lunæ; quæ lineæ se invicem lege quâdam certâ interfecant, in punctis D & C: in C versatur Nodus Boreus, in D Nodus Austrinus, & in B hujus limes.

Quando igitur Luna circa Limitem versatur (e. g. in B) animadvertimus lineam, vel, ut rectius loquar, sectionem luminis & umbræ, quæ à puncto culminantis e ad f per centrum rectâ descendit, certam respectu Macularum Lunæ, faciem repræsentare, sic quidem, ut hæc orbitam Lunæ perpendiculariter, sive ad angulos rectos interfecet. Hoc perpendiculare simul monstrat, Lunâ existente in Limitibus, veram & genuinam sectionem luminosæ & umbrosæ partis, scilicet quadraturarum, eo quidem modo, ut linea e f, orbitam Lunæ ad angulos

gulos normales interfecans, & sectio illuminationis, tum temporis, aut in unam eandemq; coincidant lineam, aut minimum parallelæ semper conspiciantur: quippe orbita Lunæ circa Limites, ratione exiguæ admodum curvatis, propemodum Eclipticæ est parallela.

Quando verò Luna circa Nodum Boreum versatur, ut hîc in C, ubi orbita Lunæ Eclipticam sub certo angulo interfecat, ibi linea perpendicularis orbitæ Lunæ e f, cum confinio lu-



cis h g, non in unam coincidit lineam; sed necessariò pariter angulum certum constituit: hinc e f, in limbo superiori, Subsolanum versùs, contrà h g sectio illuminationis in eodem jam dicto loco numerata, ratione Macularum Zephyrum versùs inclinât, prout linea illuminationis A h, & A g, ex Sole A prodeuntes luculenter ostendunt. Itaq; fit, ut omnes sectiones quadraturarum (nec non omnes & singulæ, reliquarum phasium, quibus id æque competit) circa Nodum Boreum, respectu sectionum circa limites apparentium, in limbo superiori ulteriùs occasum, & Pontum Euxinum, vel Lacus hyperboreos versùs ferantur, atque promoveantur: in inferiori limbo rursus magis magisque ortum versùs: quemadmodum omnes ad unam observationes fidem faciunt, nec non ex schemate antecedente, in quâ diversæ quadraturarum sectiones offerebantur, manifestè colligere datur.

Secus autem, cum sæpiùs memoratâ lineâ perpendiculari est comparatum, Luna videlicet si circa Nodum Austrinum moratur, tam respectu nostri quàm Solis; illa enim, ut prope D

V u z

appa

apparet, in Peripheriâ superiori, occasum versûs inclinât, cùm antea in Nodo Boreo, ad ortum tenderet : sectio veræ quadraturæ h g, ibidem supra, magis ad ortum à Ponto Euxino tendit, cùm contrarium in priori situ deprehenderetur : quod pariter lineæ A h, & A g, circa Nodum Austrinum testantur. Ex quibus luce clarius constat, Lunam necessariò, in ejusmodi diversis stationibus, ex latitudine suâ ortis, perpetuò faciem sectionesque, tam quadraturarum, quàm reliquarum phasium omnium, aliter atque aliter inclinare, atque variare : adeò, ut quendam motum Librationis cuspidum hinc generari oporteat. Inde verò quoque Maculæ, respectu Nonagesimi, modò sic modò aliter ratione inclinationis spectantur, ac si Luna hanc vel alteram partem versûs, stato tempore librata esset ; sicuti etiam revera in Lunâ accidit, experienciâ teste. Inprimis hæc differentia, sive libratio, ex latitudine profecta, in Pleniluniis admodum est conspicua circa Nonagesimum ; de quibus paulò post, quando de Pleniluniis ipsis dicitur, plura percipies.

Libratio cuspidum habet & suas inæqualitates.

Cæterum, & hæc quoque Libratio cuspidum, non singulis mensibus semper est eadem ac constans ; sed insuper alii inæqualitati minori est subjecta, eaque inæqualitas eo modo, ut angulus Eclipticæ & Orbitæ Lunæ, variatur. Eamq; ob causam, & hæc Libratio, simul cum hoc angulo, jam crescit, jam decrescit ; nisi quod tamen hæc inæqualitas & differentia, fateor, valde sit exigua (ad aliquot namque tantum minuta se se extendit) ut vix ac ne vix in hisce observationibus deprehendi possit.

Atque his, quæ generatim de progressionibus & retrogressionibus Sectionum Menstruis & Annuis, tam quadraturarum, quàm aliarum omnium phasium, quæ ex motu Longitudinis proficiuntur ; nec non, quæ de variationibus cuspidum quadraturarum, aliarumq; phasium ex motu Latitudinis orientibus dicta sunt, tandem aliquando concludamus.

Tres præcedentes quadraturæ maxime sunt notabiles.

Nisi quod insuper conducere non parum videatur, ut circa ipsum finem capitis hujusce, commune faciamus, quò tres pariter delineatæ quadraturæ, phasis nempe 10. 11. & 12. præsertim sequentes ob causas bene notentur. 1. Propter diversam

faciam

*Radius Lunae Dimidiata Crescentis
Opposita in 53 Gradibus.*

G. D. A. N. S.

*Anno Christi 1644. Die 8 Oct. Hora 7 à merid. rom.
à Coniunctione veri 21. Diei 8 Curr. 7 ante veram □.*



32.

Auctor Sculpit.

fam lineæ illuminationis progressionem & retrogressionem; variationemque cuspidum: prima namque & secunda quadratura, decima nempe & undecima phasis, in Cancro, & quidem circa Limitem Austrinum; tertia verò, duodecima scilicet phasis, in Capricorno, circa Limitem Boreum est observata. 2. Propter diversos Librationis terminos, circa Lunæ Limbum superiorem, & inferiorem conspicuos. Quia enim 10. & 11. in Cancro, & adhæc in maximâ Latitudine Australi, existunt; ideo & interstitium inter Paludem Mæotidem Lacumque hyperboreum superiorem, & Peripheriam maximè conspicitur amplum: quare & ex hac ratione, modò dicti Lacus & Palus, ut apparet, maximè sunt dilatati. At in figurâ duodecimâ vides, quomodo hæc spatia maximè sint compressa, atque coarctata, non minùs eadem Palus Lacusque; quippe Luna in Capricorno & Limite Boreo, tum temporis versabatur: cujus certè generis quadratura rarerent admodum conspicitur.

Ex quibus denuo Motus ille, terminique ejus maximæ & minimæ Librationis, in principio Cancri & Capricorni extantes, stabiliuntur. De cætero, non solùm reliquis omnibus meis innumeris observationibus; sed & multis aliis à Petro Gassendo, viro eruditionis præstantia clarissimo, amico nostro plurimum colendo, & Ismaele Bullialdo ingenii excellentis acerrimique judicii Viro, peractis, (quarum hic meminit in Astronomiâ Philolaicâ lib. II. cap. 13.) apertè & indubitatè demonstrare possumus. Quia verò hoc loco id exequi nimis quàm longum foret, cum præter opinionem jam prolixiores fuimus; idcirco plura hic dicere non attinet: sed hæc observationes sup

Motus Librationis, terminiq; ejus, non solùm meo, sed & aliorum observationibus confirmatur.

loco & tempore, quando de diversis Librationum Periodis dicetur, reservabuntur.



CAPUT XIX.

DE LUNÆ PLUSQUAM BIFIDÆ
PHASI.

*Nonnunquã
quadratura
hanc phasin
magnitudine
adequanti.*


PRæfens figura in ordine decima tertia, omnium est prima, quæ incipit esse gibbosa: quamvis & quadratura certo tempore dari possit, quæ æque sit magna, cujusq; terminus luminosæ & obscuræ partis, ferè per easdem transeat Maculas; nisi quòd confinium tum temporis, circa phasin hanc dimidiatam, omnino sit rectum, & minimè incurvatum. Quod colligere licet ex Longitudinis motu Librationis disci, diversisque quadraturis, quæ scilicet in Capricorno sunt observatæ; cum primis verò ex duodecimâ, & ex trigestimâ secundâ phasi, figurâq; præcedentis capitæ, in quâ termini sectionum quadraturarum sunt consignati. Quia verò hæc phasis in Cancro, signo scilicet opposito adumbrata fuit, idcirco & sectio primùm die post quadraturam primâ, eo usque in Lunam se se extendere potuit.

Porro quidem, res variæ notatu dignæ in hac phasi animadvertendæ: 1. Vertices & areolæ in parte superiori extra confinium admodum conspicuæ, fastigia sunt Montium, Lacum nigrum majorem circumcingentium. Duæ illæ cuspides clariiores in ipso termino lucis, tertiæque extra illam in parte tenebricosâ, Insulæ sunt Balearides. Semilunula infra illas emergens, pars est Montium, qui Insulam Corsicam coronant.

*Quinoniam
Montes, alii sunt
excellentes?*

Dehinc, manifestissimè etiam ex hac figurâ deprehenditur, quinam Montes alii sunt altiores, etiamsi omni ex parte lumine jam Solis perfundantur. Hoc enim conjicitur ex umbrâ, quam Montes illi in subjacentem de se spargunt Vallem; sicuti jam suprâ capite 8: hac de re facta est mentio. Nam, quò in Vallibus umbra nigricantior apparet, in æquali quidem distantia ab illuminationis lineâ; eò quoque Montes reliquis sunt sublimiores. Altiora enim corpora opaca, majorem nigrioremque de se spargunt umbram, quàm depressiora; secundùm illud

*Præter Lineam plerumque Bifidam
 Offortata in 14 Gradibus circa puncta medie remotioris.
 G. E. D. A. N. S.
 Anno Christi 1644. Die 16 Martii, hora 9 à merid. numer. à
 Coniunctione vero 2 Dies 9 Carr.*



13.

Acta Astronomica

illud Theorema Opticum : *Umbra multiplicata obscurior est.* Francisc. Aguil. lib. v. prop. 63. pag. 426. Uti enim lumen alterius luminis accessione augetur, ita & umbra, accedente aliâ umbrâ, obscurior evadit.

Hincque evidentissimè colligitur, Montes, inter alios Phœnicem, Cragum, Cadnum, Antilobanum, altitudine Sipyllum, Maficytum & Libanum multùm antecellere : præsens namq; figura testatur, umbram illarum Vallium harum umbrâ esse obscuriorem; cùm tamen hæ viciniores sint, lineæ luminosæ & umbrosæ partis, atque illæ.

Cæterùm, & hoc notatu atque consideratu dignum hîc occurrit, quantò minores Montes Dalangveri, Coibacarani & Uxii, seu potius illarum Vallium circumferentiæ, in hac phasi appareant, quàm in præcedente decimâ, undecimâ, & duodecimâ; & quod de die in diem magis magisque quoad ejus figuram, tantum decrevant, quantum ipsi Lunæ quotidie luminis accrescat, usq; dum circa Plenilunium ferè prorsus evanescant : quemadmodum crescentes omnes Lunæ phases id confirmant. Ratio hujus Phænomeni satis superque jam capite octavo indicatâ : quo Lectorem ablego.

Vallium circumferentia quoad apparentiam videtur crescere, atq; decrecere.

Postremò savor sum Astrophilis, ut curam in conquiendum optimum Telescopium impendant, eoque comparato, hanc Lunæ phasin lustrent, & diligenter attendant; tum præfertim ob magnam varietatem, quàm hîc deprehendent præ aliis Phasibus, tum ob incredibilem delectationem, quam inde percipient. Quandoquidem in tali Lunæ constitutione & apparitione, maxima pars sublimiorum Montium & Vallium, visibile Lunæ hemisphærium occupantium, in maximè conspicuâ, gratissimâ, meliori que formâ repræsentabitur; id

Hæc phasis digna, ut Telescopio consideretur.

quod in adultiori phasi frustra
expectabis.



CAPUT

CAPUT XX.


DE LUNAE GIBBEROSAE CRE-
SCENTIS PHASI.

SI ullo unquam tempore, confinium luminosæ & obscuræ partis, æquabile ac minimè asperum atque anfractuosum extitit; certè in hac phasi omnino ejusmodi cernitur: cùm sectio Mare Mediterraneum circa Insulam Majoricam, Siciliam, Zacynthum, Cretamque interfecat; tunc enim longissima conspicitur linea, quæ unquam per Mare quoddam Lunare transire potest. Ideoque quoniam illo in loco, ferè tota per aquas, aut; si mavelis, per spatiosissimam quandam planitiem tendit, necessariò & rectissima, & planissima apparet. Areolæ verò minores extra sectionem emicantes, vertices sunt quorundam Montium atque Insularum. Jam magnus ille clareque illustratus circulus, in mediâ circiter parte lineæ illuminationis, est Mons Ætna Siciliæ; cujus Vallis hoc tempore maximè est obscura, ut unquam fieri obscurior possit: quippe, cui Sol (propriè loquendo) primùm oritur, sic ut fastigia tantummodo horum Montium lumine suo perstringere possit.

*Cur Insula
Sicilia in hac
phasi nigri-
cantior appa-
reat, more so-
lito?*

Ipsa item Insula Siciliæ, admodum in hac phasi apparet nigricans; nec adeò magna differentia, inter hanc prædictam Insulam, & Mare Mediterraneum quoad colorem, modò deprehenditur. Quæritur ergò meritò, unde hoc oriatur; jure enim hæc Insula, haud parùm lucidior se se repræsentare deberet, quia pars est Lunæ continentis? respondetur verò quod id ita sit: nam terra Lunæ, tanquam corpus magis opacum, radiis Solaribus magis resistere valet, & idcirco etiam illos fortius reflectere (ut in præcedentibus dictum) clariorque apparere potest. Quòd autem hic secus eveniat, id innumeris diversissimis mireque inclinatis Montibus adscribendum, qui partim in viciniâ hujus Insulæ, partim etiam in illa ipsâ hinc inde affatim conspiciuntur; quorum procul dubio adhuc plures ibidem extant: verùm cùm sint humiliores, propterea minimè illorum conceditur

Plafu Lunæ Gibbosa Crescentis .
Observata in 19 Grad. N. non procul Perigæo 43 .
C. E. D. A. H. G.
Anno Christi 1643, Die 19 Decemb. hora 10 à merid. æqu.
à Coniunctione vero 15, Dies 9 Currentis .



14.

Aut. Senne

ditur aspectus. Hi autem Montes, quoniam in hac Lunæ constitutione, confinio admodum sunt vicini, eam ob causam & maximam, longissimam obscurissimamque hoc tempore de se spargunt umbram; ut de hisce innumeris variè inclinatis sitisq; Montibus, ubiq; locorum in Sicilia, umbra quasi continua procreetur: adeoque ut fieri propemodum aliter haud possit, quàm quòd Insula hæc obscuram, ac nigricantem faciem nobis spectandam exhibeat.

Replices autem: si hæc, quæ jam retulisti, solido quodam fundamento nituntur, necessum est, ut hæc Insula indies, Lunâ crescente, clarior lucidiorque evadat: quia umbra etiam decrescit rariorque existit, prout Sol ibidem altiùs elevatur: atque hîc iterum affirmo, sic equidem cum hac re esse comparatum; & quod aliter fieri nequeat, id fidis observationibus tam Lunæ crescentis, quàm decrescientis commonstrabo. Nam quemadmodum Lunâ grandescente, Insula Sicilia indies fit clarior atque lucidior, sic è contrario Luna senescente quotidie paulatim obscurior, nigriorque evadit: quod reipsa deprehendes, si phases subsequentes 15. 16. 17. 18. & 19. diligenter expendaris. In Plenilunio quidem & paulò post, omni tempore erit clarissima; quamprimum autem Luna notabiliter decrescit, sicut in phasi fit vigesimâ sextâ, tunc simul incipit pedetentim obumbrari, ita, ut indies in phasibus ordine sequentibus fiat umbrosior, usque ad 34. & 35. phasin; quo tempore de novo obscurissima apparet: quoniam tunc in ipso ferè confinio iterum est constituta.

Quòd verò linea sectionis, infra Siciliam, non planè æquabilis, aut lævigata spectetur, cum tamen adhuc per aquam sive planitiem transeat, inde oritur; quia hæc linea, rectâ per Insulam Cretam, Montemque Sæpher fertur, quò fit, ut, necessario anfractuosa esse, oporteat.

Denique & hoc notandum, Paludem Amadocam non procul à Lacu hyperboreo superiori, in ipsâ ferè Lunæ Peripheriâ extare: ratio est, quòd Luna, id temporis, circa medium Arietis, Nodumque Austrinum, fuerit observata: aliàs enim existente Lunâ in Cancro, satis hic Lacus à Limbo remotus con-

X x

spici-

Insula, Sicilia, modo obscurior, modo luminosior apparet. Cujus Phænomeni ratio investigatur.

Nomunquam linea Mare interfecans quodammodo aspera, atq; inaquabilis existit.

spicitur : in Capricorno verò, præsertim circa Limitem Bo-
reum, parum, aut nihil propemodum, de eo cernitur. Præ-
terea in hac phasi, tantummodo Lacus minor occidentalis se
nobis offert, alter major hac vice in Peripheriâ latet : in Can-
cro verò se se ambo clarè, atque distinctè semper præsentant.

CAPUT XXI.

DE LUNAE IN ORBEM INSINUA- TAE PHASI.




Trigonum Lunæ, nullo alio tempore, ac-
cidere posse, quàm, cùm Luna quatuor integris signis à Sole
est remota, hoc est, 120. gradibus distat; quod illos quoque
minimè fugit, qui vel à limine Astronomiam salutarunt. Ejus-
modi Trigonum hæc phasis exhibet. Non est autem, quòd
existimes, sectiones luminosæ & umbrosæ partis, pari modo,
continuè, per easdem semper Maculas ferri : quemadmodum
hic Lunæ aspectus, perpetuò in certâ quadam accidit distantiâ;
pariterque ut in hac phasi videre est, in quâ confinium per In-
sulam Ficariam, Montes Ærios, Insulam Maltam, Insulas Di-
dymas, incedit; sed, quòd illud non rarò, modò propiùs Zephy-
rum, modò longiùs Subsolanum versùs: respectu Macularum,
adinstar sectionum quadraturarum, promoveatur; quæ reci-
procatio, æq; ex motu Lunæ Librationis, suam ducit originem.

*Et Trigonum
Sectiones ordinem
reciprocantur.*

*De extremis
Trigonorum
Terminis.*

Duos autem illos extremos terminos sectionum Trigoni-
carum, inter quos omnes ac singulæ lineæ illuminationis, per
totum annum, tempore Trigoni reciprocantur, præcedens de-
cima quarta, & subsequens decima sexta phasis nobis common-
strat. Quando enim Luna in Capricorno versatur, hoc est,
quando Palus Mæotica limbo est vicinissima, tunc Trigoni se-
ctio similis est sectioni 14. phaseos, in quâ illud confinium pro-
pè Insulam Sardiniam, Montem Ætnam, Insulamque Cre-
tam ingreditur. Si Luna verò tempore veri Trigoni observe-
tur in Cancro, quando Palus Mæotis contrà quàm longissimè
à Peripheriâ abest, tunc ferè æqualis apparet sectio ei, quæ in
sequen-

Discus Lunae in orbem insinuata.
Observata in 3 Grad. 8. tam circa meoem. libat. gñ limit. d.
G. E. D. A. N. G.
Annus Christi 1644 Die 17 Februarii hora 7 à merid. num.
à Coniunctione s'ris 30' Diei 30 Curr.



15.

Lator Sigant.

sequenti decimâ sextâ phasi habetur, perque Sinum Apollinis, Insulam Cercinnam, Mare Ægyptiacum, Sinum Sirbonis &c. trajicitur.

Jam si observationem, paulò antè, vel post verum Trigonium Aspectum, instituas; tum nec sectiones hos terminos tam strictè attendere possunt; sed aut unam alteramve partem versùs, magis magisque, pro ratione temporis, promoventur: cujus exemplum & nunc sub oculis versatur. Hæc namque phasis, septem vel octo horis tardiùs, quàm fieri debuisset, respectu Trigoni, est observata: quapropter & sectio ejus jam verum terminum transgressa conspicitur. Etenim, cum Luna illo tempore omnino in Cancro extiterit; utique & illius confinium meritò per Montem Æternam, Insulam Cretam perimeare debuit: quod autem secùs accidit, ratio est, ut modò dicebam, Lunam octo scilicet horis tardiùs esse animadvertam. Interea tamen de his Trigonorum Terminis securus esto; siquidem ex innumeris meis observationibus, id certo certius mihi innotuit, rem aliter se se non habere: sicuti idem Lunationes sequentes, hoc abundè satis demonstrabunt. Interea tamen & æque similis quædam (quamvis exigua) variatio, sive inæqualitas, circa hos terminos, ac circa quadraturas, se se detegit: quia verò planè ejusdem cum superiori deprehenditur naturæ; idcirco supervacaneum duco, pluribus hanc inæqualitatem persequi.

*Trigonorum
Termini quibusdam
inæqualitatibus
implicantur.*

Perpectis itaque perceptisque his Trigonorum Terminis, spatioque interjacente, in sex partes æquales diviso, secundùm Signorum ordinem Ascendentium, & Descendentium, veluti suprâ in quadraturis instituebatur, in figurâ scilicet pag. 329. insertâ; nullo quoque negotio imposterum univasas & singulas Trigonorum sectiones, per totum anni curriculum conspicuas, aut quovis alio tempore unquam futuras, indubitanter certèque prædicere, determinare, ac secundùm Maculas, accuratissimè sectionem illam certo tempori respondentem, delineare possumus. Cum primis autem, multò adhuc accuratiùs, hoc negotium succedet, si motum Librationis cuspidum & hac in parte diligenter attenderis.

X x 2

Postre-

Postremò autem & hoc notandum, quòd, in hac phasi, & Mons *Ætna*, & *Insula Creta*, & Mons *Sinai*, quando adeò vicini lineæ illuminationi existunt, aspectui multò jucundiores gratioresque sint, quàm unquam fieri aliàs possint; præprimis autem *Ætna* adinstar pretiosissimi unionis rutilat: quapropter phasis hæc omnino meretur, ut diligenter à rerum Cœlestium Scrutatoribus consideretur, atque examinetur.

CAPUT XXII.

DE LUNAE INCURVATAE CRESCENTIS PHASI.

*De Macula
Marium Lu-
narium secun-
darii.*

Cùm Aquarum ac Marium Lunæ, utpote, Mediterranei, Caspii, Ponti Euxini, Propontidis colorem probe atque accuratè examinamus, atque perpendimus (quorum semper obscurior est, quàm Insularum atque Continentium) animadvertimus colorem Aquarum Lunarium esse diversum, & minimè æquabilem; quod non solum hac præfente, sed & omnibus reliquis figuris comprobatur: quam diversitatem colorum, quovis tempore, in omnibus meis observationibus, pro virili, accuratissimeque attendi. Hæ autem Maculæ aquarum secundariæ, (ita illas appellare lubet) nunquam variantur, vel mutantur; sed perpetuò quoad apparentiam, eandem figuram formamve retinent; quod phænomenon certè insolens mirumque videtur, adeò, ut vix abs re sit futurum penitiùs illud introspicere, & genuinam ejus causam, quantum licebit investigare.

*Unde Macu-
la ista orian-
tur?*


Enimvero altè animo meo insidet hæc opinio; quòd, quemadmodum Maria nostra terrestria, non prorsus sunt nuda & inania; verùm sparsim multis innumeris Insulis Rupibusque à DEO Optimo Maximo locupletata: sic & Maria Lunaria, ratione ejusdem materiæ, non minùs variis Insulis, Montibus, Rupibusque possint esse referta; quarum rerum omnium quotidie pars haud exigua, optimo Telescopio distinctè ac perspicuè apprehendi potest. Interim tamen fortassis adhuc multò

plu-

Phase Lunæ incurvata Crescentis.
Observata in 7 Gradibus, circa Perigæum et 8.

G. B. D. A. P. S.

Anno Grægorii 1643 Die 21 Novemb. hora 7 à merid. sum.
à Conjunctione videlicet 34 Dies 31 Curæ.



16.

Acton Salsæ.

plures eæque innumeræ Insulæ; sed minutiones, vixque perceptibiles, ibidem in illis Maribus extare possunt: quæ propter immensam distantiam, oculi imbecillitatem, ac Telescopii imperfectionem, visumque nostrum maximâ ex parte, eludunt, subterfugiuntque; ita, ut vix ac ne vix quidem talia perfectè dignoscere possimus. Ac ne fortè hoc cuipiam non tantùm valde mirabile, sed & prorsus absurdum videatur, cogitet rogo; numquid etiam nobis in Lunâ existentibus Maldiviarum Insularum Indiæ Orientalis, sive Insularum Græciæ concederetur aspectus, sic ut non solum eas perfectè discernere, sed & numerare liceret? certè non dubito, quin omnes mecum consentiant, rem hanc planè esse impossibilem, nec adeò distinctam in oculo nostro humano visionem existere unquam posse. Quæ cum ita sint, profectò non video, quare non simile quiddam in Maribus Lunaribus occurrere possit, quod æque difficulter visu à nobis comprehendatur. Fortassis verò & ibidem sparsim sive Maldiviæ, sive aliarum minimarum multarum ingens turba extat Insularum, quæ, propter modò allatas rationes, haud omnino distingvi à nobis possunt. Quamobrem aliter fieri nequit, quàm ut ejusmodi Marium loca, nobis aliquantò dilutiora, atque paululùm luminosiora appareant: quia aqua ibidem terræ, hoc est Insulis, permixta videtur. In illis autem, aquæ vel Maris partibus, ubi nec Insulæ, Paludes, Rupes, vel aliud quiddam animadvertitur, sed sola aqua, necessariò & loca illa nigricantiora, & æquabiliora reliquis spectantur; sicuti in hac phasi, ut & in reliquis omnibus, Maculæ scilicet secundariæ se exhibent. Quod si præterea quibusdam in locis Arundineta, Fruticeta, & ejuscemodi alia genera aquaticorum fruticum dentur, ut quidem credibile, maximeq; etiam possibile; cum & in nostris Maribus affatim talia reperiantur: non absolum utique erit, ab ejusmodi cum variis, tum longè diversissimis rebus, diversam radiorum Solarium reflexionem procreari: ut sive hic, sive ille locus aut umbrosior aut lucidior, ratione distinctæ opacitatis, non possit non visu percipi.

Montes, vel potiùs Valles, Ætnæ & Sinai, quod porrò atinet, hæ in adjunctâ decimâ sextâ phasi, jam non adeò um-

brarum plenæ, ut in præcedente 15, inprimis 14, deprehenduntur: quippe confinium umbrosæ partis, tantò spatio magis magisque ab illis removetur, quanto Sol illo loco altior redditur: quàmobrem indies umbra, tam in his, quàm in aliis Vallibus decurratur comprimaturque, quoad omnino evanescat; quando scilicet Sol illis quasi verticalis existit; veluti tempore Plenilunii conspicitur, quo Valles profundissimæ, & antea umbris obscurissimæ, lumine undique perfusæ & lucidissimæ apparent; quod omnes phases sequentes manifestè testantur.

De longiusculis Apennini Maculis.

Demum ex longiusculis nigerrimis Maculis, in Monte Apennino conspicuis, colligere licet, ibidem profundissimas Valles, cavernas, foveasque extare; maximè autem aperte præcedentes phases id commonstrant, præsertim decima tertia, ubi cavernæ illæ adhuc longè nigriores spectantur, quæ in subsequenter figuris, indies, ad Plenilunium usque, ratione umbræ decrescunt, majorique paulatim lumine perfunduntur, more aliarum Vallium. In hoc autem hic Apenninus non parùm discrepat, ab aliis Montibus Vallibusque, quòd non simili ratione decrescat, ut quidem crescit. Exempli gratiâ: Lunâ crescente, indies plus acquirit luminis; eamque igitur ob causam, Lunâ decrescente, de die in diem magis magisque obscurari deberet, instar reliquorum Montium Valliumque; secus autem apparere in hoc Apennino, palàm est: post oppositionem enim, æque clarè ac reliqui Montes à Sole illuminatur, imò tempore ultimæ quadraturæ, ferè adhuc clarior conspicitur. Præcipua autem ratio hujus Phænomeni hæc est; quòd omnium altissimæ cuspidès Montium, in latere occidentali sitæ sint, quæ, dum Luna crescit, notabilem de se spargunt umbram ortum versùs, in circumjacentes Montes Vallesque: reliqui verò vertices Montium orientales, cum sint depressiores, paulatimque in altum

assurgant, ideo debilem planè procreant umbram;

contrà verò longè luminosiores apparent

post, quàm ante Lunæ

oppositionem.

CAPUT

CAPUT XXIII.

DE LUNAE GIBBEROSAE CRE-
SCENTIS PHASI.

Quemadmodum materia Globi Terreni, ex quâ partim Montes, Valles, partim planities sunt compositæ, non prorsus constat ex partibus homogeneis ejusdem naturæ & qualitatis; sic pariter cum Lunæ sive Antichtonos materiâ opacâ (quam nulli profectò rei convenientius ac nostræ terræ conferre possumus) comparatum est. Etenim, Montes, Valles, planitiesque Lunares, ratione materiæ maximè inter se differunt; modò enim hic locus petrosus, modò alius arenosus existit; quorum iterum alia atq; alia sunt diversi generis, quæ partim ex sabulo livescente, partim rubicundo &c. constant. Quæ ut ne videantur sive somnia dormientis, sive vigilantis fragmenta, verùm rationi planè consentanea; idcirco hoc in capite atque sub præsentis figuræ intuitu (quemadmodum id valde opportunè, & commodè fieri potest) illa ita demonstrare mecum constitui, ut non possis non mihi astipulari. At enim (fateor) mihimet ipsi ego valde audaculus videor, dum tantæ molis opus aggredior, cum de remotis adeò rebus, tum superiori tempore inauditis ediffertaturus, eoque ipso quintam essentiam cœlestem Peripateticorum quasi prorsus distlaturus. Verùm enimvero, cum observationibus haud vacillantibus, ocularique experienciâ, in tam arduo negotio me bene esse fultum non nesciam, quin feliciter hoc meum successurum sit propositum, nullus dubito.

Primò, quòd diversi generis loca petrosa rupesque passim inter Montes Lunares occurrant, jam ex parte cap. 8. retuli: quo loco dicebam, rationi non repugnare, omnes ejusmodi Valles, quæ omnino nihil quoad formam figuramve variant; sed à primâ illuminationis die, Lunâ nimirum crescente, indies nequaquam decrescunt, sive coarctantur, Rupes Montesque esse petrosos: quippe Montes arenosi, non æque præruptè in altum

*Luna, uti
Terra nostra,
prorsus ex
partibus ho-
mogeneis cõ-
stat.*

altum affurgere possunt, sed magis sunt clivosi, & circa verticem magis magisque in acuminatum affurgunt apicem: quam obrem & illorum Valles, infra, & circa Montium pedes, arctiores sunt, quam circa cacumina; sic, ut ex necessitate quotidie in phasibus Lunæ crescentibus decrescere, sicuti in decrescitibus crescere illas oporteat.


Aliaratio.

Dehinc, adhuc alia superest ratio, quæ me pariter commovet ad credendum, ejusmodi rupes locaque saxosa, in superficie Lunæ extare posse. Isti enim Valles Montesque, qui licet non sint excelsiores reliquis, nihilo tamen minus, claritate splendoreque tempore Plenilunii multum reliquos antecellant, ut inter alios M. Ætna, Montes Insulæ Cretæ, M. Sinai, Montes Insulæ Besbicæ &c. hos inquam saxæ sunt naturæ, aptioresque propter illam opacitatem majorem soliditatemque, ad melius fortiusque reflectendos radios Solares: unde omnino majus ac valentius procreatur lumen. Posito autem, Montes Lunares ex unâ tantum materiâ, scilicet sabulo, seu luto constare; tunc certè impossibile foret, ut illorum reflexio radiorum Solarium, tam varia atque diversa daretur; sed omnes cum Vallibus illis, Montes Lunares, æque luminosi semper spectarentur, & nulli supra alios claritate excellerent. Cùm verò reflexio adeò varia, & diversa animadvertatur; utique sequitur, Valles Montesque ex diversissimâ, instar Globi nostri Terreni compositos esse materiâ. Dico itaque denuo loca illa præ reliquis luminosiora atque splendidiora, esse petrosa: nam corpora solidiora, lumen & radios Solares fortius reflectunt, quam minus dura; ideoque & clariora his apparent: quod in Catoptrici abundè demonstratum.

*Prima ob-
jectio.*

Quod si autem mihi objicias, & alias dari posse rationes, quare Vallis una præ alterâ splendidior appareat? idque fieri scilicet quia una præ alterâ existit profundior; ita ut quò sunt altiores, eò major varietas reflexionis à circumstantibus variè inclinatis Montibus oriatur; & idcirco necessariò ejusmodi Valles etiam clariorem referant speciem, quemadmodum prædictæ, Ætnæ, Cretæ, Sinai &c. Quæ ut non inficias eo, cùm planè se se ita habeant, ita etiam largior omnia, sed dextrè ta-
men

*Rever. Lunae Gibbosa Crescentis.
Observata in 13 Grad. N.
C. ED. A. 1644.
Anno Christi 1644 Die 30 Februarii, Hora 10 à merid. aem.
à Conjunctione vers 13, Diei 12 Carr.*



17.

Anton. Sculp.

men intellecta : interim significes rogo, cur non omnes Valles profunditate similes, non æque etiam claræ, tempore Plenilunii spectentur ? utpote, Insula major Caspii, Mons Serrorum, Mons Carpates & alii : hos autem cum prioribus omnino ejusdem esse altitudinis, ex illorum primâ & ultimâ apparitione, quando nimirum confinium luminis & umbræ, illis maximè vicinum existit, faciliè demonstrare possumus. Hic igitur nihil superest quod respondeamus, quàm hoc, Valles illas ex parte obscuriores, partim & paludosas, & nemorosas, & frutecosas esse posse; quod si concedatur, necessariò inde fit, non posse non istas se se nobis obscuriores exhibere. His adde, loca luminosiora & Montes albicantes gypseos forsitan esse, qui pariter clarius fortiusque nobis communicarent lumen, reliquis nigricantiori materiâ constantibus. Non abnuo quæ intulisti, rationi minimè adversari; ipsemetque statuo, hujus generis Montes diversos, in Lunâ reperiri posse : quæ si ita sint, idem quod prius sequitur, varios diversissimosque, respectu materiæ, Montes Vallesque in Lunâ extare.

Insuper in superficie Lunæ, adhuc alius Mons primùm in hac phasi ortus, reperitur, scilicet Porphyrites in Mari Eoo, supra Insulam Cercinnam; qui apertè confirmat, alios ratione materiæ aliis Montibus esse prorsus diversissimos. Et hunc Porphyritem, aut ex terrâ rubicundâ, instar Porphyritis Ægypti (secundùm quem, Lunarem denominavimus) aut, quod mihi magis videtur consonum, ex materiâ nitrosâ, vel sulphureâ constare nullus dubito : imo pro persuaso habeo, quòd ignem alat perpetuum, atque adeò ex numero fit ignivomorum, quales apud nos sunt M. Ætna, Hecla, Vesuvius & alii.

Adq; hoc statuendum, certè non exigua levisq; me impellit ratio. Nam, postquam nullo non tempore, in omnibus Lunæ vicissitudinibus, manifestè atque luculenter conspexerim, Montem Porphyritem se se perpetuò, quoad colorem atque splendorem, planè aliter ac reliquos omnes, in patente Lunæ hemisphærio ullibi extantes, repræsentare; croceumque, sive subflavum colorem, seu aureum sive igneum, præ se ferre; qui color ipsi quasi naturalis & perpetuus; (siquidem à primo sta-

Mons Porphyrites certè arguit, diversissimos ratione materiæ in superficie Lunæ extare Montes.

Quibus rationibus Autor potissimè fuerit commotus ejusmodi fovere opinionem.

tim illuminationis die, ad ultimum usque, hac in parte non variatur) sicuti id omnibus bono Telescopio instructis, quovis tempore experiri licet. Hanc igitur ob causam nolens volens statuere sum coactus, hunc Porphyritem, aut ex rupe rubrà, aut sabulo, sive terrâ rubicundâ constare, aut prorsus ardere, sive perpetuo igne exundare : etenim si terrenis rebus æquiparari debent, ut fieri aliter mentis nostræ dextrè informandi causâ non potest; nullæ certæ res aliæ occurrunt, cum quibus convenientius comparari queunt.

Nec, aberrationis visus, nec Tubi illustri, hoc phenomenon adscribendū.

Proinde igitur, cum hæc apparentia nullo modo hallucinationi visus, nec fallaciæ Telescopii adscribi possit; (siquidem ut mihi res hæc in obtutum venit, ita ab omnibus, qui experimentum ejus facere non detrectabunt, citra exceptionem temporis, deprehendetur, animadversuris, magnam esse differentiam inter Porphyritem, reliquosque Montes Lunares, sive unum, sive plures Tubos, eosque ex quovis segmento præparatos, adhibeant) omnino sequitur, certos Montes Lunares, ex vario diversoque saxo, sabulo, sive luto compositos esse, ne dicam, nonnullos esse Ignivomos, quemadmodum de Porphyrite modo accepimus; cui plures similes ibidem latere valde mihi fit credibile (in quorum numero & ille Mons recensendus, cujus capite 13. sub finem mentionem fecimus) hujusmodi naturæ ac qualitatis extare : quos quia sunt minores declivioresque, tam accuratè atque distinctè intueri minimè conceditur.

Porphyrites: quamquam constet figurâ?

Cæterum, & hoc maximè notabile, quòd hic Porphyrites, nunquam non planè aliam, ratione formæ & figuræ, referat speciem, quàm omnes reliqui Montes Lunares. Circa medium quandoquidem constat quasi corpore rotundo, de quo Austrum versùs, cornu quoddam curvatum excurrit: sursum Aquilonem versùs, similiter quidam apex curvatus conspicitur; sed à corpore medio omnino avulsus: adeò, ut mediante illo interstitio, cœu pars Maris, dilucidè conspici possit. Præterea invenitur & alius Mons, Pyramis videlicet nominatus, propè Montem Argentarium, juxta promontorium Lunæ Maris Mediterranei, qui peregrinam pariter præ se fert formam figuramve, nec Pyramidi est absimilis, unde & nomen sortitus.

Qui-

Placis Lunae Adulce.
Observata in 8 Gradus ☉.
G. D. A. N. I.
Anno Christi 1644 Die 21 Januarii, Hora 11 à merid. sun.
à Coniunctione Solis 13 Dies 13 Curr.



Quibus tamen tribus modò dictis Montibus quoad faciem, nulli, in citeriori parte Lunæ, ut ut diligenter per singulas etiam phases in id inquiras, animadvertuntur pares.

CAPUT XXIV.

DE LUNAE ADULTAE PHASI.

NOta Insula Cercinna, in appositâ phasi, De Insulâ Cercinnâ, & ejus colore. jam haud parùm luminosior videtur, quàm in præcedente decimâ septimâ; ratioque faciliè petitur ex illis, quæ capite 20. de simili apparentiâ Insulæ Siciliæ, dicta sunt. Nam, cùm in Insulâ Cercinnâ similiter innumeri Montium tractus, scopulorumque series affatim reperiantur, uti ex radiis illis luminosis deprehenditur; pariter etiam accidit, quando confinium umbrosæ partis, in viciniâ illius Insulæ versatur, ut, ob illos innumeros Montes, umbras eo tempore longissimas densissimasque de se spargentes, nigricantior spectetur: medium verò hujus, Insulæ, cùm sit paludosum (Monte tamen erecto conspicuum) idcirco & aliquantulum umbrosius apparet.

Mare verò illud Syriticum, infra jam nominatam Insulam Cercinnam situm, cùm majori pallore sit suffusum, quàm reliquum Mare, & adhæc sparsim areolis clarioribus refertum: unde haud difficulter colligitur, vadofum quasi existere, vel, ut propriè dicam, hinc inde scopulis abundare. In hoc Mare flexuosæ quædam lineæ ingrediuntur, perinde ac si essent Fluvii permagni sinuosi, hoc loco se se in Mare exonerantes. Porro, quoniam Nilus interveniente diversorum brachiorum serie, pariter in nostrum Syriticum Mare, quod æque est vadofum, intrat; idcirco & illos Lunares fluvios, nomine Nili appellare placuit. Loca autem illa quæ præterlabitur alluitque, videntur esse Paludosa, & minimè sicca, prout ex colore certò præsumitur: quam etiam ob causam, eò adhuc melius, Nilus ille cum nostro terrestri convenit. Scis enim, hunc nostrum non ræreter exundare in illa loca finitima; hincque fortassis & Selenitis, similis, ratione coloris, circumjacentium Nili locorum

De Mari Syritico, Nilus & Lunari.

erit aspectus: hoc tamen cum discrimine, quòd nostri Nili inundatio nonnunquam Selenitis evanescere videbitur: Paludes contra circa Nilum Lunarem existentes semper nobis eandem referunt speciem.

Motum librationis quod attinet, tam hujus quàm sequentis Phaseos; ille in maximâ occidentaliori variationeprehenditur, ubi nimirum interstitium Paludem Mæotidem inter & Peripheriam, omnium maximè conspicitur dilatatum: siquidem hæ duæ phases, non solum in Cancro, uti ex inscriptione patet, sed & circa limitem Austrinum observatæ.

CAPUT XXV.

DE LUNAE AD OPPOSITIONEM VERGENTIS PHASI.

Posteaquam igitur Luna oppositioni admodum appropinquaverit, maxima se se circa Montes Vallesque exserit metamorphosis. Nam quæ Valles antehac omnium erant nigerrimæ, tempore scilicet primæ apparitionis, illæ nunc clariore luminosioresque, quàm unquam alio tempore (cùm ipsis Sol quasi verticalis extat, sic ut rectà lumine illas perfundere possit) spectantur: Vallis nempe Ætna, Inf. Creta, Vallis Sinai, Inf. Besbicus, Vallis Sipyli, Didymi Maficyti &c. Verùm tamen non omnes Valles circa oppositionem æque clarè existunt: ratio est, quam jam supra capite 23. retuli: quòd nimirum in fundo non pariter omnes complanatæ, pariter ac scabrosæ sint. Accedit & hoc, quòd in illis nigricantioribus Vallibus, forsitan vastissimæ paludes, arundineta, fruticeta, nemoraque &c. extent, quæ cùm maximam partem radorum Solarium absorbeant, ita ut minimè omnes à superficie ejus minùs opacâ, ad nos reflecti possint: ita fit, ut obcuritas quædam exinde oriatur.

*De Insula
Rhodi colore,
formâq; pe-
reginâ.*

Nigricantes autem Maculæ, quæ hoc tempore, præter Maria apparent, Lacus sunt Paludes atque stagna, ut ex Tabulâ Selenographicâ adhuc clariùs conspicitur. Quas inter reliquas

Macu-

*Discus Lunae ad Oppositionem Vergentis.
Observata in 41. Gradu P.*

G. ED. A. N. S.

*Anno Christi 1644. Die 22. Janu. Hora 11 à merid. rom.
à Conjunctione 9. Die 14. Die 14. Cuae.*



19.

Ant. Scapont.

Maculas, Insulas, Valles Montesque, certa reperitur Insula, Rhodus nominata, quæ maximâ ex parte plana, atque æqualis, ac nullis Montibus est circumdata: hæcque speciem refert mirabilem, quàm sæpenumero haud parùm sum admiratus, dum nimirum hæc modò dicta Insula, à parte superiori sive Septentrionali, prorsus obscura nigraque apparet. Quod si verò id à parte ejus dextrâ, seu sinistrâ, accideret, Montibusque esset circumvestita, nihil foret admirabile: jam autem, cum ibidem nulli omnino videantur Montes, quemadmodum istud superiores observationes luculentissimè id attestantur; adhæc in verâ etiam id contingat oppositione, quòd à parte nempe superiori planè sit obscurata: fateor sanè, aliquid certi hac de re statuere, causamque genuinam, atque sufficientem hujus phænomeni investigare, esse admodum difficile.

Id extra omnem quidem dubitationis aleam positum est, Insulam hanc Rhodum, in vastissimâ palude esse sitam, quæ propemodum figuram Rhombi refert, ut ex omnibus phasibus videre licet, partem autem obscuram illius Insulæ inter paludes referre non possum, alioquin non posset esse sic nigra; sed similem cum circumjacente palude repræsentaret colorem: ideoque colligere aliter non possum, quàm partem illam dimidiam nigricantem illius Insulæ, aut esse nemorosam, aut aquosam. Si alius adfit, qui rationem magis convenientem invenire possit, profectò, tum mihi, tum omnibus Scientiæ cupidis, rem faciet gratissimam.

Radii autem albicantes, sive luminosi, qui circa Plenilunium in Oceanis Lunaribus, Insulis, continentique sparsim se se offerunt, nihil sunt aliud, ut jam antea referebam, quàm scopulorum series, præaltorumque Montium tractus, qui hoc tempore, ferè similem habent aspectum, ac nostri Montes excelsiores, æternâ nivì obsessi. Montium Lunarium verò clariorum tractus, præsertim ex Monte Sinai orientium, pariter esse nivosos, vix credibile: cum enim nullæ ibidem pluvix deprehendantur, sed continuè Cælum extet sudum, (si ita loqui liceat) facilè etiam colligere datur, nullas prorsus nives, in Lunâ generari posse: quòd autem aliis luminosiores spectentur,

De radiis albicantibus circa Plenilunium conspicuis.

In Lunâ nulla datur pluvia nec nives.

fortassis ab illorum materiâ, colore, asperitate, & situ convenientiori, proficiscitur.

CAPUT XXVI.

DE PLENILUNIIS, ALIISQUE REBUS SCITU DIGNISSIMIS.



*Pleniluniorum aspectus
semper variatur.*

HAud ægrè animo assequi licet, non omnia Plenilunia, quotannis singulisque Mensibus, unam omnino eandemque nobis exhibere faciem; ratione scilicet varii diversique motus Librationis disci, tam ex motu Lunæ longitudinis, quàm latitudinis descendens. Nam, quemadmodum omnes quadraturæ, imò & phases, ob hanc potissimum causam, mirum in modum variantur, librantur, distorquenturque; sic pariter & Plenilunia immutantur. Modò enim interstitium inter Paludem Mæotidem, vel Maræotidem, lumbumque Lunæ; modò ejus pars, sive Septentrionalis, sive Australis strictior, aliquando verò etiam latior conspicitur. Quæ præsertim ratio, me impulit, ut duos hoc loco in gratiam Astrosophorum exhiberem Plenilunii Iconismos, quorum prior, faciem Lunæ in Capricorno, circaque linitem Boreum existentis præsentat (nullo enim alio tempore hætenus, quàm æstivo circa Solstitium accidit; eapropter & illud Plenilunium Æstivum appellavi) posterior effigiem Lunæ in Cancro, circa linitem Austrinum versantis refert; quæ quia semper circiter Solstitium Hybernum huc usque fuit deprehensa: idcirco inde Plenilunium Hybernum dicitur. Ex quibus quidem duobus Iconismis, quilibet maximam & minimam librationem, ad Peripheriam animadvertendam, ejusque terminos, nullo negotio deprehendet.

*De primo
Plenilunio in
Capricorno
observato.*

Prima autem hic ostensa Lunæ facies, ut ex titulo ejus apparet, est illa, quæ circa Capricornum, & Linitem Septentrionalem fuit observata; circa Capricornum inquam, quod bene notetur. Hæc enim observatio, Anno Æræ Christianæ 1644. die 19. Julii, horâ 10. vespertinâ, in ultimò gradu Capricorni

ter-

Plenissimum Ferrum.
Obscuratum.
GEDANI.
In Quadrante Orientali, circa F. et Limit Bra.



tertioque latitudinis Septentrionalis; est suscepta; quo scilicet tempore Luna jam terminum minimæ librationis erat transgressa, quoniam ad initium Aquarii jam pervenerat: eamque ob causam, & interstitium illud inter Paludem Mæotidem, limbumque Lunæ aliquatenus latius animadvertebatur, quam si id Plenilunii, in ipso primo gradu Capricorni omnino; adhuc in maximâ latitudine Boreali, delineatum esset: tum enim Lacus uterque hyperboreus, non adeo foret à limbo remotus, ut quidem in hac delineatione deprehenditur; sed in ipsâ quasi peripheriâ spectaretur.

Quod verò in hoc ipso Plenilunio Maculæ tam valde videantur inclinatæ Subfolanum versus, ita ut Pontus Euxinus more solito elevatior appareat; hinc oritur: quia hæc observatio in quadranti Orientali, Nonagesimo in occidentali existente, habita fuit. Quæris autem, quare Plenilunium illud non exhibuerim in tali formâ, in quali videlicet circa Nonagesimum fuerit constitutum? scias itaque, quod jam antea quatuor figuræ circa Nonagesimum existentes, nimirum O, P, Q, R, hoc modo fuerint repræsentatæ; quapropter & Lunam aliter propius scilicet horizonti constitutam tibi offerre placuit.

De inclinatione hujus Plenilunii.

Necque inconvenienter hoc loco quaritur, postquam intellectum, constitutionem Macularum, sive totam disci inclinationem, in quadrante orientali, aliter spectari, quam in occidentali; an non ergo perpetuò facies Lunæ, sive situs Macularum, respectu perpendicularis nonagesimi gradus, sit prorsus eadem; nec non inclinatio Lunæ orientis, in quovis signo, graduque Eclipticæ constitutæ, ac insuper cum inclinatione occidentis omni tempore, minimè sit diversa?

Primò autem, quod Lunæ constitutionem in Nonagesimo attinet, facile conijcere potes, si illa, quæ passim multoties, in primis capite 18. circa quadraturas de illarum Sectionibus dicta fuerunt, probè perpenderit; impossibile esse, illam quovis tempore non variari: eo insuper attento, quod Sectiones quadraturarum, vel quod idem, perpendiculara nonagesimi, in diverso latitudinis situ, perpetuò mutantur. Quando verò Luna in utroque Limite versatur, perpendicularum ejus incedit, secundum

Inclinatio Lunæ, & in Nonagesimo variatur.

dùm figuram cap. 18. pag. 329. insertam : circa Nodum Ascendentem verò, magis occasum versùs, in superiori nempe peripheriâ inclinât : circa Nodum descendentem magis magisque per aliquot gradus ortum versùs. Hincque evenit, ut discus Lunæ, unâ cum Maculis, modò sic modò aliter, in Nonagesimo conspiciatur. Quæ in quantum variatio excurrat, ex capite jam dicto pariter deprehenditur : adeò, ut omnino Maculæ, ad lineam à Polo Eclipticæ per centrum Lunæ ductum, minimè constantem; sed in quavis latitudinis variatione, variabilem dispositionem obtineant, teste ipsâ experientiâ: ut ut Severinus Longomontanus aliam foverit opinionem, quàm lib. I. Theoricorum pag. 192. Astronomiæ Danicæ expressit.

In Quadrante Orientali & Occidentali major est Luna Inclinatio.

Variatur itaque hæc inclinatio Lunæ aliquantulum in gradu nonagesimo, verùm Inclinaciones orientis occidentisque longè majori mutationi sunt subjectæ. In circulo quidem Nonagesimo, tantùm ex diverso latitudinis situ descendunt; in ortu verò atque occasu, non solum ex diversâ latitudine, sed & longitudine proficiscuntur. Hæc autem, si rectè intelligi debeant, necesse est, ut scias, lineam illam, quæ perpendiculariter per centrum, & orbitam Lunæ fertur, per se (non verò respectu nostri, in quo multùm differentiæ est situm) semper esse immobilem, ut suprâ memini : & idcirco Luna, sive sit in ortu, Nonagesimo, seu occasu, nihilominus semper viam Lunarem, ad angulos interfecat rectos : indeque facilè præsumendum, Lunam in ortu longè aliter, quàm in occasu, & sic iterum vice versâ inclinari, prout angulus orbitæ Lunæ & horizontis fuerit acutior, sive obtusior.

Porrò etiam compertum habemus, hunc angulum admodum variari, eodem planè modo, ut angulus orientis & occidentis, cui affinitate est conjunctus : nisi quòd angulus orbitæ Lunæ & horizontis, majori adhuc variationi sit obnoxius, quàm Angulus Orientis, seu Occidentis. Quia enim orbita Lunæ Eclipticam in duobus punctis oppositis interfecat, sic ut pars ejus dimidia, magis Boream versùs altiusque, altera magis Austrum versùs, atque decliviùs extendatur : hocque modo angulus orbitæ & horizontis, jam major, jam minor, evadit

I.
Inclinatio Dantiocana,
Luna circa initium ☽, et ☿ existentis.




fig 8.

Aut Sculp.

dit, respectu anguli Eclipticæ & horizontis, præsertim extra Nodos : circa Nodum Austrinum, hic angulus quinque gradibus & aliquot minutis, minor est in ortu, quàm ipse angulus orientis : in occasu verò, tot gradibus aliquotque minutis major angulo occidentis. Circa Nodum Boreum autem, angulus hîc orbitæ Lunæ & horizontis, in ortu omnitempore quinque grad. & septendecim circiter minut. major existit, angulo orientis : atque rursus in occasu, tantò minor : secundùm quem, & omnes Inclinationes Lunæ disci variantur. Quò autem Lector scientiæ cupidus, hæc, quæ jam dicta sunt, eò meliùs percipiat, ipsemetque etiam quasdam Inclinationes & constitutiones Lunæ, tam in ortu, & nonagesimo, quàm occasu oculis lustrare possit; placuit in certis quibusdam casibus, diversas Lunæ Inclinationes in figuram scilicet S referre præsentem.

Juxta numerum 1, tres conspiciuntur Lunæ facies, quomodo inclinatur in ortu, nonagesimo & occasu, Lunam nimirum existente in primo gradu Libræ, atque in ipso Nodo Ascendente. Sub numero 2. in eadem situatione, disci constitutio sive Inclinatione conspicitur, cum nempe Luna in primo gradu Arietis versatur, Nodoque itidem Boreo. Prope num. 3. quando Luna in primo gradu Cancris seu Capricorni, pariterque in Nodo Boreo commoratur. Quam ratione autem has Inclinationes delineaverim, jam indicabo. Primò, necesse est, exploratum ut habeamus punctum illud verticale, vel perpendiculum Nonagesimi e scilicet seu e g : hoc quippe ut percepisti, ad aliquot paucos circiter gradus, respectu nostri & Eclipticæ aliquantulum variatur, atque libratur. Secundò, ad constitutionem Lunæ orientis, requiritur etiam, ut sit cognitus angulus orbitæ Lunæ & horizontis; qui si non ex certâ ad hoc negotium adornatâ Tabulâ excerpti poterit, oportet illum, speciatim computare: Quam verò viâ id aggrediendum, peritis obvium est; at reliqui in rebus Astronomicis parùm exercitati, id ex libris sphaericorum assequi possunt, quò illos ablegamus.

Explorato igitur hoc angulo, in figurâ præsentem ad num. 1. & quidem in ortu, c a b notato, simul quoque innotescit complementum ejus ad quadrantem sive 90. gradus, nimirum

Z z

a b g.

Diverse Inclinationes Lunæ Dantischemate exhibentur.

Indicatur ratio delineationis Inclinationis.

a b g. Dico itaq; præterea, angulum e a f angulo b a g, tanquam suo verticali prorsus esse æqualem : nam *anguli ad verticem inter se sunt æquales*, per Theor. 8. proposi. 15. I. Euclid. Quæ cum ita sint, propterea simpliciter tantummodo opus; anguli complementum orbitæ & horizontis, ad sinistram nempe in ortu, ab f incipiendo, sursum versus constituere : sic ut à puncto verticali e, ad f usque, non plures neque pauciores gradus quàm à dicto complemento comprehendantur. In quo casu hic Dantisci, quando Luna in primo gradu Libræ & Leonis versatur, invenitur angulus orbitæ & horizontis orientalis 64. gradus, & insuper aliquot minuta (qui nullo negotio innotescit, Lunâ existente circa Nodos, ex Tabulâ nempe orientis, & quidem ex simplici additione, vel subtractione, anguli orbitæ & Eclipticæ, angulique orientis vel occidentis, quorum prior semper quinque circiter æquatur gradibus) complementum igitur ejus ad quadrantem provenit 26. gradus. Huic æqualem, ab f usque e designo; quo facto, vera confestim Lunæ inclinatio est repræsentata.

Ad Inclinationem Lunæ occidentis inveniendam, eodem planè modo proceditur, excepto, quòd in hoc casu, non angulo orientis orbitæ & horizontis utimur, sed occidentis, à quo quinque illi gradus subtrahuntur : hic angulus occidentis, si ad orientis angulum conferatur, ferè perpetuò ei est inæqualis, ad instar angulorum orientis vel occidentis, horizontis & Eclipticæ. In figurâ quidem appositâ Lunæ occidentis ad Num. 1. Angulus orbitæ & horizontis c a b invenitur hic Dantisci circiter 12. graduum : à quo si subtrahas 5. restabunt 7. cuius complementum ad 90. gradus, scilicet b a g fit 83. grad. cui planè angulus e a f, tanquam verticalis est æqualis. Quod si igitur complementum illud anguli horizontis & orbitæ, occidentis, scilicet 83. gradus, ab f usque e, ad dextram constituatur, desideratam illicò habebis Inclinationem.

Quem item modum sub Num. 2. & 3. cum Luna in primo gradu Arietis, Cancri & Capricorni versatur, sequuti sumus. Ex quibus delineationibus satis superque videre est, cum hac disci Inclinatione, omnino aliter esse comparatum in ortu

ortu aliter iterum in occasu; non minùs verò in Librà, Ariete, Cancro, vel Capricorno, semper existere diversimodam. Interim non solum in his tribus duntaxat stationibus variantur; sed & in quovis gradu minutoque longitudinis; eoque magis vel minùs, ratione motus, Cuspillum Lunæ.

In gratiam autem Astrofophorum, hoc quoque loco Inclinationes Dantisfanas, tam Lunæ orientis, quam occidentis, in omnibus Signorum principiis constitutas (Lunâ scilicet versante circa Nodum Boreum) atque planè eo quem diximus, modo, delineatas apponere placet. Ex quibus utique, singulari cum animi voluptate, percipies, mirabilem Lunæ variationem & inclinationem, nec non, quomodo successivè alius atq; alius peripheriæ gradus, verticalis existat. Hincque haud difficulter colligitur, perpendiculum Nonagesimi, perpetuò se se in Quadrante orientali ad circulum usque Nonagesimum, plus plusque erigere: in Quadrante verò occidentali magis magisque inclinare horizontem versùs; ob variationem scilicet anguli verticalis orbitæque Lunæ horariam.

*Inclinationes
Lunæ Dantisfana
in principiis Signo-
rum, tam in
ortu quam
occasu exhi-
bentur.*

*Constitutio seu Inclinatio Lunæ Orientis, circa principia
Signorum, Nodumque Boreum, in horizonte Gedanensi.*



*Constitutio seu Inclinatio Lunæ Occidentis, circa principia
Signorum, Nodumque Boreum, in horizonte Gedanensi.*



Autor Sculpsit.

Expetisne autem quoque ad quamvis datam horam, minutamque, disci inclinationem Lunæ constituere? necesse est
Z z z igitur

ad quamvis datam hanc, invenire Inclinationem.

igitur ut primùm angulum circuli verticalis & orbitæ Lunæ ad datum tempus, aut ex peculiari Tabulâ, aut ex calculo trigonometrico, exploratum habeas: tuncque viâ prædictâ complementum ejus constitue, in Quadrante orientali ad sinistram, ab f usque e, ita habebis veram inclinationem ad illud ipsum præfinitum tempus.

Inclinatio ex diversissimis oritur causis, unde admodum est varia.

Ex quibus omnibus, quæ modò diximus, satis superque liquet, Inclinationes Lunæ, non solum ex motu longitudinis atque latitudinis; sed etiam ex diverso situ Lunæ, respectu Nonagesimi & horizontis variari. Neque his adhuc absolvuntur; siquidem Inclinationes Lunæ in diversis horizontibus, diversissimæ existunt: hoc est, pro diversitate Poli Elevationis, adhuc præter illam priorem variationem, magis magisque alterantur. Cæterùm, quantò locorum elevatio Poli est depressior, tantò hæc inclinatio evadit major (hoc est, tantò punctum nimirum verticale Nonagesimi magis horizontem versus, tam in ortu quàm occasu, inclinatur) ac rursus, quantò Elevationis Poli in quodam loco sublimior datur, tantò hæc inclinatio ibidem est minor.

Inclinationes rectè determinare, non parùm habet momenti.


Ex quibus denuo clarè patet, tam diversam esse Inclinationem, ut vix possibile, ob continuam variationem longitudinis, latitudinis, altitudinis Lunæ, Poli que elevationis, has sæpius memoratas inclinationes determinare. Veruntamen haud parùm conducere, ut quilibet, in horizonte quocunque degens, inclinationem Lunæ per omnes supra dictos casus, beneficio alicujus præfigurati Plenilunii, haud magno labore, & quidem ex tempore, sibi oculis subjicere posset: quippe non tantùm in Eclipsibus, sed & in reliquis omnibus Lunæ observationibus, magno certè res hæc foret adminiculo; quemadmodum inferiùs suo loco demonstrabitur.

Plenilunii versatili ope, universas Lunæ Inclinationes quocunque loco & tempore, repræsentare, docetur.

Hocque feliciter, sine ullo laboris & temporis multi dispendio succedere posse, si motus librationis non attendatur, præfente Plenilunio Brumali versatili, in eam gratiam adornato, jam jam commonstrabo. Antequam autem eò pervenire possimus, summopere opus est, ut tibi Tabulam Angulorum circuli verticalis orbitæque Lunaris, ad tuam Poli Elevationem supputes,

ad

Plenitium Beumale
 Obeoratum.
 GEDAR.
 Circa initium Cancris, et Limit Aust
 Sun. Eum. C. Longaerum.



21.

Peter Scheiner

ad singulos videlicet gradus longitudinis & altitudinis : id quod si tibi nimium molestum esse videatur, sufficit huic negotio, ad decem duntaxat gradus longitudinis, & ad singulas semihoras, sive horarum quadrantes, illam computare. Quam verò magni est laboris ejusmodi conficere Tabulam, tamque magnum rursum adfert commodum, tamque gravior nobis, oim illâ opus habemus, accidit. Hujus enim si non datur copia, multò certè molestius est, ad quamlibet inclinationem primùm supputare angulum. Tabulâ itaque probè confectâ, quære hujus beneficio, ad datum tempus locumq; Lunę, angulum circuli verticalis & orbitæ Lunæ, ad quem eruendum, duplici parte proportionali opus erit : quo factò, in extremo diviso circulo ab A sursum, C punctum nonagesimum versùs, tot dinumera gradus, quot anguli complementum comprehendit; si nimirum Inclinationem Lunæ orientalis desideres : postmodùm, cum hæc figura ita sit præparata, ut circumagi possit, sinistrorsum eam obverte, quoad de tribus superioribus punctis unum (quæ inter 30. & 40. gradum conspiciuntur) ultimum dinumeratum gradum anguli complementi tangat. Rogitas autem, quodnam punctum horum trium hîc debeat attendi? respondeo : si Luna in Nodo Austrino commoretur, necesse est, ut omnium orientalius ad 37. gradum situm, apprehendas; medium, si circa Limites versatur; atque illud occidentale ad 31. gradum conspicuum, quando Luna circa Nodum Boreum existit. Quod si scire etiam expetis situm inclinationis Lunæ in quadrante orientali; dinumera tot gradus à B, C versùs, ut priùs factum, quot anguli complementum verticalis orbitęq; Lunę possidet; tunc dextrorsum Zephyrum versùs hunc Plenilunii Iconisimum circumvolve, usque dum iterum unum, ex illis tribus superioribus punctis, quod tum temporis necesse habes, ad ultimum dinumeratum gradum constituitur; quibus peractis, genuinam tempori dato locoque Lunæ respondentem inclinationem planè tenes : ex quâ illicò percipies, quinam gradus peripheriæ illo tempore in nonagesimo extet, nec verò minùs quænam loca, Valles Montesq; cum puncto nonagesimi C, centroq; Lunæ in unâ rectâ sint constituti, quod quidem ad-

miniculo talis fili serici accuratè examinari poterit. Cui verò bono commodoque hoc esse possit, suo reservabitur loco dicendum.

Postquam igitur hæc satis, ut arbitror, de variatione inclinationis Lunaræ diximus, non absolum erit, ad reliqua, quaestionesque aliquas ad Plenilunium spectantes accedere. Primo enim quaeritur: an Sol quovis tempore, praesertim Plenilunii, mediam exactè partem Lunæ illuminet? negatur. Quamquam minimè diffiteor, si sphaera luminosa sphaera opaca aequalis fuerit, quòd media quoque pars opacæ à mediâ luminosâ illustretur, per proposit. 45. lib. v. Optic. Aguilonii; vel, ut loquitur Alhasen lib. de Crepusc. N. 2. & Vitell. lib. 2. proposit. 26. atque Aristarchus Samius in lib. de Magnitud. & intervallis, Solis & Lunæ: *Si sphaericum luminosum illuminet opacum aequale: hemisphaerium illuminabit.* Posteaquam verò Sol orbe Lunari longè est major, ideoque & majorem medietate partem illustrat, vi propositionis 46. lib. v. Optic. Aguilonii: *Si sphaera luminosa major fuerit opaca, à minore parte lumine major pars illustrabitur,* vel ut utar verbis Alhas. lib. de Crepusc. N. 3.: *Si sphaericum luminosum illuminet opacum minus: plus hemisphaerio illuminabit.* Quod non minùs à Vitellione lib. 27. & Aristarch. Sam. lib. de Magnit. & intervall. Solis & Lunæ corroboratur. Oportet igitur terminum illuminationis esse circulum, minorem tamen eo, qui in sphaerico Lunæ corpore maximus describitur. Hic verò circulus illuminationis non perpetuò est ejusdem magnitudinis; sed paululùm variat, ratione Solis à Lunâ distantiae: quantò autem fuerit major, tantò minor pars illa illuminata de corpore opaco existit. Cùm itaque hic circulus, tempore Plenilunii sit omnium maximus; sequitur lege quadam certâ, partem Lunæ plenæ illuminatam, esse omnium minimam. Hæc autem verba, propriè loquendo, æquivalent illis, quæ jam proferam: Lunam nunquam minùs illustrari, quàm cùm est plena. Quod vulgus vix unquam sibi persuadebit; hac enim in opinione hæret: Lunam in Plenilunio maximè Solis fulgore perfundi. Verùm toto sic aberratur Cælo; ignorato, quòd corpus opacum sphaericum, à luminoso sphaerico majori & remotiori, minùs; à propinquiori verò,

an quovis tempore totum profus hemisphaerium Lunæ a Sole illuminetur?

Luna nunquam minùs, quàm cùm est plena, illuminatur.

verò, licet æquali, plus illuminetur : quod abundè satis Optici, præferim Franciscus Aguilonius lib. v. prop. 48. Optic. demonstravit, his verbis : *Sphæroides luminosum majus è propinquo, ampliore partem opaci irradiat, quàm è remoto.* Hoc æque corroborat Vitell. lib. 2. prop. 23. Cùm igitur Luna orbe plena, semper sit quàm maximè à Sole remota (quando nimirum terra interponitur) quàm ante vel post oppositionem, inprimis tempore conjunctionis, quo differentia ferè 120. semidiam. æstimatur; sequitur ergo, ut modò referebam, Lunam nunquam minùs, quàm, cùm est plena, illuminari : eapropter & circulus illuminationis, id temporis omnium est minimus. *Quanta autem revera sit pars Lunæ illuminata, circulo maximo seu minimo existente, Astronomi viâ diversâ docent, cognitâ videlicet distantia utriusq; Sideris datisq; diametris, investigare, inter reliquos Erasmus Reinholdus, in Commentario super Theorias Peurbachii fol. 165. partem illam ad circulum usque illuminationis determinat, quòd nimirum sit grad. 189.45. min. sic ut Luna 9. grad. supra partem dimidiam illuminetur. Acutissimus verò Kepplerus in Astronomiâ Opticâ cap. 6. n. 3. pag. 231. hoc non solum in dubium vocat; sed & partem circuli illuminati, longè esse minorem apertè demonstrat, quòd nimirum sit grad. solummodo 180. min. 31. sec. 20. quando nova, atque in Apogæo versatur; umbrosa verò pars, nempe residua, grad. 179. min. 28. sec. 40; at Lunâ in perigæo versante, posse arcum illuminatum esse grad. 180. min. 28. sec. 12.*

Interea tamen totam hanc à Sole illustratam partem, hemisphærio majorem in Plenilunio non conspicimus, quoniam scilicet corporis illuminati Lunarum, diameter visibilis major existit, quàm spatium illud, inter utrumque oculum nostrum (tum enim circulus visionis hemisphærio est minor) secundum propof. 70. iv. Vitell : *Linca connectens centra amborum visuum, si diametro spheræ convexæ minor fuerit; minus hemisphærio est, quod videtur.* Ratione verò distantia inter oculos nostros, & corpus illuminatum, circulus visionis decrescit, ita ut majorem partem, de parte Lunæ illuminatâ tum temporis spectare liceat. Hæc autem ita esse Aguilonius confirmat, prop. 44. lib. v. Optic. his

ver-

*Quanta sit
pars illumi-
nata Luna?*

*Quò minus
Luna à Sole
illuminatur,
eò plus de eâ
cernitur.*

verbis : *Externum signum luminosum, majorem partem sphaera remotioris irradiat quàm propinquioris.* Hincque colligitur, quòd de Luna in Apogæo plus spectetur, licet à Sole minus illustretur : in Perigæo autem plus illustretur, & minus cernatur. Maxima verò pars quæ unquam in Apogæo à nobis videtur, semper ut jam suprâ memini, hemisphærio est minor, sicuti pars à Sole illuminata, semper hemisphærio major existit. Circuli autem visionis & illuminationis, qui inde oriuntur, æque distant à peripheriâ circuli majoris, & sub ipsum verissimæ oppositionis momentum, distat uterque circulus undique circiter 30. minutis.

*Quam diu
perfectâ Ple-
nilunium du-
rare possit?*

Quamdiu igitur circulus visionis, circulum illuminationis nondum tangit, tam diu Luna accuratè profusque plena rotundaque apparet. Unde Vitellio quidem atque Reinholdus concluderunt; Lunam plenam & per duas integras horas invariata ratione decrementi persistere posse, priusquam videatur decrefcere; quemadmodum id Kepplerus refert, loco jam suprâ citato. Verùm huic sententiæ ibidem pag. 237. omnino refragatur Autor modò dictus, inquires : *nunquam nec visum esse, nec videri posse ullum perfectum Plenilunium ; tantùm abest, ut unum Plenilunium duas horas duret.* Porrò cùm autem sint maximè notabilia atque longè ingeniosissima, quæ de his omnibus is ipse in sequentibus profert; idcirco ipsiusmet verba hoc loco adjiciam : *Etenim, quia semidiameter umbræ æquat duas semis Luna semidiametros, additâ unâ Luna semidiametro ; ut contra Luna & umbræ spatium justum ex pers. umbræ admittant, conficiuntur circiter 64. aut 66. scrupula : totidem necesse est, Lunam abesse à Solis opposito, seu in longum, seu in latum ; nisi umbram delibare velit. At tanto spatio distans ab oppositione, jam fit interseclio circulorum illuminationis & visionis : quia hi in distantiâ Luna & oppositi loci Solis 30. scrupulorum se mutuo tangunt. Aut igitur nequit impleri Luna ob latitudinem Boream vel Austrinam, aut si potest impleri, articulos peragrans oppositionis, priusquam impleatur, deficere incipit, umbram terræ subiens. Nisi fortè distanti in Boream parallaxi Austrina, vel contrâ, subveniat.*

*Kepleri hac
de re opinio.*

Hæc autem quàm acutè tam verè profectò sunt dicta, quam paulò obcuriùs. Sensus verò genuinus hic est : quando luminarium oppositio circa Nodos accidit, tunc Luna suo centro perquam vicina est Eclipticæ, in quâ tum temporis simul centrum umbræ terrenæ versatur, cujus diameter circiter 64. vel 65. min. existit. At Luna non citiùs plena rotundaque peni-

penitus spectatur, quàm donec 30. tantùm minut. prim. à puncto opposito Solis, vel centro umbræ est remota, ubi duo illi circuli visionis & illuminationis se mutuo ampliùs interfecare desistunt: priusquam autem eadem trigefimum minutum à puncto opposito Solis attingit, necessum est ut jam umbram stringat; ejus namque diameter ad 66. minut. prim. se se extendit: sic ut citiùs ad umbram appellat, quàm lumen suum totale acquirat. Rursum, post oppositionem, antequam ex umbrâ egreditur, iterum decrefcere incipit: semidiameter enim umbræ 36. minutis major est, quàm distantia à puncto Solis opposito, ad terminum usque interfectionis duorum istorum circulorum visionis & illuminationis. Quod si verò Luna tempore oppositionis majorem latitudinem habeat, aut Borealem aut Australem semidiametro umbræ, sic ut umbram sine attactu, vel à parte superiori, vel inferiori, præterire possit; nihilominus & eo tempore minimè foret undique plena: siquidem latitudo tunc multò foret major, quàm illa prædicta distantia 30. minorum: in quo interstitio, Luna solummodo accurate plena rotundaque apparet. Quò autem major foret latitudo, eò plus limbus superior, vel inferior decrevisse videretur. Ita, ut revera propriè loquendo, Luna, sive sit circa Nodos, limites, sive distantiam inter mediam, perpetuò citiùs decrefcatur, priusquam justè plena evadat. Impossibile itaque, ut ullo tempore plenariè rotundum verumque Plenilunium, ut ut etiam sit exigua pars illa deficiens, dari possit.

Hocque præclarissimus Kepplerus, felicissimi ingenii ope ex certis indubitatisque rationibus sic colligere potuit, persuasus, partem illam Lunæ Plenæ deficientem adeò esse tenuem, ut planè conspici non possit. Sed ego ei (pace tanti Viri) adverfor: quippe qui ex observationibus, atque oculari experientia longè aliud didici: quodque licet pars illa nempe deficiens admodum sit exilis, ut facilè colligitur, nihilominus tamen omni tempore in Lunâ Soli opposita satis sit conspicua; non quidem nudis oculis, sed adminiculo longi atque perfecti Telescopii. Vix autem memini, me ullo tempore, discum Lunæ, ab omni parte lumine repletum, accurateque rotundum Plenilunium

Nulla tempore perfectum plenilunium conspiciatur.

Num pars illa Plenilunii deficiens oculis deprehendi queat?

animadvertisse ac observasse, ut non ab unâ vel alterâ parte, five superiori five inferiori, (quamvis interdum pars esset valde exigua) particula quædam luminis adhuc desideraretur: unde nonnunquam insignis scabrities, in ipso etiam oppositionis articulo se offerebat. Lunâ quidem versante prope caudam, vel caput Draconis, plerumque in orientali vel occidentali parte aliquid deficiebat: circaque Limitem Boreum, limbus Australis haud parùm erat scabrosus: in limite autem Austrino, contrâ peripheria Borealis minimè erat plena, & ab inæqualitate penitus libera: quò verò major vel minor dabatur latitudo, eò pars deficiens major minorve deprehendebatur. Ejusmodi exempla, atque observationes quàm plurimas hoc loco possem producere; ne autem Benevolum Lectorem multis morer, tantùm aliquot exhibebo: cùm capite sexto jam partim quarundam facta fuerit mentio.

Observatio prima.

1. Anno Æræ Christianæ 1644. die 21. Aprilis, horâ 11. vespertinâ, quartâ ante veram oppositionem; Luna non solum in limbo orientali nondum prorsus lumine erat completa; sed simul à parte inferiori Australi jam notabiliter erat aspera. Ratio hujus rei hæc est, quòd tum temporis latitudinem Septentrionalem $3\frac{1}{2}$ grad. obtinuerit.

Observatio secunda.

2. Anno 1645. die 5. Septembris, horâ 10. vespertinâ, 4. ante veram oppositionem, limbo iterum orientali admodum existente scabroso, pars superior & inferior satis rotunda lævisque spectabatur: quia latitudo Australis tantùm circiter $1\frac{1}{2}$ gradum adæquabat.

Observatio tertia.

3. Anno 1645. die 5. Octobris, horâ octavâ vespertinâ, sextâ post verum Plenilunium, non tantùm Luna in latere occidentali; sed & in peripheriâ Boreali supra Mare hyperboreum, haud parùm decreverat. Hoc autem tum inprimis maximèque erat animadversione, atque admiratione dignum; quòd, tametsi Luna in limbo occidentali jam satis tuberosa lacunosaque esset, tamen hoc non obstante, verticem notabilem atque maximè conspicuum alicujus excelsissimi Montis, in ipsâ peripheriâ orientali offerebat. Ex quibus clarè patet, quòd in ipso limbo manifestè Montes & Valles, beneficio alicujus præclari Tubi,

bi, animadvertere licet; quemadmodum jam antea capite sexto à nobis fuit demonstratum. Partem autem superiorem peripheriæ non mediocriter extitisse anfractuosam, exinde ortum traxit, quòd latitudo Lunæ Australis, eo tempore graduum fuit 4½.

4. Anno 1645. die 8. Junii, horâ 12. ante verissimum oppositionis momentum, pars illa Euroaustralis à Lacu Maræotide usque ad Montes Dalangueros vehementer erat aspera atque inæqualis, ac minimè undique plena, & rotundata. Horâ 12. post veram oppositionem, die nimirum 9. Junii, jam ipsa peripheria Notozephyrum versus, à Lacu Meridionali usque ad Paludem Mæotidem, itidem admodum erat inæqualis & sinuosa; præter hanc autem asperitatem, totus Lunæ ambitus extremus æquabili quodam tractu spectabatur: adeo ut hæc asperitas, parsque deficiens à limbi parte Euroaustrali, per Austrum Notozephyrum versus, se se promoverit. Unde utique conficitur, tempore veræ oppositionis, maximam Lunæ inæqualitatem in ipso Limbo Lunæ inferiori Australi fuisse conspicuam: Luna enim tum temporis versabatur circa Limitem Boreum, ut ita haud aliter quam sic fieri potuerit.

*Observatio
quarta.*

5. Anno 1646. die 29. Aprilis, horâ nonâ vespertinâ ipso Plenilunii articulo, Limbus Lunæ ferè undique erat rotundatus, nisi quòd solummodo in parte Lunæ magis Australi notabiliter scabrosus, atque flexuosus existeret; quæ asperitas ad 90. circiter gradus se se extendebat: ratio est, quòd Luna eo tempore latitudinem quinque graduum acquisiverat, limitemque Borealem affecuta fuerat.

*Observatio
quinta.*


Ex quibus certè observationibus apertè elucet, quando Plenilunium accidit circa Nodos, Lunam, aut in limbo orientali, aut occidentali, non profus esse plenam; sed omnino scabrosam atque asperam apparere. Existente verò Plenilunio in limite Boreo, tunc à parte Australi, scilicet inferiori, ejusmodi inæqualitas animadvertitur. At si circa limitem Austrinum illud observetur, rursus in parte superiori Boreali, pars quædam deficiens limbi deprehenditur: quæ scabrities jam major jam minor existit, ratione scilicet Lunæ majoris vel minoris latitudinis.

*Pro diversa
Pleniluniorum
latitudine,
modo hæc,
modo alia
pars limbi
scabrosa de-
prehenditur.*

dinis. Nunc autem hac de materiâ nihil ampliùs superest dicere, quàm ut hæc, quæ modò dixi, schemate declaremus, ut cuilibet Selenographiæ tironi, genuina hujus rei ratio non menti tantùm pateat, sed & ipsis oculis subjiciatur.

Quod sibi-
mate decla-
ratur;

Igitur in præsentè diagrammate lineæ A d c esto Ecliptica, c Sol, d Terra, vel locus visionis; A, Luna in Eclipticâ scilicet circa Nodos constituta; B, Luna in limite Boreo exi-



itens; C verò in limite Austrino: omnes lineæ à Sole ad Lunam tendentes, c e nempe & c f, sunt lineæ illuminationis; e f basis pyramidis illuminationis. Lineæ ab oculo nostro d, ad Lunam usque properantes, lineæ sunt visionis, g h basis pyramidis visionis: pars illa à lineis illuminationis comprehensa, tantùm à Sole illuminatur; & quæ à lineis visionis continetur, à nobis tantummodo cernitur. Apud A, Lunâ existente circa Nodos, bases pyramidis in unam coincidunt lineam, quam ob causam eo tempore nihil quicquam de Lunæ hemisphærio tenebricoso spectatur: & idcirco periphæria ejus illo ipso tempore accuratè lævis, atq; rotundata necessariò apparet. Circa limites verò, bases pyramidum illuminationis & visionis, se mutuò interfecant; sic ut aliter esse non possit, quàm ut nobis aliqua particula de obscurato hemisphærio latente objiciatur: quamobrem eo tempore Plenilunii, periphæria non penitus plana atque rotunda, sed ex parte tuberosa asperaque, respectu oculi apparet. Circa limitem Boreum deest particula que-

dam

dam de parte inferiori, nempe Australi: sicuti in parte inilluminatâ f h hic videre licet. In limite Austrino jam limbus superior non videtur planè lumine impletus; quemadmodum pars tenebricosa e, g. apertè notat; quod erat demonstrandum.

Inde verò haud vulgaris oritur quæstio, quam breviter ante conclusionem hujus capituli enodabo: an nimirum asperitas illa, atque pars deficiens peripheriæ, tam in uno, quàm altero limite, ejusdem semper magnitudinis à nobis spectetur? Respondeo, quòd non. Hoc autem nonnullis mirum videbitur. Cùm enim Luna tum in limite Boreo, tum Austrino, æquali distantia ab Eclipticâ removeatur, excepto eo, quod in illâ statione tanto spatio supra Eclipticam, quantò in hac infra existat; cur non etiam pars deficiens peripheriæ Australis circa limitem Boreum, alteri parti peripheriæ Borealis circa limitem Austrinum omnino æquetur? Quòd autem id secus eveniat, ex parallaxi altitudinis proficiscitur. Nam, uti percepimus capite septimo, ratione hujus parallaxeos Luna ad integrum circiter gradum perpetuò deprimitur: sic ut Lunâ versante in ipso limite Boreo, integro gradu humilior appareat; hincque visibilis distantia ab Eclipticâ tantò etiam redditur minor. In limite verò Austrino pariter per integrum gradum, ex vero illius loco deprimitur; unde distantia ab Eclipticâ tantò fit major, quantò in casu priori facta erat minor. Differentia itaque duos adæquat gradus, quòd nimirum Australis distantia ab Eclipticâ, sive latitudo, major apparet: quapropter & pars deficiens Plenilunii, circa limitem Australem, ex necessitate se se nobis major exhibet, quàm circa limitem Septentrionalem. Præterea & hoc inde sequitur, quòd Luna circa Nodos constituta, nunquam, quoad peripheriam superiorem, prorsus plena rotundaque spectetur; siquidem per integrum gradum respectu nostri, ut etiam antè inculcatum, eo tempore fit declivior. Quando verò Luna in latitudine Boreali unius gradus deprehenditur, tum parallaxeos beneficio exactè in Eclipticam locatur, quo tempore, cùm superior,

tum inferior ejus limbus, undique æquabilis,

plenus, rotundusque

apparet.

A a a 3 CA-

Nam in utroq; limite, semper eadè Plenilunii asperitas deprehendatur.

CAPUT XXVII.

DE LUNAE AB OPPOSITIONE RE-
CENTIS PHASI.

*Non statim
primâ die de-
crefcere Lu-
nam alii fla-
tuerunt.*

Multi quidem è Clarissimis Viris, ut Fran-
ciscus Aguilonius, Josephus Blancanus, & alii, hac in opinione
fuerunt; non statim primâ die decrefcere Lunam; sed decre-
mentum Plenilunii exacti, vix altero, imo nonnisi tertio post
oppositionem die, posse deprehendi: sicuti ille pag. 410. 414.
415. lib. v. Optic. hic verò pag. 72. circa finem cap. 3. lib. 9.
difertè scribit: idque inde ratiocinando colligunt, quòd nimi-
rum statuunt, latitudinem inter circulos illuminationis, & visio-
nis utriusve lineas terminantes esse permagnam; unde omni-
no Luna tam diu luminis plenitudinem retinere potest, usque
dum hi duo circuli se mutuò interfecent.

Hanc autem existimationem non solum hac phasi manife-
stè refutare possumus, cum in 30. horarum spatio post opposi-
tionem notabiliter decreverit; sed & ex illis capite præcedente
circa finem prolatis itidem contrarium patet. Nam uti dixi-
mus, atque à Kepplero etiam est abundè demonstratum, latitudo
inter circulos illuminationis & visionis, non superat 30. minu-
ta; quare Luna lumine plena, vel periphèria ejus undique ro-
tunda ac æqualiter terminata, minimè per duas horas, nedum
per biduum aut triduum, durare potest. Imò ex capite priori
liquidò constat, vix ullum unquam perfectum Plenilunium vi-
deri posse, in quo ambitus circularis ejus, ab uno vel altero la-
tere non præcisus imminutusve esse deprehendatur: verum
de his satis.

*In quâ parte
limbi Luna
decrefcere in-
cipiat?*

Jam circa phasin hancce, ubi primùm Luna decrefcere inci-
pit, utique percontatio talis ponetur: utrum Luna perpetuò
in latere dextro lumen amittat, nec ne? Quæ quidem interro-
gatio primâ fronte videri potest supervacanea: quia omnes &
singulæ phasès Lunæ decrefcentis confirmant, decrementum
ejus omni tempore ab occasu incipere, veluti incrementum
sem-

*Plagus Lunae, et Occultatio weneris
Occurrit, in 21^a Jorda II, circa horam A.*

G. D. A. G.

*Anno Christi 1643, Die 26 Novemb. hora 11 e merid. nun. et
Oppositione veis 6. Duri 2 Current.*



Summary :

semper ab ortu definit. Nihilò tamen minùs, contrarium ut prohem annitar : primum nimirum Lunæ decrementum non semper in occidentaliori parte, verùm modò in parte limbi Boream, modò Corum, modò Zephyrum, modò Notozephyrum, modò etiam Austrum versùs initium capere. Cujus quidem rei argumenta atque probationes, maximâ ex parte, in capite præcedente continentur; cùm verò aliam planè ob causam ibidem productæ, aliisquæ rebus applicatæ fuerint, necessarium erit, illas aliquatenus repetere.

Atque istis, quæ capite superiori diximus ac demonstravimus, nullum unquam verum omnino & undique rotundum Plenilunium dari posse, Lunamque citius decrescere, quàm undique lumine impleri, concessis, videtur hæc quæstio proposita prorsus per se quasi corruere. Nam, quia incrementi Lunæ nullus ferè finis, idcirco & nullum decrementi, rectè loquendo initium dari potest. Si verò umbram terrenam tempore Plenilunii, Lunâ circa Nodos versante, removeamus, perinde ac si ibidem in loco suo non existeret; tunc Luna, in tali casu, non solùm omni ex parte plena fieri potest, sed & per temporis aliquod spatium (ut ut etiam sit exiguum) pleno undique lumine, ambituque extremo æquabili permanere, & postmodum demum decrementi facere initium : quo tempore (quod bene notandum) quando nimirum Luna est circa Nodos, ultimum peripheriæ illuminatum punctum, quo completur, planè in oriente existet, & per consequens etiam primum decrementi punctum, sive ejus initium, perfectè in occasu.

Quum autem Luna prope limitem versatur Austrinum tunc, propriè loquendo, ut paulò antè referebam, nec finis, neque initium Lunæ crescentis vel decrescens, animadvertitur; quamprimum namque Luna oppositionis puncto appropinquat, pars illa obumbrata scabrosa peripheriæ, se se paulatim Arcæpeliothem versùs promovet; postmodum tempore veræ oppositionis in Septentrionem, & deinde mox Corum, denique sensim Zephyrum versùs pergit : sic ut pars illa residua obscura Lunæ crescentis, dum continuo cursu, se se per Lunæ partem superiorem extendit, in partem deficientem Lunæ decrescens trans-

mute-

mutetur. Itaque sanè initium Lunæ decreſcentis, in limite Auſtrali, nequaquam incipit in occaſu, ſed potiùs in parte limbi, quæ Arctapeliotem, vel etiam Boream verſùs, ſpectat.

Quando verò Luna, tempore Plenilunii, circa limitem Boreum commoratur, tunc pars Lunæ creſcentis deficiens orientalis, primùm in Euroauſtrum, deinde per Auſtrum in Notozephyrum, & denique rectà in occaſum tendit; quemadmodum ex ſuperioribus citatis obſervationibus, capitũ præcedentis, præſertim ex quartâ, Anno 1645. die 8. Junii obſervatâ, clarè ac apertè perſpicitur: ſic, ut denuo eo ipſo tempore decrementi, initium Lunæ decreſcentis, in Euroauſtro, vel Auſtro obſervetur, & neutiquam perpetuo in occaſu; quod erat probandum.

CAPUT XXVIII.

DE LUNAE DECRESCENTIS PHASI.



*De Vallium
umbrâ.*

His in phaſibus decreſcentibus, cum primis in adjunctâ optimè ac perſpicuè conſpicitur, quomodo in Vallibus, Montium umbræ in partem obverſam ſe ſe contulerint, reſpectu umbrarum Lunę creſcentis: id enim temporis in parte Vallium occidentali, nunc verò in orientali ſpectantur. Ad hæc in omnibus ante oppoſitionem phaſibus, umbra quotidie paulatim contrahitur, breviorque redditur: quam ob cauſam Valles illæ pedetentim tunc luminioſiores exiſtunt. Poſt oppoſitionem verò, Luna cum decreſcit, umbra indies creſcit, longiorque evadit: ideoque & Valles, paulatim umbroſiores videntur: quippe confinium obſcuræ & illuminatæ partis, ſingulis momentis illis magis magisque appropinquat. Hocque manifeſtum eſt in Inſulâ majori, Maris Caſpii; eſtque enim illa certè multò obſcurior hodie quàm fuit die proximè præcedente: & ſic cum omnibus lacuſis, ac tuberoſis partibus eſt comparatum.

Confiniumque hujus faciei Lunæ, jam ſatis denticulatum anfractuofumque ſpectandum ſe exhibet; & in parte umbroſâ, areolæ quoque clariores quàm plurimæ ſe ſe offerunt, præſer-

Placis Lunae Descrictio.
Obfervata in 4 Gradu 30' tam circa puncto intermedio, qm. lina A.
C. E. D. A. P. G.
Anno Christi 1643, Die 27 Novemb. hora 11 à merid. romane.
ab Oppositione vero 6. Diei 3 Curant.



23.

luna Sulpas.

fertim circa paludem Mæotidem, quæ infallibili argumento sunt, celsissimos innumeros Montes circa limbum occidentalem extare. Supra Lacum verò hyperboreum superiorem, vastissimus sinus in Lunam admodum extensus cernitur; hicq; perpetuò in ejusmodi Lunæ constitutione, quando videlicet in signis illa versatur Solstitialibus Æstivis, conspicitur: at in Hybernis nullo modo deprehenditur, cum eo tempore pars Lunæ superior, valde sit coarctata: unde etiam evenit, ut hic sinus in ipsammet peripheriam transferatur.

Motum librationis disci quod attinet, faciliè colligere datur, cum Luna prope initium Cancræ, & limitem Austrinum existat, quòd & interstitium inter Paludem Mæotidem & peripheriam amplissimum, & maximè sit dilatatum; è contrario interstitium inter lacum Maræotidem atq; limbum illo ipso tempore, nunquam esse possit strictius: quemadmodum non solum hæc effigies Lunæ, sed & Plenilunium Brumale, Phasis 21. 24. & 30. Lunæ Bifectæ in primo gradu Cancræ observatæ confirmant. Tametsi verò illud prædictum spatium valde spectetur eo tempore tenue, nihilo tamen minùs, stagnum Miris nunquam à Lunæ limbo occultatur, verùm semper manet conspicuum, quemcunq; Luna etiam occupet locum Eclipticæ, dummodo à Sole illustretur.

Denique & hoc animadvertendum; cum hæc phasis in Cancro accidit, seu, cum interstitium Mæotidis est maximè amplum, quòd confinium lucis & umbræ, duos tum minimùm requirat dies, priusquam ad ora paludis Mæotidis, vel Montes circumjacentes pervenire possit, ut clarè hîc patet: contra, quando similis Lunæ facies circa Capricornum contingit, in uno certè die eo usq; dictus terminus lucis, ut faciliè est intelligere, promovetur: interstitium enim tunc strictius est, quàm, cum in Cancro versatur. Sed in reliquis signis intermediis, quòd à Capricorno magis removetur, eo plus requirit temporis confinium, ad littus Paludis Mæotidis assequendum.

CAPUT XXIX.

DE LUNAE GIBBEROSAE DECRE-
SCENTIS PHASI.

Uemadmodum à primâ Quadraturâ usque ad oppositionem, sectiones luminosæ & umbrosæ partis, indies magis magisque curvatæ gibberosæque fiunt continuæ: simili modo rursum post oppositionem, ad ultimam quadraturam usque, indies obtusiores, rectioresque paulatim spectantur: id quod dilucidè omnino tam in antecedentibus, quam

*Quare Palus
Mæotis in hac
Phasi, quasi
abrupta à
continenti vi-
deatur?*

consequentibus apparet Iconisimis. Inprimis autem meretur, hujus figuræ confinium ut diligenter observetur, propter res alicujus momenti, maximè circa istud conspicuas, præsertim Paludem Mæotidem, quæ à continenti quasi videtur esse abrupta: imò, attento hoc phænomeno, ferè dubitandi datur occasio, num etiam Palus Mæotis aquis comparari possit propter illas duas admodum profundas lacunas, quæ se se in eâ conspiciendas præbent: quod certè in aquis planitiem referentibus nunquam fieri potest. Quocirca summopere est necessarium, ut hac de re plenius agatur, & disquiratur; utrùm scilicet phænomenon hocce quædam Valles sive concavitates efficiant, nec ne? Ego quidem me non levibus duci argumentis mihi videor, quod alia subfit rei hujus ratio. Nam primò ex phasibus corniculatis, præsertim tertiâ, satis superque innotuit, quòd Palus Mæotis, circumcirca, cum primis in latere orientali, innumeris Montibus celsissimis sit septa, qui omni tempore obscuram atque densissimam (cùm scilicet confinium ad ejus littora appropinquat) de se spargunt in partem contrariam umbram; quo fit, ut pars illa Paludis, in quam hæc umbra cadit, undique tenebricosa appareat, perinde ac si esset pars ipsa Lunæ obscura, vel Valles quædam præaltæ: hincque porro prope terminum lucis hæc umbra longior videtur, quàm in distantiam remotiori. Quòd autem non ubique umbra æque latè diffusa cernitur, fortassis ex diversâ Montium Alanorum altitudine proficiscitur.

Inter-

Pleura Lunae Gibbosa Decrescentis.
Observata in 20 Gradu E.

G. D. A. S.

Annus Christi, 1643. Die 29. Novemb. hora 3^a i media nocte sum.
et Oppositione vix 7 Diei + Cursum.



24.

J. J. J. J.

Interdum autem in tali Lunæ constitutione, in superficie paludis parvulæ nigricantiores Maculæ se se offerunt; itemque pars confinii paludem determinans, haud æquabili quodam tractu conspicitur, sicuti Anno 1644. die 17. Decemb. horâ primâ antemeridianâ factum: quæ apparentia pariter ex modo dicto fundamento oritur. Dum enim diversi Montium Alanorum vertices, superficiem paludis aliter atque aliter obumbrant, fieri potest, ut non solum modo dicta superficies, Maculis hinc inde conspersa, sed & confinium ex parte anfractuosum, & inæquale videatur. Sed areola illa clarè illuminata, quæ adhuc in termino paludis conspicitur, Insula est Alopecia; extra quam, prorsus nulla in totâ palude deprehenditur.

Quantum sit ratio, quid Macula non nunquam in ipsâ superficie Paludis appareant?

Jam magnus ille semicirculus supra hanc paludem conspicuus, est Vallis Montium Riphæorum; in quâ certa cuspis altissimi Montis se se detegit. Quin & variæ nigriores Maculæ sectioni lucis imminentes haud obscurè confirmant, superficiem lunarem undique versum tumoribus ac lacunis esse conspersam.

De cætero in hac phasi, nihil ampliùs occurrit notatu dignum, nisi quod à 18. usque ad hanc ipsam Lunæ faciem, nunquam non duæ minores Maculæ in Valle luminosâ Ætnâ spectentur: quæ certo indicio sunt, aut loca paludosa, aut nemorosa ibidem extare, quæ alio tempore minimè in obtutum veniunt; contrâ verò, tunc punctum quoddam satis clarè illustratum, in medio istius Vallis se se conspiciendum exhibet;

quemadmodum Iconismi omnes ad unum id testantur.



CAPUT XXX.

DE LUNÆ INCURVATAE DECRESCENTIS PHASI.

IN præcedentibus Lunæ Iconismis, post oppositionem hæctenus delineatis, nulla propemodum notabilis mutatio, quoad Montes & Valles fuit deprehensa: at in præfente, ubi Luna magis decrefcit, confiniumque longiùs in eam extenditur, Valles respectu umbræ, admodum mutatae magisque conspicuæ, quàm circa oppositionem, se se offerunt. Rursum pars Lunæ livescens, circumdans Montem Sinai, aliàs desertum Zin dicta, à primâ statim die illuminationis, in omnibus à decimâ quintâ nimirum phasi computatis huc usq; semper unam eandemque nigricantem refert faciem: cum tamen oræ finitimæ semper modis diversis mutantur, ac varientur. Quænam hujus rei sit ratio, & qualia sint loca, mox mox ex sequentibus figuris patebit: quòd nempe locus sit tuberosus, atque lacunofus, undique Montibus atque concavitatibus refertus. Idque manifestè testantur, inprimis tres illæ quadraturæ decrefcentes, trigefimâ scilicet phasis, trigesima prima & secunda: quòd Mons nimirum Sinai, ab aliis Montibus depressioribus sit planè circumdatus. Ejusmodi autem loca præ aliis perpetuò nigricantiora apparere, hinc fortassis oritur, quòd ibidem paludes atq; nemora (vel hujus generis aliud quidpiam) extant, quæ ad reflectendos Solis radios minùs sunt idonea, quàm alia loca superficie opaciori constantia. Qualia adhuc in Lunâ quàm plurima dantur alia, è quorum numero non infimum locum tenet pars illa, quæ Montem Horminium cingit: pariter namq; illa semper obscurior, perinde ac desertum Zin conspicitur. Inter omnia autem reliqua loca, præ aquis liventia, & præ continenti nigricantia, principalis est, qui Monte Apennino, M. Argentario ac Mari Mediterraneo clauditur, Montibusque Ligustino & Montuniatè insignibus est præditus. Hicque locus non ex innumeris collibus tumoribusque, adin-

star

*De partibus
quibusdam
livescentibus:*

Plaga Luna Emurpate Decrescentis.
Observata in 13° Grada N. circa Aequinoctium et 13.
G. D. A. N. Y.
Anno Claudi 1644. Die 23 Julii, hora 2 a medie nocte num.
et Oppositione vers 8; Dies 4 Curr.



25.

Aut. Sculpit.

star deserti Zin, constat, sed valde est paludosus; id quod ex eo præsumitur: cum respectu coloris sit immutabilis, reliquæ verò partes, desertum scilicet Zin, & pars livescens, quæ Montem Horminium ambit, sæpenumero colorem, formam, figuramve transmutent.

CAPUT XXXI.

DE LUNAE IN ORBEM INSINUATAE
DECRESCENTIS PHASI.

More Veterum, Phases istas in aspectu Trigonico observatas, pariter & in Orbem insinuatas appellavit; in quarum numero & præsens habenda: cum quatuor duntaxat horis ante verum aspectum fuerit delineata. Insuper, quemadmodum sectiones Trigonorum Lunæ crescentis, uti cap. 21. dictum, certos suos terminos limitesque observant, inter quos omnes illorum sectiones reciprocantur; sic quoque est comparatum, cum confiniis Trigonis Lunæ decrescens. Extremus omnium terminus, centro Lunæ vicinissimus, conspicitur, quando Trigonus in Capricorno versatur; tunc enim hæc sectio, à parte superiori incipiendo, per Montes Sarmaticos, inter Montem Carpatem & Peuce, prope Promontorium Hippolai transit, hincque per Insulam Cyaneam, Apoloniam minorem, plagam orientalem Montis Moschi versus, per Montes Uxios & Dalangueros fertur, tempore nimirum veri aspectus: quod si verò aliquot horis post vel ante observaretur, minimè terminis hæc sectio responderet. Adhæc & motus cuspidum, statò tempore differentiam & variationem quæ in superiori, quæ inferiori peripheriæ parte infert; quam tamen hoc loco, ut ratio temporis habeatur, non attendimus.

*De Trigonis
& illorū sectionum terminis.*

Alter terminus extimus oppositus Trigonorum, quando à centro omnium maxime remotus & limbo est vicinus, existit circa initium Cancris; quo tempore Montes Macrocmnios, Sinum Cercinitem, M. Berosum, Paludem Bycem, Insulam Aëam, Mont. Caucaum, M. Coibacaranos & Dalangueros

transgreditur. Quod si autem, in alio atque alio Signo, hic Trigonus observetur, tum & illius sectio hujus vel illius termini vicinior, vel remotior conspicitur: sicuti in hoc confinio clarissimè elucet. Quia enim hic Trigonus circa initium Arietis accidit, idcirco & hujus sectio illis duobus terminis neutiquam respondet: interim tamen jure viâ intermediâ incederet. Quòd autem aliquantulum occidentalior hic appareat; ex eo proficiscitur, quòd, quatuor integris horis citiùs, priusquam verus aspectus contigerit, Luna fuerit observata.


Cæterùm, circa hoc confinium luminis & umbræ, id maximè est notatu dignum; cur videlicet duæ illæ cuspides illuminatæ partis, non verum observent perpendicularum, uti quidem necessariò deberet? inscriptio enim clarè indicat, hanc ipsam phasin, circa Nonagesimum esse adumbratam. Quòd autem hîc Luna aliam ratione inclinationis referat faciem, nullo ex alio fundamento, Benevole Lector, oritur; nisi, quòd dum sculperetur, casu paululum de loco sit mota, indeque vitiosam inclinationem acquisiverit: quò minus verò id malè interpretari possis, idcirco te lubens de hoc admonere volui.

Præterea Insulam Macram non instar reliquarum Vallium, in ipso confinio existentium, prorsus umbrosam nigricantemque; verùm aliquantò livescentiorem, luminosiorēque spectari; hinc, ut facilè colligitur, evenit, quòd, dum pars ejus orientalis Pontum Euxinum versùs, non adeò præaltis Montibus est stipata, ut quidem pars ejus occidentalis, umbra inde multò densissima, ac nigerrima procreatur.

Infra etiam Insulam Macram, in littore Ponti Euxini, per multæ luminosæ areolæ, ac semilunulæ videntur, quæ evidenti sunt argumento, illo in loco, innumeras miræ altitudinis rupes, Montesque esse sitos.



Præter Lunæ in orbem incruentæ Decrescentis.
Observata in 29º Gradu N. circa Hærag. Bergi et C.
GBDAGH.
Annæ Christi 1644. Die 24 Julii, horæ 3 à media noct. sum.
ab Oppositione vixit 9. Diei 5 Curæ.



26.

Acti 3. Julii

CAPUT XXXII.

DE LUNAE GIBBOSAE DECRE-
SCENTIS PHASI.

Dimetientem Lunæ visibilem, in Apogæo, loco remotissimo, omni tempore minimam, & rursus in Perigæo, loco vicinissimo, maximam à nobis spectari, omnibus rerum Cœlestium Studiosis, ex capite septimo satis superque innotuit. Verùm hanc diametrorum differentiam Lunæ visibilium, ex istâ variâ distantia ortam, in hisce Iconismis Lunari-
bus minimè observavimus, nec operę pretium duximus, diametrum respectu apparentiæ, perpetuò variare: eo attento, quòd hoc pacto delineatio, & explicatio Iconismorum magis magisque confunderetur. Quam quidem ob causam, in phasium figuris multò potius, certam diametrum visibilem constitui, quam & in posterum semper retinui; nec turbari me passus sum, Lunam circa horizontem tam ortivum quàm occiduam, quoad diametrum, multò majorem apparere, quàm in situ elevatori, vel alto Cœlo: cum sit apparentia, seu hallucinatio duntaxat visus. Unde autem hæc oriatur, & quænam hujus rei vera sit ratio, meretur, hac datâ occasione, ut fusiùs dicatur?

*De apparenti
Lunæ diamet-
tro.*

Duæ quidem in primis rationes occurrunt. Prima est, quoniam circa horizontem perpetuò densiores dantur vapores, quàm in situ excelsiori. Proinde, si Luna per ejusmodi crassiores exhalationes aspicitur, necessariò nobis videtur major, quàm per rariore observata. Radii namque ex medio rariore venientes, in medio densiori franguntur, & quidem ad perpendicularium; quo fit, ut angulus visionis major reddatur: hincque etiam Luna major apparet, vi illius Optici axiomatis Capite 2. citati. Quo autem hi vapores densiores, eò refractio & anguli dilatatio evadit amplior: & proinde itaque, quia circa horizontes in situ depressiori Lunæ, quàm elevatori vapores crassiores & densiores sunt; idcirco omnino necesse est, ut diameter ejus, in ejusmodi vario situ jam major, jam minor appareat.

Altera ratio est, quòd hujus diversæ apparentiæ diametro-

rum

Pro diversis gradibus latitudinis & Luna modo major, modo minor apparet.


rum Lunæ, à pupillâ nostrâ procreentur. Quod tamen si rectè intelligi debet, primùm scire oportet, pupillam, sive foramen pupillæ à DEO Omnipotente, non semper ad unam eandemque retinendi magnitudinem esse creatam; sed ita comparatam, ut nullo labore, modò se se comprimere, modò dilatare possit; dilatata quidem, oculo in medio clariori, comprimere verò, eodè in medio obscuriori constituto. Namq; nisi diversi lucis grad. non nihil formam magnitudinemq; pupillæ certa quâdam proportione variarent, ut, scilicet vel multùm vel parùm lucis in oculũ, cum primis in tunicam retinam intromittatur, retina illa vitium facillè contraheret, visusq; ipse conturbaretur: ut aliquando id accidit, luce nimis forti, vel vehementi imprudenter admissâ.

Pro pupilla latitudine & Luna modo major, modo minor apparet.

Hoc verò nonnullis mirum videbitur, præsertim illis, qui nunquam id observarunt, atque diversam oculi dilatationem conspexere: verùm enim vero id nullo negotio quilibet hominum suimet oculi experimento discere potest; si nimirum pupillæ suæ rationem, primò, quidem in loco quodam tenebricoso, postmodum autem in lucidiori constitutus diligenter consideraverit. Quò igitur major pupilla, eò plures radii in oculum transferuntur, & sic per consequens etiam quodlibet objectum necesse, ut majus appareat, quàm cum foramen pupillæ magis compressum, atque minus existit. Propterea igitur, quia, circa horizontes, ratione crassiorum vaporum, Luna quodammodo hebetata conspicitur; hinc necessariò evenit, pupillam, interveniente debiliore imbecilliorique lumine dilatari, ita ut discus Lunæ visibilis in tunicâ retinâ major formetur, quàm elevatione Lunâ, circa meridiem, extra crassiores densioresque vapores, constitutâ: quo tempore vividiori clariorique lumine est prædita, per quod pupilla plus plusque constringitur, sic ut non possit non esse, Lunam inde majorem apparere. Qui autem in hanc sententiam specialia plura desiderat, legat, si velit, primam & secundam Epistolam de apparente magnitudine Solis humilis & sublimis, Ingeniosissimi Petri Gassendi: quâ occasione, & planè alium proponit modum diametrum Lunæ multò correctiorem, scilicet per umbram investigandi: ibidemque pariter demonstrat, umbram Lunæ nocturno tempore minorem atque graciliorem esse, quàm deinceps

ceps

Plena Luna Gibbosa Occidentis.
Obscurata in 57 Gradu N. prop. d. et Arg. 5.
G. P. A. S.
Anno 1648, Die 31 Decemb. hora 3 a media noct. numer. et
Oppositione vers 20, Diei 6 Curr.



Aut. S. S. S.

ceps in aurorâ, atque, per auroram, iterum majorem & latiorrem, quàm postmodum, Sole multùm elato, cùm tamen contrarium potius animadverti deberet: unde autem id eveniat itidem ibi ab ipso affatim explicatur. Inter cætera verò sic inquit (quod observatu dignum) *tametsi Luna minor interdum ad oculum quàm per noctem appareat, apparere tamen adhuc majorem, quàm reverâ sit octavâ ferè diametri parte: ut comprobatum habeo, per expositum organum, quod perinde ac oculus, non est tot fallaciis obnoxium.* Epist. 1. pag. 8.

Faciem Lunæ ipsam quod attinet, dignum utique est, ut ab Astrophilis ipsis, beneficio exquisitè fabrefacti Tubi observetur, articulatinque consideretur; quippe circiter hoc tempus, diesque mox subsequentes, res quamplurimæ, maximaque variatio in Lunâ deprehenditur, tam quoad Montes & Valles, quàm confinia lucis & umbræ. Inprimis hoc valde notabile, quòd sectio in hac adjectâ figurâ Pontum Euxinum non æqualiter, sive æquabili tractu terminet, ut quidem jure deberet, cùm hic locus oceanum, seu aquam, vel si mavelis planitiem, repræsentet: quod ego huc usq; non habui quò referrem aliò, nisi ad loca diversa paludosa in Ponto Euxino, & quædam vadosa, prætereaque ad Insulas quàm plurimas hinc inde extantes, quæ talem exiguam asperitatem in confinio procreare sanè non nequeunt.

At maxima termini lucis scabrositas quæ Pontum infra Euxinum animadvertitur, nimirum illæ valde remotæ cuspides, à Monte Moscho originem trahunt; qui certè ob miram altitudinem, ut ex illis clarè illuminatis areolis, in parte umbrosâ existentibus apparet, inter reliquos Lunares vix est postremus.

CAPUT XXXIII.

DE LUNAE GIBBAE DECRESCENTIS PHASI.

Sæpenumero profectò accidit, ut similes sectiones, ratione Macularum tractus, in diversis phasibus, diversoque tempore, tam Lunæ crescentis, quàm decrescens obser-

*Hac figura
est quasi com-
plementum
nonæ.*

serventur. Simile quidem exemplum oculis modò obverfatur, cujus confinium propemodum ab omni parte, confinio nonæ phaseos crescentis est æquale; perindeque, ac si modò dicta nona, hujus præsentis complementum fit ad integrum hemisphærium: illa die septimo, post Luminarium Synodum, hæc verò tot diebus post veram oppositionem est adumbrata. Jam hujus sectio luminosæ & umbrosæ partis, dividit Montem Serrorum, M. Carpatem, (quod visu admodum est jucundum) Pontumque Euxinum, prope Sinum Peronticum, Promontoriumque Archerusiam, & quidem in lineâ rectâ, pertransit; illius nonæ scilicet phaseos confinium, æqualiter ita terminatur: hoc tamen discrimine, quò Montes Carpates & Serrorum in hoc Iconismo, paululùm majores appaerant, quàm in illo nono. Ratio est, Lunam tunc temporis in Capricorno non procul à limite Boreo extitisse, ut evenerit, quò illi occidentiores, Septentrionalioresque Montes, peripheriæ viciniore facti fuerint: & hinc paulò minores strictioresque spectentur. At in hac figurâ longiùs à limbo distant, & contrâ viciniùs centro sunt constituti: Luna namque hic in Leone, atque circa Nodum Boreum observata, quapropter & majores apparere necesse est.


Adhæc, sectio in hac phasi paululùm obtusior videtur, quàm in illâ; ratio autem est eadem: quò nimirum hujus confinium per motum librationis disci (quippe Luna in Leone) centro viciniùs fuit constitutum, quàm illius, cùm in Capricorno versaretur.

*De Maculis
nigricantibus
Ponti
Euxini.*

Maculæ autem illæ nigricantiores in littore orientali Ponti Euxini, speciem quidem Vallium concavitarumque referunt, quemadmodum in phasi 24. in Palude Mærotide deprehendimus: verùm nullæ ibidem extant lacunæ; sed umbra solummodo est nigerrima, quæ à sublimibus Montibus (catena Mundi appellatis) plagam Ponti orientalem circundantibus, in hoc Mare spargitur; hincque evenit, ut diversa loca, in quibus umbra terminatur, nigriora atque obscuriora appaerant.

CAPUT

Præse Luna Gibba Decrescentis.
Observata in 27 Græda & tem circa Apog. qm. dd.
G. D. A. N. G.
Anno Christi 1643. Die 2 Decemb. hora 4 i med. noct. num.
ab Oppositione veis 33. Diei 7 Current.



28.

Acta Script.

Plurimae Lunae et Quadraturae proprietates.
Observatae in 29 gradu N. prope Angl. & S.

G. E. D. A. G.

Annus Christi 1644. Die 1 Januarii. Hora 3 a med. noct. un. ab
Oppositione vers 20. Diei 7 Carr.



29.

Autore Scilicet

CAPUT XXXIV.

DE LUNÆ AD QUADRATURAM PRO-
PERANTIS PHASI.

PRæfens Lunæ facies, parùm aut ferè nihil differt à præcedente, tum, quoad locum Eclipticæ, in quo observata ac delineata, tum quoad motum librationis; nisi quòd sectio propiùs ad centrum accedat. Hæc enim phasis aliquot horis ætate est major, quam ob causam, nec duo illi Montes Serrorum & Carpates, ampliùs in hujus figuræ confinio conspiciuntur; verùm eo in loco, nunc tantùm duæ spatiosissimæ cavernæ supersunt, perinde ac si Montes prædicti radicitus essent evulsi, imò vix crediderim, ibidem unquam extitisse, nisi illos priùs conspexissem.

*Quid sibi ve-
lunt dua illa
caverna, in
sectione lucis
conspicua?*

Itidem Maculæ illæ obscuriores in parte orientali Ponti Euxini conspicuæ, etiamnum nigricantiores, amplioresque apparent; id quod evidentissimè illa, quæ capite 33. sunt prolata corroborant; nimirum esse eas nihil aliud, nisi umbram ab illis Montibus sublimiter erectis, productam.

Inter reliqua verò confinia phasium delineatarum Lunæ decrefcentis, illis quadraturarum exceptis, hoc omnium minùs est curvatum, ad lineamq; rectam sese conformat; cùm ante veram quadraturam, non adeò diu fuerit delineatum: quamvis Luna sæpissime tantùm temporis minimè sibi deposcat, ad lineam usque rectam, hoc est, ad quadraturam perveniendi, uti ex phasi Lunæ Bisectæ constat, quæ quinque circiter horis hac sectione est junior, quæque quodammodo adhuc gibba deprehenditur. Hoc autem ex diversis oritur causis, prout Luna tarda, seu velox, in signis Solstitialibus Æstivis, vel Hybernis commoratur, motusque librationis fuerit comparatus, de quo jam antea diximus. Jam Propontidem infra Pontum Euxinum, adeò esse asperum atq; scabrosum, hinc oritur: quia ibidem primùm littus incipit illuminari; quod, cùm undiq; Sinubus atque promontoriis sit refertum, utiq; fieri aliter non potest, quam ut ejusmodi apparentia spectetur.


C c c 2

Insu-

Insula Besbica, hîc ultimùm se se conspiciendam præbet; verùm multùm contractior, quàm cùm Luna orbe pleno collucescit: contrà hoc loco est nigricantior, quàm ullo tempore fieri possit. Plerùmque etiam reliquæ univèrsæ Valles circa confinia existentes, minores arctioresq; paululùm conspiciuntur, quàm in oppositione; eò quòd circa sectiones luminis & umbræ, solùm Vallium fundi quasi videantur; circa verò Plenilunia, Valles unà cum circumjacentibus Montibus cernuntur, qui pariter ac illæ, æquè clarè à Sole illuminantur.

CAPUT XXXV.

DE QUADRATURIS ULTIMIS.

Uare Sectiones Quadraturarum tam Lunæ crescentis, quàm decrescantis, in delineatis Iconisimis, non perpetuò per verum transeant centrum ejus, nec in iisdem Lunæ faciebus semper pars illuminata parti obscuræ, sive hæc illi; sit magnitudine æqualis, id suprâ capite decimo octavo de quadraturis Lunæ crescentis initio fuit à me enodatum; simulque est additum, quòd, propriè loquendo, si Luna per se consideretur, sectiones quadraturarum continuè per centrum ejus transeant, Lunam bifecent, nulloque tempore pars ejus illustrata, alteri obscuræ, vel hanc illi, quoad magnitudinem, & latitudinem sit inæqualis, quàm propemodum parte admodum exiguâ. Ex quibus hoc in primis oritur: quòd Luna nunquam planè bifecetur, si rem accuratè expendas. Quanta autem pars ejus illustrata, seu obscura reverà sit, & num omni tempore prorsus eadem nec ne? id in præsentè capite investigare, & explicare constituimus.


Luna nunquam prorsus bifecatur.

Initio; apparentem Lunæ splendorem in quadrato aspectu semicirculo majorem esse, maximâ ex parte colligitur ex capite 26. ubi circa Plenilunia probatum fuit, cùm Sol, tanquam corpus illuminans, major sit Lunâ corpore illuminato, quòd ideo & pars ejus illustrata, hemisphærio sit major. Hocque non solùm tempore Plenilunii accidit; sed & nunquam non

alio

Placidus Lunae Bifidae Diversifcentis.
Offerrate in 3 Gradu S.

1644.
Annus Christi 1644. Die 23 Septemb. hora 3 a med. noct. num.
ad Oppositionem vero 15 Diei 7 Curr. Temp. nim. vera D.



alio tempore, quam etiamcunq̄ue Luna nobis referat faciem : sic quoque evenit, partem illustratam, tempore veræ quadraturæ (quia circulus illuminationis tunc pariter medium, vel maximum circulum transcendit) in Lunâ Bifidâ, aliquantò majorem existere parte obscuratâ; illamq̄ue lineam rectam in quadraturis conspicuam, non omnino per centrum ferri. Verùm hunc partis illuminatæ excessum supra quadrantem, non admodum esse notabilem, sed valde exiguum, hinc probari potest, quòd (ut pariter Kepplerus comprobat in parte Astron. Opticâ cap. 6. n. 8. pag. 246.) tantummodo 15. sit secundorum; interim tamen non omni tempore manet idem, verùm variat in omnibus ferè quadraturis, secundùm Lunam in Apogæo vel Perigæo existentem. In perigæo pars illa est omnium maxima, in apogæo omnium minima, vi illius Theor. Optici: *Spheroides luminosum majus è propinquo ampliolem partem opaci irradiat, quàm è remoto.*

Ex iis igitur, quæ jam proposuimus, partem videlicet illuminatam quadraturarum majorem esse parte umbrosâ, sequitur sanè & hoc; confinium quadraturarum Lunæ crescentis, ad centrum sive terminum sectionis, citiùs & prius pervenire posse, quàm vera contingat quadratura. Rursum in Ultimis quadraturis, primùm post veram quadraturam, confinium luminosæ & umbrosæ partis, usq̄ue ad centrum se se promovet. Idq̄; ratione temporis quidem, paulùm adfert momenti; (diximus enim differentiam illuminatæ & umbrosæ partis, propemodum esse exiguam, atq̄ue vix notabilem) interea tamen reverà aliqua hic datur discrepantia, qualicunq̄ue illa sit proportionis ratione.

Porro autem demonstrant Optici, quòd quemadmodum sectio Lunæ falcata, vel gibbæ, est elliptica; sic dimidiatæ, necessariò quidem recta apparere debeat; idque ex verbis hinc Vitellionis lib. IV. prop. 76. clarè deprehenditur: *Basi pyramidis visionis spheræ interfecante basim pyramidis illuminationis, ita, ut ipsorum axes angulum rectum contineant: communis earum sectio est quarta superficiei sphericæ: videtur autem in majori distantia plana superficies unâ rectâ lineâ & semicirculo contenta.* Persuadet autem sibi Kepplerus lineam hanc non omnino esse rectam; observasse se namq̄; ait Anno 1602.

Nonnunquã certis de causis sectiones quadraturarum vel promoveniunt, vel retardantur.

Linea Quadraturæ terminans est recta.

die 21. Decemb. cornu Lunæ superius paululum inferiori acutius. Sed cum ista ejus observatio absq; perspicillo fuerit peracta, idcirco planè existimo, hallucinationem fuisse visus; siquidem ad ejusmodi res minutissimas discernendas, nudus oculus nullatenus sufficit.

Possibile, ut cornu alterum modò acutius, modò obtusius existat.

Quando verò Lunam consideramus, tanquam corpus montosum, & Vallibus collibusque undiquaque stipatum, tunc non solum hoc vel illud cornu, modò acutius, modò obtusius, sed & tota linea sectionis Lunæ Bisectionis diversa spectatur: propter diversam scilicet asperitatem illam, quàm ex omnibus quadraturis exploratam habemus. Quòd verò plerumque cornua inferiora acutiora appareant: eò accidere, quippe quòd ibi plures altioresque dentur Montes; idque tribus hisce Lunæ dimidiatæ phasibus egregiè palàm facientibus. Quam tamen differentiam, non nisi oculo probè armato minimè deprehendes: ut hinc rectè mihi videar colligere, Kepplerum hoc phænomeni, haud unquam accuratè animadvertisse.


Quæritur an pars illuminata visibilis quadraturæ, major sit quartâ Lunæ parte?

Postquam autem probatum fuit, partem illuminatam visibilem quadraturarum, paululum esse majorem parte umbrosâ, jure insuper hinc quæritur; an etiam necessario sequatur, partem illam illuminatam majorem semper esse quartâ parte corporis Lunaris? Et videtur hoc quidem primâ fronte ita fieri debere: Sol enim plus quàm hemisphærium Lunæ illustrat. Quod si hoc verò rectæ rationis trutinâ examinetur, atque accuratè perpendatur; statim elucescet, partem illuminatam quadraturæ, necquicquam majorem, neque minorem, quartâ parte corporis Lunæ, unquam dari posse. Non quidem inficias eo, circulum illuminationis, circulum maximum transcendere; contra verò, ut jam suprâ demonstravimus, circulus visionis hemisphærio est minor, tantò scilicet, quantò illuminationis est major: idcirco quantò de illo latere, ubi basis illuminationis confinium constituens versatur, plus cernitur; tantò de altero latere iterum minùs (ubi nimirum circulus visionis quadraturam semicirculo finit) conspicias. Sic ut demum tuto statuere liceat, partem quadraturarum illustratam, nullo tempore, vel majorem, vel minorem quartâ parte superficièi sphericæ Lunæ, existe-

Plume Quæstura Linc.
Obvoluta in 10 gradu N. prope dō et Angl̄:

C. D. A. N. Y.

Annus Christi 1673 Die 3 Decemb. hora 5 à med. noct. nubes
ab Oppositione vdie 12 Diei 8 Curr. 3 antè veram Quæst.



existere posse. At pars obscura Lunæ Bisectæ perpetuò est minor, parte illuminatâ; ut & minor quartâ parte superficiei Lunæ sphericæ. Circulus namque visionis in latere obscurato, itidem est hemisphærio minor; circulus autem illuminationis, cum supra partem dimidiam in obscuratâ terminetur, ideo & lege quadam certâ minor omnino constitui debet.

Parti Luna dimidiata, umbrosa nobis obversa, semper existit minor parte illuminatâ.

Insuper autem adhuc alia circa has quadraturas occurrit quæstio; *cujus phaeseos momentum facilius cognoscatur?* respondeo, quòd Lunæ dimidiatæ: aliquot enim horarum spatio multum mutatam ejus phasim deprehendimus, sic ut circa quadraturam, sectio ejus modò curvata, modò recta, modò iterum gibba appareat, cum prope centrum contingant: quò verò longius à centro, peripheriæque viciniùs accidunt, eò tardiùs variantur. Nam, etsi arcus diurni illuminationis quotidie in superficie Lunæ sunt æquales; nihilo tamen minùs circa centrum apparent majores, quàm prope peripheriam; quia tunc rectiùs ibidem visui objiciuntur, ad limbum verò obliquiùs spectantur. Unde necessariò conficitur, quòd sectiones illuminationis circa quadraturas citiùs velociùsque, quàm alio unquam tempore reliquarum phasium, mutantur, atque cognoscantur.

Cujus phaeseos momentum facilius cognoscatur?

Explicatis verò quæstiunculis hisce, ad tres sequentes quadraturas hìc delineatas transeamus. Primam quod attinet, Anno Æræ Christianæ 1644. die 23. Septemb. horâ 3. matutinâ adumbratam, trigesimam scilicet in ordine, ea notatu atque consideratu certè est digna. Est enim illa, quæ vix multòrum Mensium absolutis periodis in obtutum venit; cum non solùm tempore veræ quadraturæ, verùm etiam in ipso primo gradu Cancrì, limiteq; Austrino observata fuerit: quo tempore confinium omnium occidentalium, quod unquam in Lunâ apparet, respectu Macularum, motusque librationis disci animadvertitur; pariter & maximum interstitium inter Mare hyperboreum limbumque Lunæ, ut & minimum, inter Paludem Maræotidem limbumque repræsentatur. Quæ sectio minimam partem aquarum pertransit, & tantùm per Mare hyperboreum atque Propontidem, (in quo scilicet Propontide semilunula

Phasi 30.

con-

conspicitur, quæ pars est Insulæ Besbicæ) hincque confinium hoc admodum sinuosum atque flexuosum spectatur, figurâ ipsâ comprobante. Quin etiam in hac phasi Montes insigniores, in optimâ & maximè conspicuâ formâ, deprehenduntur: quippe valde vicini existunt lineæ luminosæ & umbrosæ partis, imò partim in ipso confinio, Antilbanus scilicet, Olympus & Didymus conspiciuntur. Hic autem ultimus jure nomine illo græco à me fuit appellatus, quod idem significat ac geminus, quandoquidem non tantum ad pedem Montis Sipyli est situs, sed & huic quoad figuram, situm atque magnitudinem, prorsus æqualis, perinde ac si Gemini essent; quarum certè Vallium pares, vix in totâ Lunâ ullibi reperies.

Phasis 31.


Altera quadratura Lunæ decrefcentis, in ordine nempe trigesima prima, diverso planè tempore, diversoque in Eclipticæ loco observata; quapropter & diversam omnino refert faciem. Sectio ulterius Subsolanum versûs vicinîusque centro animadvertitur: interstitium ad Paludem Maræotidem limbumque multò est latius: Luna enim in decimo gradu Virginis, propè Nodum Boreum, tribus horis ante quadraturam adumbrata, qualem phasin dimidiatam bis quotannis, quâ sectionem motumque librationis deprehendes. Tu verò adhuc sic forsitan cogitabis: quid audio, nonne quadratura decrefcentis, pariter tantum quotannis semel in Virgine reperitur, sicuti & duntaxat semel in Cancro vel Capricorno? Hoc equidem non disputo; verum quemadmodum Lunâ existente in Cancro, confinium in extremo termino occidentali versatur, atque in Capricorno, in extremo termino orientali, sic quoque maximè differunt. Contrà in Ariete & Librà, differentia ratione interstitii nulla (præsertim quando Nodi in his signis versantur, sicuti in his proximis annis præterlapsis, atque etiam in hoc casu contigit) animadvertitur. Nihil itaque refert, num Arietem vel Libram Luna occupet; confinium namque easdem transgreditur Maculas, cum in his locis Signiferi idem sit motus librationis. Proinde, quia ejusmodi similis constitutio bis quotannis accidit; aliter utique fieri non potest, quam quòd duæ ab omni parte æquales quadraturæ in conspectum veniant.

Secundò, faciamus esse quòd Luna occupet Geminos, Cancrum

Planus Lune Viridus Decrescentis.
Observata in 28 F. in partibus intermed. non procul V.

G. B. D. A. S.

Anno Christi 1645. Die 19 Januarii, hora 4 a med. nocte sumes.
et Observationes vero 30, Dies 9 Curr. 3 ante vesperam □.



crum vel Leonem; tu verò quadraturam non ipso tempore veri ipsius aspectus observare possis, ut sæpius fit, sed primùm quartâ vel quintâ horâ elapsâ: tunc rursus deprehendes in Lunâ ferè simillimam luminis sectionem, ac si in Ariete vel Librâ esset constituta. Porro quod si Luna in Sagittario, Capricorno vel Aquario commoretur, ejusque quadratura primùm die sequenti manè incidat, tum denuo confinium, respectu Macularum, propemodum erit unum idemque: sectiones enim istæ, uti jam suprâ dictum, celeriter admodum se se variant. Ex quo sanè fundamento affirmare licet, ejusmodi quadraturas, hujus figuræ 31. haudquaquam dissimiles, quotannis quamplurimas, contingere posse.

Similiter, cum *Quadræ Lunæ crescentis*, est comparatum. Qualem namque speciem in Ariete, vel Librâ præ se ferunt, ratione confinium, talem equidem & in aliis signis, si tardiùs vel citiùs aliquot horis, respectu veri aspectus, delineentur, referre possunt. Hoc tantùm interest, si Luna in Cancro versetur, necesse est, ut tardiùs, si verò in Capricorno, citiùs aliquot horis, observatio sit peragenda; sic namque termini luminosæ & obscuræ partis, prorsus æquales extabunt.

Pòst, inter Montem Apenninum, Ligustinum atque Montuniatem, duæ amplissimæ cavernæ spectantur, quæ magnam partem Apennini quasi avellunt; sic, ut tres notabiles culpides circa finem ejusdem Montis sint conspicuæ: quod phænomenon clarè demonstrat, & huic Apenninum Valles habere præaltas: tametsi alio tempore existimes, hunc Apenninum, continuâ serie extensam esse rupem; cum plerumque umbrarum penè sit expers, valdeque claro gaudeat lumine.

Sed Maculæ nigricantiores, in latere occidentali istius Montis conspicuæ, non nisi umbræ sunt, à verticibus erectorum Montium Apennini, procreatæ.

Cæterùm, & hæc apposita quadratura, figura scilicet 32. ut diligenter expendatur operæ præmium est. Exhibet enim talem sectionem, qualem videre rarò nobis obtingit: quippe Luna non tantùm in Capricorno, sed & circa Nodum descendentem observatur. Ex cujus delineatione, tum extimus terminus

Phafis 32.

D d d

nus

nus orientalis confinium quadraturarum, tum motus cuspidum, sive confinii inclinatio, Lunâ existente in Nodo Austri-
no, fit planè conspicuus: ita ut ex hac, & 30. phasi, duo illi ex-
tremi termini sectionum quadraturarum, optimè innotescant,
inter quos per totum anni curriculum reciprocaiones quadra-
turarum, variatione cuspidum exceptâ, peraguntur.

*Mons Apenninus prope-
modum o-
mnium in lu-
nâ est altissi-
mus.*


Seçtio hic partim est flexuosa, partim etiam plana; quia
per Mare Mediterraneum ex parte protenditur. Quibus-
dam autem in locis, præclaræ admodum cuspides, in partem
tenebricosam se se extendentes animadvertuntur; pars nimi-
rum Apennini, & superiùs ad Lacum nigrum pars Alpium,
luculenter ostendentes, inter reliquos Montes Lunares, non
esse dictos è postremis. Imò ex hac quidem apparentiâ, hic
Apenninus ferè omnium maximus jure æstimabitur: nam in
omnibus Iconismis Lunaribus à me delineatis nullus ullibi
Mons apparet, qui longiùs distet à parte illustratâ. Quâ gra-
tiâ simul animadvertendum, quòd hic Apenninus in quadra-
turis decrefcentibus, tanto distet spatio ab obscuratâ parte,
quanto ejus umbra à confinio abesse, videatur;
prout ex figurâ duodecimâ haud ob-
scurè patet.



Plasia Lune a Quadratura Recontis.
Observata in 20 Grada L non procul Ang. et D.

J. B. A. H. F.

Anno Christi 1643, Die 4 Novemb. hora 5 a med. noct. nuncie.
ab Oppositione vers 23, Diel 8 Curr.



CAPUT XXXVI.

DE LUNAE à QUADRATURÀ RE-
CENTIS PHASI.

Uemadmodum hæc phasis omnium decrescentium est primâ, quæ curvefcit; ita & de novo primùm in hac phasi lumen illud secundarium, in parte à Sole averfâ fcilicet, Lunæ obfcuratâ (de quo fuſe in capite duodecimo hujus Selenographiæ egimus) ſe ſe prodiſ; verùm id adeò exiſtit debile, ut vix ac ne vix percipi poſſit: ſubſequentibus tamen diebus, indies creſcit clariorque evadit, ſicuti in phaſibus creſcentibus, ad primam quadraturam uſque, de die in diem decreſcit, exiſtitque debilius.

*Lumen ſe-
cundarium
in hac phaſi
iterum con-
ſpicitur.*

Quæ ſectionis linea, licet ſit curvata, attamen in parte limbi Auſtraliiori, vix eouſque eſt promotâ, quàm præcedens ſectio quadraturæ; in parte limbi verò Boreali haudquaquam eò adhuc pervenit, ſed declinat magis Zephyrum verſus. Luna namque tum temporis in Leone, circâ Nodum Auſtrinum; hîc verò circa Nodum Boreum viſa. Præterea, parùm aliquid notatu dignum hîc occurrit, niſi quòd adhuc ſatis longa cuspis, Montis Apennini, in parte Lunæ obſcurâ conſpiciatur, & quòd infra Mare Mediterraneum, ad ejuſdem confinium, ſemicirculus diverſi coloris, ſeminiger nempe, ac ſemialbicans ſe ſe præſentet: quæ apparentia, quantum pro hoc tempore colligo, à ſublimium Montium Taboris ſaſtigiis, umbram ſpargentibus, ſuam ducit originem.

Hac ipſa die, Mons Sacer Sinum circundans Sirbonis, ad Mare Mediterraneum, clarè incipit illuminari, perinde ac ſi nive undique eſſet tectus: ſimilemque referunt ſpeciem Alpes, atque Atlas minor, qui ſuprà, Mare Mediterraneum, inprimis

Sinum Apollinis circumdant; claritate verò

Montem Sacrum longè antecellunt.

DE LUNAE PLUSQUAM LUNATAE
PHASI.

PARI modo ut Luna indies ad Solem, aut paulatim propius accedit, aut ab eo recedit; ita non solum etiam ejus phases, sicuti facile colligitur, sed & ejus Maculæ, quotidie magis magisque variantur: hincque evenit, ut hac die res diversæ appareant, quæ præcedente minimè conspiciantur. Exempli gratiâ; Mons Porphyrites qui peculiarem semper colorem, uti supra narratum, refert, à primâ illuminationis die hucusque; semper formam figuramque suam immutatam conservavit, jam verò planè variatus conspicitur: unum namque cornu superius amisit, quòd plerumque primâ, vel secundâ statim post ultimam quadraturam die, fieri deprehenditur, sic ut cornu prædictum tunc nusquam appareat.

Mons Porphyrites mutat quidem formam, sed non colorem.

Deinde in universis Phasibus, tam Lunæ crescentis quam decrecentis, Sinum Apollinis clarè admodum illustrato circulo, sive maximè luminosis Montibus circumvestitum, conspeximus; at in hac trigesimâ quartâ, jam pars inferior dimidia, illius circuli luminosi, penitus obscura facta est, nisi quòd de parte superiori adhuc aliquantulum resplenduerit; sicuti ex schemate patet. Sic quoque à 16. phasi hucusque, amplissimus lateque extensus Mons Sæpher, albicans atque clarissimus, adinstar splendidissimorum quorundam radiorum conspicuus fuit: sed in figurâ adjectâ, quædam tantùm illius pars, eaque, more solito multò obscurior, spectanda sistitur.

De quibusdâ Maculis colorum non tantibus.


Rursum autem ibi diversa reperiuntur loca (aquis sive Maribus etiam non attentis) quæ perpetuò eandem præ se ferunt formam coloremque, à primâ illuminationis die ad ultimam usque: utpote sunt, loca paludosa, arundineta, atque fruticeta, quæ omni tempore colorem, ut modò dicebam, conservant: idque pariter & ex hac figurâ fit satis manifestum, & ex illis præsertim duabus Paludibus ad Sinum Apollinis, Insulamque

Erro-

Præter Lunæ pluresq; Lunatae Decembris.
Obcurate in 2 Gradibus circa Aegypti quam dō.

G 8 D A G G.

Anno Christi 1643 Die 5 Novemb. hora 5^a à med. noct. numer. et
Oppositione vici 25ⁱ Diei 9 Curr.



34.

Actus Sialpne.

Erroris in Mari Mediterraneo sitis : nec verò tantùm ex istis duabus, quæ nunquam non nec obscuriores, nec clariores visæ; sed & ex quibuscunq̃ue aliis, quæ simul in Ponto Euxino, Mariq̃ue Mediterraneo, simul in Mari Eoo spectantur, propemodumq̃ue nihil, tam in crescentibus, quàm decreascentibus Lunæ phasibus, se se variant; quòd aliàs, tum in Montibus & Vallibus, tum planitie secus apparet : dum partes hæ omnes, de die in diem, imò singulis horis, nonnunquam, modò quoad colorem modò quoad formam figuramve, ut omnes testantur Iconismi, mutantur.

Ex his igitur, quæ diximus, in hunc ferè modum vix frivole argumentari licet; quæcunq̃ue Maculæ Lunares livescuntiores, Maribus atq̃; aquis conspiciuntur, sunt verò paululùm obscuriores continenti; in superq̃; colorem, formã, figuramve, profus in nullâ phasi variant; sed perpetuò stabilem constantemq̃; conservant, illæ possunt esse Paludes, vel aliæ id genus res : atqui Mare hyperboreum aliquantò lumine vividiori est præditum, quàm reliqua Maria, præterea obscurius continente, & incommutabile : sequitur ergò, & hoc Mare, esse Paludes, aut tale quidpiam, haud absimile. Reperiuntur & alibi quidem ejusmodi Maculæ, quoad colores, sed non perennant; verùm, aut obscuriores, aut luminosiores existunt, imò interdum & penitus evanescent, sic ut ejusmodi Maculæ nec Paludibus nec arudineticis ullo modo comparari possint.



CAPUT XXXVIII.

DE LUNÆ LUNATAE DECRESCENTIS PHASI.

Apposita hæc trigesima quinta facies Lunæ decrescens, est decimæ quartæ Lunæ crescentis complementum ad hemisphærium, qualis certè inter reliquas vix reperiuntur, quæ casu ita se se nobis obtulissent; non solum enim ratione motus librationis, (quia hæc in Librà, illa in Ariete observata) verum etiam quoad confinium omnino sunt pares. Namque quemadmodum illud maximè ex parte planum, & parùm admodum flexuosum, ita & hoc quod vides confinium, pariter se habet: quippe utrumque in uno eodemque loco Maris Mediterranei terminatur: vixque credo plures sectiones in Lunâ conspici posse, quæ vel planiores, vel æquabiliori tractu appareant. Præterea in utraque delineatione transgreditur hæc sectio Montem Ætnam, illumque quasi bifecat: hoc tamen discrimine, quòd in hac phasi, nequicquam de Monte Ætnâ in parte umbrôsâ videatur; in illa verò, pars propemodum Montium dimidia, instar candidissimi semicirculi, extra partem Lunæ illustratam, se se objiciat. Hincque concluditur, Montes orientales Ætnæ, excelsiores esse, occidentalioribus; quia illi longius à confinio distantes illuminantur.

*An Phases
decrecentes,
crescentibus
claritate sint
pares?*

Porro, quòd hæc figura quoad colorem, Insulæ scilicet Sici-liæ, Phasi decimæ quartæ planè sit similis, non aliunde oritur, quàm quòd illa ipsa Insula, in utraque phasi, pari distantia à termino lucis umbræque remouetur; idcirco & simili obscuritate utrobique gaudet. Unde autem hæc obscuratio procreetur, jam capite vigesimo videor mihi sic satis exposuisse.


Non autem hic intermittere possum, quin hac occasione quæstiunculam quandam in medium proferam, quæ omnibus Selenographiæ Studiosis, ut judico, haud ingrata accidet: an nimirum phases Lunæ decrescens curvatæ (quando videlicet ratione digitorum sunt æquales, & simili aurâ defæcata obser-

van-

Præfixa Luna Functæ Decrecentis.
Afferente in 4º Gradu = circa Argv. et D.

G. D. A. G.

Anno Christi 1643, Die 5 Decemb. hora 6½ a med. noct. un.
et Consuetud. Diei 13, Dies 10 Carr.



35.

des. S. S.

vantur) nobis semper æque claræ ac luminosæ appareant? negatur: differentia enim hac in parte non exigua deprehenditur. Sed hæc quæstio quodammodo ex illâ dependet, quæ capite 13. hujus Selenographiæ de lumine secundario proponebatur. Nam hoc de lumine ibi affirmabatur, id in phasibus senescentibus multò clarius existere posse, quàm in crescentibus: partim, quòd in parte Lunæ occidentali plus terræ, quàm aquæ detur; partim, quòd hic noster Globus terrenus, à quo reflexio ad Lunam usque projicitur, tum temporis majorem partem continentis, Lunæ obvertat: hincque adeò evenit, lumen secundarium in phasibus falcatis ante conjunctionem, quàm post illam, omnino majus, clarius atque fortius apparere posse.

Ex quo fundamento similiter concludo; Lumen primum phasium senescentium, multò esse debilius quàm crescentium. Radios quidem Solares operatione esse diversos, à nostris terrestribus, hac vice nolo affirmare; sed lumen illius suppono esse æquabile: quamvis, si rectæ rationis trutinâ omnia ponderentur, & differentia quoque radiorum, sive luminis hinc aliqua sanè deprehendi posset: eo nimirum attento tempore, cum Maculæ Solares, Facularumque ingens tractus, in ipso Solis disco hærent. Tunc equidem radii permulti Solares de Lunâ deducerentur, sic ut hoc respectu, meo judicio, Luna necessariò existeret debilior. Verùm enimvero hanc luminis differentiam, ut modò dicebam, impræsentiarum non attendam; sed hoc unicum tantum monebo: quòd Lunæ pars orientalis, oceanis ac Maribus undique magis sit referta, quàm occidentalis; ea propter & radios Solares non ita fortiter reflectere valent, quàm Montes Vallesque, ut antea jam satis superque demonstratum. Ex quo sanè fit, quòd phasès decrecentes, vel lumen illarum primum, minimè ita clarum splendidumque ullo tempore apparet. Atqui Senescentes plus aquæ possidere, manifestissimè ex phasi apposita elucet, quæ maximâ ex parte, aquis atque oceanis abundat. Rursum, si phasim Lunæ crescentis, quoad digitos æqualem consideremus, sive sit in Cancro, sive Capricorno observata, (exempli gratiâ, octavam vel nonam
pha-

*In Phasibus
senescentibus
lumen pri-
marii mul-
tò est debi-
lius, quàm in
crescentibus.*

phasin) mox utique elucet, maximam ejus partem continente, Montibus & Vallibus constare, sicuti præsentem hancce Maribus, atque oceanis benè refertam esse videmus. Ideoque lumen phasium senescentium primarium perpetuò debilius, obscuriusque, quàm crescentium spectatur: non aliter ac lumen secundarium in illis vividius fortiusque, quàm in his, deprehenditur.

Ratio, cur lumen secundarium Lunæ in phasibus senescentibus, perpetuò clarius deprehendatur?

Quâ oppurtunitate adhuc aliam indicabo rationem, quare lumen secundarium in senescentibus, omni tempore fortius clariusque esse possit, quàm in crescentibus; quod nimirum pupilla nostra, hac in re non parùm adferat momenti: namque ut perceptum capite 32. modò illa se se dilatare, modò comprimere valet, respectu mediū videlicet clarioris, vel obscurioris, in quo est occupata. Etenim, cùm lumen primarium phæos Lunæ, paulò obscurius sit, quàm crescentis; utique sequitur, ratione debilioris luminis, pupillam magis ac magis necessariò dilatari, quàm quum phasim crescentis Lunæ aliquantò luminosiorē suspiciamus. Evenit itaque, ut, quantò major pupilla existit, eò plures radii luminis secundarii ad tunicam retinam transferantur. Proinde, cùm in observationibus Lunæ decrescens, pupilla sit amplior, idcirco non solum plures radii per pupillam illam ampliorem in oculum intrant, sed & per consequens, lumen secundarium clarius fortiusque nobis apparet. Et hoc est, quod demonstratum dare constituimus.


CAPUT XXXIX.

DE LUNÆ CORNUTÆ DECRESCENTIS PHASI.

De Insulâ Cercinnâ.

POsteaquam (quod bene animadvertes) hæc sectio luminosæ & umbrosæ partis, Insulæ Cercinnæ vicinior extitit, quàm in phasi præcedente, propterea etiam illa Insula, in hac figurâ quâ colorem, est obscurior. Similem verò hic propemodum speciem refert, ac si palus esset; interim tamen nulla est, sed in medio tantum locus quidam paludosus repe-

Placis Lunae Crante Divergentis.
 Observata in 8 Gradu N. circa Aequum & Limit. Brs.
 GEDANK.
 Anno Christi 1644. Die 24 Decemb. hora 7 i. med. noct. num.
 ab Oppositione vers 33. Diei 33 Curr.



36.

Autor Scalant.

reperitur, ex quo longa Montium series, brachiaque diversa, tam in Mare Mediterraneum, quam Eoum excurrunt, quæ in reliquis Iconismis instar albicantium radorum, se se objiciunt; jam verò quodammodo ob diversam umbram nigriores spectantur, sicut & tota illa Insula, unà cum illo præclaro Monte, in medio illius loci paludosi conspicuo.

Mons Porphyrites, uti percepimus, jam in phasi 34. cornu superius aniferat, de quo & huc usque nihil apparet; in parte verò reliquâ hujus Montis, antrum quoddam, sive concavitas quædam haud exigua animadvertitur, quæ in reliquis omnibus Lunæ faciebus minimè conspecta: hincque præsumitur, non solum hanc unicam esse rupem; sed quòd Montium potius sit continua series, Vallem aliquam talem constituentium.

Sed præterea, hæc Lunæ cornutæ facies, huic rei inprimis defervit, quòd hujus beneficio, loca permulta Montes Vallesque (quod aliàs ex nullis aliis conceditur) inde cognosci possunt: illique nimirum Montes, qui infra Mare Eoum, Sinum Sirbonis & in Ægypto Lunari siti sunt: inter cæteros Mons Eos, M. Castus, M. Troicus, M. Ajax, M. Cataractes &c.

Duæ autem illæ nigerrimæ Maculæ, quæ in ipsâ superiori parte confinii, prope Mare hyperboreum conspiciuntur, partes sunt Maris Mediterranei, ac comprimis Sinus Apollinis. Quòd autem in hac phasi, sinus ille prædictus quasi adhæreat Mari hyperboreo, deinde & hoc Mare adeò vicinum sit limbo, sic ut interstitium inter Peripheriam & Mare modò dictum, admodum strictum appareat: hinc oritur, quòd Luna circa limitem Boreum sit adumbrata. At in phasi proximâ & antecedente, in quâ illud ipsum interstitium multò latius videbatur, Luna circa Nodum ascendentem commorabatur, ita, ut omnino amplius esse oporteat, sicuti ex motu librationis sit manifestum.

Inprimis verò, circà hanc Lunæ faciem, maximè notatu, animadversioneque non indignum occurrit, quòd ejus periphæria, quæ plerumque æquabili tractu aliàs apparet, hîc, ad Hujus phasos periphæria. ex parte, si altrosi apparet. cuspidem, nempe Australem, (uti apparet) satis tuberoso ac sinuoso ambitu terminata spectetur; cujus generis phænomena

na perrarò certè observavimus. Sed hoc eam habet causam, quòd Luna tum temporis in maximâ latitudine Boreali extiterit; unde talis apparentia à parte limbi inferiori necessariò evenit, quemadmodum jam suprâ cap. 26. monuimus. Atque hoc verò iterum elucet, in ipsâ quoque Lunæ peripheriâ, Montes Vallesque affatim extare.

CAPUT XL.

DE LUNAE CORNIGENAE DECRESCENTIS PHASI.


De Monte Porphyrite. **J**AM sæpius indicavimus, Montem Porphyritem, ratione aspectus in phasibus prioribus, semper unam eandemque retulisse faciem; nunc autem tandem, cum ejus instat occasus, est inconstans, deque die in diem mutat figuram. Primum in phasi 34. cornu superius evanescebat; secundo, in figurâ 36. in medio concavitas quædam animadvertebatur; jam in præsentè & cornu inferius evanuit, Lacunaque est multò amplior. A parte sinistra, tantùm adhuc aliqui Montes conspiciuntur, in formâ luminosi semicirculi, ad dextram verò nulli adsunt: Vallisq; penitus est obscurata. Ex quibus colligere licet, Montes ad sinistram sitos, altiores esse existentibus ad dextram: qui lucem Solis quasi impediunt, quò minùs ratione altitudinis ad reliquos oppositos depressiores, pervenire possit; & itaque utique necesse est, ut hanc ob causam lux prætervolet. Quando verò Montes illam plagam versùs, in quo Sol conspicitur, depressiores sunt, tunc lumen Solis ad Montes oppositos rectâ tendit, sic ut eo tempore Montes Soli obversi, omni ex parte clari atque luminosi deprehendantur. Hujus generis Valles, quæ de uno latere sublimioribus Montibus clausæ sunt, quàm de altero, præter prædictas, adhuc quamplurimè in Lunâ inveniuntur; ut ex phasibus Lunæ crescentis videre licet; præsertim ex figurâ decimâ, Monte nimirum Armeniae, M. Carpatis, M. Serrorum, qui à parte sinistra altiores sunt: Mons verò Ida rursum à parte dextrâ excelsior.

Quò

Præcis Lunæ Cornuonæ Descrictio.
Observata in 26 Grad. N. prope S. et Arg.º.

G. D. A. G.

Anno Christi 1643, Die 7 Novemb. hora 7 e med. nocte num. ab
Observatione vers 2, Die 12 Curæ.



37.

Actus Scalpæ.

Quò igitur longiùs à confinio lucis & umbræ, talis lucidiffimus Solem verfùs fpectatur femicirculus, eò depreffiores funt Montes oppofiti obfcuriores : quò verò propiùs confinio tale quid confpicitur, eò funt altiores. Propterea rectè concluditur, Montes in latere dextro Porphyritis fublimiores effe, occidentalioribus Montis Audi; cùm hi longiùs, quàm ifti, à fectione umbræ diftent.

Occurrit infuper in phafi appofitâ, & alia apparentia, quæ aliquibus fine dubio hunc fcrupulum ingeret; cur videlicet Montes, Climax, Cafius atque Eos, in hac icone, quafi majores, quàm in præcedente, fint depiçti? Ratio autem hæc efl, quòd hîc viciniore confinio extiterint; quare & omnino majores apparere neceffe fit. Sol enim declivior, illis in locis, Valles tantum circa Montium vertices, terminat : in præcedente verò phafi, ubi Sol fublimior erat, ibi fimul profundiùs radios in Valles evibrabat, fic ut eæ compreffiores ibidem appareant, quàm cùm circa vertices Montium illuminantur. Sed de iis hoc loco non attinet plura dicere.

Cæterum, in ipfo termino lucis, confpicitur adhuc pars Sinus Sirbonis, partem obfcuram verfùs, lineâ rectâ inftar aquæ terminata; alteram verò partem luminofam introrfum verfùs, fectione circuli clarè illuftratâ, quæ Montem repræfentat Sacrum. Circa quem hoc inprimis confideratione dignum videtur, quòd ifte nempe Mons, umbram haud exiguam in modò dictum Sinum, five fuperficiem hujus aquæ fpargat : uti Maculæ illæ nigricantiores ad fectionem circuli clarâ confpicuæ, manifefte indicant. Quæ apparentia, ex nullâ equidem aliâ phafi tam diftinctè, quàm ex hac, deprehendi poteft.

CAPUT XLII.

DE LUNAE FALCATAE DECRESCENTIS PHASI.

Cùm igitur hæc phafis vehementer decreverit, proveftâq; admodum ætate extiterit, ac infuper fectione luminofæ & umbrofe partis jam tandem per Mare Eoum tranfeat : non adeò multa notatu digna hîc occurrunt. Nam quæcunq;

quæstiones de phasibus corniculatis crescentibus, proponuntur, pariter & de his Senescentibus affirmantur, vel negantur; tum, quod lumen Lunæ secundarium, tum adventitium ejusque luminis auctiorem, atque diminutionem concernit. Idcirco nolo te Lector Benevole, temporis præsertim redimendi gratiâ, diutius morari, nisi quod hæc paucula solummodo addam. Primò; scias, quòd tres illos Sinus in confinio extantes, Valles Montis Baronisi, M. Porphyritis, atque Thambis constituent. Secundò, quòd ad cuspides egregiæ claræque illuminatæ areolæ conspiciantur; quæ in phasibus lumine auctioribus, tam distinctè nunquam animadvertuntur: verùm quò Luna conjunctioni propinquior, cornuaque ejus acutiora videntur, eò globuli isti magis magisque emicant; exceptis duobus, ante vel post lunarium Synodum, diebus, quo tempore, sicuti ex primâ & ultimâ phasi fit perspicuum, non æque clari apparent.

Paludem Maræotidem quod attinet, & hîc aliquantulum mutata spectatur: ab utroque enim latere sublimiorum Montium fastigia illam circumdantia (postquam ad terminum lucis propius advenit) se se conspicienda præbent; cum antea tantum à latere dextro fuerint animadversa. Hæc verò apparentia, ut modò dicebam, in nullâ aliâ phasi cernitur, nisi in ultimâ ante conjunctionem die, ac in phasi ad oppositionem vergente, ubi omnino similem palus illa refert faciem.


Denique & hoc probè notetur, me in observatione hujus phaseos, adminiculo excellentissimi Tubi Maculas Lunæ majores, Maria scilicet, in parte Lunæ tenebricosâ mediocriter discernere potuisse, quod in prioribus Lunæ faciebus nullo poterat fieri modo; unde autem hîc licuerit, satis superque ex

illis, quæ capite 38. dicta sunt, colligi permittitur.



CAPUT

Plagiis Lunae Fulcatis Decrecentibus.
Observata in 8 Gradibus ≈ non parculi Jazgi: et dd.
G. D. A. P. T.
Anno Circa 1643. Die 8 Novemb. hora 6 1/2 i med. noct. sum.
et Oppositione vov. t. Diei 18 Current.



38.

Anton Schenk

CAPUT XLII.

DE LUNÆ CORNICULATAE DECRE-
SCENTIS PHASI.

Apite decimo quarto, circa phasin Lunæ

Lunatæ, de inclinationibus cornuum Lunæ diximus; cornua nempe non planè modo eodem indies inclinari, atque variari: partim ratione diversæ Lunæ à Sole distantiae, partim, quòd Luna non semper eadem omni horâ observetur, partim quòd etiam continuè locum respectu Eclipticæ mutet. Hinc quò phases Nonagesimo viciniores delineantur, eò, ratione cornuum sunt erectiores. Apparet enim in phasibus corniculatis Lunæ crescentibus, itidemque ex decrescendentibus, imprimis illis quatuor postremis, cornua superiora indies à perpendiculo plus plusque recessisse. Non est autem, quòd quisquam sibi imaginetur, inclinationem cornuum tempore quocunq̄ue (licet phasis tum respectu digitorum, tum ætatis prorsus fuerit æqualis) perpetuò fore eandem; minimè certè, nisi casu eveniat, ut hæc ipsa phasis, denuo in illo ipso gradu ac minuto, longitudinis latitudinisque reperiatur. Quæ si verò in alio signo aliâque latitudine deprehendatur, tunc inclinatio, veluti angulus orbitæ Lunæ & horizontis, maximè variatur; modoque major, modò minor evadit, hoc est, modò magis, modò minùs à perpendiculo declinat: sic ut illico magna variatio inclinationis oriri possit; licet Luna in ipso eodem loco, respectu Nonagesimi, ut suprâ referebam, observetur.

*De inclinatio-
nibus cor-
nuum Lunæ.*

Hac igitur occasione, jure quæritur; cum ex diversis rationibus ejusmodi diversissima quotidiana, imò horaria, inclinatio Lunæ cornuum existat; num etiam hujus inclinationis differentiam, quoad gradus, indicare possimus; in quantum videlicet cornua à puncto verticali statò tempore declinent? Respondemus: maximè; ut jam jam res fiet manifestior; quanquam fortassis aliis hæc res planè impossibilis videbitur; propter magnas scilicet variasque mutationes, quæ sub quâlibet diversâ elevatione Poli, magis magisque eveniunt.

*Num hujus
inclinatio-
nis differen-
tiam quovis tem-
pore, ritè de-
terminare
possimus?*

E e e 3 Sed

Sed ad hoc rectè expediendum magnis ambagibus opus foret, nisi ea in auxilium mihi venirent, quæ capite 26. circa Plenilunia de Macularum inclinationibus dicta fuère. Proinde, cum simile quiddam tam in cornuum quàm Macularum inclinationibus (pariter namque, modoque planè eodem, tanquam in uno corpore moventur) accidat: idcirco, & nullo negotio, imprimis adminiculo Plenilunii versatilis, hoc tentare demonstrareque possumus, quod volumus.

Igitur te tantùm mi Lector, ad caput dictum ablego, ut illa ibi imprimis diligenter perlegantur animoque expendantur quæcunque de Macularum inclinationibus disseruimus: inuenies ibidem inter alia; quomodo, beneficio Plenilunii versatilis, ad quemlibet Lunæ locum, datamque horam, sub quacunque elevatione Poli, & mediante tabulâ Anguli verticalis & Orbitæ Lunæ, inclinationem Macularum constituere, oculisque subijcere valeas.

Quæ via inclinationis cornuum investigetur?


Hac itaque prorsus ratione proceditur, si inclinationem Lunæ, ad certum datumque tempus locumque Lunæ desideras; ac si inclinatio Macularum investigari debeat. Deinde lineam duc rectam per certum punctum, istorum scilicet trium, ad peripheriam Plenilunii versatilis existentium (quo tunc temporis usus fueris) centrumque Lunæ; quo factò, ex inclinatione hujus lineæ, & illicò etiam cornuum Lunæ Inclinationem cognosces. Nam inter utramque nulla omnino est differentia; nisi quòd in phasibus corniculatis, cornua lineam istam planè non attingant: veruntamen cuspis utraque æqualiter ab illâ modo dictâ lineâ distabit.

Postremò denique paulò attentior quilibet Lector (etiam me tacente) hoc quoque facile animadvertit, ex antè dictis colligens, quòd planè necesse sit, ut anguli verticalis & orbitæ Lunæ complementum, in quadrante occidentali constituatur, si quis cornuum inclinationem Phasium crescentium desideret: contra si inclinatio cornuum Phasium decrecentium quæras, ut angulum istum in quadrantem orientalem transferatur, attinet: sic enim omnino habebis ad quodvis tempus, desideratam phasios cujusvis futuræ inclinationem, idque sub quavis datâ elevatione, in quocunque etiam loco Eclipticæ, Luna, tam respectu longitudinis, quàm latitudinis, versetur. **CAPUT**

Placu Lune Corniculata Decurvatu.
Observata in 20 Grada \cong .

G. D. A. R. G.

Anno Græg. 1643. Die 9. Novemb. horæ 6 $\frac{1}{2}$ i. med. noct. nam.
ab Oppositione verò $\frac{1}{2}$ Dies 3 $\frac{1}{2}$ Current.



39.

Anton. S. Galant.

CAPUT XLIII.

DE ULTIMÂ IN CONJUNCTIONEM
PROPENDEnte PHASI.

IN Pleniluniorum præsentia capite 26. diverti generis quædam, eaque vix, ut arbitror, injucunda fuere excussa; inprimis autem duo hæc, ut reliqua taceam: Lunam nempe nunquam minus illuminari, quam cum est plena: & nunquam nec visum esse, nec videri posse, ullum perfectum Plenilunium, undique quidem levigatâ Peripheriâ terminatum. Quæ tamen duo, minimè Plenilunia tantum; verum etiam Novilunia, si rectè applicentur, concernunt. Primum quod attingit; sicuti Luna nunquam minore lumine perfunditur, quam in oppositione; ita nunquam majori illustratur lumine, quam in conjunctione: quia eo tempore, Solis corpori videlicet luminoso majori, maximè est propinqua, præsertim, si in Apogæo fuerit constituta; rationes capite 26. satis fuscè explicavimus, quò Lectorem ablego.

Luna nunquam majori illuminatur lumine, quam in conjunctione.

Alterum quòd spectat: ut nullum unquam prorsus perfectum & undique rotundum, quoad Peripheriam datur Plenilunium; sic pariter & nullum omnino perfectum Novilunium reperitur: propter easdem causas, quas capite modò citato in medium protulimus. Quando namque Luna eo usque tantum à Sole distat (in quocumque etiam sit latere) ut partem Solis minimè tegat; tunc necessariò certa pars ejus luminosa, nobis objicitur (quia tum circuli illuminationis & visionis se se interfecant) & quidem particula de parte inferiori, Lunâ existente in Septentrione: de parte autem superiori, quando existit Australis, ante scilicet conjunctionem in latere orientali; post conjunctionem verò de parte occidentali, prout tempore Plenilunii illa limbi asperitas procreatur, de quo vide suo loco.

Nullum unquam perfectum invenitur Novilunium.

Est autem præsens hæc phasis ex illarum numero, cujusmodi permultis vix certè unquam est visa; cum peradmodum rarò conspiciendam se præbeat, ut phasis prima ac novissima: siqui-

Hæc phasis rarò admodum conspiciatur. & quare?

siquidem tria pariter, necesse est ut hîc concurrant, si nobis in obtutum venire debeat. Et quidem primò requiritur ut phasis hujuscemodi in signis descendantibus, ac præsertim verò in Librà se offerat: secundò, ut habeat latitudinem Borealem, sitq;, ut capite nono diximus, cita veloxq;. Cùm itaq; & circa hanc phasin, duo ejusmodi requisita se se exhibent, hinc evenit, ut eam adeò tardè ante conjunctionem conspexerim, quæque tum erat satis adhuc elevata; sic ut minimè dubitarem, me & sequente ipsâ conjunctionis die, illam distinctè fore conspecturum: quod procul dubio & factum fuisset, nisi Templi alicujus nostri fastigium, Lunæ aspectum mihi omnino eripuisset. Luna, ut ex inscriptione patet, occupabat gradum secundum Scorpii, initiumque quarti gradus latitudinis Borealis: distabat duntaxat 15. grad. 40. min. à Sole in longitudine, atque observabatur ante conjunctionem horâ trigesimâ secundâ.

Anno 1645. die 17. Novemb. similem omnino phasin ultimam senescentem vidi, Lunâ solummodo duodecim gradibus à Sole remotâ, 27. horis ante circiter conjunctionem. Luna namque in 13. gradu Scorpii versabatur, in maximâ scilicet latitudine Boreali: cujusmodi exempla perrarò certè spectâtur; tum ratione aëris nubilosi, tum quod tantummodo semel quotannis talis phasis contingere possit: imò sæpenumero evenit, ut vix multorum annorum elapso spatio, illam observare liceat.

Cæterùm, hanc phasin adhuc tenuiorem esse primâ, hinc oritur, quòd vicinior propemodum 8. horis, seu 4. circiter gradibus longitudinis, ipso observationis articulo extiterit: ita, ut necessariò aliter apparere haud potuerit. Ideoque, cùm graciior esset, inde & nulla insignis asperitas in ipso confinio spectabatur: quamvis ex parte nihilominus certò visa fuisset scabrosa, si Lunam id temporis prælongo Telescopio contemplatus fuisssem; sed, quo tunc utebar, mediocris tantummodo erat longitudinis. Cornua autem perquam erant acuta, sic ut volupe esset illa aspicere. Cornu quidem inferius haud parùm existerat obscurius superiore; quò autem hujus apparentiæ ratio referenda sit, certè hac vice non habeo dicere: umbra namq; erat dilutissima, sic ut minimè distinctè, ac dilucidè discer-


ni, atq; dignosci possit.

CAPUT

Luna Senex in Coniunctionem propendens.
Observata in 2 Gradu N. Die altera ante Coniunct.

G. G. D. A. N. J.

Anno Græci 1643. Die 10 Novemb. hora 7 à med. noct. num.
ab Oppositione vesp. 3. Diei 15 Carr.



40.

Ad. Salsus

CAPUT XLIV.

DE UTILITATE EX FIGURÂ PRIMARIÂ
Phasium & Lunationum redundante; deque
observationis modo Sectionum diurnarum; & denique quo-
modo viâ haud vulgari, ex ejusmodi continuatis Lunatio-
num observationibus, motus Librationis Disci
investigari possit?

Cùm in diversis præcedentibus capitibus;
quantum sufficiat, ut arbitror, tam de Pleniluniis, & Quadraturis,
quàm universis & singulis reliquis phasibus, nihil reticentes
que utrinque scitu, atque observatu digna de his fuerint, egerimus:
utique in consequentibus, in primis de motu Librationis Disci
(de quo jam capite 8. mentionem fecimus) dicere propositum
nobis est. Non eum quidem in finem, ac si ibidem non sufficienter
satis eo de fuerit dictum; sed eam potius ob causam, ut motum
illum, plus plusque aliis diversis observationibus additis
stabilire, atque confirmare possimus. Estque illud perquam
necessarium, ut ea, quæ hætenus nondum satis sunt comperta,
penitus ex fundamento demonstrantur. Idque maximè equidem
ex variarum phasium iconisimis fieri potest. Postquam autem
hætenus phases, nec diebus attentis Mensibusque singulis
ordine se excipientibus adumbrare licuit; vix exinde tam
perspicuè, ut velim libenter quotidianum Lunæ incrementum
decrementumque fortassis perspicere datum: quod ut existimo,
ex sequentibus meliùs patefiet.

Quâ gratiâ quidem, ut omnia succederent feliciùs, novum
planè huc usque minimè cognitum inventum, in mentem venit,
dum integram videlicet Lunationem, in unicam coarctamus
figuram: unde ipsimet accuratè probeque deprehendimus,
quomodo non solum Librationis motus, indies se se
variaverit; sed & quâ ratione sectiones Lunæ diurnæ illuminationis,
continuè mutata, singulisque Mensibus variata fuerint;
cum primis autem exinde quadraturarum quoque Metamorphoses
(veluti jam supra indicavimus) earumque causas, hoc
modo

*Quomodo
observationes
Lunationum
instituantur?*

modo satis superque cognovimus. Initiò itaque hanc primariam Phasium Lunationumque figuram T construximus, (prout capite 8. intimatum) quæ prorsus eandem, quam magna illa Tabula Selenographica Phasium generalis, faciem refert; nisi quòd in hoc iconismo, omnium Macularum, tum majorum, tum minorum, figuræ & species, simplicibus subtilissimisque lineis fuerint delineatæ. Circa medium item centri motum, per puncta ibidem annotata, in omnibus signorum principiis, indicavimus. Certam quidem peripheriam, sive limbum figuræ non circumscripsimus: idque eò, ne non universis omnino observationibus (peripheria namque ex motu libratorio existit mobilis) tam phasium, quam Lunationum, accommoda esset. In quâ primariâ hac Lunæ facie, & situs & proportio Macularum, pro viribus simul est observata atque exhibita, non verò tantum Marium, Sinuum & Promontoriorum; sed & reliquarum omnium Macularum, Insularum scilicet Montium, Valliumque: utpote, ex quarum proportionatâ commensuratione, propemodum tota dependet Selenographia. Atque nisi hæc figura probè esset correctâ, mendarum expers, ex illâ vix ulla sperari posset utilitas. At, constitutionem & situm Macularum accuratissimè hîc fuisse delineatam, dicto capite octavo, sufficienter meo iudicio patefecimus.

Figura Primaria est maxime utilis.

Est autem primò, primarius hic Lunæ typus, ad quamcunq; phasin delineandam perquam utilis; quam delineationem hoc modo instituere poteris. Prius enim cape Scalæ longitudinem, in figurâ adjunctâ obviam, quâ tanquam radio (si quidem antè innotuerit longitudo atque latitudo ipsius Lunaris phaseos, quam observare sive adumbrare, tum temporis tibi proposueris) ex certo puncto, sive centro, secundum longitudinem & latitudinem inventam, describes circulum, sive peripheriam: atque ita simul habebis atque videbis, non solum latitudinem interstitii Paludis Mæotidis, Maræotidisque, sed & latitudinem partium Borealium atque Australium, veramque disci Librationem. Postmodum verò duntaxat opus erit, ut confinium ducas, per illas ipsas Maculas, in Lunæ sectione conspicuas: deinde itemque Valles Montesque eadem ratione ad faciem

Figura Primaria Placium et Lunationum.




Fig. T.

Semiciameter Lunae.



Dignis Ecliptici.



Aut. Sculp.

Figura Pleniluniorum Generalis.





Fig. T.t.

Semidiameter Lune.



Aut. Scaph.

Dyiti Solvatis.



ciem Lunę ut obumbres; ita planè totam phasin quamcunq; perficies. Quod certè haud magno negotio fieri poterit; cum jam antea Macularum distantia proportioque, in figurâ hac primaria, laboris sublevandi gratiâ leniter fuerit delineata. Verùm enimvero absq; figuræ hujusce adminiculo, phasin aliquam paulò accuratiùs adumbrare, idque si præsertim minùs exercitatus conari velit, hic labor hoc opus est, quod omnes qui rei huic manum admoverint, benè fatebuntur.

Neque non verò secundò, poterit quoque ad diversas alias observationes, archetypus hicce T feliciter applicari. Exempli gratiâ: ad Fixarum atque Planetarum occultationes à Lunâ descendentes, & cum primis ad Eclipses Lunares: quam hæ tamen nihilo minùs, imò æque bene & accuratè, quid? quod & commodiùs, per alteram figuram Pleniluniorum generalem, hic in latere averso schematis præcedentis T exhibitam, instituuntur. Et differentia quidem utramq; inter figuram istam nulla alia intercedit, nisi quòd prior omnes in Lunâ existentes Maculas, perque phases paulatim conspicuas, præsentet; hæc verò posterior, faciem Lunæ, Maculasque ejus sic tantùm referat, veluti tempore oppositionis illas conspiciamus, & ut in Plenilunio cum majori P, tum minori O, adumbratas vides. Hincq; quoniam tempore Eclipseos hæc adminiculante figurâ, Maculæ Lunares ab Astrophilis minùs peritis commodiùs inter se dignoscuntur; idcirco hæc tamen præ altera illis fortean arridebit Pleniluniorum generalis figura: sed eo de infrâ adhuc fusiùs dicemus, cum locus nobis iterum offeret opportunus; nunc solummodo monstrabimus quomodo figuræ phasium generalis beneficio, sectiones Lunæ diurnæ illuminationis, totaque pariter Lunatio observari debeat: utpote ex quâ observatione, permagnum (sicuti ex sequentibus fiet perspicuum) ad nos redundare potest emolumentum.

Observationes autem illæ Lunationum sic, suscipi debent. Primò, necesse est, ut in promptu sit exemplar, figuræ illius primariæ, quam vidisti: ideoque aut delineare aliquam talem te oportet, secundùm figuram (quam sub finem nostræ Selenographiæ invenies) huic operi planè destinatam, aut si deli-

*Ratio influ-
tuenda obser-
vationes Lu-
nationum.*

neationis talis laborem subterfugas (qui sanè non nisi magno tædio, temporisq̄ue non pauci impendio absolvitur, ut haud difficulter indicare possem, nisi tempori parcens, id lubenter prætermitterem) poteris, si placet, tot Icones hujus figuræ primariæ, aut à me ipso, aut à Bibliopolis Selenographiam vendentibus, quot opus habueris, nempe 50. 100. pauciores pluresve, tantillo quo veneunt tibi comparare pretio. Quæ quidem Icones quantopere tibi sint infervituræ, ut de redempto temporis spatio nihil dicam, in posterum percipies. Attende autem diligenter ne exemplaribus secundâ vice ab aliis æri incisis, decipiaris: impossibile namq̄ue, ut secundùm hanc meam impressam, alia sculpatur æque correctâ figura, propter papyri nempe dilatationem, constrictionemq̄ue: cavendo scilicet ne loco archetyporum meorum, qui primariam à memet ipso, quoad fieri potuit æri incisam, accuratè exhibent figuram, pseudotypi tibi supponantur.

Quando verò talem ad manus habes Iconisimum; Lunationemq̄ue, exempli gratiâ Lunæ crescentis, observare satagis, quære initiò ex Ephemeridibus longitudinem & latitudinem Lunæ, tempore Novilunii; deinde ex centro motui respondentem, radio (quem scalæ longitudo mensurat) duc Lunæ peripheriam, & ita unâ eademq̄ue opera habebis motum librationis qui tempore Conjunctionis est animadvertendus. Posthæc autem eundem Lunæ motum, qualis est tempore quadraturæ, investiga; quibus inventis, limbum quadraturæ competentem, eo quem diximus modo describe: postremo fac scias, Lunæ, cum plena est longitudinem & latitudinem, & cum hujus tum illius beneficio Lunarem depinge peripheriam. Sic enim trium istorum auxilio circularum, nullo negotio cognosces; an motus ille libratorius crescat, an decrescat; sectiones item num ascendant an descendant; ut & non minùs se dabit, an observationes diurnæ librationis, in primis circa quadraturam & Plenilunium, hisce delineatis sectionibus, interstitiisque descriptis optimè congruant?

Ad quamlibet quidem sectionem, peculiari peripheriâ opus est; cum librationis centriq̄ue motus, perpetuò varietur: atq̄;
sic,

fic, quot sectiones describuntur, tot jure ducendi essent limbi. At tum hæ peripheriæ admodum confunderentur. Quamobrem consuevi, tantùm tres illos suprâ dictos limbos adumbrare. Nisi quod nihilominus tamen sectiones in parte superiori, vel inferiori, aut longiores, aut breviores in Lunationum figuris, secundùm genuinam illarum effigiem, duxerimus; idq; in sequentibus observationibus, est in propatulo.

Tribus autem istis limbis rectè constitutis, de die in diem, annuente Cœli serenitate, Lunam observa diligenter, & quolibet viginti quatuor horarum spatio elapso, si id fieri poterit, sectionem luminis & umbræ describe, secundùm genuinum Lunę confinium: quas & accuratè facillimoq; negotio assequeris, si prius probè rectèque universas ac singulas Lunæ cognoveris Maculas, hasque tibi firmiter imaginatus fueris. Cæteroqui nisi hæc exercitatione multâ, crebrâq; inspectione tibi familiaria reddideris, nihil non impossibile tibi hîc videbitur. Quare cui animus est tales instituere observationes, necesse, ut faciem Lunæ Plenæ, Tabulamque Selenographicam Phasium generalem, omnino habeat perspectam, locorumque Lunæ omnium nomina memoriter teneat, aliàs frustraneus erit labor atque conatus. Sectiones item oportet, ut singulis diebus usq; ad Plenilunium continentur. Quod quidem si feceris, totam habebis Lunationem in unicam figuram ad amussim conjectam. Atq; inde quidem non solùm percipies miram Lunę reciprocationem; sed etiam admirandam sectionum vicissitudinem: adeò ut perquam rarò, Lunatio Lunationi prorsus sit ab omni parte similis; quod ex ipso motu Lunæ haud difficulter colligitur. Apparebit verò quoque indies, ex ejusmodi observationum periodis, quomodo Valles Lunares, modò nigriores, modò luminosiores, modò majores, modò minores evadant? ut & insuper, quomodo subitanea illa confinium mutatio, ratione asperitatis se se habeat, & hujuscemodi alia quamplurima, de quibus imposterum pluribus dicetur.

Enimvero nec mihi dubium est, ex accuratis continuisque Lunationum observationibus, (si in diversis regionibus à Vi-

Quid ex Lunationum observationibus sperandum?

cillorum instituantur atque continuentur) cum tempore majora, quàm adhuc intelligimus, vel nobis imaginamur, inventum, atque detectum iri. Nisi quidem & ipse hunc observandi modum statim initio arripuissem, singulisque diebus, ac Cœlo maximè sereno, per aliquot annos continuassem; profectò non tantùm figuram primariam, reliquasque phases omnes haud eousque perduxissem; verùm nec motum librationis disci, tam longitudinis quàm latitudinis, nec motum cuspidum, quadraturarum, aliarumque phasium; multò verò minùs inclinationem Macularum, Lunæque cornuum, eousque pervestigassem; ut taceam cætera quamplurima mihi hætenus incognita, quæ hujus contentionis assiduæ beneficio demùm, maximâ cum voluptate, ne dicam utilitate perdidici, atque perspexi.

Utinam tantùm in regionibus hisce Septentrionalibus, Cœlum semper haberemus propitium, longè certè faciliùs, minoreque cum labore, hæc Lunationum observationes peragerentur. Quia verò, præsertim tempore Autumnali atque Brumali, plures nubilosus, quàm sereni, ac defæcati dies se se hic offerunt; ideoque multùm tunc facessitur negotii, si Lunationem totam, cum omnibus singulisque diurnis sectionibus absolvere, atque representare studemus. Nonnunquam quatuor vel plures Lunationes, cum Lunæ crescentis, tum decrecentis incipiuntur, de quibus vix unica ad finem perducitur. Jam unâ die sectionem delineare conceditur, mox secundâ vel tertiâ die, id, ratione nubilosus aëris, prohibetur. Cujusmodi Lunationes imperfectas, observavi certè permultas, quas huc referre minimè duxi pretium operæ. Illas verò solummodò exhibebo, in quibus minimum major pars est deducta: quippe quòd ex his major capiat etiam utilitas. Quod si verò in Ægypto, ubi ferè continua affulget Cœli serenitas, observationes hæc susciperentur; utique plures omnino in unius anni spatio Lunationes, quàm in his regionibus intra quatuor, seu quinque annos acquirerentur; quid? quod & majora atque multò certiora investigare daretur. Cæterùm crebra etiam observationum perturbatio homines nimis quàm reddit tædiosos. Fit namque sæ-

pisti-

pissimè, quando speramus notabilem aliquam quadraturam, si-
ve aliam quamcunq; imminere phasin, ut repente præter spem
Cœlum nubibus undiq; profus obveletur; sic ut hac ratio-
ne totius anni pereat spes : dum nonnullæ semel in anno tan-
tùm existunt phases. Sed, hæc quidem hæctenus : nunc ad ob-
servatiões, quas ex Cœlo ipsemet depromsi, transeo; quâ oc-
casione omnia illa, quæ vel per se obscura, vel suprâ nondum
fatis enodata, explicabo; præprimis autem motum librationis
disci, motumq; progressionum, & retrogressionum quadra-
turarum, magis magisque stabiliam.

CAPUT LXV.

LUNATIO LUNAE CRESCENTIS

observata,

GEDANI,

Anno Christi 1644. Mense Aprili.

Conjunctio Luminarium in schemate fe-
quente V incidit in 18. grad. Arietis; quo tempore latitudo
Lunæ inveniebatur 2. grad. 41. min. die nimirum 7. Aprilis,
horâ 4. min. 20. matutinâ.

Lunatio cre-
scens I.

- A. Observata in 13. grad. Tauri, & 4. grad. 17. min. latit.
Austral. non procul à Perigæo & limite A. Die 8. Aprilis,
horâ 8. à meridie numerata, 8. conj. verò 16. diei 2. curr.
- B. Observata in 28. grad. Tauri & 4. grad. 57. min. latit.
Aust. non procul à Perigæo; die 9. Aprilis horâ 8. à merid.
num. 8 conjunct. verò 16. diei 3. curr.
- C. Observata in 12. grad. Geminorum in 5. grad. 8. min.
latitudinis Austrinæ circa nempe limitem : die 10. Aprilis
horâ 8. à merid. num. à conjunct. verò 16. diei 4. curr.
- D. Observata in 26. grad. Geminorum, in 5. grad. 4. min.
lat. Aust. : die 11. Ap. h. 9. à mer. num. à conj. verò 17. d. 5. cur.
- E. Observata in 10. gr. Cancrî, in 4. gr. 43. min. latit. Aust.
non procul à li. m. Aust. in distantia intermediâ; die 12. Apr.
ho. 9. à mer. num. à conj. verò 17. diei 6. curr. F. Pri-

- F. Prima quadratura, aliàs Vernalis à me dicta, observata in 23. grad. Cancrì, in 4. grad. 7. min. latitud. Aust. circa puncta intermedia & limitem; die 13. Apr. hor. 9. à mer. num. à conj. verò 7. diei 7. curr. hor. nimirum 2. ante ver. quad.
- G. Observata in 6. gr. Leon. & 3. gr. 19. min. lat. Aust. Die 14. Apr. horâ 9. à merid. num. à conj. verò 17. diei 9. curr.
- H. Observata in 18 gr. Leonis, & 2 gr. 27 min. lat. Austr. Die 15 April. h. 9 à mer. num. à conj. verò 17, diei 9 curr.
- I. Observata in 30. grad. Leonis, in 1. gr. 26. min. lat. Aust. non procul à Nodo Boreo: die 16. Aprilis horâ 9. à mer. num. à conjunct. verò 17. diei 10. currentis.
- K. Observata in 12. grad. Virg. in 0. grad. 23. min. lat. Aust. circa N. B: d. 17. Ap. h. 9. à mer. à conj. verò 17. d. 11. curr.
- L. Observata in 24. grad. Virg. & 0. grad. 41. min. lat. Aust: die 18. Apr. hor. 9. à mer. num. à conj. verò 18. diei 12. curr.
- M. Observata in 6. grad. Libræ, in 1. grad. 44. min. latit. Bor: die 19. Apr. horâ 9. à mer. num. à conj. verò 17. diei 13. curr.
- N. Observata in 18. gr. Libræ, & 2. gr. 41. min. lat. Bor. circa Apog; d. 20. Ap. h. 10. à mer. num. à conj. verò 18. d. 14. cur: Plenilunium observatum in 30. gradu Libræ, in 3: gradu 33. min. latit. Sept. non procul ab Apogæo; die 21. Aprilis horâ 11. à merid. num. à conjunct. verò 19. diei 15. curr. 4. ante veram opposit: quæ extitit in 3. grad. Scorpii in 3. grad. 43. min. latit. Boreal. Die 22. Aprilis horâ 3. min. 41. matutinâ.
1. Circa has sectiones illuminationis, hoc imprimis bene notetur, quòd statim à Novilunio, interstitium dextrum ad Paludem Mazotidem, & peripheriam indies creverit, usque ad diem scilicet Aprilis 12. sectionemq; E. Et Luna tunc in 10. gradu Cancrì, circa limitem Austrinum versabatur. Decrevit autem postmodum spatium illud de die in diem, arctiusq; extitit. At interstitium ad Paludem Maræotidem, sinistram versus, tanto spatio ad Plenilunium usque crevit; quo tempore, spatium dextrum multò erat compressius, ut & regio hyperborea: quippe Luna circa initium Scorpii commorabatur.
2. Plenilunium, à parte Australiori peripheriæ non planè equabili, sed satis aspero atq; scabroso tractu nobis apparebat: ratio hæc est; quòd Luna tum latitudinem 4 gr. possidebat.
3. Quo-

Plenilunium
non sordidè, et
erat rotundè.

Lunatio Crescens.

J.




Fig. V.

See page

Lunatio Crescens.
2.




Fig. W

Fig. 51

3. Quoniam quadratura hujus primæ Lunationis, non modo in Cancro, sed & circa limitem Austrinum fuit observata; ideoque & sectio admodum occasum versùs tendit, ita ut nunquam, quoad Maculas, videri possit occidentalior. Quapropter & probè hæc sectio attendatur, ut & omnes phasès, in quibus interstitium librationis ad Paludem Mæotidem, æque latum, atque in hac, conspicitur. Scire enim te cupio, Benevole Lector, te tale equidem amplum spatium, in nullis phasibus Lunæ crescentibus, nedum quadraturis, in 14. vel 15. annorum spatio deprehensurum; in quibus Luna videlicet simul in Cancro, simulque in limite Austrino, exabit: verùm ab anno incunte 1660. usque ad 1663. denuo spatium illud, Lunà versante in Cancro, æque omnino amplum spectabitur: rursum ab anno 1664. iterum paulatim successu temporis, decreset, quod & Anno 1647. 48. & 49. eveniet. Hincque certissimum, quòd in his proximis annis, in nullis phasibus, Lunà existente in Cancro, tale dilatatum interstitium, inter paludem Mæotidem limbumque, conspicietur, quale quidem limbus Lunæ horizontalis in Cancro, in magnis meis Pleniluniorum iconis, & aliis nonnullis phasibus commonstrat. Quam tamen ob rem, non est certè quòd adeò mireris: siquidem Luna in Cancro constituta, ante annum 1660. nunquam iterum limitem Austrinum occupabit. Quod cum primis hanc ob causam benè notetur, ne impostertum quando hoc spatium paululum arctius videbitur, meæ id incuriæ imputes.

*Quadratura
hæc admodum
notabilis.*

CAPUT LXVI.

LUNATIO LUNAE CRESCEN-

TIS OBSERVATA,

GEDANI,

Anno Christi 1644. Mense Majo.



Uminarium Conjunctio, in schemate W
accidit in 1 grad. 29 min. Tauri, & 3 grad. 38 min. latit. Aust: die 6 Maji, horâ 0 min. 29, post meridiem.

*Lunatio cre-
scens II.*

G g g

A. Ob.

- A. Observata in 18 grad. Cancrī, 4 grad. 8 min. latitud. Aufst. in punctis intermediis; die 10 Maij, horâ 9 à merid. num. à conjunctione verò 9, diei 5 currentis.
- B. Observata in 3 grad. Leonis, & 3 grad. 32 min. latitud. Aufst. in mediâ distantia: die 11 Maij, horâ 10 à merid. num. à conjunctione verò 10, diei 6 currentis.
- C. Observata in 15 grad. Leonis, in 2 grad. 30 min. latitud. Auftr: die 12 Maij, horâ 9 à meridie num. à conjunctione verò 9, die 7 currentis.
- D. Quadratura observata in 26 gradu Leonis, & 1 grad. 43 min. latitud. Auftr. non procul à Nodo Boreo; die 13 Maij, horâ 8 à meridie num. à conjunctione 8, diei 8 curr.
- E. Observata in 9 grad. Virginis, & 0 grad. 33 min. latitudinis Austrinæ circa Nodum nimirum Boreum: die 14 Maij, horâ 9 à merid. num. à conjunct. 9, die 9. currentis.
- F. Observata in 21 grad. Virginis, in 0 grad. 36 min. latitud. Septent. die 15 Maij, horâ 10 à mer. num. & à conjunctione 10, diei 10 curren. Die 16 Cœlum non erat sudum.
- H. Observata in 15 grad. Libræ, & 2 grad. 32 min. latitud. Borealis circa Apogæum: die 17 Maij, horâ 10 à meridie numerata, à conjunctione item 10, die 12 currentis.
- I. Observata in 27 grad. Libræ, & 3 grad. 24 min. latitudinis Bor. circa Apog. die 18 Maij, horâ 11 à meridie & conjunctione numeratâ. Die 13 currentis.
- K. Observata in 8 grad. Scorpii, & 4 grad. 5 min. lat. Aufst: die 19 Maij, horâ 11 à merid. & à conj. num. diei 14 curr. Oppositio Luminarium contigit in 1 grad. Sagittarii, & 4 grad. 51 min. latitudinis Borealis: die 21. Maij, horâ 6.36 m. vespertinâ.

1. Animadvertendum hîc, interstitium, Paludem Mæotidem inter limbumque, ad sectionem A omnium esse amplissimum. Similiter pars illa Boream versûs valde videtur spatiosa; ut linea tenuior semicircularis clarè indicat: quippe Luna tum temporis iterum in Cancro, itemque in maximâ ferè latitudine Austrinâ deprehendebatur: deinde autem statim spatium illud magis magisque est coarctatum. Tempore quadraturæ

turæ ita decreverat, ut lacus major occidentalis parùm admodum esset conspicuus.

2. Confinium quadraturæ quod attinet, jam ulteriùs ortùm versùs promotum conspicitur; aliasque planè Maculas, quàm in Lunatione præcedente, interfecat: quia namq; circà initium Virginis, ac insuper 5 horis post veram oppositionem, illud observatum est. Quò igitur ulteriùs quadraturarum sectiones in partem Lunæ orientalem se se ingerunt, eò magis Maculæ in quadrante scilicet occidentali comprimuntur; ac rursus in orientali dilatantur. Quando verò sectio quadraturæ omnium cernitur occidentalissima, ut in præcedente diagrammate V, in quadraturâ nempe Vernali, (quæ nullo non tempore hætenus in Cancro est conspecta) tunc Maculæ in quadrante occidentali, quàm unquam possunt maximè dilatantur; contra Maculæ orientales, eò plus constringuntur. Contrarium accidit circa quadraturam Autumnalem, in Capricorno existentem, cujus sectio perpetuò omnium est orientalisissima, & tum Maculæ in quadrante orientali tantò magis dilatantur, quântò in quadrante occidentali comprimuntur. Hincque evenit, quòd, licet in his delineationibus, modò quadraturæ majores, modò minores appareant, nihilominus tamen semper æque sint reverâ magnæ, ita, ut quartam scilicet Lunæ partem omnino repræsentent: exceptâ particulâ quâdam minimâ, de quâ satis suprâ diximus.

3. Præterea verò & hoc notatu dignissimum; quòd tum sectio hujus quadraturæ, tum & confinium illius, quæ anno 1644 die 15 Martii tota à me delineata, casu tantùm quodam per easdem profus transiverit Maculas: hoc tantùm discrimine, quòd interstitium dextrum, ut & superius, die 15 Martii, haud parùm erat amplius, quàm in hac 13 Maij observatâ. Ratio evidens est, quia nempe Luna in primo gradu Cancrî, atque circa limitem Austrinum tunc temporis subsistebat.

4. Sectio E, similem planè refert phasin, quàm quæ 16 Martii à me fuit adumbrata; nec ulla alia inter has duas apparuit differentia, quàm quòd in hac adjectâ, spatium occidentale Mæotidis paulò arctius, ob motum disci librationis, extiterit.

5. F verò propemodum ab omni parte, simul quoad confi-

G g g 2 nium,

nium, simul quoad motum librationis, phasi Lunæ gibbosæ crescenti, decimæ quartæ scilicet in ordine, omnino apparet æqualis. Unde colligitur, ejusmodi similes phases, non rarò utique evenire posse.

6. A quadraturâ usque ad Plenilunium, Mæotidis interstitium, ut & Boreale, quotidie decrevit, arctiusque extitit; quemadmodum hic quadraturæ limbus, clarè commonstrat.

CAPUT XLVII.

LUNATIO LUNAE CRESCENTIS OBSERVATA, GEDANI,

Anno Christi 1644. Mense Julio.



Lunatio crescentis III.

Uminarium conjunctio figuræ X incidit in grad. 12 Cancrî; latitudo Lunæ erat 4 grad. 8 min Austr. Die 4 Julii horâ 5 min. 26 vespertinâ.

- A. Observata in 1 grad. Virginis, & 0 grad. 49 min. latit. merid. non procul à Nodo Boreo; die 7 Julii, horâ 9½ à merid. num. à conjunctione verò 17, diei 4 currentis.
- B. Observata in 13 grad. Virginis, in 0 grad. 17 min. latit. Sept. circa Nodum ascendentem: die 8 Julii, horâ 9½ à merid. num. à conjunctione verò 17, diei 5 currentis.
- C. Observata in 24 grad. Virginis, & 1 grad. 26 min. latit. Borealis, die 9 Julii, horâ 8½ à meridie num. à conjunctione verò 16, diei 6 currentis.
- D. Observata in 7 grad. Libræ, in 2 grad. 26 min. latitud. Septent. circa Apogæum, die 10 Julii, horâ 9½ à merid. num. à conjunctione verò 17, diei 7 currentis.
- E. Quadratura Lunæ observata in 19 grad. Libræ, & 3 gr. 17 min. latitud. Septent. circa Apogæum: die 11 Julii, horâ 9 à meridie num. à conjunctione verò 16½, diei 8 curr.
- F. Observata in 1 grad. Scorpîi, & 4 grad. latitud. Septen. non procul ab Apog: die 12 Julii, horâ 9 à meridie num. à conjunctione verò 16½, diei 9 currentis.

G. Ob.

Lunatis Creocens.

3.




Fig. X.

Aut. Sc.

Lunatio Decrescens.
J.




Fig. Y

A. S.

G. Observata in 12 grad. Scorpii, & 5 grad. 2 minut. latit. Sept. die 13 Julii, horâ 9 à meridie num. à conjunctiōe verò 16½, diei 10 currentis.

H. Observata in 24 grad. Scorpii, & 5 grad. 10 min. latitud. circa limitem nimirum Boreum : die 14 Julii, horâ 9 à meridie num. à conjunctiōe verò 16½, diei 11 currentis.

I. Observata in 7 grad. Sagittarii & 5 grad. 7 min. latitud. Borealis, die 15 Julii, horâ 9 à mer. num. à conjunct. verò 16½, diei 12 currentis.

K. Observata in 19 grad. Sagittarii & 5 grad. 0 min. latitud. Borealis die 16 Julii, horâ 9 à mer. num. à conjunct. verò 16½, die 13 currentis.

Die 17 & 18 Julii Cœlum erat nubilosum.

Luminarium oppositio contigit in 28 gradu Capricorni, in 3 grad. 20 min. latitudinis Borealis: die 19 Julii, horâ 5 min. 26 vespertinâ; atque observata horâ 10 vespertinâ. Interstitium inter Paludem Mæotidem admodum erat tenue, ut & uterq; Lacus hyperboreus, qui ferè visum eludebat, prout hoc quoque ex oppositionis peripheriâ, Lunationis X deprehenditur.

1. Ex hac periodo denuo apertè ac perspicuè apparet, quâ ratione motus librationis disci augeatur, atque minuatur, & quo id fiat tempore; quòd scilicet in Capricorno interstitium dextrum sit omnium strictissimum, veluti sinistrum amplissimum: at verò in Cancro contrarium omnino conspicitur.

2. Statim à conjunctiōe (quia Luna existerat in Cancro) interstitium in hac Lunatione indies decrevit ad oppositionem usque: unde colligere datur, Lunam propter motum Librationis continuè retrorsum, contra signorum sequelam esse actam; quòd aliàs certè nunquam fieri poterit, nisi conjunctio pariter in Cancro, atque oppositio in Capricorno deprehendatur. Id quod hac tamen cum exceptione assevero, si impofterum quidem Luna terminos Librationis, in his modò dictis signis, perpetuo conservabit, motumque suum eo, qui hactenus in proximè elapsis annis est observatus, modo continuabit, nullas autem alias, præsertim cum Nodorum retrocessiōe (quòd tamen do esse minimè impossibile) passâ fuerit

inæqualitates, de quibus tamen omnibus tractu diuturnioris temporis, per similes continuatas Lunationum observationes, fieri poterimus certiores.

CAPUT XLVIII.

LUNATIO LUNAE DECRESCENTIS OBSERVATA.

GEDANI,

Anno Christi 1644. Mense Julio.

Lunatio de-
crescens I.

Luminarium oppositio schematis Y extitit; in 28 grad. Capricorni, & 3 grad. 20 min. latitudinis Borealis, die 19 Julii, horâ 5 min. 56 vespertinâ.

A. Observata in 13 grad. Aquarii, & 2 gr. 6 min. latit. Bor. circa puncta intermedia : die 20 Julii, horâ 10 à meridie num. ab oppositione verò 4, diei 2 currentis.

B. Observata in 27 grad. Aquarii & 0 grad. 51 min. latitudinis Borealis, non procul à Nodo Austrino : die 21 Julii, horâ 11 à merid. num. ab opposi. verò 5, diei 3 currentis.

C. Observata in 12 grad. Piscium, in 0 grad. 41 min. latit. circa Nodum nimirum Austrinum : die 23 Julii, horâ 1 à med. nocte, ab oppositione verò 7, diei 4 currentis.

D. Observata in 28 grad. Piscium, & 1 grad. 51 min. latit. Merid : die 24 Julii, horâ 3 à med. nocte num. ab oppositione verò 9, diei 5 currentis.

E. Observata in 12 grad. Arietis, & 2 grad. 58 min. latitud. Aust. prope Perigæum; die 25 Julii, horâ 2 à med. nocte num. ab oppositione verò 8, diei 6 currentis.

F. Observata in 26 grad. Arietis, & 3 grad. 57 min. latitud. Aust. circa Perigæum : die 26 Julii, ho. 2 à med. nocte num. ab oppositione verò 8, diei 7 currentis.

G. Observata in 10 grad. Tauri, & 4 grad. 35 min. latitud. Merid; die 27 Julii, horâ 2 à med. nocte num. ab oppositione verò 8, diei 8 currentis.

H. Observata in 25 grad. Tauri, & 5 grad. 2 min. latitudinis

nis Austr. die 28 Julii, horâ 3 à med. nocte num: ab oppositione verò 9, diei 9 currentis.

I. Observata in 9 gradu Geminorum, & 5 grad. 9 minut. latit. circa limitem nempe Austrinum; die 29 Julii, horâ 3 à med. nocte num. ab oppositione verò 9, diei 10 currentis.

K. Observata in 23 grad. Geminorum, & 4 grad. 58 minut. latitudinis Austrinæ, in punctis intermediis; die 30 Julii, horâ 4 à med. nocte num. ab opposit. verò 10, diei 11 curr.

Luminarium conjunctio incidit in grad. 12 Leonis, & grad. 2 min. 22 latit. Merid. desc: die 2 Augusti, horâ 4 min. 24 post meridiem.

1. Hoc loco illud velim attendas; Lunam, secundùm seriem signorum, ab oppositione ad sectionem usque K se se circumvoluisse: quia in signis ascendentibus permansit. Unde interstitium, sinistram versùs, Paludem Mæotidem inter limbumq; semper decrevit, arctiusque extitit: sic ut oppositum interstitium Mæotidis indies paulatim crescere oportuerit.

2. Nullam omnino rectam quadraturæ sectionem, in hac Lunatione, dari, est perspicuum: id quod exinde verò oritur, quòd tempore veræ quadraturæ, nullam phasin observare poterim. Quippe quadratura ipsa de die, & quidem circa meridiem accidebat: ita ut sectionem F tantummodo ante, & sectionem G, post ipsam quadraturam delineare licuerit: quapropter necessariò utraq; sectio curvata apparuit. Quod si tibi autem imagineris lineam quandam rectam inter F & G; tunc illico hinc deprehendes, quomodo hæc quadraturæ sectio, Maculas transiverit.

3. Universæ & singulæ illuminationis sectiones, in quibuscunque Lunationum figuris, summâ quidem diligentia sunt delineatæ, per illas ipsas Maculas, in Lunâ apparentes: & tamen diurna illuminationis interstitia, modò latiora, modò compressiora videntur. Ratio est; quòd cum Luna in perpetuo motu libratorio versetur, exinde & Macularum continua existat compressio, vel dilatatio. Etenim, quoniam hanc subitanam mutationem Macularum, in unicam referre figuram est impossibile (quemadmodum id facilè peritiores intelligunt) utiq; necesse

cessè est, ut ejusmodi apparentia, atque exigua differentia, interstitiorum diurnorum, illuminationis interdum appareat. Hoc tamen quod diximus, interstitia tantùm diurna peripheriæ viciniora concernit; in reliquis enim quadraturæ, centroque vicinioribus, nil quicquam infert differentiæ.

4. Mirari certè satis haud possumus, quòd tam mirum in modum hi tres limbi conjunctionis, quadraturæ & oppositionis se se mutant, atque variant. Jam enim suprâ, Boream versùs, conjunctionis limbus est omnium extimus, jam quadraturæ, jam oppositionis; quod equidem ex motu Librationis disci, centrique Lunæ solummodo proficiscitur. Hincque non tantùm singulis mœnibus quadraturarum sectiones mutantur; sed & aliarum omnium Phasium: adeò ut perrarò (sicuti ex Lunationum periodis manifestè fit perspicuum) phasis phasi, ab omni parte, omnino sit de facie similis, atque æqualis.

CAPUT XLIX.

LUNATIO LUNAE CRESCENTIS OBSERVATA, GEDANI,

Anno Christi 1644. Mense Septembri:

Lunatio crescens II. **L**uminarium conjunctio in schemate Z, accidit in 10 grad. Virginis, circa Nodum Boreum; die 1. Septemb. horâ 6. 10 min. matutinâ.

A. Observata in 28 grad. Scorpii, & 5 grad. 12 min. latitud. Borealis, die 7. Septemb. horâ 8½ à meridie num. à conjunctione verò 14½, diei 7 currentis.

B. Observata in 10 grad. Sagittarii, & 5 grad. 14 min. latit. Boreal. circa nempe limitem Boreum; die 8 Sept. horâ 8 à meridie num. à conjunctione verò 14, diei 8 currentis.

C. Luna bifida, observata in 23 gr. Sagittarii, & 5 gr. 3 min. lat. Sept. circa puncta intermedia; die 9 Septemb. horâ 9. à meridie num. à conjunctione verò 15, diei 9 currentis.

Die 10 Septem. propter Cœli inclementiam, observandi non data est occasio. D. Tri-

Lunatio Greecens.

†.



fig. Z

Act. 62

Lunatio Decreccens.
2.




fig AA.

Aut. Sc.

D. Trigonus Lunæ observatus in 17 grad. Capricorni, & 4 grad. 1 min. latit. Borealis, circa mediam distantiam; die 11 Septemb. horâ 8 à merid. num. à conjunct. verò 14, diei 11 curr. horâ tertiâ, antequam verus accideret aspectus.

E. Observata in 1 grad. Aquarii, & 3 grad. 7 min. latitud. Borealis; die 12 Septemb. horâ 8 à meridie num. à conjunctione 14, diei 12 currentis.

Luminarium oppositio, incidit in 24 gr. Piscium, & 1 gr. 30 min. latit. Sept. die 16 Sept. horâ 0 min. 15 post merid.

Cùm quidem Luna, in Lunatione Z, tantùm in signis Solstitialibus hybernis permanferit; idcirco & interstitium Mæotidis parùm aut nihil se se variavit, non minùs & hi tres limbi, conjunctionis videlicet, quadraturæ & oppositionis. Spatium autem quadraturæ, omnium fuit arctissimum: siquidem quadra, circa initium Capricorni contigit. Eapropter eadem notatu perquam est digna: præsertim, quia terminus extremus orientalis progressionum, & retrogressionum quadraturarum (qualis nempe sit) ex hac sectione conspicitur: cujus generis certè quadraturam, vix unicam tantummodo in anno, circa æquinoctium nempe Autumnale deprehendes; hac tamen expressâ conditione, si Cœlum fuerit sudum, atque quadratura circa vesperam acciderit.

Cæterùm hoc confinium C, est ut propriè dicam, terminus oppositus sectionum quadraturarum, si ad quadram, quæ scilicet in Cancro, circa Æquinoctium extitit (qualem in primo Lunationis diagrammate delineavimus) referatur.

CAPUT L.

LUNATIO LUNAE DECRESCENTIS OBSERVATA.

GEDANI,

Anno Christi 1644. Mense Septembri.

Luminarium Oppositio in diagrammate Lunatio decrescens II.

A A, contigit in 24 grad. Piscium, & 1 grad. 30 lat. Bor.
d. 16 Sept. horâ 0 min. 51 post mer. H h h A. Ob-

- A. Observata in 14 Arietis, 3 grad. 13 min. latit. Aufst. circa Perigæum. Die 17 Septembris, horâ 11 à meridie num. ab oppositione verò 10, diei 2 currentis.
- B. Observata in 19 grad. Arietis, 4 grad. 17 min. lat. Aufst. circa Perigæum; die 18 Septemb. horâ 11 à meridie num. ab oppositione verò 10, diei 3 currentis.
- C. Observata in 15 gr. Tauri, & 4 gr. 52 lat. Mer. d. 20 Sep. horâ 1 à med. noct. num. ab opposit. verò 12, diei 4 curren.
- D. Observata in 30 grad. Tauri, & 5 gr. 11 min. lat. circa limitem nimirum Austrinum, die 21 Septembris, horâ 1 à mediâ nocte num. ab oppositione verò 12, diei 5 currentis.
- E. Observata in 15 gradu Geminorum, & 5 gr. 11 min. latit. Auftr. descen. die 22 Septemb. horâ 2 à mediâ nocte num. ab oppositione verò 13, diei 6 currentis.
- F. Quadratura ultima Autumnalis, observata in 29 gr. Geminorum, & 4 gr. 48 min. lat. mer. die 23 Sept. horâ 3 à mediâ nocte, ab oppositione 14, diei 7 currentis.
- G. Observata in 13. gr. Cancri, & 4 gr. 13 min. lat. Merid. in mediâ distantia; die 24 Sept. horâ 3 à mediâ nocte, ab oppositione 14, diei 8 currentis.
- H. Observata in 27 gradu Cancri, & 3 grad. 20 min. latitudinis Merid. die 25 Septemb. horâ 5 à mediâ nocte, ab oppositione verò 16, diei 9 currentis.

Luminarium conjunctio extitit in 8 grad. Libræ, & 2 gr. 45 min. lat. Bor. die 30 Sept. horâ 10 min. 29 vespertinâ.

Annotetur verò hic. 1 Quòd duo solummodo limbi, hanc Lunationem circumvestiant; limbus videlicet conjunctionis & oppositionis, iiq; unum omnino eundemq; casu constituent circulum. Etenim quia in 24 gr. Piscium & 8 gr. Libræ, adhæc in simili ferè latit. Bor. (differentia namque unius gradus latitudinis, nihil propemodum infert) motus librationis centriq; idem prorsus est. Ab oppositione usque ad quadraturam, interstitium Maræotidis ad sinistram semper crevit, ampliusque extitit; post quadraturam verò, rursus paulatim decrevit.

2. Hæc sectio quadraturæ ultimæ, nihil planè differt à quadraturâ primæ Lunationis; cùm hæc, æque ac illa, circa initium Can-

Cancrī, limitemque Austrinum fuerit observata: Ex quā sanè plus plusque ultimus terminus occidentalis progressionum quadraturarum corroboratur. Quale equidem confinium nunquam non conspicies, quando Luna similem longitudinem latitudinemque habebit. De cætero, quia & hæc quadratura, illi, primæ scilicet Lunationis, planè ab omni parte respondet; hinc quoque patet, sectiones in quadrante occidentali, ferè omnino esse ratione Macularum æquales. Interea tamen illæ duæ sectiones peripheriæ viciniores, non prorsus quidem similes esse videntur: idque ex eo oritur, quòd conjunctio primæ Lunationis Lunæ crescentis, atque hæc oppositio Lunationis decrescens, non planè eodem tempore, horâque contigerint.

3. Circa primam sectionem A, hoc animadvertatur, quòd omnino fuerit possibile, illam ipsam sectionem in 24 horarum spatio ad Paludem Mæotidem usque, pervenisse: Luna namque circa Arietem commorabatur, ubi interstitium illud, non admodum erat amplum; adhæc verò circa Perigæum existebat, sic ut esset planè velox: & hinc planè sectio illa in tam brevi temporis spatio, eo usque appropinquare potuit. Ex quo sequitur, sectiones ad partem peripheriæ occidentalioris, nonnunquam uno die ulterius, quam alio tempore duobus, promoveri: ulterius quidem uno die, quando oppositio seu conjunctio in Capricorno, atque in Perigæo accidit: quum verò oppositio seu conjunctio in Cancro existit circa Apogæum, tunc sectiones vix bidui ad Paludem Mæotidem pervenire possunt: quantum motus librationis (Luna versante in Capricorno) qui eo tempore secundum seriem signorum progreditur, sectiones aliquantulum retardat: rursus paululum iterum sectiones promoventur, Lunâ degente in Cancro; quia motus modò dictus librationis, contra signorum ordinem fertur: cum tamen res hæc vix sit perceptibilis; itidemque circa peripheriam existat; idcirco parùm quidem id facere potest, vel ad accelerandas, vel retardandas sectiones.

CAPUT LI.

LUNATIO LUNAE CRESCEN-
TIS OBSERVATA,

GEDANI,

Anno Christi 1645. Mense Februario & Martio.*Lunatio cre-
scens V.*

Conjunctio Luminarium in schemate B B incidit in 20 grad. Piscium, & 0 grad. 49 min. lat: Auf. die 26 Februarij, horâ 9 min. 50 matutinâ.

- A. Observata in 12 grad. Arietis, & 3 grad. 38 min. latitud. Auftrinae circa Apogæum; die 28 Februarij, horâ 7 à meridie num. à conjunctione 10, diei 3 currentis.
- B. Observata in 27 grad. Arietis, 4 grad. 26 min. latitudinis Auftrinae, prope Apogæum: die 1 Martij, horâ 7 à meridie, à conjunctione 10, diei 4 currentis.
- C. Observata in 12 grad. Tauri, in 5 grad. 0 min. latitudinis Auftrinae, circa Apogæum: die 2 Martii, horâ 7 à meridie, à conjunctione 10, diei 5 currentis.
- D. Observata in 26 grad. Tauri, in 5 grad. 14 min. lat. circa limitem scilicet Auftrinum; die 3 Martij, horâ 7 à meridie, à conjunctione 10, diei 6 currentis.
- E. Observata in 10 grad. Geminorum, & 5 grad. 6 minut. latitud. Auftrinae desc. die 4 Martii, horâ 8 à meridie, à conjunctione 11, die 7 currentis.


Propter aërem continuè turbidum, phases sequentes, minimè observare potuimus.

- F. Observata in 22 grad. Cancri, & 3 grad. 5 min. latitudinis Auftr. circa puncta intermedia: die 7 Martii, horâ 9 vespertinâ, à conjunctione 12, diei 10 currentis.
- G. Observata in 19 grad. Leonis, & 0 grad. 55 min. latit. Auftr. non procul à Nodo Auftrino: die 9 Martii, horâ 9 à meridie, à conjunctione 12, diei 12 currentis.

Oppositio Luminarium extitit in 10 gr. Virginis, & 1 gr. 0 min. lat. Boreal. die 12 Mar. h. 11 46 mi. à mer. num.

En

Lunatio Crescens.
3.



f B.B.

Aut. Sc.

Lunatio Crecescens.

6.




Fig. CC.

Aut. Sc.

En notanda: 1. Uterque limbus conjunctionis & oppositionis, denuo propemodum unum eundemque constituit circum. Motus namque librationis, qui ex motu Lunæ longitudinis proficiscitur, ferè est idem: latitudo quidem paululum variat; hincque limbi etiam hi conjunctionis, & oppositionis inter se aliquid differunt.

2. A conjunctione usque ad sectionem E, interstitium indies crevit, ampliusque factum; Luna quippe in signis ascendentibus tunc commorabatur: post quadraturam verò, in tali proportione decrevit, arctiusque extitit, ut perpetuò fieri assollet in signis descendentibus.

CAPUT LII.

LUNATIO LUNAE CRESCENTIS OBSERVATA, GEDANI,

Anno Christi 1645. Mense Martio & Aprili.

LUMINARIUM CONJUNCTIO IN DIAGRAMMATE

C C accidit in 8 gr. Arietis, & 3 grad. 17 min. lat. Austr. non procul ab Apogæo; die 27 Martii horâ 8 min. 42 vesp.

A. Observata in 7 grad. Geminorum, in 5 grad. 10 min. lat. Austr. circa Limitem & Apogæum: die 31 Martii, horâ 8 à meridie, à conjunctione 23, diei 4 currentis.

B. Observata in 6 gradu Cancri, in 4 grad. 3 min. Austr. latitudinis desc. Die 2 Aprilis, horâ 8 à meridie, à conjunctione 23, diei 6 currentis.

C. Observata in 20 gradu Cancri, in 3 grad. 9 min. latitud. Austr. die 3 Aprilis, horâ 9 à meridie, 9 post veram quadraturam, à conjunctione verò die completo septimo:

D. Observata in 2 gr. Leonis, in 2 gr. 13 min. latit. Austr. die 4 Aprilis, horâ 6½ à mer. à conj. 22, diei 8 currentis.

E. Observata in 16 gr. Leonis, in 1 grad. 2 min. Austr. latit. in mediâ remotione. Die 5 Aprilis horâ 8½ à meridie, die completo nimirum nono.

Hh h 3

F. Ob-

Lunatio crescens VII.

F. Observata in 12 grad. Virginis, & 0 grad. 8 min. Boreal. latit. circa Nodum Boreum. Die 7 Martij, horâ 10 à meridie, à conjunctione verò 1, diei 11 currentis

Oppositio Luminarium contigit in 16 gr. Libræ, in 3 gr. 48 min. latitud. Borealis. Die 10 Apr. horâ 6 vespertinâ,

Animadvertenda 1. Tres illi limbi Lunationem C C terminantes, tum quoad situm, tum quoad librationis motum, illis tribus peripheriis primæ Lunationis, propemodum sunt æquales : in quâ extimus circulus ad quadraturam, intermedius ad conjunctionem, atque tertius ad oppositionem spectat. A conjunctione ad quadram usque, tam hujus Lunationis, quàm illius primæ, interstitium Mæotidis de die in diem crevit, postea verò iterum ad Plenilunium usque decrevit : ratio est, quòd utriusque Lunationis conjunctio, quadratura & oppositio, & in iisdem propemodum signis, & ferè eodem anni tempore, observatæ fuerint.

2. Inter has sectiones, nulla iterum recta linea, sive perfecta quadra occurrit : hinc evenit, sectionem C, 8 horis post veram quadraturam delineatam esse.

3. Quòd interstitium diurnum illuminationis, inter D & E latius appareat, quàm illud inter C & D, causa hæc est ; quòd à C usque ad D, tantum in tempore 21 ; à D verò usque ad E, horæ 26 elapsæ sint. Ideoque nisi sectiones, singulis diebus eadem præcisè horâ observentur, impossibile erit, ut omni tempore interstitia diurna, omnibus etiam aliis obstaculis remotis, proportionaliter crescere, vel decrescere possint.

CAPUT LIII.

LUNATIO LUNAE CRESCENTIS OBSERVATA, GEDANI,

Anno Christi 1645. Mense Aprili & Majo.



Luminarium Conjunctio, in figurâ D D extitit in 6 gr. Tauri, in 4 gr. 42 min. lat. Aufst. circa limitem & Perig. die 26 April. hor. 2 min. 20 matut. A. Ob-

Lunatio crescentis VII.

- A. Observata in 1 grad. Geminorum, & 5 grad. latitudinis Auftrinæ circiter, non procul à Perigæo. Die 27 Aprilis, horâ 8 à meridie, à conjunctione 18, diei 2 currentis.
- B. Observata in 1 grad. Cancris, & 4 grad. 1 min. lat. Aufst. Die 29 Ap. horâ 9 à mer. num. à conj. verò 19, diei 4 cur.
- C. Observata in 16 gr. Cancris, & 3 gr. 8 min. lat. Aufst. Die 30 Ap. horâ 9 $\frac{1}{2}$, à mer. num. à conj. verò 20, d. 5 curr.
- D. Observata in 29 gr. Cancris, & 2 grad. 13 latit. Aufst. die 1 Maij, horâ 8 à mer. num. à conj. verò 18, diei 6 currentis.
- E. Quadratura observata in 13 gr. Leonis, & 1 grad. 4 min. latit. Aufst. die 2 Maij, horâ 9 à meridie num. à conj. verò 19, diei 7 currentis, tempore videlicet veræ quadraturæ.
- F. Observata in 26 grad. Leonis, & 0 grad. 3 min. lat. Borealis, circa Nodum ascend. & puncta intermedia. Die 3 Maij, horâ 9 $\frac{1}{2}$ à meridie, à conjunct. 20, diei 8 currentis.
- G. Observata in 8 grad. Virginis, in 1 grad. 9 min. lat. Borealis die 4 Maij, horâ 8 $\frac{1}{2}$ à meridie numerata, à conjunctione verò 19, diei 9 currentis.
- H. Observata in 21 gr. Virginis, & 2 gr. 10 min. lat. Bor. die 5 Maij, horâ 9 à mer. num. à conjunct. verò 19, diei 10 curr.
- I. Observata in 3 gr. Libræ, & 3 gr. 4 min. lat. Boreal. die 6 Maij, horâ 9 à mer. num. à conj. verò 19, diei 11 currentis.
- K. Observata in 28 grad. Libræ, & 4 grad. 23 min. latitud. Borealis, circa Apogæum. Die 8 Maij, horâ 9 à meridie num. à conjunctione verò 19, diei 13 currentis.
- Luminarium oppositio incidit in 20 grad. Scorpii, & 5 grad. latitudinis Borealis circa limitem & Apogæum. Die 10 Maij, horâ 8 vespertinâ.

Observabis 1. Circa phasin B & C, interstitium inter Paludem Mæotidem atque Peripheriam omnium fuisse amplissimum; paulò post decrevisse indies, usque ad oppositionem.

2. Sectio quadraturæ similem ferè refert speciem, atq; quadræ sectio Lunationis primæ, nisi quòd illa paululùm adhuc videatur orientior. Præterea, si utramque sectionem accuratè consideraveris, probè animadverteres, hanc sectionem, in parte scilicet superiori, aliquanto ulteriùs ad occasum atque in inferiori

ri, magis ad ortum inclinare. Id inde evenit, quòd hæc præfens, propè Nodum Boreum, illa verò circà limitem Auſtrinum fuerit obſervata. Hincque clarè deprehenditur, beneficio harum Lunationum, & inclinationes cuspidum, præfertim quadraturarum, optimè explorari poſſe: ſi nimirum diligenter tantum accurateq; ſingulis Menſibus, nunquam ceſſante operâ, ſectiones delineentur.

CAPUT LIV.

LUNATIO LUNÆ CRESCENTIS OBSERVATA, GEDANI,

Anno Chriſti 1645. Menſe Decembri.

Luminarium conjunctio in diagrammate

*Lunatio cres-
cens VIII.*

E E contigit in 27 grad. Sagittarii, & 3 grad. 31 latitudinis Borealis. Die 18 Decembris horâ 5 min. 32 matutinâ.

A. Obſervata in 9 grad. Aquarii, in 0 grad. 10 min. latitud. Borealis, circa Nodum Auſtrinum: die 21 Decemb. horâ 5 à meridie, à conjunctiõne 12, diei 4 currentis.

B. Obſervata in 4 grad. Piſcium & 2 grad. 2 min. latitudinis Auſtrinæ: Die 23 Decembris, horâ 5: à meridie num. à conjunctiõne verò 13, diei 6 currentis.

C. Obſervata in 17 grad. Piſcium, 2 grad. 59 min. latitudinis Auſtrinæ in punctis intermediis: die 24 Decembris horâ 5 à meridie, à conjunctiõne 12, diei 7 currentis.

D. Quadratura obſervata in 1 gr. Arietis, in 3 grad. 52 min. latitudinis Auſtrinæ, die 25 Decembris, horâ 7 vespertinâ à meridie, à conjunctiõne verò 14, diei 8 currentis, 1 poſt veram quadraturam.

E. Obſervata in 13 grad. Arietis, in 4 grad. 35 min. latitudinis Auſtrinæ. Die 26 Decembris horâ 6 à meridie num. à conjunctiõne verò 13, diei 9 currentis.

F. Obſervata in 28 grad. Arietis, 5 grad. 2 min. Auſtr. latitudinis, die 27 Decembris, horâ 8 à meridie num. à conjunct. 15, diei 10 currentis.

G. Ob-

Lunaris Greccens.

7.




Fig. DD

Pl. 5.

Lunatis Græcens.
8.




fig EE.

Autor Sculpserit

G. Observata in 13 grad. Tauri, circa Limitem Austrinum; die 28 Decembris horâ 10 à meridie num. à conjunctione verò 17, diei 11 currentis.

H. Observata in 26 grad. Tauri, in 4 grad. 58 min. Austr. latitud. die 29 Decembris, horâ 7 à meridie num. à conjunctione verò 14, diei 12 currentis.

I. Observata in 10 grad. Geminorum, in 4 grad. 26 min. latitudinis Austr. circa Perigæum: die 30 Decembris horâ 7 à meridie num. à conjunctione verò 14, diei 13 currentis.

K. Observata in 27 grad. Geminorum, in 3 grad. 31 min. latit. Austr. die 31 Decemb. horâ 9 à meridie num. à conjunctione 16, diei 14 curr. 23 ante veram quadraturam.

Plenilunium observatum in 11 grad. Cancri, 2 grad. 27 min. latitudinis Austr. die 1 Januarii Anno 1646, horâ 8 vespertinâ, tempore nimirum veræ oppositionis.

Attende 1. Hanc Lunationis periodum, inprimis eam ob causam maximè esse notabilem, quòd ejus conjunctio circa ipsum principium Capricorni, haud exiguam habeat latitudinem Borealem; quadratura in primo gradu Arietis; atque oppositio circa initium Cancri, in latitudine Austrinâ, fuerit deprehensa: quare & hi tres limbi, in æquali ferè distantia ab invicem remoti conspiciuntur. Duo extremi, quàm unquam possunt maximè distant. Limbus conjunctionis, indicat terminum minimæ librationis, in latere dextro; & in sinistro, terminum maximæ librationis; simulque faciem nobis offert Plenilunii Æstivi. Limbus oppositionis, propemodum terminum maximæ librationis commoustrat, in latere dextro, atque in sinistro, minimæ librationis; pariter & faciem Plenilunii Brumalis hactenus conspicui nobis exhibet.

Notatu digna.

2. Motus librationis disci, à conjunctione usq; ad oppositionem (quia Luna in signis descendentibus commoratur) omni tempore secundum ordinem signorum, est progressus: exinde & interstitium Mæotidis, indies magis magisque fuit dilatatum.

3. Peripheria Plenilunii, tempore veræ oppositionis, de parte superiori, Boream versùs, non æquabili quodam tractu, sed quodammodo flexuoso apparebat; atque primâ statim vel se-

cundâ post ipsum Plenilunium horâ non occasum, ad Paludem Mæotidem, verùm Corum versùs, circa Paludem Amadocam, decrefcere incipiebat: Id autem potiffimùm eam ob rem evenit, quòd nimirum tunc habuerit latitudinem Australem 24 graduum; ex quâ necessariò talis oritur apparentia, ut capite 26 de Pleniluniis satis superque ostendimus.

Ex his igitur Lunationum observationibus, út & omnium reliquarum phasium iconifmis, abundè satis, inter alia probatum, atque demonstratum arbitror, non solùm motum quendam librationis disci in Lunâ reperiri; sed & hunc, ex nullo alio fundamento oriri, quàm ex ipso motu longitudinis, latitudinis, atque Lunæ Nodorum: quare & singulis Mensibus, quemadmodum totum tanto intervallo percurrit Zodiacum, ita & motum illum librationis ex parte absolvit. Nam accedit, & hoc, quòd dum Luna circa initium Cancrî præfertim propè limitem Austrinum existit, spatium inter Paludem Mæotidem limbumque occidentalem, omnium semper fit ampliffimùm; & modò dicta Palus, ab ipso limbo remotiffima; atque Macula ex adverso, (Palus aliàs Maræotis à me nominata) limbo tunc fit maximè vicina. Contrarium autem accidere observavi Luna in Capricorno, atque limite Boreali versante: Palus quippe Mæotidis tum limbo Lunæ est viciniffima, Lacus verò Maræotidis remotiffimus: in reliquis autem signis respectu hujus diverfi positus, hæ Maculæ, modò longiùs modò propiùs à limbo Lunæ abesse conspiciuntur. Quæ quidem, ut judico, de hac materiâ sufficerent: veruntamen, ut quilibet Siderum scrutator harum rerum eò reddatur certior, proposui hunc librationis motum, aliorum quoque Præclariffimorum Virorum observationibus corroborare, præfertim illorum, quæ à summæ eruditionis Viro, Ismaele Bullialdo, magnoque illo fide Gallicano Petro Gassendo nobis sunt proditæ. Harum autem Bullialdus mentionem facit, in Astronomiâ Philolaicâ cap. 13. pag. 179. 180. 181. lib. III: quibus periodum librationis, quartamque inæqualitatem investigare omnibus viribus tentavit. Effet quidem animus, omnes & singulas quinquaginta observationes oculis subjicere, argumentorumque loco illis
uti:

uti : sed, ne te Benevole Lector nimis diu morer, idcirco præcipuas tantùm huc referam, quæ omnium apertius indicant, quando Palus Mæotis (Bullialdo, seu Gassendo Mare Caspium appellata) maximè à limbo Lunæ occidentaliori distiterit, & quando iterum ei fuerit vicinissima : vel quando Lacus Maræotis (ipsis Macula orientalis dictus) fuerit quàm maximè à limbo orientali remotus, vel ei propinquus : quanquam & omnes reliquæ observationes, si longitudes latitudinesque Lunæ diligenter considerentur, mihi quàm optimè astipulantur; ut quilibet observationes illas examinaturus, re ipsâ experietur.

1. *Prima Observatio habita fuit à Petro Gassendo, Anno 1636, die 23. Septemb. quo tempore Macula orientalis (id est, Lacus Maræotis) visa fuit prope limbum ortivum. Quod ita necessariò fieri oportuit. Luna namq; tunc in 25 grad. Cancri subsistebat, ubi interstitium Maræotidis semper arctissimum à nobis fuit visum.* Observatio 1. mibu P. Gassendi, revolutio & Termini librations Lunæ stabiliuntur.

2. *Die 8. Octobris sic adnotat. Interstitium lucis inter Maculam caspiam (id est Paludem Mæotidem) & limbum occiduum Lunæ ita fuit attenuatum, ut strictius nunquam viderim. Hoc pariter hinc evenit, quòd Luna in Capricorno extiterit, quo tempore, interstitium Paludis Mæotidis solet esse tenuissimum.* Observatio 2.

3. *Die 20. Mane, Maculam orientalem vicinam valde limbo observatam esse scribit: nec mirum, cum Luna fuerit in 20 gradu circiter Cancri.* Observatio 3.

4. *In duabus sequentibus observationibus, ait, à 9 Novembris, usque ad 11. interstitium inter limbum & Caspiam visum sensibilibiter increvisse. Quod equidem mihi favit maximè: Luna enim tum versabatur in signis Ascendentibus; die 9 Novemb. erat in Ariete, & undecimo in Tauro, ita ut necessariò interstitium creverit.* Observatio 4.

5. *Die 19. Mane Macula orientalis limbo vicinissima. Die 20. eadem vicinissima. Die 21. tantillum remotior. Quia die 19 circa ultimum gradum Leonis extitit: die verò 21, jam in 25 gradu Virginis.* Observatio 5.

6. *Die 5. Decemb. Caspia ora proxima. Die 10. Caspia sensibilibiter remotior. Nam in primo loco observata fuit in Piscibus, in secundo autem in 25 gradu circiter Tauri, in quibus signis usque ad Cancrum, interstitium Caspiæ vel Pal. Mæotidis, uti notum, semper crescit. Reliquæ P. Gassendi observationes, optimè etiam* Observatio 6.

consentiunt, si illas diligenter ad motum longitudinis, latitudinisque Lunæ examinaveris; exceptis duabus vel tribus, quæ paululum vacillare mihi videntur; præsertim quæ habita fuit, Anno 1638. die 20. Decembris; fortassis enim, pro Maculâ orientali, Caspia fuit annotata.

Jam verò me ad observationes Bullialdi conferam; inter quas certè nulla reperitur, quæ vel in minimis mihi contrariatur; sed omnes ad amussim cum meis observationibus, motuque meo libratorio conveniunt: uti quibuscunque earum examinatoribus clarissimè patebit.

Observationes Bullialdi.
Observatio 7

7. Eodem enim annotante An. 1643. die 2. Junii, Macula Caspiæ limbus, aberat à limbo Lunæ occiduo, minori quintâ parte latitudinis ipsius Macule intervallo. Opposita & ad ortum sita Macula, distabat à limbo orientali, totâ suâ longitudine, & etiam tantillo majori interstitio. Solis & Lunæ oppositio fuerat eo die duabus horis ante meridiem. Quibus verbis exprimit, Maculam caspiam (Paludem Mæotidem) limbo occiduo fuisse vicinissimam & Maculam orientalem (Lacum Maræotidem) à limbo orientali remotissimam. Quæ quidem observatio perquam bene mecum consentit: Luna enim tum temporis in 17. grad. circiter Sagittarii, non procul à Capricorno situm habuit, & quidem circa limitem Borealem: in quâ constitutione, eadem semper talem nobis exhibet faciem; sicuti ex meis iconis, præsertim ex limbo horizontali Capricorni, in quibusdam Pleniluniis descripto, patet.

Observatio 8

8. Die Junii 3. horâ undecimâ, usque ad Maculæ Caspiæ limbum occiduum decreverat Luna. Macula orientalis in eodem situ, ac pridie apparuit. Gemma inferior, quæ & turris rotundæ, albæ atque lucidæ speciem exhibet (Mons scilicet Sinai) unde Montium longa series utrinque producitur, in superficie corporis Lunaris, valde alta erat in disco Lunæ. Profectò, sic esse debuit; quia Luna in Capricorno, & limite Boreali fuit observata: in quo situ, hæ omnes apparentiæ, se se nobis semper offerunt.

Observatio 9

9. Septembris die 18. horâ 7. 30. min. Limbus Maculæ Caspiæ stringebat ferè limbum occiduum Lunæ, nec antea magis propiores videram; non erat intervallum majus sextâ parte latitudinis Maculæ, admodum penes latitudinem contractæ, imò vix æquabat sextam latitudinis illius partem. Quòd in hac observatione aspectus Lunæ planè similis fuerit duobus antecedentibus, facilè colligitur ex eo, quòd Luna pariter circa Sagittarium, limitemque Boreum fuerit constituta.

10. Dic

10. Die 1. Octobris, *Macula orientalis propior facta erat, & coarctata magis* *Observat. 10.*
(quàm die 27. & 30. Septemb.) neq̄ anteatam proximam limbo videram. Ratio est, quòd priùs fuerit in Ariete & Tauro, postmodum autem ad Geminos, limitemq̄ Austrinum pervenit: hinc quotidie *Macula orientalis vicinior margini, arctiorq̄e viâ.*

11. Oct. d. 24. *limbus Caspiæ recesserat à limbo Lunæ occiduo, septem uncias latitudinis: Macula oblonga* (id est, lacus occidentalis minor) *apparuit inter limbos Caspiæ & Lunæ.* Nam: cùm Luna fuerit in Ariete prope Nodum Austrinum, interstitium illud nec majus nec minus apparere, neq̄e in illo, non nisi unica duarum Macularum oblonga conspici potuit; phasibus quamplurimis id comprobantibus. *Observat. 11.*

12. Die 26. Octobris hor. 7. *vesperi; Caspiæ limbus distitit à limbo occiduo, dodrante latitudinis Maculæ, & ipsa latissima apparuit: visæ sunt insuper duæ* *Observat. 12.*
Maculæ oblongæ, inter Caspiæ & Lunæ margines. Macula orientalis distabat à limbo orientali Lunæ (cujus rotunditas nondum perfecte completa erat, etsi, quod deerat, ferè insensibile foret) paulò plus latitudine suâ, vel saltem intervallo aequali. Tempore hujus observationis, Luna scilicet ad initium Tauri circiter pervenerat: quapropter non solum intervallum illud magis extensum apparuit, sed & ambæ jam Maculæ oblongæ inter caspiam (Paludem Mæotidem) limbumq̄; Lunæ fuerunt animadversæ.

13. *Novembris die 16. vesperi, Caspiæ ora occidua, distitit ab occiduo Lunæ margine, quadrante latitudinis Maculæ.* Ita ut hanc Maculam limbo Lunæ vicinissimam fuisse, faciliè colligatur. Luna enim circa ultimum gradum Capricorni, limitemq̄e Boreum versabatur. In sequentibus autem observationibus, quæ die 16. 18. 20. 21. 22. & 30. Novemb. habitæ fuerunt, *Macula caspia à limbo Lunæ occiduo, quotidie fuit facta remotior: quippe Luna in signis ascendentibus tunc ferebatur:* *Observat. 13.*

14. *Decembris 23. hor. 8. fuit remotissima Caspia à limbo.* Nec mirum; *Observat. 14.*
cùm observata fuerit in 15. grad. Geminorum, & præterea circa limitem Austrinum.

15. Anno 1644. *Januarii 18. fuit caspia remotissima.* Volvebatur *Observat. 15.*
enim Luna, circa initium Geminorum, limitemq̄; Austrinum.

16. *Februarii 12. visa est Caspia remotissima.* Luna namq̄e illo tem-

pore circa Taurum erat constituta, non procul à limite Austrino : idcirco interstitium inter Caspiæ ac Lunæ limbos satis fuit amplum; sed nihilominus, aliquantulum arctius fuisse, quàm in antecedente, vel subsequente observatione, penitus mihi persuadeo.

Observat. 17. 17. Martii 13. *vidi caspiam, ait à limbo remotissimam.* Luna enim erat in 5. circiter gradu Geminorum, limiteque Austrino : quo tempore, tanquam circa puncta Solstitialia Æstiva, Macula prædicta, semper maximè à peripheriâ Lunæ occiduâ, remota conspicitur.

Ex his autem, ut & reliquis omnibus observationibus Ismaelis Bulliardi, ac P. Gassendi, plus quàm satis apparet, maximam, Maculæ Caspiæ, vel Paludis Mæotidis à limbo remotionem, & minimam, Maculæ orientalis vel lacus Maræotidis, circâ initium Cancri, limitemque Austrinum se se nobis conspiciendam obtulisse. E contrario verò in principio Capricorni & latitudine maximâ Septentrionali, Paludem Mæotidem, semper fuisse limbo Lunæ vicinissimam, lacumque Maræotidem remotissimum: prout ex omnibus nostris phasium observationibus, ex ipso Cœlo petitis, liquidò demonstravimus. Utrùm verò, modo illo jam dicto, constanter perpetuoque maxima & minima libratio in Cancro, & Capricorno perseveret; an tractu diuturnioris temporis Luna adhuc inæqualitates quasdam patiatur, vel utrùm secus se res habeat? certò sanè in præsens affirmare nequeo, hoc autem maximè possum, quòd hucusque, observationum mearum tempore, nihil aliter deprehenderim, quàm quòd continuè in illis signis, Cancro scilicet & Capricorno, limites librationis fuerint animadversi. Quamobrem totus sum in eâ opinione, limbos quidem maximæ & minimæ librationis, in Lunâ, respectu Macularum, nunquam variaturos; motum tamen maximæ & minimæ librationis, sive limites non perpetuò in iisdem signis permanseuros; sed cum tempore, secundùm Nodorum retrocessionem, ex Cancro & Capricorno pedetentim exituros. Quod autem cum in tam brevi temporis spatio, paucorum videlicet annorum (veluti intelligentes rerum cœlestium existimatores faciliè concedent) minimè à nobis deprehendi potuerit; idcirco summè erit ne-

necessarium, ut omnes & singuli cœlestis fornicis indefessi scrutatores, & maximâ quidem cum diligentia, tum constantiâ adhibitâ, deinceps etiam attendant, num videlicet ejusmodi librationis motus, per omnia in Lunâ cum progressu temporis, persistat, necne; ut & ille continuis multorum annorum observationibus, naturæ legibus consentaneis, & indubitatis astringatur: id quod haud dubiè non infeliciter assequatur, si viam superiùs indicatam, per continuas Lunationum periodos tritam, fideliter sequentur. Igitur eos etiam perquam humanissimè admonitos, & obtestatos velim, ut in hanc rem, quam possunt maximè incumbant, & nihil intentatum relinquunt, quòd plenè investigando huic Lunæ librationis motui deservire non nequeat. Me quod attinet, non patiar ita somnum mihi esse charum, ut tantæ rei indagatio non sit charior. Unde etiam, quæ impofterum sum animadversurus, me cum Mathematicis cultoribus libenter esse communicaturum, quasi stipulatò & sanctè polliceor.

CAPUT LV.

EX PHASIIUM NUDO ASPECTU, LOCUM
Lunæ circiter verum, distantiam luminarium,
Lunæque ætatem explorare: nec non adminiculo figuræ phasium
primariæ, genuinam quantitatem, atq; proportionem diametrorum stellarum, novâ quâdam ratione
investigare.

Nemo certè inficias ire potest, artes Mathematicas, præsertim autem Astronomiam, Geographiam, remque nauticam, generi humano per esse scitu necessariam; propterea quòd nullus unquam in toto orbe terrarum, cujuscunque etiam sit conditionis, reperiatur, qui non ex hac illâve Matheseos parte, insignem sperare possit utilitatem. Consequitur verò proinde evidenter, omnes illas scientias & artes, quæ modò dictam Mathesin juvant, ornant, provehuntque, non solùm esse utilissimas, sed mereri, ut magni illas faciamus. Cum itaque Selenographia, tum Astronomiæ & Geographiæ, tum Rei nauticæ, auxiliatrices porrigat manus, uti ex sequen-
tibus

Selenographia Mathematicarum scientiarum non est postrema.

Selenographia, ad res in naturâ abstrusissimas, nobis pandit fores.

Selenographia ope Astronomiam excolimur.

tibus egregiè fiet manifestum; non, opinor, certè hallucinabor, si illam Mathematicarum artium gemmulam nuncupavero. Neque aliud mihi persuadere possum, quàm quod Selenographia, cum maximè Astrophilis, præ gemmâ aliquâ charior sit futura, dum iis penè innumeras, easdemque admodum varias Lunæ phases, cum admirandis illarum vicissitudinibus, quasi coràm spectandas exhibet: quâ ratione simul ad diversissimas (quibus nihil esse potest jucundius) meditationesque contemplationes, tam Physicas, quàm Mathematicas; hoc est, ad perscrutandas res nimis quàm multas in naturæ theatro abstrusas, quasi manu ducuntur. Denique verò etiam omnium nostrum mens, ex objectâ tam stupendorum operum divinorum, quæ hîc visuntur, specie, plus plusque excitabitur, ut ab eâ opifex creatorque ipse, à quo omnia in humani generis emolumentum, atque oblectationem sunt condita (cujus officii nos præsertim Christianos decet esse memores, quibus id in Scripturâ Sacrà est clarè præscriptum) tantò magis suspiciatur, laudetur atque celebretur.

Ne autem Lectorem quasi in limine, hîc nimis morer; brevibus, at non obscure, commonstratum ibo illic; qui ad Astronomiam universam, (illam inquam scientiarum Reginam, à quâ ut Geographia, ita sigillatim res nautica, quid? quod & reliquæ partes artesque Mathematicæ universitatis lucem multam accipiunt) excolendam, hoc est, & corrigendam, atque perpoliendam permultum faciat Selenographia? Nam ut nullus dubitare potest aut debet, quin Astronomiam (qualem jam habemus) nobis pepererint corporum observationes cœlestium: ita manet, omni tempore per easdem observationes esse augendam, atque ejusdem professores (si alicubi in eâ tradenda erraverint) comiter revocandos esse in viam. Uti etiam sanè non aliter comparatum est, non minùs cum Astronomiâ, quàm cum reliquis scientiis humanis, quòd hæ omnes cum illâ multum imperfectionis habeant; dum & ingenio, & ætate deficiamus miseri mortales, ut nihil absoluti à nobis & undique perfecti, etiam si conemur animosius, efficere queamus. Ac credo soli sibi hoc DEUS vindicare vult, quòd ejus opera à se efficta,

cta, & perfecta debeant esse bona, hoc est perfecta : nobis autem illud reliquit, ut in illorum contemplatione, & investigatione atque initiatione, multò autem maximè in sui laudatione, quoad possumus, occupemur omnes ordine, omniq̃ tempore. Itemq̃ue ergò in Astronomiâ multa adhuc supersunt, tam in Systematibus, quàm circa syderum motus, quæ nondum satis explorata habemus; ut planè non desit, quod indefesso studio sidereorum scrutatorum sit eruendum, & in lucem profereendum. Unde sanè profectò assiduis continuisq̃ue siderum observationibus vacare nos oportet, ac præsertim Eclipsium, tum Solarium, Lunariumq̃ue, quàm reliquorum Planetarum atq̃ue stellarum : quò enim hæ accuratiùs instituentur, eò certiores, simulq̃ue Astronomicæ, simul res omnes inde pendentes reddentur. Scias autem hoc velim pro certo, observationes ejusmodi universas & singulas, longè feliciori successu impofterum, hujus Selenographiæ ope, quàm quidem hæctenus factum, nos aggressuros; sic, ut iis mediantibus, non solum Lunæ motum, ejusq̃ue varias inæqualitates (quæ Astronomis nullo non tempore multum negotii faceffivère) sed & longitudes locorum, quibus tota Geographia, resq̃ue nautica innititur, magis exquisitè, accurateq̃ue investigare in proclivi sit futurum.

*Astronomia
nondum ad
perfectiõni
culmen est
redacta.*

*Selenogra-
phia benefi-
cio, observa-
tiones Ecli-
psiu impes-
tum longe ac-
curatius in-
stitui possit.*

Priusquam autem ad observationum harumq̃ue, earumq̃ue amussitate, & sine mendarum periculo, instituendarum modum aperiendum accingamur; placet Astrophilis rationem præscribere, quâ per motum Lunæ librorium; à nobis Selenographico huic labori intentis, inventum, adq̃; certas Astronomicas leges redactum, perductumq̃ue, multa alia summè necessaria, mente suâ assequantur, ad quæ huc usq̃ue pertingere non fuit datum. Sic majores nostri statuere, quòd ex simplici Lunæ adpectu, nullo planè modo, ejus longitudo, atq̃ue latitudo (licet ex parte tantum, nec adeò accuratè id fieri debeat) si haud alio utaris adminiculo, (exempli gratiâ : Ephemeridibus, Calendariis, Globis cœlestibus, vel stellis fixis, quibus Luna adstat) deprehendi, atq̃ue explorari possit. Jam verò facilimò id negotio, satis accuratè fieri posse, explorato tandem

*Motus libra-
tionis perquâ
utili:*

*Ex nudo Lu-
na aspectu,
longitudinè
ac latitudi-
nem ejus in-
dagare.*

K k k

libra-

librationis, atque cuspidum Lunæ motu, primariâque phasium figurâ constructâ, clarè perspicies.

Quemadmodum enim ex iis, quæ suprâ hinc inde dicta sunt, satis superque patet, quomodo ex datâ longitudine & latitudine Lunæ, motus librationis ejus, ad certum aliquod tempus, indagari possit : ita quoque è contrario, dato librationis motu, longitudo atque latitudo Lunæ, non adeò quidem exacto, sed laxiore tamen modo cognoscitur.

*Quomodo
motus libra-
tionis addi-
satur ?*

Atque initio quidem, motus jam dictus, ex intervallo, quod inter paludem Mæotidis & Maræotidis, nec non ex Borealis Australisque parte, Telescopii ope observatâ, hoc modo deprehenditur. Observa enim, sis diligenter, an interstitium ad paludem Mæotidem, in phasibus Lunæ crescentibus, adeò sit amplum, ut duæ illæ oblongiusculæ, Maculæ occidentales, optimè sint conspicuæ ? namque hoc si interstitium ita appareat, evidens est argumentum, Lunam versari in Cancro. Quod si autem idem valde sit coarctatum, rectè omnino concluditur, Lunam commorari circa Capricornum. Viso autem illo spatio nec admodum amplo, nec admodum compresso, indicium est, Lunam circa Arietem, aut Libram existere. Insuper, cum neminem facile lateat, quem Menssem agamus, per se etiam liquet, in quo signo Sol versetur : ut non impeditum sit, inde etiam conjectare, num Luna vel Arietem, vel Libram occupet ? quamvis utroque in signo illo, interstitium illud Mæotidis, æquali constet latitudine. Ex quibus itaque laxiori modo (nam examissim id fieri non posse, ultrò largior) cognoscēs, quando Luna in punctis versetur cardinalibus. Nunc verò item docebimus, quomodo Luna simul in reliquis signis consistens, investigari non nequeat.

*In quonam
signo Luna
extet djudi-
cave.*

Eoque primùm, Lunam Tubospicilli ope instructus, cum probè intuitus fueris, figuræ phasium primariæ, in gratiam observationum constructæ, capitique 44. insertæ, inscribe ejus limbum, liberâ manu, per easdem Maculas, in facie Lunæ conspicuas, interstitiumque ad veram ejus imaginem constitue : quo factò, radio figuræ primario, investiga Lunæ centrum, peripheriæ latitudinisque interstitiî correspondens : tunc enim simul

simul innotescet, quo in circiter signo Luna, quoad longitudinem, latitudinisque gradum, tum temporis versetur, modò tamen & Lunæ partem Australem, Borealemque diligenter fuerit contemplatus.

Secundò verò, ex quadraturis Pleniluniisque hæc Lunæ latitudo longè accuratiùs cognoscitur. In quadraturis quidem, ex sectione luminis & umbræ, si hanc ope figuræ primariæ delineaveris, sectionibusque figuræ capituli decimi octavi, ad paginam 334. insertæ comparaveris. Ubi tamen accuratâ admodum consideratione, atque distinctione opus, quomodo nempe Lunæ sectio inclinet ad reliquas ibidem repræsentatas sectiones; num parallela sit illis, circa limitem observatis, vel circa Nodum Boreum, vel Austrinum descriptis? ex quibus quidem postmodum certò colligitur, an Luna circa limites, vel Nodos existat? itemque ex inclinatione sectionis luminis & umbræ, majori vel minori, etiam latitudinis differentia innotescit. Sed minimè taceo, quòd ad ejusmodi observationes bene administrandas, diligentissimus, atque exercitatissimus requiratur observator, qui tam Lunæ faciem, quàm motum ejus librationis, penitus perspectum habet; aliàs certè omnis labor erit frustraneus.

Ex lucis umbræ, conspiciuntur, optime latitudo Lunæ investigatur.

Jam tertio; in Pleniluniis omnium optime Lunæ latitudo ex peripheriæ asperitate addiscitur, tempore nimirum veræ oppositionis. Quum enim peripheria Lunæ tum temporis æquabili planè tractu undique appareat, certo est argumento, Lunam circa Nodos, sive Eclipticam, versari: Lunæ autem peripheriâ Australiori, ab inferiori videlicet parte, existente asperâ, atque anfractuosa tum maximam possidere latitudinem Borealem significatur: sin verò peripheria Borealis, pars nimirum superior, videatur satis tuberosa, atque lacunosa, liquidum esto, Lunam circa limitem commorari Austrinum. Ex quâ quoque peripheriæ majori ac minori asperitate, & latitudinis circiter gradus innotescit; de quo tamen jam satis fusè capite 26. diximus, quorsum te Lector cupide pedem tuum referre volumus.

Quâ viâ Lunæ latitudo, Plenilunii tẽpore, exploratur?

Cum itaque ex simplici phasium intuitu, locus Lunæ propè verus æstimari possit; sic pariter eodem modo distantia Lu-

*Ex phasium,
Luna à Sole
distantiam
inquirere.*

næ à Sole cognoscitur. Etenim, sicut jam suprâ memini, dato loco Solis, beneficio Mensium semper cognito, locoque Lunæ, ex motu librationis invento, datur quoque propemodum colligere, Lunæ à Sole distantiam, ex simplici videlicet phasium aspectu.

Cognitis verò longitudine atque latitudine Lunæ, tunc quevis futura phasium facies, ratione motus librationis, quovis tempore poterit prædici: partis nimirum Lunæ Septentrionalis vel Australis, respectu amplitudinis, qualisnam poterit esse constitutio? numque spatium Mæoridis, vel Maræotidis eo tempore amplum, vel arctum sit appariturum? perspectum non minus item evadet, quomodo quadraturarum facies erunt comparatæ, inprimisque illarum sectiones, an huc vel illuc inclinabunt? quid? quod & hujuscemodi alia permulta inde præcognoscere licebit; de quibus verò in superioribus jam satis est dictum.

*Num ex pha-
sium quanti-
tate, Luna æ-
tatem conjicere liceat?*

Cæterùm, hîc quæritur, num etiam Lunæ ætatem ex phasium magnitudine, & quantitate investigare possimus? negari quidem haud poterit, Lunam multis diversissimis mirisque motibus, præ reliquis Planetis omnibus, esse subjectam; id quod sufficienter ex capite septimo hujus Selenographiæ palàm est. Hincque variæ illæ inæqualitates, variationesque Mensis Synodici oriuntur. Luna enim ex motu vario jam dicto, modò velox, modò tarda conspicitur, sic ut perrarò, Mensis Mensi, videlicet Synodico, omnino æqualis existat: ita ut phases cujuslibet lunationis perpetuò varientur, observationibus Lunationum phasiumque clarè id attestantibus. Videbitur igitur alicui fortè prorsus impossibile, ex quantitate phasium, ætatem Lunæ crescentis, vel decrescantis exquisitè posse æstimari; accedente etiam hoc, quòd spatia diurna illuminationis, quoad visum, planè inæqualia appareant; quæ, quò peripheriæ sunt viciniora, & à centro remotiora, eò arctiora spectantur: quò verò à limbo remotiora, centroque viciniora, eò ampliora, æstimantur. Insuper verò, ob motum Lunæ librationis, qui utiq; idem est varius, spatia illa diurna illuminationis, phasiumque sectiones, adhuc magis magisque respectu Macularum, modò pro-

promoventur, modò retardantur, mirumq; in modum variantur atque distorquentur. Hoc tamen ego non obstante liquidum aliquem modum facilè detegam, per quem non longe à vero (etsi enim aliquando paululum aberrabitur, nihilominus in unâ aut alterâ tantùm horâ, propter putâ dilatationem & compressionem Macularum, id futurum) colligere poteris, ad quadraturam usque, sive sit in phasibus crescentibus, sive decreascentibus, quânam scilicet sit Lunæ ætas à conjunctione, vel quot dies elapsi sint post oppositionem? quando verò quadraturæ fuerint præterlapsæ, cognosces, quot dies horæque circiter restabunt ad Plenilunium in lunatione nimirum crescente; in decreascente autem, quot dies adhuc erunt residui, ad Synodum usque luminarium? ita ut ex cujuscunq; phaseos aspectu, id, quòd modò diximus, omnino investigare liceat.

Quando igitur hæc scrutari, & quidem absque ullâ aliâ longitudinis, atque latitudinis Lunæ præcognitione animus est, tunc phasin illam præsentem diligenter Telescopio simul adhibito considera; (sed necesse profectò, ut Maculæ tibi Lunares, motusq; ejus librationis, sicuti jam sæpius dixi, admodum sint familiares) adhuc verò contemplare item accuratè interstitium, in phasibus nimirum Lunæ crescentis, inter limbum occidentalem, Paludemque Mæotidem conspicuum, non minùs Regionis hyperboreæ latitudinem; ut scilicet postea possis in iconismo delineationis primariæ, secundùm motum libratorium inventum, limbum describere, phasique competentem: quod utique haud difficulter ab exercitato perficietur. Limbo itaq; phaseos sic descripto, cujus ætatem explorare lubet, summâ opera duc confinium lucis & umbræ; postmodum amplitudinem phaseos circa medium, ejusque maximam latitudinem circino investiga, per scalam nempe, sive mensuram phasium, eamque primariis delineationibus appositam, inque 100. particulas distributam. Et sic Latitudine etiam inventâ, quære in tabulâ subjectâ, qui ei respondeat numerum: Quem si exactè invenies, confestim sanè ex latere sinistro hujus tabellæ, quot dies Luna fuerit nata, à conjunctione numeratâ perspicies. Si autem latitudo phaseos ex scalâ proposita, non præcisè in hac

Modus, ætatem phasium explorandi, detegitur.

tabellâ reperiatur, tunc parte proportionali opus erit, quâ acquisitâ deprehendes, quot horis ætate erit mage confecta Luna. Etsi (quod libenter do) ad unam alteramve horam interdum phases non sic detur astringere. Et hic est modus ætatem Lunæ ante quadraturam primam investigandi; post Lunam verò dimidiatam, similiter quidem in limbi confiniis; descriptione proceditur; sed loco partis Lunæ illuminatæ, quære beneficio scalæ, latitudinem partis obscuræ & non illuminatæ, quâ, tabellam adi postmodum, quærendo numerum in latere dextro ipsi competentem; utpote ex quo statim dies ætatis in sinistro cognoscuntur: dies autem quos invenies, non numerabis à conjunctione, sed scias, dies esse ad oppositionem restantes. Tum in phasibus Lunæ decrecentibus usque ad quadraturam ultimam, iterum latitudinem partis Lunæ obscuræ, sive deficientis, sive complementi phaseos inquire; qui dies subsidio latitudinis reperti indicabunt, planè ætatem Lunæ ab oppositione. Rursum post ultimam Lunæ bisectionem, parte illuminatâ phaseos, dies ad conjunctionem restantes investigantur.

TABELLA LUNÆ ÆTATIS.

Dies Lunæ ætatis, aut à conjunctione, aut ad oppositionem; vel etiam ab & ad & numerata DIEB.

Phasium quantitas, in particulis, quarum radius Luna disti, 100. aquat, expressa. PART.

1.	4.
2.	11.
3.	21.
4.	35.
5.	53.
6.	76.
7.	96.
8.	114.

Unde Autor hos depromserit numeros.

Si autem percipere satagis, Benevole Lector, unde hos deduxerim numeros, sive phasium quantitatem, in particulis centesimis expressam; scias me illos ex multifariis phasium observationibus, Lunationumq; Periodis eruisse, atq; composuisse.

De cætero, si hæc operatio à sedulo multumque exercitato Selenographiæ Studioso instituetur, certè

& in ipsis horis interdum calculus consentiet. Et ut possint exempla se offerre, ubi à vero aberratum sit scopo; rarentius id tamen fiet: nunquam verò hallucinatio ista duodecim excedet horas. Quâ, opinor, viâ commonstratâ contenti esse in præsens

sens tempus esse possumus : attento, quòd primò omnium hæc à nobis modò signata fuerit. Quanquam methodum hanc ætatis Lunaræ accuratiùs cognoscendæ, continuatis tantùm diligenter Lunationum observationibus, impostero possè accuratiorem reddi, nullus sanè dubito; & fortassis ipse ego, quam primùm duntaxat à reliquis occupationibus meis otii tantillum nactus fuero, multò certiozem Lunæ ætatem investigandi, regulam construam, constructamque cum orbe boni causâ publicè communicabo. Etenim non sum utique nescius, quâ in parte correctione aliquâ hîc adhuc sit opus, & rei huic non adeò difficulter subveniri non nequeat; sed hoc alii reservandum erit tempori. Jam, sis, tabellâ utere concessâ.

Porro, recensitis quibusdam Selenographiæ utilitatibus, planè singularis adhuc aliqua, hîc erit publicanda : quomodo videlicet, adminiculo figuræ primariæ phasium generalis, illiusque Macularum ad Lunæ diametrum veræ proportionis, supra quàm dici potest facillimè atque accuratè, genuina diametrorum quantitas & proportio, tam Planetarum, quàm omnium aliarum stellarum, explorari possit? Ad quas quidem dimetiendas diametros, Astronomi hæctenus, nulli labori pepercerunt; attamen meo iudicio, multum certè à vero scopo, determinatione suâ aberrarunt : sic ut existimem, diametros stellarum longè majores, quàm revera sint, æstimasse, inò tertiâ parte majores exhibuisse. Quod ne temerè dixisse videar, ecce ipsam meram veritatem, ex sequenti demonstratione liquidissimè elucescentem.

Initiò enim, quis mihi negatum ibit, si præsertim illa, quæ de observatione stellarum fixarum, capite III. dicta fuère, benè perceperit, & rerum omnium periculum ipse fecerit; nos Telescopiorum nimirum ope, multò accuratiùs correctiùsque stellarum diametros, quàm nudo visu dimetiri posse : eo attento, quòd visus noster, nullo alio adminiculo adjutus, facilè lumine radorum adventitio, decipi possit; adeò, ut stellas semper majores, quàm revera sunt, iudicet. Atenimvero tubus, cum lumen superfluum, radiosque spurios, stellis, maximâ ex parte detrahat, corpora illorum planè rotundata, crinibusque profus

Nova certissimaque, diametros stellarum dimetiendi ratio.

Stellarum diametri multò minores sunt, quam veteres unquam putarunt.

Accuratiùs armato, quàm nudo, oculo investigantur stellarum diametri.

*Per Maculas
Lunares o-
mnium opti-
mæ stellarum
diametri de-
finiuntur.*

fus orbata, exhibet : sequitur utique ut diximus, Telescopium ad mensurandas stellarum diametros, quàm maximè esse convenientissimum. Interim tamen solus Tubus huic rei nondum equidem sufficit; sed omnino necesse est, ut alio quodam adminiculo, corpore videlicet aliquo cœlesti insimul utamur, cujus diameter nobis longè sit notior, quàm aliarum stellarum, quarum diameter est determinanda. Namq; sic indubitato stellæ dimetientem, quam inquirimus cum illius corporis, comparare, certamque proportionem inter illas diametros instituere poterimus. Jam nullum unquam meâ sententiâ nobis dabis corpus cœleste, ad has quidem observationes instituendas magis idoneum, quàm corpus Lunare, cum ejusdem Maculis, Montibus nempe & Vallibus, Infulis Scopulisque in eo detectis. Nam, cum multæ diversissimæ, ratione magnitudinis Maculæ, in Lunâ inveniuntur, quæ partim majores, partim minores, in variâ proportione reliquis existant : utique, unam vel alteram Maculam, quovis tempore, in superficie Lunæ patenti, inter tot infinitas, reperiri posse, quæ aut huic Planetæ, aut illi stellæ fixæ, quoad diametrum æquiparetur, nullum certè dubium est.

Quod si verò objicias, diametrum Lunæ visibilem, nondum satis esse cognitam, atque exploratam? respondeo quòd utcunq; se habeat magnitudo diametri Lunaris, in eo, quod ad hanc rem facit, nihil adeò esse situm. Hoc enim non potest impedire, quin nihilominus possit vera proportio inter Lunæ, stellæq; alicujus dimetientem inveniri : ut potiùs, confirmatâ deinceps Lunæ diametro, diameter stellæ alterius quæsitiæ planè rectissimè se se sit habitura. Quamvis enim insuper Lunæ dimetiens, uno alterove minuto major, vel minor statuatur, attamen parùm admodum nostro negotio id obstat; quippe quòd sic in quibusdam duntaxat minutisecundis, levis aliqua differentia animadvertetur, cujus gratiâ tantò minùs nos esse hoc tempore admodum sollicitos attinet, quantò minùs nos inter & veteres, ratione stellarum diametrorum, vel quâ minuta prima conveniat.

Sed jam ipsum modum, diametros stellarum visibiles ex-
plo-

plorandi monstrabo. Primò, Telescopii cujusdam eximii ope, observa diligenter diametrum alicujus stellæ (hoc autem fieri oportet, Lunâ versante in viciniâ) illiusque quantitatem probè tibi imaginare; tumque extemplò percursita Lunam universam, ejusque Maculas, num aliqua harum adsit, quæ huic stellæ in magnitudine (quarum certè Macularum haud exiguus reperietur numerus) comparari possit, quæ observatio aliquoties deinde, majoris certitudinis gratiâ reiteretur. Quo scilicet modo Anno Æræ Christianæ 1646. die 22. Aprilis, horâ mediâ octavâ vespertinâ, proportionem diametrorum Jovis, Veneris & Lunæ investigavi. Jovis diameter tum temporis æquabatur uni, trium Montium Moscho in Lunâ, ad Sinum Atheniensem Ponti Euxini sito. Venus verò, tertiâ ferè parte; eodem tempore, quoad diametrum existebat Jove major, sic, ut, accuratâ inspectione adhibitâ, magnitudinem quasi Montis Didymi, vel Sipyli præ se ferret. Quo quidem à me percepto, accuratè admodum perpendi figuram phasium primariam; quoties nimirum Macularum inventarum diameter, ab hac Lunari comprehenderetur. Inveni itaque diametrum Montis Dydimi esse $\frac{11}{12}$ partem Lunæ dimetientis, & diametrum Montis Moschi $\frac{1}{3}$ circiter partem. Proinde, constitutâ diametro Lunæ visibili pro tempore 30. minorum circiter; sequitur necessariò diametrum Jovis 1. min. 2. secundis non fuisse majorem: Veneris verò diametrum 1. min. 22. secund. tantùm æquasse. Ex quibus utique vides Venerem multò esse minorem, licet in Perigæo extiterit, quàm tribus minutis primis, ut quidem Veteres Astronomi aestimarunt. In mediâ remotione, inprimis in Apogæo, longè verò adhuc minor reperitur. Bene enim memini, Anno 1644. cùm Venus, circa suam quadraturam esset matutina, quòd non excederet Montem Ætnam, cujus diameter ad Lunæ diametrum, se habet ut 1. ad 39. Provenit itaq; inde, quòd data Lunæ diametro 30. min. diameter Veneris tantùm sit 46. sec. Hincque etiam si in Apogæo observandi ejus diametrum daretur occasio, longè adhuc minorem inventum iri facilè colligitur.

Ipse stellarū diametros in vestigandi modo proponitur.

Jovis & Veneris diameter quanta sit?

Quanta Veneris diameter sit in mediâ elongatione à Terrâ?

Cognitum primam Planetarum diametrum Fixarum quoque dimittentes nullo negotio determinatur.

Quâ quidem methodo, non solum Planetarum omnium; sed & ipsarum stellarum fixarum diametros investigari posse, nullum certè apud me est dubium. Proinde minimè absonum erit, ut primùm omnium Planetarum, atque Fixarum primæ magnitudinis, diametri explorentur, quò inter eas ad invicem comparatio quædam institui possit, quantò scilicet ratione reliquarum, num dimidiâ, tertiâ vel quartâ parte &c. sint majores vel minores? Id quod eò feliciter succedet, si modus ille novus à me primò ostensus, per foramina nimirum minora convexis lentibus applicata, Fixis, Marti, Veneri Mercurioque lumen detrahendi adventitium, adhibeatur.

Quibus qui delectatur contemplationibus, hoc modo, quo diximus, illas feliciter instituere poterit. Ad quas quidem observationes mecum certatim suscipiendas, & præcipuarum stellarum diametros explorandas, omnes & singulos Astronomiæ Cultores, quàm humanissimè invito, ut hoc pacto unus alterum excitet; & ita omnes simul omnem moveamus lapidem, omniaque subsidia nobis comparemus, quibus aliquando ad veram diametrorum stellarum proportionem pervenire liceat. Id enim sanè profectò & Republicæ universæ literariæ, & præsertim divinæ nostræ artis Astronomiæ permagni interest. Quo ipso in negotio, nî fallor ipse ego jam multò ulterius gradum protulisset, si aliis Selenographicis observationibus hætenus non fuisset noctuque diuque detentus: qui tamen imposterum nihil intentatum eapropter relinquam, simul ac tantum Selenographiam hancce nostram, ad finem exoptatum perduxero, & si (quod precor) DEUS omnium nostrarum arbiter rerum, sanitatemque vitamque clementissimè concesserit.



CAPUT

CAPUT LVI.

OBSERVATIONES ECLIPSIUM LUNARIUM,
 atque stellarum occultationes, correctè ut fieri quàm maximè potest, instituere; cùm verò inprimis initia, fines, phasèsque reliquas, tum veram phasium quantitatem, radiumq; umbræ terrenæ nova methodo, viâq; planè infallibili determinare: nec non Longitudines, hæctenus planè incomperato modo investigare, Globumq; Lunarem artificiosè construere.

UT observationes Eclipsium Lunarium, ab omnibus in universum spectatoribus exquisitè instituantur, tamque principium finisque singularum phasium, quàm illarum vera quantitas, præsertim autem umbra terrena accuratè determinetur, animus est impræsentiarum methodum eò facientem, atque eam haud vulgarem palàm facere. Nam & hujus rei infallibilis scientia, summopere requiritur; cùm tota Astronomia, Geographia, resque Nautica, veluti jam sæpius diximus, iis rebus innitantur, & unicè fulciantur. Etenim, ut ut veteres observationibus Eclipsium Lunarium operam dederint assiduam, negare tamen nihil vereor; illos ullam sanè accuratam Eclipsium quantitatem, aut legitimam initii finisque determinationem, unquam nobis exhibuisse: imò, reliquorum omnium quempiam, qui ejusmodi observationes huc usque, absq; Tubi adminiculo instituit, aliquid certi annotare potuisse; quod vel ad longitudines locorum inveniendas, vel ad Tabulas Geographicas corrigendas, multò minùs ad motum Lunæ examinandum, aliquid solidi contulisset: id quod ex sequentibus satis superque fiet manifestum.

*A Veteribus
 Eclipsium ob-
 servationes
 minùs emen-
 datè admini-
 strari potuerunt*

Primò enim, ex Eclipsium continuis Lunæ observationibus, certo certius edocti sumus, quòd earum initium nudo visu observatum, omni tempore citius ingruere videatur, quàm si oculo armato cernatur: quodque Eclipses, absque Tubo observatæ, tardius finem facere appareant, quàm si Telescopio admoto eas inspicias, sic, ut differentia illa ad semidigitum, imò interdum

*Luna, nudo
 visus citius
 obscurari;
 cõtra tardius
 lumen recu-
 perare, vide-
 tur.*

dum ad ipsum integrum digitum, se se extendere non nequeat. Scias enim velim densissimam illam veram, atque obscurissimam umbram, non statim in momento se se in Lunam ingerere; sed pedetentim ab initio eam occupare. Estque circa Eclipsios principium, umbra instar fumi admodum diluta tenuisve, quæ paulatim tractu temporis densior evadit, usque dum in nigerrimam tandem terminetur. Fieri itaque procul dubio potest, ut is, qui observationes absque Tubi adminiculo instituit, aut hanc penumbram, aut intermediam umbræ quandam particulam, pro vero umbræ Eclipsiosque initio, apprehendat. Unde impossibile (quoniam observatores non omnes & singuli, initium finemque annotando, viâ planè eâdem incedunt, Tubisque utuntur) ut observationes in ipsis minutis convenire possint.

*Penumbra
quadam, tẽ-
pore Eclipsiũ,
veram præce-
dit umbram.*

*Nudo oculo
Eclipsis omni
tempore mi-
nor quàm est,
apparet.*

*Pro diversa
pupilla dila-
tatione modò
major, modò
minor eadem
Eclipsis spe-
ciatur.*

*Rarò diversi
observatores
usam ean-
dem, Ecli-
psios quanti-
tatem deter-
minant.*

Secundò; apparet quoque Eclipsis, semper oculo inermi minor, quàm revera Telescopio armato, existit: quemadmodum sedulus quilibet rerum cœlestium spectator, re ipsa experietur. Contrà pars luminis ab Eclipsi libera, nudo oculo, perpetuò major quàm est, se se objicit. Itaque, pari modo, qui in phasibus corniculatis & falcatis animadvertitur, de quo, ut autumo, capite undecimo superiori, jam satis dictum. Præterea accedit & hoc, quòd cuilibet observatori, nudâ oculorum acie, Eclipsin Lunæ, ejusque phasin, spectanti, illa aut aliquantulum major, aut minor, quàm alteri videatur; prout huic observatori pupilla amplior vel arctior, quàm alteri à naturâ est concessa: sive ratione etiam medii obscurioris, vel clarioris, in quo contemplator Eclipsios tum fuerit constitutus. In illo autem pupilla dilatatur, in hoc constringitur, ut suo item diximus loco. Hincque rarenter admodum (nisi casu quodam eveniat) observatores in Eclipsium determinandâ quantitate, inter se conveniunt: modò enim hic, exempli gratiâ, Eclipsin partialem septem æstimat digitos, modò alter septem cum dimidio, modò tertius, octo digitos eam planè exæquasse affirmat; tamen omnes illi sub uno eodemque Meridiano fuerint. In cujus rei fidem exempla quamplurima, in medium possem proferre, nisi temporis haberetur ratio: interim tamen unum atque

atque alterum hîc attexam; cujus Kepplerus in Astronomiæ part. Opticâ, capit. XI. Probl. 6. mentionem facit: *Mæstlinus* id quod ex-
plus probatur. Anno 1572. 25. Junii, defectum maximum æstimavit præcisè semissem diametri. At *Gemma Frisius* scribit Lovanii defecisse 8. digitos, lib. 2. *Cosmocritices*. 2. Anno 1601. 29. Nov. vel 9. Decemb. bona quidem pars (inquit Kepplerus) de Lune corpore superfuit, quanta verò esset, discerni non potuit à quopiam cum fiducia. *Ambrosius Rhodius*, *Tychoni* aliquandiu à calculo, æstimavit defectum 10. digitorum *Witebergæ*. 3. Anno 1603. 8. 18. Novemb. contendebant (inquit item Kepplerus) alii plus quartâ parte in defectu esse, mihi minus aliquid hoc abesse censebatur: Etamen obumbrata circumferentiæ pars conspicua fuit. Ex quibus sanè omni luce clariùs patet, quàm lubrica, & fluxa sit Eclipsium quantitatis determinatio, quæ nudis acquiritur oculis. Attamen multùm certè refert, genuinam Eclipsium annotare quantitatem: quemadmodum & Kepplerus, in Astron. part. Opt. eodem modo citato capite, mihi hac in parte his verbis astipulatur: *Magni interest Astronomiæ partiales defectus rectè annotari*: pergitque ibidem circa finem ejusdem Problematis, dicens: *Cupio Astronomos operam dare, ut certiores aliqui modi hujus observationis constituantur. Nam ab hac unâ re dependet id, quod in Astronomiâ vulgò maximi fit, dimensio altitudinis & corporis Solaris. Etenim, si sit parallaxis Solis maxima 3. scrupulorum, & in æstimatione defectus Lunaris tertîa parte digiti aberretur, actum est de 600. semidiametris terræ; si maxima Solis Parallaxis sit 2, aberrabimus 1700. semidiametris terræ, omissione unius scrupuli in defectu Lunari; ut videre est in fronte nostræ Parallaxicæ: hæc illæ.* Concludimus itaque audaçter, ex iis, quæ suprâ attulimus, iterum ut antea; omnium plane Eclipsium à quocunq; observatarum sine subsidio Telescopii peractarum fidem vacillare, nihilque certi ex iis hauriri posse, ut ut quàm accuratissimè videantur observata.

Astronomia multum interest, Eclipses rectè annotari.

Accuratè Eclipses absq; Perspicillo observare, est impossibile.

Quæ cum ita sint, erit profectò summoperè necessarium, omnem adhibere diligentiam, omnibusque viribus contendere, ut huic negotio succuratur, impofterumque omnes præsertim Eclipsium observationes absque omni prorsus aberrandi periculo instituantur. Quod si verò id fieri à nobis poterit, certè tale aliquid nos esse assequutos deprehendemus, quod in primis ad longitudes multò magis exquisitè, quàm potuit fieri hætenus, determinandas, maximopere conducet. Dummodo illa, quæ de observationibus rectè instituendis, jam

jam à nobis proferentur, minimè neglecta fuerint omnia.

*Quenam cir-
ca Eclipsium
observationes
attendendi de-
beant ut ma-
jori certitu-
dine instituā-
tur.*

Primò enim, operæ pretium est, ut omnes & singuli obser-
vatores, quibuscunq̃ue est animus, observationes Eclipsium
Lunarium adornare, sibi de Telescopiis prospiciant: nullamq̃;
omnino observationem, iis destituti aggrediantur.

Secundò, ut universi, non diversâ, sed unâ eâdem omnino
ratione, atq̃ue operâ, ad contemplationes suscipiendas, se
accingant.

Tertiò, ut perpetuò id fiat, ope primariæ alicujus figuræ,
omnes in Plenilunii facie Maculas, legitimâ proportionem refe-
rentis, & huic operi seorsim destinatæ.

Quartò, ut observatores prius faciem Lunæ Maculasq̃ue
ejus, ratione situs, nec non nominatenus, optimè noverint; aliàs
difficile, ne dicam impossibile erit, exquisitam absolvere ob-
servationem:

Quintò, ut omnes & singuli, verum tempus cujuslibet pha-
seos, per altitudines stellarum Fixarum, medianibus entymet-
ricis instrumentis haud mediocri magnitudinis captas, auto-
matis non profus neglectis, accuratissimè investigent.

In quam sententiam, aliquantò etiam fusiùs mentem meam
explicabo: quomodo videlicet, Telescopiorum adminiculo, hæc
observationes quàm accuratissimè sint instituendæ?

*Et Eclipsium
observationes
accuratè in-
stituendi ra-
tio.*

*Duorum pri-
mariorū ico-
nismorū dif-
ferentia.*

Primò, necesse eò est, ut exemplar quoddam figuræ prima-
riæ Lunationum, sive phasium, ejusdem generis, capite 44.
exhibitum tibi sit in promptu; vel, quod ferè præstat, ad Ecli-
psium Lunarium observationes, exemplar archetypi Plenilu-
niorum, in eodem modò citato capite conspicuum. Inter quas
duas quidem delineationes, nulla alia occurrit differentia, nisi
quòd posterior, Lunæ faciem, Maculasq̃ue ejus, sic planè præ-
sentet, quemadmodum tempore oppositionis se se nobis obji-
ciunt; in priori verò primariâ delineatione Lunationum, Mon-
tes convallesq̃ue non aliter, quàm ut quotidie per phases ap-
parent, exhibentur. Præstat utiq̃ue igitur iconismo Plenilu-
niorum, ob faciem magis similem, ad Plenilunia Ecliptica uti.
Observatori tamen exercitato perinde est, utro utatur; cum
proportio utriusq̃; schematis omnino sit eadem. Quâ autem
viâ

viâ hujus generis primarias phases, absq; omni etiam delineationis labore tibi comparare possis, jam supra capite 44. indicavimus.

Secundò verò, in illâ ipsâ figurâ, verum Lunæ limbum secundùm longitudinem latitudinemque, tempore Plenilunii datam describe, id quod pariter in præcedentibus jam aliquoties docuimus. Si tamen aliud etiam placuerit, poteris etiam ingruente Eclipsi, vel paulò ante eam, ex ipsa Lunæ facie, illiusq; interstitiorum, tam Mæotidis & Maræotidis, quàm partis Australioris & Septentrionalioris, amplitudine, peripheriam Lunæ competentem delineare. Quando autem hic conatus in exercitato vix succedet, ut priori quilibet insistant modo, sva-deo & auctor sum. Deinde item necessarium est, ut ejusmodi delineationes vero limbo circumscriptas, aliquot ad manus habeas, quò alterâ phasium lineis undique maculatâ, altera, confusionis evitandæ gratiâ, adsit.

Tertiò; Tubo haud vulgari instructus, initium Eclipses attende diligenter. Diligenter ajo. Nam nescire te nolim, quòd in observatione & delineatione, cùm initii, tum finis, facilè à vero scopo deflectere queas. Ratio est, quòd, priusquam vera umbra ingruat, penumbra, sive umbra quædam dilutissima, uti diximus, nunquam non præcedat. Quam item annotare non minùs placet, servato tamen discrimine, inter hanc & veram illam umbram mox subsequuturam. Ad primum itaque umbræ aspectum, accuratè summâque industriâ in primariâ tuâ figurâ, umbræ appulsum, atque ingressum in Lunam notabis; quam nempè limbi in partem, tum quoad Maculas, tum in quem circiter gradum se se insinuet; simul quoque eodem momento, focii cujusdam observatoris operâ, altitudinem alicujus stellæ fixæ per quadrantem, vel aliud quoddam affabrè elaboratum instrumentum huic negotio accommodatum, indagabis: quemadmodum sanè nec abs re erit, automata minuta prima & secunda temporis indicantia, habere in promptu, quò Cœlo nubeculis obvelato, stellisque fixis se se nonnunquam subducentibus, tempus nihilominus scire non nequeas: nam ea, licet vero tempori, eo momento non exactè respondeant, poterunt ta-

Initium & finem Eclipses rectè annotare, est res valde lubrica.

men

*Inclinationes
annotare, cit-
ca Eclipsium
phasem maxi-
mopere est
necess.*

men per quasdam altitudines prius observatas, vel orto Sole, secundum sciatericum lineæ meridianæ applicatum, feliciter corrigi. Dum igitur umbræ primum aspectum, ejusque tempus modo utroque jam dicto annotas, oportet etiam unâ operâ inclinationem principii Eclipsios consignare: hoc est; quanto nimirum illud distet à puncto verticali Zenith, vel Nadir? Has enim inclinationes, rectè scire permagni interest; quæ (inquit Kepplerus Astron. part. Optic. cap. x. probl. 14. pag. 360.) *si certissimè observentur maximarum rerum in motu Lunæ nobis argumenta præbent, & compendio serviunt.* Item pag. 391. capite x. probl. 26: *Magni interest Astronomiæ & Geographiæ, inclinationes phasium exactè observari & annotari.* Quomodo verò eæ haud difficulter viâque planè compendiariâ, eaque hætenus incompertâ annotentur, atq; observentur, jam jam indicabimus.

Quartò; initio Eclipsios præterlapso, cùm phasis jam aliqua Lunæ fit conspicua, tum denuò illam in figurâ primariâ designare oportet, hoc quidem modo: observa studiosè admoto Tubospicillo, ad quas Maculas, Promontoria, Sinus atque Insulas, arcus umbræ terrenæ terminetur; quo animadverso, eodem prorsus modo, arcum istum in iconisimum transfer, simul altitudinem alicujus Fixæ, tempusque ab automatis petitum, & non minùs ejus inclinationem consigna. Quæ certè cuncta atque singula, circa quamlibet phasim delineandam, summinâ curâ atque diligentiam necessariò debent attendi. Adhæc, quò plures phases delineantur, eò major ex istâ observatione speranda erit utilitas, majoremq; merebitur apud eruditos fidem, præsertim, si omnes phases inter se optimè consentiant, adque normam veritatis respondeant. Si verò omnes phases non in unam referre poteris figuram, accipe alteram, tertiam, imò tot, quot opus est. Instante autem Eclipsi totali, pariter, ab initio recuperationis luminis, usque ad ejus finem, quemadmodum ab ejus initio, ad totalem obscurationem factam, procedendum; nullâq; penitus sinas effugere phasim, sed, si id temporis ratio permittit, ad singulam quartam partem cujusvis digiti, ejus lucis umbræq; terminum depinge. Quamvis verò rarò sic ordine omnes assequamur; cùm nos sæpissimè aëris turbida tempestas

&

& nubeculæ Lunam prætervolantes impediunt, ita ut paucioribus plerumque oporteat esse contentum.

Porro inclinationes phasium quod attinet, has Mathematici, interque cæteros Mæstlinus, Tycho, Kepplerus diverso modo annotare, atque investigare conati sunt; sicut ex hujus Astro-nomiæ part. Optic. cap. x. probl. 14. & sequentibus videre licet: partim quadrante exiguæ magnitudinis adhibito, partim etiam in suas partes distributo circulo. Nonnunquam ad cornua umbræ attendebant, sive quando præcisè in vertice, sive in imâ Lunaris parte, sive ab alterutro latere spectabantur, hoc est, cum cornua aut præcisè sursum supina, aut deorsum prona vergebant, aut ad perpendicularum erecta stabant, vel denique quando cornua Lunæ cum certis fixis, unam eandemque lineam rectam constituebant. Qui inclinationes investigandi modi, ut observatoribus, licet exercitatis, non parùm successerunt negotii, sic admodum etiam deprehenduntur vacillantes: id quod observationes passim satis superque testantur. Enimvero, ut ut sollicitè in id intenderint, nunquam tamen certi esse potuerunt, rem se acu tetigisse; siquidem nudo planè visu, (quod profectò valde lubricum) inclinationes venati sunt, attestante id Præclarissimi & attentissimi Siderum Observatoris, Schickardi, in descriptione observationis Lunæ laborantis Anno 1631. die 29. Octobris habitæ, cujus mentionem ipse facit in responsione ad Epistolam Gassendi, de Mercurio sub Sole viso. Eam igitur ob causam, novam prorsus Astrophilis communicabonem, cujus ope accuratissimè, & quidem ex tempore, nulloque negotio, non tamen citra Telescopium, figuram primariam, Pleniluniumque versatile, capite 26. exhibitum, inclinationes comparantur.

1. Eodem temporis puncto, cum phasim aliquam, ejusque arcum notaveris, denuò faciem Lunæ generoso Tubo oculis applicato contemplare; animadverso videlicet an duæ aliquæ Maculæ à se invicem haud nimium remotæ, in eadem perpendiculari lineâ inveniantur? (admodum enim distantes, Telescopium inprimis 5. vel 6. pedes longum, simul non capit, quod ideo huic negotio minimè conducit) quarum certè quovis tem-

*De phasium
inclinatio-
nibus.*

*Quomodo
hactenus in-
clinationes
investigate
suerint?*

*Quomodo via
planè aliâ
certâque, incli-
nationes sint
acquirendæ?*

M in m

po-

pore nonnullæ reperientur. Si tamen se non offerant Montes quidam insignes, non deerunt (sat scio) Promontoria, Sinus, Lacus, Insulæ, vel scopuli præ aliis lucidissimi quos animadvertere liceat. Exempli gratiâ; quærendum, an Lacus videlicet hyperboreus superior, Insulaque Besbica, in lineâ occurrant perpendicularis; seu verò etiam Insula Besbica cum Insulâ Sinai; vel Mons Serrorum Insulaque Besbica, vel Lacus niger major atque Mons Ætna, vel jam dictus Lacus, cum Insulâ Corsica, vel Lacus niger minor & Insula Besbica, vel Mons Ætna, Monsque Sinai, vel Lacus niger major cum Insulâ Besbica, vel denique Mons Ætna, Insulaque Rhodus, vel hujuscemodi alia loca, quorum in Lunâ numerus ferè datur infinitus? quæris verò, quâ ratione id tam distinctè & accuratè explorari possit, numque certæ aliquæ duæ Maculæ, in eadem lineâ rectâ sint constitutæ? scias itaque, experientiâ me didicisse, quòd ab observatoribus contemplationum cœlestium Telescopio administrandarum assvetis, Macularumque Lunarium probè gnaris atque peritis, id certè nullo negotio, & quidem simplici tantùm aspectu, fieri possit. Quæ si autem cuipiam impossibilia videantur, circa finem hujus capituli, ubi de longitudinibus locorum quædam insuper proferre statuimus, adhuc alium nulli non comprehensibilem, quanquam non vulgarem, nec hætenus ullo tempore cognitum modum patefaciemus. Interea, ne ab instituto nimium digrediamur, in observatione nostrâ Eclipses pergemus, & reliqua animadversione digna restantia persequemur.

2. Proinde Maculas istas duas in eadem perpendiculari lineâ deprehensas, fac annotes diligenter, ad illam ipsam putâ phasin, tunc temporis adumbratam. Præterea verò, quot phases occasio permittet delineare, tot etiam par Macularum in lineâ perpendiculari constitutarum, explorare, atque cuilibet phasi suas competentes adjungere, nec non altitudinem alicujus stellæ fixæ, respondensque tempus, addere est necesse. Nam, ex hac perpendiculari lineâ, postmodum facili negotio, Plenilunii versatilis beneficio, verum limbi Lunæ punctum, vel ejus gradum investigabis. Tandemque ex hoc gradu limbi

bi verticali, iterum ipsam inclinationem cornuum à perpendiculo, tum cornu superioris inclinationem, à puncto lineæ verticalis superiori vel inferiori, tum cornu inferioris, ab utriusque jam dicto puncto distantiam, pro lubitu, adinvenies.

3. Gradus verò limbi Lunæ verticalis hoc modo exploratur. Primùm, in Plenilunii versatili figurâ, filum C extende, punctum verticale versus; si nimirum duæ illæ Maculæ in eâdem perpendiculari inventæ, centro Lunaris disci superiores fuerint: sin autem centro inferiores, filum extende punctum C oppositum, nempe Nadir, vel gradum nonagesimum inferiorem versus: quo factò, circumrota figuram Plenilunii, usque dum hæ duæ Maculæ cum filo extenso, lineam prorsus constituent parallelam; quod nudo oculo facilè dijudicare vales, vel si mavis, circino id cognosces. Figurâ itaque debito modo sic constitutâ, simul habebis veram faciei Lunæ, Macularumque ejus inclinationem, quam eo tempore, quo phasis illa, cum duæ hæ Maculæ in lineâ perpendiculari observabantur, Luna exhibebat. Deinde nota exquisitè gradum filo subjacentem. Quod si enim filum C versus est extensum, tunc ille ipse subjacens, ut modò diximus, verus & competens est Lunæ gradus verticalis; contrâ, si Maculæ illæ duæ priores centro inferiores fuerint, sic ut filum, punctum C oppositum, Nadir scilicet, versus exportrigi oportuerit, eo inquam in casu, gradus filo subjacens, non est vera Lunæ inclinatio à puncto verticali Zenith, sed est gradus oppositus hujus inclinationis: sin verò à puncto Nadir illam numerare mavelis, tunc, quem quæris, habes. Simili ratione cum omnibus Maculis sub eâdem perpendiculari se se offerentibus, tempore observatarum phasium, quarum inclinationem desideras, procedendum.

4. Arcum abscinde à chartâ, omnino similem arcui umbræ, seu phasium segmentis in figurâ primariâ paulò antè ad certas Maculas annotatis. Animadvertendum autem est, quòd omnium & singularum phasium, seu umbræ arcuum curvaturam prorsus oporteat esse eandem, si aliàs rectè, & accuratè sectiones fuerint delineatæ: sin verò nonnullæ à reliquis discrepent, ut fieri interdum facilè poterit, tunc illarum insiste vesti-

M m m 2

giis,

giis, quæ numero vincunt, & inter se curvaturâ planè consentiunt. Cæterùm, arcum à chartâ ad umbræ sectiones quàm accuratissimè abscissum, transfer in Plenilunium versatile, illumq; ad Macularum normam sic dirige & constitue, ut priùs situm faciemq; primùm phæos observatæ Eclipsæ omnino referat: postea gradum verticalem limbi hujus phæos congruum, paulò antè inventum siste ad C punctum, nimirum Zenith; sed sedulam tamen interim des operam, ne arcus chartaceus, figuræ huic versatili impositus, à loco vel tantillum dimoveatur. Quod si feceris, non solùm dilucidè & apertè phæos inclinationem, sive umbræ cornuum à vertice numeratam, oculis subjectam habebis; sed & illam in gradibus distinctè in peripheriâ Lunæ determinare nullo negotio poteris; non minùs, dicturus circa quem limbi gradum, utrumq; cornu eo ipso tempore observatæ phæos fuerit constitutum: quæ quidem omnia & singula, huic phasi postmodum diligentissimè debent adscribi. Quod iter, & cum cæteris phasibus, durante Eclipsi observatis, nec non cum ipso initio & fine, ineundum; si omnes earum inclinationes, & in gradibus accuratè investigare, simulq; verum cornuum situm cujuscunq; phæos, ad certos limbi gradus referre, ut & gradum verticalem, quem phæs observationis tempore obtinuerunt, indicare satagas. Deniq; isthoc pacto, nulli non astra cognoscendi cupido, non tantùm ipsas phæs Eclipsæ, ope Plenilunii versatilis, verùm etiam earum inclinationes omni tempore, quando placuerit, sub aspectum ponere, & quasi ad vivum repræsentare, haud magno licebit labore.

5. Quibus rebus omnibus sic inventis, inclinationes in ordinem, cum observatis phasibus, temporeq; annotato, atq; altitudinibus (ex quibus etiam verum tempus elicitur) redigantur. Hic fortè autem inquires, candide Lector, quorsum, in istis rebus minimis spectat, hæc nimia curiositas; videris mihi, quasi nodum in scirpo quærere? at ego respondeo tibi modò, iisdem planè verbis, quæ Doctissimus V Vilhelmus Schickardus in responsione ad Epistolam, de Mercurio in Sole, Gassen di pag. 37. protulit: *quæ si cuiquam in minoribus circumstantiis videntur*

*In observa-
tionu negotio
non possumus
nimis esse cu-
riosi.*

tur

tur nimis scrupulosâ, sciat, nihil diligentia hic posse nimium esse, in tam subtili negotio, quibus non Astronomiæ tantum, sed & Geographiæ pars magna imitatur; idq; potissimum prodesse curiositatem, ut phasium duarum consensus, alicujus tertiæ dissensum prodat & emendet. Illis autem, qui simpliciter tantum principia & fines notant, nunquam gratis credo; nisi addant quoq; intermedia: cum sciam, quàm proclive sit in extremitatibus labi.

6. Nunc verò item maximam quoque Eclipses obscuracionem, itemque phasium veram quantitatem, in digitis & digitorum particulis quàm exquisitissimè determinare libeat; quæ certè facillimo negotio acquiruntur, si nimirum quantitatem cujuscunq; phasios, ratione descriptorum umbræ arcuum, ex figurâ illâ primariâ, diligentissimè circino depromptam, ad scalam istam digitorum Eclipticorum infra positam, tantum examinaveris, tunc confestim id, quod quæritur, patebit.

Quantita-
tem Eclipsi-
um investi-
gare.

7. Ex quibus insuper, in figurâ illâ primariâ descriptis, atq; ritè observatis arcubus, pariter accuratè, & quàm citissimè semidiametrum umbræ terrene investigabis; quam equidem veteres, ut ut omnem adhibuerint operam, nullo modo tamen assequi potuerunt. Initio enim omnes arcus phasium, sedulo circini ope examinentur, num scilicet omnium curvatura planè sit unius ejusdemque circuli sectio? id quod si ita se habere inventum fuerit, certo est indicio, omnes phases supra quàm dici potest accuratè, esse observatas depictasque: sin verò differentia quædam phasium deprehendatur, tunc illum elige arcum, cui potiores astipulantur: postmodum ex hoc segmento circuli, ejusque centro explorato, ipsum circulum, cujus est segmentum, per problem. 3. proposit. 25. libr. III. Euclidis, describatur; vel, si lubet mechanicè, notatis videlicet in illo segmento tribus punctis; velut Clavius ibidem in ejusdem propositionis Scholio pluribus docet. Quo invento sectionis, sive ejus circuli centro, statim & radius umbræ innotescit. Tandem cum Lunæ diameter, ex figurâ illâ primariâ jam quoq; sit nota, licebit ipsam quoq; proportionem semidiametrorum Lunæ & umbræ, haud difficulter, in minutis, beneficio alicujus scalæ, atque regulæ de tribus, determinare: quemadmodum mox exemplo res evadet clarior. Sed videtur equidem, uni phasios segmento non prorsus esse


Semidiametrum Umbræ terrene exquisitè determinare.

fidendum; & propterea cum reliquis arcibus quoque eâdem pergendum viâ; ne non videlicet ex reliquorum consensu, eò magis certa elucescat veritas.

Optandum igitur esset, ut præclarum atque notabile quoddam exemplum, Astrophilorum oculis, melioris intellectus gratiâ, subjicere possem: verùm (nescio quo fato) proximè elapsis aliquot annis, Eclipses, in nostro horizonte, aëris inclementia nobis hoc modo annotandas denegavit; ita ut penitus nullam, præter unicam his diebus primùm animadversam, ex voto observare, atque delineare integrum fuerit. Ingruente quidem Eclipsi Lunæ Anno 1646. Mense Januario, Cœli serenitas quasi annuere non minùs videbatur: sed, præter spem, densissimæ nubes, fumusque nigerrimus, in viciniâ meæ speculæ Astronomicæ, eo ipso tempore subitò exoriens, penè omni ex parte observationi obstiterunt, quò minùs Lunam Telescopio accuratè intueri liceret. Hincque accidit, ut initium obscurationis istius, uno minuto fortè ferius animadverterimus, qualem qualem etiam adhibuerimus diligentiam: neq; insuper plures quàm duas phases delineavimus, easq; adhuc de Cœlo quasi clanculùm tantùm abstulimus: gradum phasium verò verticalem, illarumque inclinationes nullo pacto, ob causam modò dictam, legitimè annotare licuit. Animus quidem erat, Cœlum si affulisset sudum, & minima quædam circa hanc Eclipsin designare; sed ex voto meo observatio non successit. Interim nullus despero, DEUM, qui & Optimus & Maximus est, vitamque sanitatemque concessurum, ut eodem favente, felicius, in Astronomiæ augmentum, ejuscemodi observationes multò plures à nobis administrari possint.

*Exemplum
Eclipses Lunari.
Anno 1646.
observata.*

Interea tamen illam ipsam Eclipses observationem, ut datum, cum delineatione duarum phasium, hîc apponam. Umbra tempore initii circa A, Montem scilicet Audum Maris Eoi, paulò supra Paludem Maræotidem, se se in Lunam ingerebat. Arcus B & C, phases exhibent observatas; ex quibus femidiametrum umbræ 46. min. 30. sec. fuisse, datâ scilicet Lunæ diametro 34. min. certò colligitur; prout scilicet ex tabellâ subjectâ, hujus observationis clarè patet. Obser-




FF

Semidiameter Line



Digiti Scyptici



Ang. Sc.

Observatio Eclipsæ Lunaræ, ad diem 31. Jan.
An. Chr. 1646. ft. n. mane, ante ortum Solis,
GEDANI instituta.

Phases Luna: deficientia Telescopio deprehensa.	Altitudo Lunæ Lyrae, ad ortum.	Tempora in de Juppita.	Gradus Limbæ Verticali Lunæ.	Inclinationes Cornuum.	Semidiameter umbræ, data semid. ☽ in un.
	o. /	Ho. /.	o. /.	Grad. /.	Min. //.
Nihil adhuc penumbrae	30. 3.	3. 26. 0.	0. 0.		
Nihil.	33. 26.	3. 51. 10.			
Nihil.	37. 10.	4. 18. 32.			
Nihil.	40. 30.	4. 42. 0.			
Initium.	46. 8.	5. 11. 4.			
4 Digit.	47. 57.	5. 33. 36.			46. 30.
4½ Digit.	49. 0.	5. 40. 48.			46. 30.
11. Digit.	19. 0.	6. 12. 52.			
	19. 55.	6. 19. 20.			

Initium observationis circa 118. grad. limbi Austere. Andam deprehendebatur.

Reliquarum phasum, ut ☽ sine totali obscuracione essent, nubes fumæq; in vicinâ exortis, nobis creperant.

Cui simile aliud, in gratiam eorum, qui cœlestibus hisce spectaculis capiuntur Eclipsæ Lunaræ, quod nuperrimè item ex animi sententiâ observare nobis contigit, addamus exemplum; ne non videlicet omnes & singuli, eò meliùs mentem nostram, circa superiùs dicta percipiant, atq; impofterum, si ita visum fuerit, eò faciliùs ipsimet ejuscemodi observationes pari modo suscipere possint. Initiò verò omnes phases quas-cunq; animadvertere, ob intercurrentes subinde nubeculas licuit, annotatis simul altitudinibus, nec non subjectis animadversionibus quibusdam maximè notatu dignis, ordine præmittam. Deinde etiam schema quoddam, figuram nempe F F f, addam, prout scilicet phases omnes, secundùm Maculas, ipso observationis tempore, delineatæ fuère: ut quilibet suis-met oculis deprehendat, quomodo sectiones, hoc vel illo tempore, se se in Lunari facie extenderint, & per quasnam Maculas transiverint? Numeri autem, sectionibus in eodem diagrammate adjuncti, phases serietenus à se invicem discernunt, ut eò promptius cum altitudinibus, animadversionibusq; conferri non nequeant. Atq; virgulæ quidem ad limbum superiorem annotatæ, punctum Lunæ verticale, eo ipso tempore ibidem adscripto indicant; sic, ut ex istis punctis verticalibus, nulli non, sive inclinatio Lunæ, sive Macularum ejus, facillimo negotio pateat.

Observatio Eclipsæ Lunaræ, An. 1647 ab Austere suscepta.

Ob-

Observatio Eclipsæ Lunæ, instituta

GEDANI,

Anno à nato Christo 1647. die 20. Jan. ft. n. vesp.

Phases Lunæ Tu- bipicito observata.	Altitudines.	Tempora		Tempus secundum ho- rælogium per- ale. correctū. Hor. s. ff.	Quenam Macule sub eadem lineâ perpendiculari su- perius observata; & quinam gradus limbi extiterit verticalis?
		Gr. min.	Hor. s. ff.		
	Jovis.	24. 51.	7. 12. 50.		
	Procyonis.	24. 45.	7. 28. 40.		
	Sitii.	23. 25.	7. 56. 59.		
	Procyonis.	30. 47.	8. 17. 43.		
Nihil penumbrae.	Procyonis.	10. 58.	8. 19. 19.		Mons Carpatæ & Mons Ætna per- pendiculariter erant erecti. Hinc 342 grad limbi extiterit verticalem, curtum est.
Nihil adhuc.	Procyonis.	33. 5.	8. 16. 39.		
Penumb dilatissima vestigiū	Procyonis.	33. 42.	8. 40. 48.		
Penumbra paulo crassior.	Jovis.	41. 9.	9. 7. 28.		
Penumbra valde notabilis.	Jovis.	41. 46.	9. 12. 12.		
Initium	Jovis.	42. 24.	9. 17. 40.		
1. $\frac{1}{8}$ Digit.	Jovis.	42. 40.	9. 19. 11.		
	Procyonis.	37. 22.	9. 24. 36.		
2. $\frac{1}{2}$ Dig. & paulò plus	Procyonis.	37. 44.	9. 29. 17.		
3. $\frac{1}{2}$ Digit.	Jovis.	44. 37.	9. 34. 51.		
4. $\frac{1}{2}$ Digit.	Jovis.	44. 55.	9. 37. 23.		
5. 3. Digit.	Procyonis.	38. 48.	9. 44. 7.	9. 47. 21.	Sinum Sagaricum Ponti Euxini, Insulam Bosphoræ, in lineâ p. r. perpendiculari deprehendimus; unde annotescit, quid 352. gr. Luna culminaverit.
6. $\frac{3}{4}$ Digit.	Procyonis.	39. 19.	9. 53. 11.		
7. $\frac{3}{4}$ Digit.	Procyonis.	39. 40.	9. 58. 7.		
8. 4. Digit ferè.	Jovis.	48. 0.	10. 6. 45.		
9. $\frac{4}{4}$ Digit.	Jovis.	48. 9.	10. 8. 11.		
10. $\frac{4}{4}$ Digit.	Cord. Leonis.	32. 55.	10. 10. 31.		
11. $\frac{1}{2}$ Di. & paulò plus.	Jovis.	49. 4.	10. 17. 0.		
12. $\frac{1}{2}$ Digit.	Jovis.	49. 24.	10. 20. 22.		
13. 5. Digit.	Jovis.	50. 14.	10. 29. 5.		
14. 5. D. & paulò minus.	Jovis.	50. 41.	10. 34. 2.		
15. $\frac{4}{4}$ Digit.				10. 45. 0.	
16. $\frac{4}{4}$ vel par. amplius.				10. 49. 30.	
17. $\frac{3}{4}$ ferè digit.				10. 57. 0.	
18. $\frac{3}{4}$ vel par. ampl.	Jovis.	52. 58.	11. 2. 59.		
19. $\frac{3}{4}$ Digit. ferè.				11. 3. 55.	
20. $\frac{3}{4}$ Digit.				11. 10. 2.	
21. $\frac{2}{4}$ Digit.				11. 13. 40.	
22. 3. Digit.				11. 16. 0.	
23. $\frac{1}{2}$ paul. ampl.				11. 19. 15.	
24. $\frac{1}{2}$ Digit.	Cord. Leon.	41. 21.	11. 20. 53.		
25. $\frac{1}{2}$ Dig. ferè.				11. 22. 20.	
26. $\frac{1}{2}$ Digit.				11. 24. 45.	
Finis.	Cord. Leon.	42. 5.	11. 27. 44.		
Demetapenu ubra	Cord. Leon.	42. 19.	11. 30. 3.		
Penumbra dilutor				11. 33. 16.	
Penumbra diuissima.				11. 35. 48.	
Finis penumbrae.				11. 38. 40.	

*Per quas Maculas transvererint
umbra scitones.*

*Animadversiones quaedam, circa
hanc Eclipsin notatu digna.*

Paulò ante initium Eclipsos, clarè admodum omnes 4. circumjebiales, tres scitones Jobi ad sinistram. & quartum ad dextram ejus, contextimus, hoc circiter posita.




- Initium contigit circa 170. grad. limbi,
- 1 Per Montem Acabe, Lacum Meridionalem, ejusq. Montem.
 - 2 Per M. Ajjacem, Pal. Arabia; interq. M. Lionem, Amadq.
 - 3 Per Sinum Sirbonis, I. Didymas, M. Horeb, prope M. Smae.
 - 4 Per M. Cataracten I. Letoam, perq. partem M. Sinai Austral.
 - 5 Per part. infer. Pal. Maraot, Mare mortuum, M. Dalangero,
 - 6 Per Pal. Maraotidem Inf. Carpathon, Taurumq.
 - 7 Per sup. p. P. Maraot, infra Rhod. per I. Cyp. per Lib. M. Coib.
 - 8 Per Pal. Maraotid. I. Melam, supra Rhodum & M. Armen.
 - 9 Per P. Maraotid. M. Phanicom, M. Cragum, atq. M. Sogdian
 - 10 Per inf. p. P. Maraotid. per tum. Celen. int. M. Sog. & P. Areef.
 - 11 Infra P. Maraotid. M. Masfytum & Paludem Areefiam.
 - 12 Inf. P. Mara. sup. M. Albon, inf. M. Sip. Didymiq. pr. S. ext. P.
 - 13 Per I. Lemnam, M. Sipyium, Didym. M. Moichum & S. ex. P.
 - 14 Per Mare Syriticu, M. Athon, M. Didym. M. Tancon & Pet. Sog.
 - 15 Per M. Cataract. I. Melam, I. Lesbicam, M. Masfytū M. Tanc.
 - 16 Per M. Acabem, I. Cret. I. Rhod. M. Cragū, M. Cad. atq. Pet. Sog.
 - 17 Per M. Phoran M. Nistria ad Mare Pamp. supra Pet. Sogdianā
 - 18 Per M. Troicum, M. Tator, infra Tanconem.
 - 19 Per M. Hor. M. Libanum, inf. Tanconem & supra Pet. Sogdian.
 - 20 Per M. Anna, M. Sinai, L. Tbolpidem, Petram Sogdianam.
 - 21 Per M. Seir, Taurum, infra Petram Sogdianam.
 - 22 Per M. Seir, M. Calchastam M. Sogdianum.
 - 23 Per Desertum Raphidim, M. Caucasum & Nerofum.
 - 24 Per M. Coibacavanos, M. Paropansum & Montem Nerofū
 - 25 Per M. Techifandam M. Dalangeroos infra M. Nerofum.
 - 26 Infra Dalangeroos.
- Fin. Finiū obtigit circ. 2247. grad. limbi.

- Capū Eclipsis à parte infera, & quidem dext. versus 5. scilicet grad. a puncto Nadir, obscurari. A line à verò nonagesimi perpendiculari ortū versus 38. cir. grad. obumbrati incipit
- 1 Umbra Sinum Sirbonis stringebat.
 - 2 Mons Sinai cegi incipiebat.
 - 3 Mons Sinai planè tectus.
 - 4 Umbra circa partem inferiorem Paludem Maraotidū terminabatur. Itemq. cuspis dextra distitit à puncto Nadir 60. grad. aleva verò 40. grad. circiter ortum versus.
 - 5 Cuspis dextra distabat à puncto Nadir 73. gr. & sinistra 45. gr.
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12 Umbra ad Sinum extremum P. Euxini usq. pervenerat
 - 13 Maxima cum observabatur obscuratio, umbra Inf. Lemnam transgrediebatur. Cuspis dextra tum elongabatur à puncto Nadir 90. grad. & sinistra ortum versus 48. grad.
 - 14
 - 15
 - 16 Cuspis dextra planè in occasu, hoc est 90. grad. à puncto Nadir remota erat.
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20 Mons Sinai iterum illustrari incipiebat.
 - 21 Altera cuspidè in puncto Nadir, altera pleniè ut idem umbra terminabatur, sicut phasè id tempus à partem periq. occupari.
 - 22 Cuspis dextra omnino sub linea normali, qua lineam perpendiculararem intersectabat animadversio: sinistra verò 5. grad. à puncto Nadir ortum versus erat remota.
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
- Fin. Finis extitit à puncto Nadir dextram versus 45. grad. circ. à linea verò perpendiculari nonagesimi tantum 38. circiter grad.

Sed ut paulò etiam curiosiori eò magis satisfiat Lectori, ecce, cujusvis digiti phasin, in peculiare retuli schema, uti in adjuncto diagrammate F F f* videre est. Quamvis autem longè sint minora illa diagrammata, quàm ea esse aliquis optet, attamen Maculæ principales, quæ præ cæteris eminent, quoad fieri potuit, summâ diligentia ibidem sunt adumbratæ; ita ut non solum, meo judicio, cujusvis digiti sectionem, sive phasin, satis probè animadvertere; sed & quod magis ipsam Lunæ inclinationem, quæ circa quamlibet phasin fuit advertenda, accuratè admodum dijudicare possis, præsertim verò annotatis illis se se invicem interfecantibus lineis duabus, quæ nunquam non angulum inclinationis constituunt. Linea enim a b, demonstrat lineam perpendicularem, Luna in Nonagesimo, circaque Nodum Boreum constituta; altera verò c d, lineam indicat, quovis tempore, ex puncto Lunæ verticali, per centrum ejus perpendiculariter descendente: hincque valde velociter hæc variatur, at illa a b, intra dies aliquot vix parùm admodum de loco suo dimovetur: sic ut statim, primo intuitu, ex angulo isto, quem duæ illæ lineæ constituunt, inclinationem, seu distantiam lineæ perpendiculis Nonagesimi à lineâ verticali Lunæ, nemo non, nescire non possit. De quibus quidem, ut te, Lector amice, priusquam observationem ipsammet oculis tuis sifterem, quasi in antecessum admonere æquum duxi. Tandem verò sub finem figuræ F F f* etiam Jovis transitum à nobis observatum adjiciam; idque eo præsertim fine ut velocem Macularum Lunarium inclinationem, (cùm eadem nocte, tam hic Jovis transcursus, quàm Eclipsis Lunæ acciderit) eò deprehendas meliùs: quicquid autem præterea de istâ Jovis observatione animadvertum à nobis fuit, imposterum suo loco, inprimis ubi de occultationibus stellarum, ex instituti nostri lege agemus, pluribus edifferetur.

Quo etiam Eclipses sic à nobis præfiguratæ exemplo accepto, quilibet, ut arbitror, rerum Mathematicarum non planè omnino rudis, non poterit non intelligere, quâ nimirum ratione, observationes hujus generis, institui, phasésque secundum Maculas ritè delineari, cùm semidiameter umbræ, tum ipsa Ecli-

*Eclipses Lunae Partiales, observata
 GEORGI.
 Anno ere Christiane 1647, Die 20 Januarii vespere.*



Pices Eclipsos Crescentes.



Pices Eclipsos Decrecentes.



Fig. FF f.*



Anter Scalpant



Eclipsium quantitas rectè determinari debeant. Quod si verò cuiuspiam hic noster modus, phases quascunq̄ue in unicam figuram referre primariam, nimium laborem atq̄ue operam requirere videatur, adeò ut rem istam hac viâ aggredi vix audeat; ei haud gravabor, etiam aliam eamq̄ue longè faciliorem præscribere rationem, quâ scilicet & minùs exercitati hoc in negotio quemcunq̄; Eclipsium digitum, imò non tantùm ipsos digitos & semidigitos, sed & eorum quadrantes, accuratè admodum, nulloq̄ue negotio discernere non nequeant.

Alium præscribitur phasè quascunq̄; dyadicandi modus.

Primò quidem, ex phasium, sive Plenilunii archetypi centro, sex circuli æqualis distantia ducantur, sic, ut diameter Lunæ, in duodecim partes æquales, seu tot digitos dividatur: dein, in quolibet spatio, iterum tres subtiliores concentrici describantur, ne non simul isthac ratione quadrantes digitorum indicentur, eoq̄ue planè modo, quem cap. v. pag. 106. circa observationes Eclipsium Solarium tenendum esse docuimus. Postmodum verò eâ phasium, sive Plenilunii figurâ sic adornatâ, attendes diligenter, Eclipseos tempore, quando umbra, circulos hosce, sive potius Maculas illis subjacentes stringat: id enim si probè notaveris, minimè insuper altitudinibus fixarum neglectis, non solùm quâ digitos, verùm etiam quâ digitorum quadrantes, ut modò diximus, quàm unquam fieri poterit correctè determinabis quascunq̄ue phases, utcunq̄ue umbræ sectiones minimè delineatum iveris. Interim tamen præstat, opinor, ut non minùs operam des, quò & ipsas umbræ sectiones, prout per Maculas protenduntur, adumbrare queas: quemadmodum in hac ipsâ Eclipseos observatione, à nobis istud utiq̄ue factum vides. Etenim, si isthoc pacto phases quamplurimas depingas, quanquam non semper sive integros, sive semidigitos æquant; nihilominus tamen, adminiculo aliqujus scalæ, atq̄ue regulæ de tribus, ex his delineatis phasibus, postea æque bene verum tempus, tam digitorum, quàm partium eorundem, elicies: sicuti & id ipsum circa minores Eclipsium figuras, phasésq̄ue, haud magno eam in rem impenso labore, optimè nobis successit.

Hac igitur ratione observationes Eclipsium Lunarium, ma-

*Si via com-
monstrata E-
clipsium obser-
vationes ag-
grediemur,
certe haud
parum mo-
menti inde
ad rem Ma-
thematicam
redundabit.*

gno utique cum fructu instituentur. Imò si rectè attendan-
tur omnia, non solum ad Astronomiam; sed & ad universam
Geographiam, præsertim respectu longitudinis, plus quàm ha-
ctenus unquam utilitatis sperare ausi sumus, inde profectò ma-
nabit, & inprimis quidem si tantum omnes & singuli observa-
tores, Tuborum Opticorum, figuræque primariæ, sive cujus-
dam correcti, & ad accuratam proportionem redacti Plenilu-
nii ope, observationes administraverint; itemq; evitandæ con-
fusionis gratiâ, Macularum nomina minimè variaverint, ac u-
num eundemque observandi modum retinuerint. Hoc enim
si fecerint, susceptum negotium cum DEO feliciter transige-
tur, & Bonum Astronomicum multis modis promovebitur.
De cætero, est sanè res notatu dignissima, quòd impostertum
non uni tantum Eclipseos initio, quasi adhærere & invigilare
opus sit; sed, quòd semper circa quanlibet phasin, aliud atque
aliud initium habere possimus observandum, imò tot, quot no-
bis placuerint. Dum enim umbra continuè ulteriùs se in Lu-
nam promovet, sensimque progrediens illam obscurat; fieri
certè aliter non poterit, quàm ut periphèria umbræ, modò hanc
modò aliam Maculam, Montem scilicet, vel convallem, Sinum,
Promontorium, Lacum vel Insulam omni tempore stringat:
sic ut circa quoslibet maximè notabilium Macularum appulsus,
nova semper initia Eclipseos nobis notanda subministrantur:
quæ si nunquam non, præsertim simul ab universis & singulis
Astronomis, diversisq; in regionibus, unius ejusdemque figuræ
primariæ beneficio attendantur, atq; observentur, haud parum
profectò ad longitudes investigandas accedet momenti.

*Quenam in-
super circa
Eclipsium ob-
servations
sint animad-
vertenda?*

Reliquum autem est, priusquam ad alia transeamus, ut A-
strophilum de certis quibusdam rebus, circa observationes in
genere maximè attendendis, adhæc admoneamus. Primò,
ne contemplator has observationes, ope nimis brevis Perspi-
cilli, cujus videlicet longitudo tantum unius sit pedis, instituat:
quia ejusmodi Tubus, Maculas Lunares non satis clarè & di-
stinctè sub aspectum ponit. Secundò neque Telescopio nimis
longo, octo scilicet decem vel amplius pedum, utatur: hic enim
objecta nimio plus auget, atque perrarò claritate excellit: id-
circo

circo etiam ægrè admodum hujus beneficio arcus umbræ describuntur, ac Macularum perpendiculares situs cognoscuntur; (quos tamen scire ad inclinationes eruendas, permagni interest) eò quòd ejusmodi Tubus, particulam Lunæ nobis plus æquo exiguam, uno intuitu exhibeat. Est optimum autem Tubospicillum, quod nunquam non ad hujus generis observationes adhiberi poterit, crede, illud, quod quinque vel summum sex pedes, longitudine non excedit, imprimis si præstantiâ polleat, id quod experientiâ didicimus. Tertiò, convenit etiam, ut cuilibet observatori, Eclipseos tempore, non solum Plenilunium versatile, inclinationes exhibendi ergo, præsto sit; sed & Tabula illa magna Selenographica, Macularum omnium nomina exhibens: quò tirones, quibus nomina modò dicta nondum fatis innotuerunt (in annotatione scilicet arcuum umbræ, ejusque ad varias Maculas appulsuum, tum Macularum hoc vel illo tempore in perpendiculo constitutarum) illa in memoriam sibi illicò revocent, singulaque observata chartæ eò felicius mandare non nequeant. Etenim cuncta Macularum nomina, omninò memoriter tenere, est profectò artis laborisque haud vulgaris. Sed de his fatis.

Cæterum, ostendere nunc item placet, quomodo perquam accuratè, tum figuræ primariæ phasium, tum Pleniluniorum ope, capite 44. adumbratæ, occultationes stellarum, vel Planetarum à Lunâ descendentes, institui atque peragi possint? cùm omnes imprimis hujuscemodi observationes à veteribus habitæ, nullo planè fundamento solido innitantur; ita, ut admodum fluctuent. Qui suâ tantum conjecturâ aliquâ sunt assequuti: ut ex eorum relatu nihil aliud accipere posteritas potuerit, quam quòd hæc vel illa stella, à Lunâ, hoc vel illo tempore, fuerit tecta. Veram autem lineam viæ translunaris illi fanè nullatenus determinare potuerunt, multò verò minùs ab iis fuit animadvertum, ad quam Maculam, vel quem limbi gradum primus stellæ fuerit ingressus vel egressus; nec quousque hanc vel alteram partem versus, stellæ à centro inceserint; sive quinam gradus, & qualis inclinatio, tam tempore initii occultationis, quam emersionis extiterit? & hujuscemodi alia quamplurima:

*Quomodo
occultationes
stellarum r.
sunt obser-
vanda?*

quæ, ut diximus certè viâ infallibili investigare, ut ut summis sunt annexi viribus, nullo tamen modo potuerunt. Quamvis verò alii nonnunquam talia annotare sunt conati: attamen plerumque conjecturâ suâ fuère decepti: sicuti id variis exemplis, nisi temporis haberetur ratio, facilè demonstrari posset.

1. Eclipses autem stellarum vel Planetarum, ut ad rem ipsam accedamus, quæ à Lunâ originem trahunt, hoc modo sunt observandæ. In Iconismum, Lunationum vel Pleniluniorum, primarium, (eliges tamen ex his duobus eo tempore Lunæ convenientiorem) quemadmodum docuimus circa Eclipses Lunares, describe initio, secundùm veram Lunæ longitudinem latitudinemque ejus limbum; quo factò, ingruente occultationis tempore, diligenter admodum Telescopii ope ad Lunam attende, num mox instet momentum appulsus, sive occultationis? simulque observa accuratè, cùm stella spatio unius, vel alterius digiti, sive aliquot etiam minorum adhuc à Lunæ limbo orientali abest; ad quam scilicet limbo Maculam viciniorem, primus stellæ attactus, sive ingressus (id quod certè ab omnibus & singulis facilè deprehendetur) expectandus. Deinde autem notabis, & aliam Maculam Lunæ centro propinquirem, quæ, puta, lineam rectam, cum stellâ occultandâ, & illâ priore Maculâ limbo viciniore (ad quam stella primùm appellere videtur) constituit. Postmodum per has duas Maculas, beneficio alicujus regulæ, duc lineam rectam; vel minimum aliquam, ab uno latere limbi (in figurâ nempe primariâ) usque ad alterum tibi imaginare: unde illicò apparebit, quâ parte limbi oppositi, stellæ exitus, sive ejus emergio, erit animadvertenda.

2. Eodem item momento, cùm Luna limbo suo, stellam simul stringit, simul occultat, tempus correctum, sive adminiculo accurati alicujus horologii, sive per altitudinem alicujus stellæ fixæ, investigabis; sicut quoque Maculam illam Lunarem, ad quam primus fit appulsus, sedulo annotabis; non minùs, quænam Maculæ lineam perpendicularem constituent: utpote ex quibus datis postea, Plenilunii scilicet versatilis ope, (sicuti & jam suprâ circa Eclipses Lunares docuimus) tum gradus limbi verticalis, tum gradus primi appulsus innotescit.

3. Te-

3. Tectâ stellâ, convenit planè huic negotio, ut majoris certitudinis gratiâ quarundam altitudines stellarum aliquoties observentur. Deinceps autem instante videlicet emersionis tempore, summâ cum diligentâ Tubospicillum adhibens, ad stellæ egressum denuò attende, quâ videlicet parte limbi ea erumpat, & quo temporis articulo id accidat; quod certè accuratiùs nullo unquam deprehenditur modo, quàm si iterum altitudinem alicujus fixæ, nec non gradum Lunæ verticalem, beneficio duarum Macularum in perpendicularo deprehensarum, investigates. Quibus quidem omnibus probè animadversis, lineam de-
Viam indagare translunarem.
 pingere rectam, per punctum occultationis & emersionis deductam, per quam statim elucebit vera translunaris via; utrùm nimirum Luna centro suo supra, an verò infra stellam incesse-
 rit, & quot minutis, ratione diametri Lunaris, à centro Lunæ stella distiterit?

4. Quid si etiam scire non nollis, qualem angulum orbita Lunæ cum Eclipticâ, eo tempore constituerit? hac viâ progredere. Primò, Ephemeridum adminiculo inquires, num Luna id temporis, aut circa limites, aut circa quem Nodum versetur? & tum eo explorato, erige Plenilunium versatile, secundùm animadversum Lunæ situm, hoc scilicet modo: ex illis tribus punctis superioribus, circa peripheriam illius Plenilunii versatilis annotatis, hisque signis ϑ , L , Ω , distinctis, certum quoddam elige, loco Lunæ respondens, idque ad punctum superius verticale C , figuram circumgyrando, transfer. Exinde autem accuratè admodum, beneficio scilicet alicujus regulæ, observabis, quâ parte, respectu Macularum, linea perpendicularis ex puncto C , per centrum transiens, Lunam dividat: cui lineæ perpendiculari, quoad Maculas, in figurâ tuâ primariâ, in quâ viam translunarem descripsisti, duc aliam, ab omni parte profus æqualem: per punctum iterum contactus lineæ perpendicularis, atque viæ translunaris, aliam describe lineam, ad angulos normales, in modò dictam perpendicularem incidentem, quæ Eclipticæ erit omnino parallela. Tum ex utriusque hujus lineæ, viæ scilicet translunaris, atque parallelæ Eclipticæ intersectione, vel angulo, quem utraqûe constituit,
 trans-

Angulum Orbitæ Luna & Eclipticæ, ex observatione rectè determinare.


transportorii, sive semicirculi cujusdam in gradibus divisi ad-
 miniculo, explorabis veram quantitatem Anguli orbitæ Luna-
 ris & Eclipticæ, qui nempe erat investigandus. Sed ut hæc
 etiam evadant clariora, duas haud vulgares, atque notatu di-
 gnissimas observationes Eclipsæ Palilicij à Lunâ occultationes,
 nec non rarissimam aliquam observationem Jovis à Lunâ tecti,
 (qualis profectò vix nî fallor hætenus unquam à Mathemati-
 cis debitæ fuit animadversa) unâ cum observationum schema-
 tismis eo tempore adhibitis, Selenographiæ Studiosis haud gra-
 vatè exhibebo.

Observatio Prima

Eclipsæ Palilicij, instituta

Anno Æræ Christianæ 1644. die 15. Novemb. mane


G E D A N I.

nitium occultationis Palilicij accidebat

*Palilicij Ecli-
 psæ, ab Au-
 tore, summa
 diligentia,
 observata.*

secundùm horologium correctum (altitudines enim tum tem-
 poris capiendi non dabatur occasio) horâ 3. matut. minut. 5.
 Occultabatur à Lunâ circa 96. gradum limbi, nempe orienta-
 lis, ad Montem Alabastrinum Maris Eoi, quo tempore gra-
 dus Lunæ 75. limbi verticalis existerat. Emergebatur hor. 4. min. 5.
 gradum 317. limbi occidentalis, Montemq; Alaunum, paulu-
 lum supra Paludem Mæotidem; quo temporis articulo gradus
 limbi Lunæ 78. erat verticalis. Horâ 4. min. 10; post emersionem,
 Palilicium, tanto spatio à limbo removebatur, quanto scilicet
 lata erat Palus Mæotis, parte nimirum duodecimâ circiter dia-
 metri Lunar. Horâ 4. min. 38. Palilicij à limbo Lunæ occi-
 dentali distantia æquabatur semidiametro Lunari; quam di-
 stantiam accuratè ex apertura Tubi colligebam. Linea itine-
 ris Palilicij ad Maculas translata, incedebat per Montem Ala-
 bastrinum, Insulam Corsicam, Lacum Trasimenum, Montem
 Berosum, M. Riphæum, Montemq; Alaunum; sic ut initium
 Eclipsæ, sive prima occultatio, circa 96. gradum limbi, finis
 verò seu stellæ emersio, circa 315. gradum fuerit animadversa:
 quemadmodum ex diagrammatis præsentis lineâ A B clarè de-

Observationes Eclipsium Pallicii.



deprehenditur. Limbus, secundum longitudinem & latitudinem Lunæ, est descriptus; eratque id temporis circa initium Geminorum, limitemque Austrinum. Linea F G per centrum transiens, est perpendicularis Nonagesimi, Lunâ existente in limite Austrino. Linea K L punctis notata, est parallela Eclipticæ, lineamque F G ad angulos secat normales; cum A B verò certum constituit angulum, ex quo latitudo Lunæ, seu angulus orbitæ & Eclipticæ colligitur. Circa medium Eclipsæ, five veram conjunctionem, Palilicium 6½ min. tantummodo à centro Lunæ distabat; ita, ut Luna centro suo infra stellam se se subduceret, Palilicium verò chordam Boream 141. gradus subtendentem describeret: schematismo id clarè attestante.

Altera Observatio Eclipsæ Palilicii, pariter hîc Dantisci peracta, Anno 1645. die 8. Octobris st. n. Lunâ existente gibbâ; quæ itidem in apposito repræsentatur diagrammate.



QUUM Luna Palilicio appropinquaret ad distantiam 15. minutorum ante scilicet conjunctionem, Jovis altitudo (nam fixæ alicujus, ob ærem nubilosum, altitudinem capere non licebat) quadrante ex Orichalco, confecto, accuratè deprehensa est in Plagâ oriēt.

Principium obscurati Palilicii incidebat in altitudinem Jovis.

Durante Eclipsi, altitudo Saturni in Plagâ occidentali capta.

Emergente rursus Palilicio, ex umbrâ Lunæ, altitudo humeri lucidi Orionis, in plagâ orientali inveniebatur.

Igitur ex initio obscurationis Palilicii hor. 1. 43. min. & fine hor. 2. min. 57. colligitur, medium tecti Palilicii Gedani accidisse

Et totam durationem perstitisse

Postquam autem Palilicium (vel potius Lu-

O o o

Altitudo		Tempus		Observatio Eclipsæ Pa- lilicii secun- dæ.
Grad.	min.	Hora	supp. à med. noctæ.	
36	25.	1	27	
38	48.	1	43	
43	50.	2	31	
38	45.	2	57	
		2	20	
		1	14	
			na	

na Palilicium) ad 15. minuta Lunam erat prætergressum, respectu confinii luminis & umbræ, humerus lucidus Orionis ab horizonte fuit elevatus.

Gradi	min.	Hor.	'
4 ^o	3.	3	14 ¹

Quoniam autem à limbo Lunæ vero occidentali, modò dicta stella tantùm adhuc 9. min. erat remota : (Lunam namque eo ipso tempore ad limbum occidentalem jam 6. min. decreverat, sicuti ex sectione appositi schematis apparet) quia tamen nondum satis exactè hæc minuta confecta videbantur, ideoq; paulò post altitudo Procyonis in plagâ orientali, quadrante capta est.

29 38. 3 21

Alterâ vice altitudo Procyonis fuit

29 57. 3 24

Et hoc ferè fuit tempus, quo Luna pervenit ad 90. Eclipticæ gradum, horâ nimirum

3 30

Palilicium ingressum est corpus umbrosum Lunæ, circa 118. gradum limbi orient. circa Montem Audum, per Montem Neptunum, Montem Mysium, Promontorium Chadisiam, Montem Herculis; contrâ egressum est, penes gradum 292; ita ut ferè centralis, hæc conjunctio Palilicii & Lunæ fuerit : pertransit enim proximè infra centrum Lunæ, ad unicum tantùm minutum primum, descripsitq; in hac observatione chordam Austrinam 174. gradus subtendentem; nec multum abfuit, quin totam transitu diametrum designaverit, prout ex lineâ C D dilucidè patet. Circa quam ultimam Palilicii Eclipsæ observationem, hoc imprimis notandum occurrit, quòd nulla profus differentia, inter limbum hujus observationis, & antecedentis, fuerit animadversa; id quod tamen casu evenit : nam Luna cum hoc, tum illo tempore, ferè eandem longitudinem & latitudinem habuit : quare cum centrum fuerit idem, & limbum eundem fuisse oportet.

Et tantùm quidem est, quantum de utriusque Eclipsæ Palilicii observatione hîc annotare habuimus, ac cum omnibus lubentissimo animo communicare non nolimus. Superest, ut ea etiam, quæ circa illam insignem, atque longè exoptatissimam

mam

nam Jovis Eclipsin nuper animadvertere, in eandem rem simul nobiscum intento amico nostro plurimum colendo, Præclarissimo D. Laurentio Eichstadio, nobis contigit, sic quorum maximè interest, non nescire faciamus. Utinam autem Cœlum nobis tum fuisset magis propitium, ut omnia & singula, quæcunq̃ notatu summopere fuissent digna, ex animi sententiâ, deprehendere licuisset: sed res paulò aliter, quàm volebamus, cecidit. Principio quidem, Lunâ exoriente, Cœlum admodum affulgebat sudum; verùm paulò ante occultationis initium, exinsperatò undiq̃ue facies Cœli ita fuit omnino tecta, ut sive Lunæ, sive ullius stellæ fixæ, neutiquam concederetur aspectus: hincq̃ue omnem ferè spem, hoc in observationis negotio, aliquid solidi perficiendi, perdidimus. Ex improvise tamen, horam circiter nonam, cum dimidiâ, nubes prope Lunam, ex parte sunt dissipatæ, ut nobis in Cœlo oculos defixissimos habentibus, Luna sic satis clarè iterum appareret: at ubi interrim Jupiter noster? nusquam certè conspiciendus, ut ut ille Telescopii ope, studiosè quærebat, planè ac si nunquam in illo amplissimo stellarum theatro exstitisset. Unde sanè nihil aliud, quàm Jovem à Lunâ omnino tectum, absconditumq̃ue esse, conjicere fas erat. Quamobrem diligentissimè constantissimeque limbum Lunarem, præsertim occidentalem, ubi illius exitus sperabatur, contemplati sumus; ne non minimùm Jovis emerfionem, cum ejus occultationis initium, inclementia Cœli nobis denegasset, accuratè animadverteremus: id quod & feliciter hîc Dantisci horâ scilicet 8. min. 39. sec. 30. nobis obtigit.

Profiliebat itaq̃; demum exspectatus Jupiter ex umbrâ Lunæ, circa Petram Sogdianam, ad Sinum inferiorem Maris Caspii sitam; quo ipso momento, diligenter item attendi, cum quibus Maculis in facie Lunæ maximè conspicuis, ipse Jupiter emergens, in eâdem rectâ incederet lineâ: deprehendi autem id non solùm fieri, cum Petrâ Sogdianâ, sed & Fretò Pontico, Monteque Ætnâ. Ideoq̃ue per istas Maculas, in figurâ quâdam primariâ, eo fine destinatâ, lineam duximus rectam; quæ illico simul initium occultationis accuratè nobis commonstrabat: quòd nimirum reverâ contigerit circa 100. limbi gradum,

O o o z

*Eclipsis Jovis
ab Austro ob-
servata.*

*Circa Pe-
tram Sogdia-
nam Jupiter
emerfit.*

*Per quam
Jupiter trans-
verit Macu-
las?*

dum, circaque Montem Pentadaetylum, in Mari Eoo situm : sic ut Jovis via translunaris inceserit, per prædictum M. Pentadaetylum, M. Ætnam, inter M. Mysium & Olympum, per superiorem trium Montium Moschi, Fretum Ponticum, M. Caucasum, M. Tanconem, Petramque Sogdianam, juxta quam iterum exitus Jovis animadversus, ad 275. grad. scilicet limbi. Constat ergo, Jovis lineam itineris, subtenfam fuisse 175. graduum, attentâ videlicet parte inferiori, sive Australi; superiori verò, sive Boreali, 185. graduum. Non minùs verò etiam inde fit manifestum, conjunctionem hancce Jovis & Lunæ, ferè centalem extitisse; quippe quòd tantùm 40. sec. sub Lunæ centro, Jupiter se subduxerit : idque quod ex schemate subsequente, perquam dilucidè videre est.

*Conjunctio
Jovis & Lu-
næ propemo-
dum sui cen-
tralis.*

Cæterùm te scire quoque velim Lector, quòd hæc occultatio Jovis, non ipso tempore Plenilunii; sed secundâ demum circiter die ab oppositione acciderit : unde Lunæ discus minimè undique apparebat plenus, verùm penè ad integrum decreverat digitum, ad plagam videlicet occidentalem : veluti ex sectione istâ luminis & umbræ A A, tum à nobis delineatâ, est in propatulo. Igitur facilè adhæc intelligis, primam Jovis emersionem, non ad ipsum confinium A A, sed 2. min. 15. sec. ulterius occasum versus (tantò enim intervallo, tum confinium lucis, à vero Lunæ limbo, eo in loco, erat remotum) factum visamque esse.

*Quam pla-
gam versus,
tum ingres-
sus, tã egres-
sus Jovis ob-
servatus fue-
rit?*

Deniq; cum adjecta figura G G g *, sive facies Lunæ, eandem prorsus præ se ferat inclinationem, quam eo ipso tempore emersionis, Luna obtinuit; inde utique cuilibet patet, initium ingressus, si Lunæ Cœlique constitutionem rectè consideres, contigisse circa Vulturum, in distantia 57. graduum à puncto Nadir; emersionem verò, circa Corum, in tot itidem graduum remotione, sed à puncto Zenith. Considerato autem perpendicularo nonagesimi, initium accidit, circa 69. gradum, à puncto superiori jam dicti perpendiculari distantem; finis verò occultationis, circa 69. gradum, ab inferiori puncto ejusdem perpendiculari remotum.

Postremò, quandoque denuò optima, per id temporis se se nobis

Transitus Solis observatus
An. 1677. D. 11 Junii

Eclipsis Jovis, observata
Gedara,

Eclipsis Jovis
An. 1646. D. 24 Decembris

Anno 1646, Die 24 Decembris. A. N. Greg.





Fig. GGg*



Jacobus Scheiner

nobis offerebat occasio, veram proportionem diametri Jovis, secundum Maculas Lunares, examinandi; ideò quoque summis viribus sum annexus, ut certæ alicui Maculæ Jovem iterum æquarem. Lunâ itaque probè perlustratâ, inveni, eum cum nullâ omnino alia comparari posse Maculâ, quàm Monte Ætnâ; quanquam, cum rem strictiùs attenderem, vix Jupiter adhuc Ætnæ æquabatur: interim tamen diameter ejus paulò major, quàm Vallis Sinai, & minor tamen ut jam retuli, quàm vallis Ætnæ, deprehendebatur. Id quod itidem circa superiorem Eclipsos observationem, Anno 1647. die 20. Januarii, animadvertimus. Ex quibus utique, haud magno labore, vera diametri Jovis quantitas, cognitâ videlicet proportione vallis Ætnæ, & diametri Lunæ, investigatur: quæ proportio sanè se habet ut 1. ad 34. Jam, si diametrum Lunæ perigææ præsupponas esse 34. minutorum; sequitur sine contradictione Jovis diametrum tantum unico æquari minuto primo: quod perfectò optimè, cum observatione supra pag. 449. insertâ consentit. Si verò diametrum Lunæ perigæam minorem, cum Eximio P. Gassendo, 31 duntaxat minut. & 6. sec. itatuas, diameter Jovis, vix certè 54. minut. 40. sec. constabit. Sed de his sufficiat. Nunc observationem ipsam occultati Jovis, ejusq; typum, cum in majori, tum minori formâ, adjungamus.

Diameter Jovis quanta fuerit deprehensa?

Observatio Jovis à Lunâ tecti, insti-

tuta GEDANI An. 1646. die

24. Dec. st. n. vesp.

	Altitudines.		Tempus	Tempus	
	Grad.	min.	suppl. Hor. 1 1/2	per alt. corr. Hor. 1 1/2	
1			8 39	30	Initium emerfionis. Quo tempore M. Serrorum & Inf. Corsica, sub eadem lineâ deprehendebantur perpendiculari. Hincq; 340. grad. limbi culminasse constat.
2			8 50	0	Jupiter tanto elongabatur intervallo, à confinio luminis & umbrae, quâto M. Æt. à Sin. Salvideffo; hoc est. 6 1/2 min.
3	Hum. Dex. Or. 34	50	8 58	20	Distantia Jovis à confinio, erat aequalis distantia Inf. Inf. Bœtica à M. Riphæu; hoc est 8. circiter minutu.
4	Pedis sinist. Or.	24 30	9 13	44	Distantia Jovis à limbo lucido, æquabatur distantia M. Ætnæ à confinio occident. hoc est 17. min. Distantia Jovis erat tanta, quanta distantia M. Porphyritu à M. Riphæu, tum temporu in ipso confinio situ, id est 22. circiter minutorum.

0003

Hum

5	Humluc, dext.	38	33	9	38	31
6	Limbi Dsuper.	29	52	10	4	42
	Limbi Dsuper.	30	44	10	10	52
	Jovis	31	50	10	16	14
	Martis	29	10	10	17	45
	Jovis	32	18	10	19	35
	Jovis	32	42	10	21	39
	Jovis	33	0	10	24	31
	Canis min.	32	10	10	27	56
	Canis min.	32	47	10	33	42
	Canis min.	33	7	10	36	50

Jupiter tanto spatio à confinio, quanto abesse videbatur confinium lucida & obscura partu, ab ei apposto limbo orientali; hoc est 31. min.
Jupiter à confinio 40. circiter min. removebatur.

De cætero autem, si scire quispiam etiam cupiat, quodnam planè occultationis Jovis fuerit auspiciu, licet mihi ipsi ob causam supra dictam, id animadvertere oculis non licuerit, nihilominus tamen id mysterii facilè omnibus propalabo.

Sed quomodo inquires, videtur enim id quasi impossibile? minime certè. Nam, quod id feliciter fieri possit, efficit Doctissimi M. Alberti Linemanni, amici nostri haud vulgaris, observatio, Regiomonti in Borussia nostrâ feliciter suscepta, cui, nescio quâ meliori fortunâ, initium illud Jovis occultationis, præ nobis observare obtigit, quod, sicuti ex literis ejus humanis percepi, incidit ibidem, cum Humerus sinister & præcedens Orionis altus esset 29. grad. 31. min. hoc est, hor. 7. 53. min. 3. sec. Quo de tempore, si differentiam Meridianorum 7. min. 30. sec. inter Dantiscum & Regiomontum, quamplurimis fide dignissimis observationibus multoties stabilitam, subduxeris, remanebit verum principium ingressus hîc, scilicet Dantisci, hor. 7. 45. min. 33. sec: egressus verò à nobis deprehensus horâ 8. 39. min. 30. sec. Ex quibus utique fit, quod mora obscurationis Jovis ad 54. propemodum minuta temporis se se extenderit: id quod hoc loco tacere, & silentio suppressere planè nefas duximus. Restat autem, ut nos ad transitum Jovis Anno 1647. die 21. Januar. (câ scilicet ipsâ nocte, quâ Eclipsis Lunæ superior ingruerat) animadversum, conferamus; cum non minus annotari sanè mereatur, quò simul observationum cœlestium tironibus pateat, quâ viâ hunc observaverim transitum, simulque omnes de Tabularum nostrarum perfectione, eò tutiores esse possimus. Cujus transitus typus, tam in figurâ F F f*, quàm in antecedente G G g, omnium oculis subjicitur.

Initium occultationis Jovis Regiomonti observatum.

Transitus Jovis Dantisci observatum.

Tran-

Transitus Jovis, observatus

G E D A N I,

Anno Christi 1647. die 21. Januar. mane st. n.

Altitud. Arcturi. Gr. min.	Tempus supputatum.		
	Hor.	¹ / ₁₁	
1 36 13.	2 6	49	Distantia Jovis à limbo ☽, deprehendebatur 40. circiter minutorum.
2 33 29. 39 43.	2 18 2 33	21 0.	Distantia ♃ à limbo ☽, aequabatur diametro ☽, seu 34. minutis. Monit̃ Carpatem & Byzantium, sub eadem lineâ perpendiculari animadvertimus : hincq̃, constar. 33. grad. limbi culminasse.
3 44 48.	2 33 3 6	45 15.	Marsicum centro Luna in perpendiculari observatus. Jupiter à limbo ☽, non removebatur majori intervallo, quàm M. Ætna à limbo ☽ infer. hoc est 21. circiter min. Tumq̃, Jupiter cum M. Porphyrius atq̃, Ætna, rectam omnino constituat lineam. Id quod circa tales stellarum transitus summopere dignum est observatu. Hoc enim si rectè attendatur, profectò nunquam non certum esse poterit, à quâ parte limbi distantia sit numeranda? contra, si id neglexeris, in cassum laborabis.
4 46 16.	3 18	7.	Jupiter distat à limbo Luna, tanto scilicet intervallo, quanto Insula Bœtica, à M. Porphyrite, hoc est 13. min. In rectâ verò lineâ deprehensus Jupiter cum Inf. Corsicâ atq̃, Insul. Bœticâ.
5	3 45	0.	Distantia ♃ paulò major, quàm intervallum inter Mare Mediter. & limb. Orient. Luna, circa Inf. Cercinam animadversa. Quo simul tempore ♃ recta incedebat cum Lacu nigro majori, itemq̃, Inf. Bœticâ.
6	3 57	0.	Luna cum ultimo observaretur, summam à Jove 7. min. elongabatur. Postmodum Lunam minimè amplius observare nobis concessum, cùm Calum- nidâ, nubibus densissimis obumbraretur.

Ex quibus utiq̃ue observationibus, ut & iis, quæ passim à nobis dicta sunt, satis superque (præsertim illis, qui rem aliis perpendunt) colligere haud obscure licet, quòd isthac ratione hujuscemodi observationes, multò certè accuratius, quàm quidem olim, possint administrari; ita, ut sanè nullus dubitem, si ab omnibus & universis rerum cœlestium Spectatoribus, pari modo & attentione suscipiantur, quin in magnum reipublicæ literariæ emolumentum vergant; imò, non solum Lunæ motum, quàm accuratissimè examinandi corrigendiq̃ue, sed & ex initio & fine stellarum occultatarum, longitudines locorum investigandi, uti jam superius monuimus, exoptatissima detur occasio.

Fateor equidem, rerum Astronomicarum peritos, Virosque alios præstantissimos, nullo non tempore, omnes ingenii nervos viresque unice in id intendisse, ut vario modo locorum longitudines explorarent: verùm quot quot hucusque inventi fuerint adhuc modi, nullus profectò tamen me iudice est antefereendus ei, qui per Eclipses atque stellarum occultationes (eâ

Mathemati-
ci magnopere
allaborarunt
viâ diversâ
longitudines
investigare.

ex-

*Quantum
hactenus fuit
compertum,
omniū opti-
me per Ecli-
pſes & occul-
tationes ſtel-
larum inda-
gantur.*

expreſſâ lege, ſi exquisitè admodum ab omnibus, cumprimis viâ prædictâ, ſuſcipiantur) peragitur. Interim hoc unicum tantummodo optandum eſt, ut ejuſmodi obſervationes frequentius, quàm quidem hactenus accidit, ſuſcipiantur & conferantur! quamobrem quidem ſummoperè erit neceſſarium, ut ſummis annitatur viribus, quò adhuc alia inſuper ratio venandi atque determinandi longitudines (per quam quotidie, ubivis locorum, quandocunquè placuerit, id fieri poſſit) detegatur. Atque ſanè de eo nullum eſt dubium, temporis progreſſu, hunc modum ab indiſtriis gnaviſq; ingeniis magis magiſque excultum, & ad ſuam perfectionem iri redactum.

*Luna ad lon-
gitudines in-
quirèdas ma-
ximè eſt uti-
liſ.*

Equidem certo certius eſſe poteſt, Lunam præ reliquis omnibus ſtellis, ob ejus velociſſimum motum, huic negotio maximè eſſe accommodatam, adeò ut adhuc inſallibilis medium quoddam ſit, quàm per Maculas Solares, vel Joviales, ſi tantum viâ eo rectâ deducendo incederemus: ad quam ut perveniamus, ope hujus Selenographiæ, diverſos inſuper modos nuperimè à me excogitatos, longitudines explorandi, omnibus rerum Mathematicarum peritis exhibebo; non quidem, ac ſi hæc inſiderit animo meo ſententia, à me nuncupandos modos, eſſe planè illos ipſos, per quos id unice oporteat poſſitque perquam certiffimè explorari; minimè; ſed, quò forte, ut penitus mihi perſvadeo, ejuſmodi ſint, qui minimùm non minoris habendi, ſi non cæteris hactenus excogitatis, atque orbi literario hucusque cognitis (exceptis iis tamen modis, qui per Eclipſes occultationeſque ſtellarum inſtituuntur) ſint anteferendi; & quidem ita comparati, ut temporis tractu, atque Aſtronomorum penitiori investigatione, certiores perfectioresque reddi non nequeant. Quod ut faciant præſtantiffimi quiſque artifices, in id, ut pro virili allaborent, omnes ac ſingulos, propter communem rei Mathematicæ commodum, etiam atque etiam admonitos rogatoſque velim; ſpe certiffimâ fretus, adhuc multò majora certioraque à quopiam alio, quàm quæ jam jam palàm faciam, detectū iri poſſe: quippe qui nec poſtremo Matheſeos vero cultori, Siderumq; ſcrutatori dextro, me nunquam antepoſitam.

Prima autem ratio, opinione noſtrâ, longitudines inveniendi haud

haud ita absurdè institui poterit, Lunæ inclinationem, sive gradum limbi verticalem, investigando. Luna namque à primo exortu, usque ad occasum, inclinationem, sive gradum verticalem, continuè variat; nec minùs angulum circuli verticalis orbitæque suæ; & quidem non adeò multo tempore satis velociter: quare fieri utique poterit, exactè scilicet invento verticali gradu, altitudineque alicujus fixæ exploratâ (præfertim, si id à diversis observatoribus attendatur) ut isthoc pacto longitudo locorum investigetur feliciter:

Quæras autem forsân, quomodo gradus iste Lunæ verticalis, ex inclinatione mobilis, quocunquè tempore, exploretur? scias, id fieri apprimè posse, cognitâ duarum insignium Macularum (sive id sint Montes, Insulæ, Promontoria, Sinus, Lacus, sive Paludes, perinde est) Tubospicilli beneficio, perpendiculari lineâ; hoc est, si probè attendatur, quando duæ certæ Maculæ, ad perpendiculum examinatæ, prorsus erectæ stent: quo explorato, atque auxilio quidem versatilis Plenilunii, sicuti jam paulò antè, circa observationes Lunarium Eclipsium, significavimus, haud magno negotio gradus ille limbi verticalis innotescit. Quod si regeas, lubricum admodum esse, nudâ oculorum acie, nullo alio adminiculo adhibito, id, quod quæritur, explorare, ut periti, planè omni ex parte certi, de re istâ esse possint? fateor igitur ego, minùs inexercitatum observatorem, hîc facilè isthac viâ ineuntem, impingere; ut contrâ, veteranum aliquem observatorem minimè item à verâ aberrare posse viâ, omnino mihi dandum est. Nihilo tamen secius, ne non cuilibet, ratione infallibili hujus vel illius Maculæ, situm perpendiculararem (qui saltem aliqualem faciei Lunaris cognitionem habet) dimetiri liceat; modum, candido Lectori, recens à me inventum aperiam, qui quæritidem ad phasium inclinationes, Eclipsios tempore animadvertendas, valdè commodè adhiberi poterit.

Initio scire velim, me perpendiculum quoddam Perpscilli vitro concavo applicare, cujus beneficio duarum Macularum situs perpendicularis discernitur. Simplex quidem filum neutiquam sufficit; cum id oculo admoto satis dignosci nullatenus possit;

P p p


*Nova ratio,
longitudines
scrutandi, de-
tegitur.*

*Quomodo
gradus Luna
verticalis in-
vestigetur?*

*Alia infalli-
bilis ratio,
Macularum
situm perpen-
dicularem si-
ve gradu Lu-
na verticali,
quævis tēpore
indagandi.*

possit; multò verò minùs ejus ope lineam perpendicularem duarum Macularum licet examinare: verùm necesse est, ut aliud quiddam sit in promptu, peculiare scilicet instrumentum, quod concavo Tubi vitro, tanquam oculo viciniore, aptetur; & ita quidem, ut nobis continuè lineam perpendicularem, absq; omni remorâ, aberrandiq; periculo, in quâcunq; Telescopii elevatione, sive directione, indicare queat. Quamvis id verò, paratu valdè difficile primâ fronte videatur; attamen facilè parabile est, sicuti haud grave erit, mòdum construendi illud, in sequentibus, cupido Lectori palàm facere.

1. Cura fieri annulum æreum seu ex orichalco a, hujus circiter latitudinis altitudinisq;e, prout in subjectâ figurâ vides, ut



*Fabrica cu-
juedam in-
strumētī, per
quod longitu-
dines Ecli-
psisq; modo
haud vulga-
ri, amotari
possunt.*

commodè Tubo, eo videlicet in loco, ubi lens concavo hæret, aptari, trochleisq;e illis tribus c, firmari possit. Utrique lateri hujus annuli, duæ vaginulæ b jungantur, ut in iis duo brachiola d, efflagitante necessitate, immitti, ac pro lubitu sursum deorsum moveri, longiusq;e evaginari, trochleisq;e iterum illis duabus b, sine ullâ difficultate, ad motis roborari non nequeant.

2. Alius

2. Alius insuper orbiculus *f* fabricetur, qui duos habeat polos *m*, circa quos, brachiolis illis *d* sustentus, liberè, nulloq; negotio, in orbem circumvolvi queat.

3. Qui orbiculus *f*, ex quatuor partibus construatur, in quo lamella *q*, *n*, *p*, *q*, semicircularis, ope cujusdam perpendiculari *l*, quàm facillimè circumduci, & ad quemcunq; Tubi positum, perpendiculariter erigi possit; quod haud difficulter fieri poterit: lamella orbicularis *h*, formâ planè *f* simillimâ, cingulo exiguæ latitudinis circumdetur; cui orbiculo *h*, postmodum annulus *k* affigatur, super quem, lamella altera orbicularis *f*, imponi, firmiterq; includi, spatium intus manente quodam libero, possit.

4. Lamella *p* semicircularis tenuissima, (vel, quod certis de causis præstat, illam ita fabricabis, ut semicirculum nonnihil, velut hic vides, excedat) per centrum *n*, habens aciculam loco axis pertranseuntem, illi priori orbiculo adornato, intusq; quasi excavato, inferatur; ita quidem, ut istæ aciculæ per centra *i* & *g*, orbiculorum *h* & *f* prorsus transeant: isthoc enim modo, liberè in gyrum, lamella illa semicircularis *p*, (dummodo spatium intra quod moveri debet, satis sit amplum, foraminaq; in quibus Poli illi inclusi, itidem satis lævigata) circumducetur.

5. His sic concinnè apparatis, perpendiculum aliquod *l* haud exigui ponderis, beneficio istius uncinulæ *o*, lamellæ plusquam semicirculari circumvolubili appendatur; quod ut facillè & quàm citissimè succedat, utroq; in extremo, duo parva foramina *q*, lamellæ inferi jubeas.

6. Appenso perpendiculo, totoq; instrumento ad Tubo-spiculum, trium trochlearum ope, firmato, duos inprimis motus, huic instrumento proprios animadvertes; primò, motum beneficio axis *m*, horizonti parallelum, secundò, motum ope aciculæ *n* quendam verticalem, seu perpendicularem: hincq; adminiculantibus his motibus, latus rectum *r r* lamellæ *p*, ad quemcunq; Tubi positum, sive elevationem, perpetuò perpendiculum repræsentabit.

7. Oculo itaq; huic instrumento, quod firmiter est Te-

lefcopio annexum, admoto, liberumque motum perpendiculari circumvolubili lamellæ relicto, faciem Lunæ, Maculasque ejus contemplare diligenter; dein attende, quænam Maculæ ad normam hujus lamellæ lateris $r r$, (quod accuratè distincteque admodum, oculo huic armato dijudicare permittitur) in lineâ perpendiculari, omnino appareant erectæ. Eodem momento temporis, cum duas Maculas sic fitas esse deprehendis, altitudo simul alicujus stellæ fixæ, operâ alterius observetur, quæ diligenter, cum nominibus illis Macularum perpendiculariter erectarum, annotetur.

8. Cum verò Lunâ in perpetuâ inclinatione, ab ortu ad occasum usque, ob motum diurnum deprehendatur; hinc evenit, ut continuè aliæ, atque aliæ diversæ Maculæ, sub perpendiculari lineâ se se objiciant: convenit igitur, unâ observatione non esse contentum, sed plurimas ejusmodi Maculas, cum competenti altitudine, summâ curâ acquirere; eum quidem in finem, ut si alteri observatori, sub aliâ diversâ loci latitudine, priores Maculas sic constitutas deprehendere non licuisset, tunc unam tamen atque alteram saltem postremarum annotare integrum procul dubio fuit.

Paradoxa.

9. Circa quas observationes, duæ res diversæ admiratione maximè dignæ occurrunt: primò, quòd, quamvis lamella supra dicta circumvolubilis, dimidiam partem pupillæ tegat, nihil prorsus tamen visui id noceat, nec quicquam detrimenti adferat. Secundò, quod semper illam partem objecti visu apprehendamus, quæ à lamellâ tegitur; & contrà illam partem minimè videamus, quæ patet. Exempli gratiâ, si lamella illa à dextris pendeat, Lunam dum spectamus, tunc certè non sinistram, ut quidem jure deberet, medietatem ejus cernimus, sed dextram, scilicet illam tectam. Unde verò hæc apparentia ducat originem, & quæ id fiat? videbitur fortè aliquibus, præsertim rerum Opticarum ignaris, res esse magni momenti, genuinam nimirum rationem primâ statim fronte hujus paradoxo determinare. Adeant igitur, si velint, Opticos, qui inter cætera miraphænomena, & hoc illis planiùs reddent; quandoquidem instituti mei ratio, id hujus loci pluribus pertractare, ac demonstra-

strare non permittit : nam nos nunc ea, quæ circa nostram observationem longitudinum attendi debent, ulterius persequemur

10. Quod si autem impofterum Mathematici, hanc longitudines investigandi rationem à nobis explicatam, tanti æstimaverint, ut hujus ope istud aggredi visum fit; tunc hoc imprimis summè erit necessarium, ut omnes observatores, sibi priùs Tabulam Angulorum verticalis & orbitæ Lunæ, ad quemcunq̃ue Eclipticæ gradum, & quidem ad illum ipsum horizontem, in quo observationes institui debeant, constructum eant; eò, quò neminem lateat, beneficio hujus tabellæ, quoniam tempore tales observationes sint suscipiendæ: id quod sanè fit tempore maximè opportuno, quando scilicet angulus antedictus, quàm velocissimè se se variat; contrà Maculæ Solares nullo alio tempore meliùs, quàm eo observantur, cum angulus verticalis & Eclipticæ parùm admodum mutatur. Angulus enim orbitæ Lunæ & verticalis, hac horâ plus, aliâ minùs, ut Astrophis innotuit, variatur. Illo igitur tempore, ubi majori & velociori variationi angulus iste est obnoxius, accuratius longitudines investigare opportunum erit.

11. Necessè quoq̃ue est, ut Astronomi certos constituent inter se dies, sanciantq̃ue, in quibus ejusmodi observationes, singulis mensibus, Cœlo sereno instituere, atq̃ue omni tempore continuare non nolint; ne alter hoc die, alter alio hunc laborem aggrediatur; quod si fieret, operam certè omnem perderent. Etenim singulis diebus, Cœlo annuente, observationibus invigilare, opus foret profectò tædiosissimum: optandum igitur tantùm est, sicuti modò diximus, ut certi dies ad observationes celebrandas decernantur. Exempli gratiâ, si rerum gnaris ita videbitur, non absonum erit, ut arbitror; primò, tempore crescentis Quadraturæ; deinde ultimâ ante, & primâ post oppositionem die, ut & tempore Quadraturæ decrescens observationibus vacare. De quo, si inter omnes conveniret, tunc certè perrarò alicujus observatoris labor foret frustraneus: quin inde, brevi temporis intervallo, & in Astronomiam, & in Geographiam, magnam sanè utilitatem redundare posse, certum est.

Ad longitudines inveniendas necessè est, ut constructatur Tabula Angulorum verticalis, & orbitæ Lunæ.

Certis diebus ad observationes suscipiendas constituantur.

Quoniam tempore magis convenias observationibus operam navare?

Quantā Macula circa longitudinum observandarum negotiū, in primis attendi debet?

12. Cui negotio non parū quoque adferet momenti, si certæ Maculæ Lunares essent præscriptæ atque electæ, quæ, præter cæteras, observari deberent, ut ne aliter iterum has, aliter alias attenderet. Meo autem iudicio, sequentes, propter situm commodissimum, atque majorem eminentiam, valdè his observationibus erunt accommodatæ, utpote : 1. Lacus niger major, & Mons Ætna. 2. Mons Ætna, Insulæque Creta. 3. Mons Ætna, cum Monte Sinai. 4. Lacus niger major, cum Insulâ Corficâ vel Vulcaniâ. 5. Lacus niger major, cum Insulâ Besbicâ. 6. Mons Serrorum, itidem cum Insulâ Besbicâ vel Bizantio, vel Insulâ Cyaneâ, vel Insulâ Apolloniâ; atque aliæ his similes Maculæ valde conspicuæ, quas nobis ipsa observatio ultrò deteget.

Quomodo ratio longitudines investigandi, modò explicatæ, examinari possit?

13. Cū itaq; hoc modo, in diversis regionibus, observationes accuratè fuerint administratæ, continuè reiteratæ, atq; cum aliorū observationibus collatæ, mox utiq; elucescet, num longitudo ex illis derivata, semper sibi similis prodeat: nam id si fiat, certo est indicio, modum observandi esse certissimum, observationesq; pariter quàm diligentissimè esse peractas; sic, ut de earum certitudine nullatenus sit dubitandum. Insuper verò adhuc alia superest ratio, superiorem modum examinandi; quo non neglecto, haud difficulter omnis error, si quidam irrepsit, facile deprehendetur: si nimirum duos inter bene exercitatos observatores, qui modum huncce periclitari vellent, conveniret, in duabus longè distitis regionibus, & Meridianis, quorum differentia, ex animadversis Eclipsibus, jam optimè perspecta esset, hac jam traditâ viâ, discrimen longitudinis explorare & cognoscere, an posteriores observationes, per Lunæ Maculas acquisitæ, prioribus per Eclipses deprehensis, omnino respondeant: quod si enim planè nullam differentiam deprehenderent, infallibile esset argumentum, rationem nostram Orbi literario in præsens commendatam, esse certissimam; sin verò tamen differentia quædam animadverteretur, (quod vix spero, modò observationes tantum dextrè accurateque, prout negotii gravitas hoc flagitat, administrantur) necessarium erit, ut operam demus, quò modum istum novis inventionibus cer-

certiorem, tutioremque reddere possimus. Nihil verò addubito, quin hac viâ minimùm locorum, longè ab invicem distantium, longitudines, optimè investigare liceat : nam de cætero, utrum æque bene locorum viciniorem, atque remotorum differentiam, quoad longitudinem explorare detur, nec ne? id experientiâ nos docebit. Iterum autem atque iterum circa hanc praxin notandum erit, quòd, nisi hujuscemodi observationes à sedulis & diligentissimis contemplatoribus, omnia etiam minima attendentibus, & perfectissimæ notæ Telescopio instructis peragantur, impossibile sit futurum, ut propositam, (quod & in Eclipsibus animadvertere est) attingamus metam.

14. Ex quibus quidem, quæ breviter dicta sunt, cuilibet, ut judico, patebit, quomodo longitudines à diversis observatoribus, in statione diversâ, explorari non nequeant? nunc pariter optandum esset, ut omnibus & singulis ubivis locorum degentibus, ex unico statim Macularum Lunæ aspectu, nullo non tempore, id indagare commodum esset; sic enim certè, non solum Astronomiæ, & Geographiæ, sed & imprimis rei Nauticæ, maximè foret consultum; dum scilicet Nautæ, oceanum illum magnum navigantes, quâcunq; nocte serenâ, id ex Lunæ facie, certò petere possent, quod aliàs magno labore tantùm & conjecturâ assequuntur. Quod inventi, ut nos hætenus fugit, & inmensam promittit utilitatem; sic certè meretur, ut quilibet omnem moveat lapidem, quò eo demum aliquando gaudeamus. Et quamvis non confestim primo conatu rem acu tetigerimus, nihilominus tamen, quòd studium atque operam nostram hoc in negotium, publicamque salutem conferre, pro nostrâ tenuitate, non detrectaverimus, laudem utique sanè merebimur. In magnis & voluisse sat est. Quod cum & meo subinde obverferetur animo; idcirco, in quantum ingenii mei imbecillæ vires se se extendunt, huic studio subveniam.

Primò autem hoc negotii minimè malè, meo judicio, successurum spero, si priùs adhuc alia Tabula construatur, nimirum inclinationis disci, seu Macularum Lunæ, ad singulos gradus cujuslibet signi, & ad quamcunq; diei horam; ut & non minùs si possibile, ad semihoras, & horarum quadrantes, & ad

hori-

*Ex unica
statione, quo-
vis tempore
atq; loco, ló-
gitudines, be-
neficio Macu-
larum, iuda-
gare.*

horizontem quidem Uraniburgicum; ne non scilicet tabulæ illius beneficio, cognitoque vero Lunæ loco, & die horâque datâ, veram istius temporis inclinationem Lunæ Uraniburgicam explorare possimus. Non enim te præterire potest, mi Lector, Lunam ob motum diurnum, continuè se se aliter atque aliter, sicuti jam sæpius inculcatum, inclinare; & ita quidem, ut in quolibet diverso horizonte, aliam atque aliam inclinationem, sive faciem nobis exhibeat. Hincque Luna, hac horâ, in nostro horizonte, sic inclinatur, aliter verò in alio; adeò ut perpetua differentia animadvertatur. Ut autem mentem meam plenius explicem; scias, me per inclinationem Lunæ intelligere gradum istum limbi Lunæ, qui certo tempore existit verticalis: hic, inquam, gradus verticalis Lunæ limbi, omni tempore respondens, ad horizontem nimirum Uraniburgicum supputetur, atque in debitum locum ejusdem Tabulæ construendæ referatur: quomodo verò beneficio Plenilunii versatilis, hic dictus gradus verticalis investigetur, capite 26. docuimus, quò lectorem remitto.

Secundò, Tabulâ hac ita accuratè constructâ, recteque adornatâ, porrò observatio nostra sic instituetur: nocte aliquâ serenâ, horâ itidem quâcunque volueris (præstat tamen id fieri circa Lunarem exortum, vel occasum, ob velociorem scilicet inclinationis mutationem) Lunam studiosè considerabis, hoc est, attendes diligenter, ope adhæc Telescopii instrumento perpendiculari aptati, quando duæ aliquæ insignes Maculæ, lineam omnino perpendicularem constituent, simulque eo ipso momento, altitudinem alicujus fixæ investigabis, ex quâ, ut & altitudine Poli, tempus, observationis beneficio calculi Trigonometrici, accuratè colliges. Quibus quidem perspectis, quære insuper adminiculantibus Maculis duabus animadversis in Plenilunio versatili, prout accepisti cap. 26, gradum Lunæ limbi, qui id temporis fuerit verticalis. Deinde, ex Ephemeridibus, si id ex Tabulis perpetui motus, temporis scilicet redimendi gratiâ, supputare nolueris, itidem inquire verum Lunæ locum, tum, quâ longitudinem, tum quâ latitudinem. Quo etiam cognito, accede hoc vero loco Lunæ, ad Tabulam illam inclinationis, &
ita

ita parte proportionali, si opus, minimè neglectâ, quære, quânam horâ, ille ipse inclinationis, seu verticalis limbi gradus Uraniburgi reperiatur? quod si, exempli gratiâ, invenias contigisse horâ duodecimâ; tu verò beneficio Macularum id accidisse horâ decimâ animadvertas; certum erit indicium, differentiam Meridiani istius loci, in quo observationem peregeris, duarum esse horarum, & quidem tot horis Meridiano Uraniburgico orientaliorem, cum Maculæ citius ad perpendicularum venerint, quàm Uraniburgi; quando verò id tardius accidisse deprehendes, tunc locum istum altero esse occidentaliorem, rectè omnino judicas. Quâ utique ratione, quilibet hominum, isque solus, nullis aliis observationibus adhibitis, Tubo Optico, instrumento perpendiculari armato, per Maculas Lunares, quâcunq̄ nocte serenâ (Lunâ quidem lumine sufficienti splendente) horâque quâcunq̄ voluerit, longitudes non poterit non indagare; eâ tamen expressâ conditione, si observationes exquisitè ab observatore exercitato, Tabulamque inclinationis ad Meridianum Uraniburgicum possidente, administrantur. Videbitur quidem Lectori, talem construere Tabulam esse artis laborisque haud exigui; sed ut ut sit, nihilominus tamen optimè confici poterit, imò meretur, ut perficiatur, dummodo modus antè dictus longitudes investigandi, Mathematicis arriserit. Et quanquam amplissima evadet Tabula, ratione scilicet diversæ Lunæ latitudinis, retrocessionisque Nodorum; attamen diligentiam constantiamque & hic labor ab indefessis nimirum rerum Astronomicarum Calculatoribus facile superabitur. Quis enim nescit, æque difficilia opera superiori tempore esse confecta, qualia sunt verè gigantea illa, utpote inter cætera annorum multorum diversæ Ephemerides, Tabulæ perpetuæ; ut taceam, opus illud Palatinum, Canonem illum magnum Logarithmorum Flacci, & alia, quæ si omnia & singula recenserent, tempus certè & charta penè deficeret? quidni ergo ejusmodi quoque construeretur Tabula; præsertim si in commodum emolumentumque rei literariæ, totiusque orbis vergere non nequeat. Quod si verò præter spem nullus prodierit, qui hunc laborem aggredi audeat, tunc certè & meam

operam hac in parte, dummodo DEUS vitam sanitatemque concesserit, spontè polliceor: penitus persuasus multò levius istud fore onus, quàm hoc ipsum Selenographicum, quod cum Numine mihi sumfi.

*Alter modus
longitudines
inveniendi.*

Sequitur enimvero, ut alium quoque modum investigandi longitudines explicemus; qui licet, meâ opinione, priori aliquantò sit inferior, nihilominus ostensum dabo, quòd differentia Meridianorum in locis præsertim remotis, non minùs per hunc, ac per superiorem, explorari queat. Hunc verò, nobis suppeditabit inclinatio cornuum Lunarium bene attendita. Et enim, cum & hæc in phasibus crescentibus, magis magisque continuè horizontem versùs declinent; contrà in phasibus decrescentibus, plus plusque se se erigant: utique sperandum & hac viâ aliquid certi determinari posse; modò accuratè admodum, ut quidem debent, cornuum inclinationes observentur; namque in hoc totius rei cardo vertitur. Quomodo verò hæc inclinationis determinatio institui debeat, jam jam edisseram. Primò enim, id satis feliciter fieri poterit, meâ sententiâ, adminiculo cujusdam Astrolabii pendentis, si ejus regula exactè, ad inclinationem utriusque cornu dirigatur: vel secundò, quod ferè idem, ope semicirculi tripodi affixi, cujus diameter, vel ejus linea, quando rectè ad cornua inclinatur; tunc illico, ex appenso perpendiculo, apparebit, quanta sit inclinatio in gradibus & minutis, cornu scilicet superioris à puncto Lunæ verticali. Quæ inclinatio cornuum, si unâ die aliquoties observetur (præsertim eo tempore, quo inclinatio omnium maximè existit variabilis) cum altitudine fixæ alicujus, ad verum scilicet tempus eruendum; atque item aliis in Regionibus, ab observatoribus diversis; non hæreo, quin sanè haud minus aliquid certi hac in parte elici possit. Imò & unicus observator, hac inclinatione aliquoties probè ritèque animadvertâ, atque, adminiculo Plenilunii versatilis, inquisito gradu Lunæ limbi, circa id temporis verticali, temporeque rectè ex altitudine alicujus fixæ annotato, ex illâ ad horizontem Uraniburgicum construendâ Tabulâ inclinationis Macularum Lunarium, longitudoinem cujuslibet loci pariter hac ratione proditum ibit.

Ad

Ad quas observationes viâ modò dictâ instituendas, itidem magnoperè erit opus, ut rerum Astronomicarum periti, certos dies, quibus hæc peragenda sint, præscribant, constituantq;. Ut mea verò fert opinio, illi sunt maximè eligendi dies; qui scilicet primam apparitionem sequuntur, usque ad primam quadraturam, & iterum à quadrâ ultimâ, ad ultimam apparitionem usque se ordine excipientes. Quæ quidem investigatio inclinationis cornuum, penè subtiliùs, Perispicillo, instrumento illo perpendiculari armato, explorabitur; eoq; magis, si huic instrumento, semicirculum quendam, in gradus divisum adjeceris; quò lamellâ perpendiculari circumvolubili ad inclinationem cornuum directâ, perpendiculum ei appensum, gradus minutaq; indigitare simul queat.

Reliquum autem est, ut brevibus etiam tertium modum, longitudines scrutandi, expediam; quem, si ita videbitur, hac viâ aggredieris. Inspice Lunam crescentem Telescopio adhibito, tempore quocunq; volueris, cumprimis confinium ejus luminis atq; umbræ diligenter contemplare; quando scilicet hujus, vel illius insignis Montis vertex, primùm à Sole illuminatur; simul verò illud momentum temporis ex altitudine, vel si aliter fieri nequit, ex automate quodam correcto annotabis: è contrario si Luna decrescens observabitur, attendendum, quando hic vel ille Mons penitus obumbratur; quod equidem multò certius, ut judico, fieri poterit, quàm primam cupidum Montium illuminationem certò dijudicare. Cogita enim ipse, quàm facilè error haud exiguus, atque confusio permagna, eo ipso, dum aliam planè quàm volueris, illuminatam cupidem apprehendis, oriri possit. In phasibus verò decrescen-
tibus tale quid minimè metuendum, dum videlicet id ipsum ante oculos versatur, cujus ultimam apparitionem attendere animus est. Accedit & hoc, quòd quotiescunq; visum fuerit, hoc ultimum aggredi liceat; ad prius verò per crescentes phas-
es exequendum, nonnunquam multam noctem impendere opus sit; quod profectò nulli non observatori, ut ut sit laborum vigiliarumq; patiens, nimis foret molestum. Præterea autem notandum, ut non minùs, ad hanc explorandi longitudines ra-

*Tertium mo-
dum, longitu-
dines loco-
rum investi-
gandi, detegi-
tur.*

tionem, à Mathematicis certæ Maculæ denominentur, ad quas unicè omnes spectatores, certo constituto tempore, oculos dirigant. Conduceret itaque omnino, ut non multæ, sed paucissimæ, è reliquarum numero videlicet maximè eminentes, ad hoc negotium destinentur : quo ad tum obvias, nemo non alacrius & promtius adjiciat oculum. Enimverò si nullæ certæ Maculæ essent denominatæ, sed promiscuè attenderentur omnes, fieri posset, ut modò hic illam, modò ille aliam apprehenderet; ex quo postmodum Astronomiæ & Geographiæ minimè consultum iretur. Quam ob rem inter cæteras valdè conspicuas, has putem Maculas, ob commodiorem situm, esse eligendas : 1. Inf. majorem Caspii. 2. Montes Macrocmnios. 3. Montem Serrorum atque Carpates. 4. Insul. Besbicam. 5. Montem Sipylum atque Didymum. 6. Montem Sinai. 7. Lacum nigrum majorem. 8. Montem Ætnain. 9. Insul. Cretam. 10. Montem Porphyritem. Hæ namq; si ad hoc opus destinentur, sancianturque, fermè quotidie observatio circa quamlibet phasin foret expectanda. Et tantùm dicere breviter volumus, de tribus illis diversis rationibus, quæ nostræ occurrere menti, longitudines locorum, per Lunæ Maculas investigandi. Potuissent quidem certè fufius pertractari omnia, si præsertim fundamentum, ordinemque construendæ, quam diximus Tabulæ, tradere voluiffemus; nec non verò pleniorum instrumentorum descriptionem, utpote : Astrolabii penduli, semicirculi, superiori organo perpendiculari armati: verùm, brevitati cum studeamus, tempusque penè instet, ut speciali huic Selenographiæ in universum finis imponatur, in alium locum hæc rejiciantur. Tum quoque opinor, nobis prius peritiorum de his, quæ jam exposuimus, expectandum esse judicium. Qui si, quæ prolata sunt, tanti esse putaverint, ut optent ea pleniori commentario illustrari, peculiare aliquoddam opusculum in eam sententiam, & libenter, & primâ quidem occasione, esse me conscripturum cum DEO, ingenuè promitto.

De Globo Lunari artificiofiali conscribendo.

Denique tamen priusquam receptui canamus, pauca adhuc adjicienda sunt, de conscribendo Globo Lunari; qui ut spero, non solum Astrophilis hinc inprimis gratus accidet, quod in

eo

eo omnes & singulæ Maculæ Lunares distinctè animadverti possint, nominaque simul memoriæ mandandi optimum sit medium; sed quòd & omni etiam tempore, cujuscunq; diei phaeos nativa facies, nec non motus librationis, unicuiq; quàm optimè clareque sub oculos poni eopse non nequeat: quomodo videlicet Luna, circa certum axem, ex parte libretur, ac inclinatio quovis tempore se se habeat; in summâ Globo isto, Plenilunii loco versatilis commodè uti licebit. Et hæc quidem omnia ad observationes Lunæ Eclipsium, stellarumque occultationes, partim etiam ad longitudes locorum investigandas, non minùs utilissimum, quàm accommodatissimum nobis esse videtur.

I. Cujus circa fabricam globi artificialis inter cætera hæc veniunt animadvertenda. 1. Quòd Maculæ Lunares, in hoc globo, eo planè modo occurrant expressæ, quo in Tabulâ Selenographica phasium generali R, illas adumbratas vides. 2. Singulisq; Maculis nomina competentia addantur. 3. Pariter etiam hic globus, annulo orichalcico in suos gradus divisio, adinstar Meridiani globi cœlestis, vel terrestris, circumdetur. In hoc tamen, scias, hic annulus ab illo globo cœlesti differt, quòd non Meridianum, sed potiùs horizontem repræsentet: unde meo arbitrato limbus Lunæ horizontalis jure appellabitur. In quo circulo æque ac in reliquis globis artificialibus fieri solet, Poli figantur necesse est, circa quos minor circellus, indice munitus, inque certas particulas divisus applicetur; quò scilicet ejus beneficio, ad quodvis datum tempus, libratio Lunæ exhiberi queat.

II. Præter eum autem nullo alio horizonte opus hic habemus; nisi quòd adhuc alius quidam annulus æreus, in gradus distributus fieri curetur, qui priorem limbum horizontalem planè cingat. Sed minimè est necesse, ut arctè admodum priori annectatur; quin potiùs attinet, ut aliquantò sit major, tantò scilicet, ut index in minori circello, limbo horizontali applicato, liberè circumduci possit.

III. Limbus orichalcicus posterior, eò inserviet, ut globus unà cum altero limbo, eum circumdante, circelloque ad Polum affixo, sursum deorsum, absque omni impedimento

moveri queat, idque ad Lunaris limbi gradum verticalem, & inclinationes ejus, dato certo tempore, & in quolibet quidem horizonte erigendasque repræsentandasque. Quanquam ferè idem præstat prædictus ille annulus major, quod in versatili Plenilunio extimus circulus. Ut verò eò melius hic globus officio suo faciat satis, requiritur, ut fulcro quodam firmiter sustentetur.

IV. Minor ille circellus cum indice, cujus jam supra facta est mentio, non eò adhibetur, ut nobis, horas vel horarum quadrantibus, ut in aliis fieri solet, commonstret; sed, quò signa cœlestia, certas in partes divisa, in eum transferantur; nec non horum beneficio, cognito vero loco Lunæ, omni tempori respondens, motus librationis, ita ut modò diximus, exhibeatur: simili planè ratione, sicuti antea, ope primaria Plenilunii figuræ, ex istis diversis annotatis centris, limbum Lunæ describere docuimus.

V. Globo huicce Lunari, simul Meridianus, seu circulus verticalis quidam mobilis, applicetur, ad instar videlicet quadrantis globi cœlestis terrestrisque. Etsi eà causâ hic ab illo non nihil differat, quod ille sit semicirculus, hic verò quadrans; itemque ille in puncto Zenith & Nadir affigatur: & hoc quidem eo fit fine, ut omnis generis phasæ, eaqueque, temporis cujuscunque, hoc est, sive præteritæ, sive futuræ, oculis omnibus succiantur; sicut & Maculæ quæcunque, vel hoc vel alio tempore, in confinio existentes nominatenus indicentur; itemque quænam clarè illuminatæ cuspidibus, ad hanc vel illam confinii partem, in Lunæ parte obscuratâ, hoc vel illo tempore, futuræ sint conspicuæ; vel, quo in loco sectiones luminosæ & umbrosæ partis, hæc vel illa cuspis illuminari prorsus desistat; ne dicam de rebus hujus generis quamplurimis aliis. Ad ultimum verò hoc præ cæteris, tanquam maximè singulare, in globo isto Lunari, animadvertes, quòd alterum hemisphærium Maculis penè nudatum appareat: idque accidit, quia videlicet maximam partem Lunaris hemisphærii à nobis averfi, minimè spectare possumus. Quare hemisphærium illud vacuum (ut revera est) erit terra Lunæ incognita. Ne verò pars illa dimidia, omnino maneat inanis, lice.

licebit, si ita videtur, annotationibus præceptisque quibusdam eam complere. Et profectò, nisi, & tempore egeremus, & illud, quo vela hujus Selenographiæ sunt contrahenda, jam appetere videretur, globum aliquem materialem, unà cum hoc ipso opere, cumque formâ jam indicatâ accuratè constructum, superadditâ etiam cum pleniori tum planiori expositione, nihil orbi exhibere gravarer. Quod cum autem in præsens, ob diversos, quibus destinemur, labores, fieri haud poterit, & id ipsum, & quædam alia, multò specialiora, quæ hoc loco tangere non fuit commodum, in commodiorem aliquam reservabimus occasionem.

Jam vale, cum mei, tum maximè rerum cœlestium, studiose Lector, & quem addo typum globi

Lunaris intuetor, sis, æquo
lumine.



FINIS SELENOGRAPHIÆ.

SELENOGRAPHIÆ

APPENDIX;

ET

HELIOGRAPHICAS

ALIQUOT ANNORUM

OBSERVATIONES,

ET

ORBIS JOVIALIS


POSITUM, MOTUMQUE

EXHIBENS.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

SELENOGRAPHIA ITAQUE, CUM DEO, PENITUS ad umbilicum perductâ, superest, amice Lector, ut observationes quoque Macularum Solarium, nec non Jovialium, prout supra, capite quinto, spem fecimus, appendicis loco, in medium proferamus; ut ita quilibet, usque scientiæ sideræ cupidus, ex oculari talium observationum inspectione, ac demonstratione, omnia singula, quæcumque, in prædicto capite, de Macularum ortu & occasu, cum Astronomico, tum Physico, illarumque diversis generibus, & ut vario, constantiâ tamen mirabili motu, aliisque huc pertinentibus rebus, prolata fuerint, eò melius faciliusque percipiat; tandem aliquando nobiscum statuens, (haud obstante Peripateticorum inveterato dogmate) generationem ac corruptionem, augmentationem ac diminutionem, & quidem nonnunquam sanè admirabiliter magnam, in ipsis Cæli visceribus existere: quemadmodum id ex observatis hætenus observandisque nunquam non periculis Macularum, Facularumque Solarium, Solis luce clarius elucebit. Ut hinc nobis etiam verosimile fiat, ipsos in rebus Mathematicis planè hospites, dummodo aliquâ ex parte, ad nostras hæc observationes, oculum mentemque adjecerint, in sententiam nostram concessuros; nisi cum Philosopho, solius inducti nominis autoritate, & nescio quo dictione, malint (parùm quidem, opinor, philosophicè) errare, quàm verum amplecti, & rectè sentire. Nudas verò & simplices observationes, hic tantùm apponere haud consulum esse duximus: quippe, quòd sic inde haud multum utilitatis ad Lectorem redundaret; dum Geometricis demonstrationibus essent similes, nullis adjectis literarum notis. Quare opera nulli parcentes, annotationes quasdam, quantum breves tantùm succinctasque, quoad fieri potuit, sed intellectui satis luminis præbituras, cuilibet Macularium Solarium iconi addidimus: ita ut à nobis quicquam jure desiderari vix posse amplius putemus. Id quod pariter, circa observationes Jovialium, nobis unicè fuit cura. Primò namque in quibuslibet iconismis, positum, distantiam, magnitudinem, atque proportionem stellarum, tum ad se invicem, tum ad Jovem designatam, conspicias. Secundo, in facie oppositâ, leges, quæ maximè circa quamcumque observationem notatu digna occurrunt: Unde quidem & motus horum quatuor Planetarum, Jovisque comitum, magis magisque stabilietur, & Mathematicum Doctoribus, ex his aliisque similibus contemplationibus, tabulas perpetuas construendi, exoptatissima dabitur occasio; nec non verò, si fortè jam ejusmodi à quibusdam compositæ fuerint, poterunt, si velint, optimè eas sub hanc incudem revocare, attentò, num prorsus, & omni ex parte, cum veritatis consentiant normâ? namque si etiam differentia adhibe quædam deprehendatur, in proclivi erit eas emendare. Quod ut ex omnium voto, & ad commune commodum bene succedat (nostro hocce opere, nonnihil emolumenti ad incrementum studiorum Mathematicorum adferente) animis à DEO precamur: ne non, ex singulari ejusdem Optimi Maximi gratiâ, abstrusiora multò plura, eaque majoris momenti, & exploratissime veritatis, in nominis sui gloriam, operumque suorum pleniorum cognitionem, cum tempore, nobis innotescant, inque lucem protabantur.

Animadversiones super I. Macularum Solarium periodo.

1.  Nno à nato Christo, 1642. die 26. Octob. in Sole nihil Macularum apparuit.
2. Die 27. Octobris cœlum non favit.
3. Die 28. Octob. magnam, oblongam, densam, pulcherrimamq; Maculam a, halone haud vulgari undique cinctam, animadverti; præter hanc autem unicam nihil profus in Sole deprehensum.
4. Die 29. & 30. Oct. ob aëris turbulentiam, Maculam istam notabilem, die præcedente conspectam observare non licuit.
5. Die 31. Octobris, alterâ vice, Maculam supra dictam, sed in formâ ampliori, duobusque nucleis densissimis præditam, nobis videre obtigit.
6. Die 1. Nov. illa ipsa Macula, tum quâ figuram, tum splendorem magnitudinemque nihil planè se immutaverat.
7. Die 2. Novembris, nullus Sol affulsit.
8. Die 3. Nov. non solum ulterius occasum versus in Solis disco progressa erat; sed & magis magisque ad Aquilon. deflectebat.
9. Die 4. Novembris, nihil quicquam adhuc mutata visa fuit.
10. Die 5. Nov. Cœli inclementia observationi fuit impedimento.
11. Die 6. Nov. paululum oblongior videbatur; tum, & circa ortum tres novæ minores spectabantur, quæ in sequens schema reservantur.
12. Die 7. Novembris, aër fuit turbidus.
13. Die 8. Novemb. exitum hujus insignis Maculæ perquam libenter observassem, sed frustra fuit, quia jam exiverat, sic ut nec vestigium amplius de eâ apparuerit in Peripheriâ. Cursum quod attinet Maculæ, quantum colligere licet, fuit 12. tantummodo dierum. Præterea, ex hoc motu satis superque liquet, viam hujus Maculæ fuisse concavam, Aquilonem Borealem, & convexam Austrum occidentalem versus.

Insignis Macula nimbo coronata cœparuit.

Macula 12. confecit in Sole dies.

Quâ viâ incesserit?

Ani-

GEDANI.

Anno aere Christianae 1642.

Cursus Maculae, à 20 Oct. ad 6 Novemb.




fig. H H.

Autor Scalgius.

II.

GEDANI.
 Anno xxx. Christiane. 1642.
 Caeſus Mercuriarum, à 6 ad 17 Novemb.




fig II.

Aut Scalp.

Animadversiones super II. Macularum Solarium periodo.

1. Die 5. No. Cœlum nubibus erat obductum.

2. D. 6. No. unica tantum Macula c, umbris nebulisq; coronata spectabatur: at horâ 11. 16. min. adhuc duæ minores & debiliores se se offerebant, quas illo ipso tempore primùm in Solis disco natas fuisse, apud me certum est.

3. Die 7. No. ob aëris inclementiam, nihil annotare potuimus.

4. Die 8. Nov. quatuor, cum multò illustriore comitatu facularum umbrarumque circa horizontem orientalem existentium, apparuerunt. Omnium postrema Macula erat maxima; reliquarum verò trium intermedia recens exorta, admodum rara debilisque videbatur.

5. Die 9. Nov. ex 4. Maculis die antecedente observatis, maxima tantummodo adhuc erat superstes, reliquæ planè extinctæ; &, quamvis Cœlum serenum esset, nihilominus tamen nec ullum quidem indicium earum animadversum. Unde equidem satis elucet, Maculas hæc Solem non fuisse subingressas; sed in medio ejus disco natas dissipatasq;. Faculæ autem & umbræ, penè eundem, quem die octavâ, circa horizontem tenebant locum.

Macula interdum in disco S lu generatur & corrumpitur.

6. Die 10. Novembr. Cœlum fuit nubilosum.

7. Die 11. Novemb. Macula b, tenuis debilisque deprehendebatur: Faculæ verò atque umbræ jam nullæ aderant.

8. Die 12. Nov. ex unâ tenui atq; rarâ duas majores & densiores procreatas, summâ cum admiratione, animadverti.

Ex unâ Maculâ duas fuerunt procreatae.

9. Die 13. ambæ jam dictæ erant æquales.

10. Die 14. eedem satis adhuc erant conspicuæ.

11. Die 15. minores illæ duæ Maculæ debiliores visæ sunt.

12. Die 16. antecedens ex istarum duarum numero, adeo erat attenuata, ut vix ac ne vix cerneretur.

13. Die 17. Nov. unica tantummodo, circa horizontem, undiq; umbris faculisq; circumdata apparuit. Solem hæc Maculæ diebus 13. peragrarunt, in curvilinæ ad Austrum convexâ.

Curfus Macule per d. 13.

14. Die 18. Novemb. nihil penitus in Sole deprehensum.

Sol ab omni Maculâ planè purus illustratus.

Animadversiones super III. Macularum Solarium periodo.

1. **D**ie 22. Maij, sex Maculas in Sole conspeximus, quarum posterior a, ratione magnitudinis densissimiq; nuclei, maximè erat notabilis: tres verò reliquæ c, in parte Solis occidentaliori cum minores, tum debiliores, spectabantur:

*Ex tribus
Maculis s.
nata sunt.*

2. Die 23. Maij Macula a, rotundior, nimbo cincta videbatur. Ex illis autem tribus c jam quinque erant generatæ. At duæ debilissimæ b planè jam erant dissipatæ.

3. Die 24. Maij aliquid observandi non dabatur occasio.

*Centra s.
Macula in unam
coalescunt.*

4. Die 25. iterum quatuor, sed formam figuramve omnino aliam præ se ferentes, conspeximus, Maculas. a paucillùm creverat: quinque verò illæ c, in unam & quidem debilissimam erant redactæ.

5. Die 26. præter reliquas in Sole conspicuas, nova denuò Macula e, sed tenuis ac admodum rara, circa horizontem orbitivum, se se nobis obtulit animadvertenda.

6. Die 27. Cælum erat nubilosum.

*Macula duarum
dierum.*

7. Die 28. Maij, nihil ampliùs de Maculâ istâ minori e, noviter exortâ apparebat; ut & reliquæ non parùm, quæ splendorem molemq; erant attenuatæ.

8. Die 29. Maij, duæ tantummodo a scilicet & b adhuc aderant; cæteræ prorsus evanuerant.

9. Die 30. ejusdem, Macula b, ob raritatem corporis vix incurrebat visum; altera vero a, satis adhuc densa existerat.

10. Die 31. Maij, Macula tantùm a circa occasum adhuc versabatur, b namque ex Solis orbitâ jam exiverat.

*Circa occasum,
Macularum
cursus ad re-
ctam lineam
accedit.*

11. Cursus harum Macularum circa egressum ad rectilineum accedit; idque ex schematis præsentis inspectione attentiori, cuilibet videre datur.

Animadversiones super IV. Macularum Solarium periodo.

1. **A** 9. Junij usque ad 17. ejusdem, nihil observare licuit.

2. Die

GEDANI.

Anno era Christiana, 1643.

Curfus Maculorum, à 22 May ad 31 eundem





Fig KK.

Aut. Scalae

IV.

GEDANI.

Anno era Christiana, 1643.
 Caeſus Macularum à 18. ad 23 Junij.



IVNII.

D. Hor. 1. Jov.
 18. 8 s. m. 52. 49.
 19. 7 48. u. 50. 42.
 20. 8 23. m. 52. 51.
 21. 9 42. m. 59. 34.
 22. 7 49. m. 50. 35.
 23. 7 50. m. 49. 49.

fig. LL.

A. Oriens.

B. Occidens.

Astr. Sulp.

2. Die 18. duas in Solis disco Maculas deprehendimus. Illa b admodum magna & densa erat, inq; ipsâ Eclipticâ versabatur, maximo ei proprii itineris spatio jam penè confecto: altera verò a, circa horizontem ortivum, supra Eclipticam, admodum existebat debilis, dilutaque.

Macula magna, intensa atq; præclaro nullo prædita.

3. Die 19. Junii, Maculas a & b non solum ratione magnitudinis, formæque variatas; sed & insuper novam aliam c, satis magnam densam atque conspicuam, tribus raris minoribus stipatam, in Solis medietate jam primùm natam summâ cum admiratione, deprehendimus. Præterea verò & ingens umbrarum facularumque cohors e, circa limbum orientalem apparuit.

In Solis medietate 4. Macula exorta.

4. Die 20. Macula b figuram denuo mutaverat, a verò nihil quicquam: at c mirum in modum se se variaverat. Die enim antecedente unica duntaxat magna, jam duæ autem mole insignes, densissimæque spectabantur. Faculæ item & umbræ multò latius se se extendentes, eidem ferè loco insidebant.

5. Die 21. Macula major b, absque comitibus, ad occasum vergebat. Maculæ c quotidie aliam atque aliam schemate attestante monstrabant faciem. Modò enim majores ac densiores, modò minores debilioresque, modò plures, modò pauciores videbantur; sic, ut die 23. in unam dilutissimam iterum omnes fuerint redactæ. Atque Umbræ quidem & Faculæ penitus erant dissipatæ; loco verò earum tres novæ Maculæ d, quæ antea nondum erant conspectæ, infra Eclipticam, Aust. versus prodierunt.

Macula formam figuræve indies mutant.

6. Die 22. major illa b occidentalis, Solem jam planè præterierat. Macula autem a, decrescendo cursum persequatur. Sed Maculæ d numero & magnitudine auctæ erant.

7. Die 23. Maculæ illæ qualem positum formamque obtinuerint, ex adjecto diagrammate, palàm est.

8. Die 24. h. 7. vesp. Maculas accuratè observandi non dabatur quidem occasio, sed illas tantùm videndi. a id temporis jam planè in nihilum abiverat, priusquam horizontem attingisset: c itidem amplius non cernebatur. Insuper, duæ illæ Maculæ d, tum magnitudine æquales, tum longius ab invicè remotæ cernebantur. Cæterùm & duæ novæ in Solis disco recentè natæ, supra Eclipticam, ad Aquilonem vergentes comparuerunt, de quibus die antecedente, licet Cælo maximè annuente, ne vestigium quidem fuit animadvertum. Hincque lege quâdam certâ sequitur, Maculas hæc, Solem non fuisse ingressas, sed in eo omnino generatas. De quibus autem, ut & de Maculis d peculiare schema sequens MM à nobis exhibebitur. Viam quod spectat Macularum a, b, & c, illa, uti ex apposito vides iconismo, intus fuit curvata, Corum scilicet versùs, prout simili anni tempore nunquam non fieri solet.

Macula a in orbe Solis exstincta.

Alia iterum ex inopinato ibidem nata.

Curvitas & inclinatio i. tineru.

Ani-

Animadversiones super V. Macularum Solarium Periodo.

1. **D**E Macularum d exortu, atque progressu, à die 21. Junii ad 24. ejusdem satis, ut arbitror, circa Macularum antecedentium descriptionem diximus; videamus itaque, qualisnam, in diebus consequentibus, cum haram d, tum illarum f, fuerit constitutio?

Macula non solum quoad formam, sed & numerum variata.

Macula in plures distracta.

Macula admodum rara ac sparsa.

Aliquot Macula in unam debilem redacta.

Macula in Faculas accensa.

Macula f numero decreverant.

Mora sub Sole 9. dierum.

2. Die 25. Junii, duæ illæ Maculæ die 24: à me observatæ, in 6. erant resolutæ; quarum etiam aliquot sic satis erant conspicuæ, idq; ad literam f videre est. Maculæ verò d, & majores, & remotiores ab invicem, quàm die 23. inspectæ sunt.

3. Die 26. Maculas f, quæ figuram, magnitudinem, numerumque mirificè variasse animadvertimus. Et una quidem illarum, quæ alteri adhærebat, satis quidem magna; sed admodum rara ac sparsa, instar debilis nebulæ diluta comparuit, ita ut passim Solem splendens per illam clarè deprehenderem, Australes d itidem numero auctæ erant.

4. Die 27. nullus Sol affulsit.

5. Die 28. Maculæ f, non quidem numero, sed mole videbantur increvisse. Ex quinque autem Maculis e, una tantum adhuc erat residua. Australes reliquas quoque in duas debiliores, minoresque denegaverant.

6. Die 29. Junii Maculæ f adhuc in plures se se dilataverant. Inferiores verò d, in umbras Faculasque tenuissimas defecerant, in quarum medio Macula debilissima, quæ tamen visum ferè eludebat, extitit.

7. Die 30. Jun. observationi obstitit Cœli inclementia.

8. Die 1. Julij, ex Maculis f, quinque tantummodo conspeximus. At Faculæ prorsus erant extinctæ.


9. D. 2. Jul. de Maculis f non nisi 3. adhuc erant conspicuæ.

10. Unica duntaxat Macularum f circa horizontem apparuit; reliquæ tum exiverant, tum evanuerant. Quæ Maculæ f, dies duntaxat 9. in Sole commoratae sunt; quandoquidem die 23. Junij, nequicquam de illis fuit animadversum.

V.

GEDANI.

Anno MDCCLXIII.
Eclipsis Macularum, à 25 Junij, ad 3 Julij.



JUNII.

D.	H.	m.	Sec.
21.	9	43.	m. 53. 30.
22.	7	49.	m. 50. 25.
23.	7	50.	m. 49. 49.
24.	7	35.	m. 49. 4.
25.	7	37.	m. 40. 20.
26.	9	50.	m. 57. 34.
29.	7	50.	m. 47. 44.

JULII.

D.	H.	m.	Sec.
1.	+	34.	m. 55. 11.
2.	0	6.	m. 47. 2.
3.	0	0.	m. 45. 0.

fig MM.

Aut. Sc.

VI.

GEDANI.

Anni aera Christianae, 1643.
 Curfus Macularum, à 7 Julii, ad 18 eiusdem.




fig. NN.

Aut. Souter.

11. Die 4. Julij horâ 4. 30. min. nil Macularum in Solis disco vidimus, nec 5. & 6. die quicquam, Cœlo licet serenissimo, deprehendimus.

Sol Macularum vacuum deprehenditur.

Animadversiones super VI. Macularum Solarium periodo.

1. Die 7. Julii, horâ 6. 10. vesp. denuo Macula a nigerrima valdeque conspicua, circa horizontem ortivum comparuit; simulque tres debilissimæ Australes b & c, in quadrante Solis occidentali extiterunt, quæ neque Solem more consueti ingressæ, neque antea unquam à nobis conspexerant.

Macula duorum dierum.

2. Die 8 Jul. m., Maculam a, umbræ & Faculæ concomitabantur: de quibus tamen, die proximè præcedente. ne vestigium quidem aderat. Atque ex b & c illis minoribus, una tantum adhuc erat ad spectabilis; reliquæ funditus erant abolitæ. Post meridiem verò horâ 5. 5 1/2 min. Facularum alia erat constitutio; itemque sub Maculâ a, parvula quædam deprehensa.

3. Die 9. debilissima Macula b, in Faculas, cumque iis planè demum abivit. At reliquæ Faculæ orientales, huc usque semper fuerunt animadversæ, sed tamen indies aliam atque aliam habentes formam figuramque.

Macula decrescens sub ipsâ Eclipticâ animadversa.

4. 14. Julij, Macula a Eclipticam stringebat; deque die in diem decrevit; usque ad exitum. Insuper parvula illa majoris comes, hac die ultimum visa; nam postea nusquam amplius apparuit.

Facula fulgentes, circa Macula. tum exortum, tum occasum exiitæ.

5. Die 17. iterum nova d Solem intraverat; cujus cursum in schemate sequente habebis. Simul verò quoque circa alteram Maculam a, Faculæ fulgentissimæ prodierunt, quæ ad exitum illius Maculæ a, fulgorem conservarunt: Macula verò ipsa paulatim ita decrevit, ut circa occasum die scilicet 19, penè visum effugeret.

Casus 14. ferme dierû.

6. Quæ Macula a ab horizonte ad horizontem duravit dies ferè 14. Motus præterea ejus fuit curvilineus, concavusque Septentrionem Occidentalem versus; inque isto quadrante, Polus ejus arcticus id temporis ascendit.

Macula rediit est omnibus circumstantiis.

7. Cæterum notanda hic habes; 1. hanc Maculam a, ex numero fuisse reducum, atque illam ipsam extitisse b in imagine IV. expressam, quæ nimirum die 22. Junij, mane, Solis discum effugerat. Id quod certè locus, tempus, motus, & parallelus idem svadet. Namque Solem eo in loco omnino secundâ vice intravit, ubi & illum ingredi jure debuit. Videtur quidem hæc Macula in ortu Eclipticæ propinquior fuisse, quam in priori ingressu; verum id necessariò ex cursu ejus, Poli que annui promotione sequitur: urpote quòd Polus iste jam in Septentrione occidentali versatur, & magis magisque ab occidente, punctum Zenith versus, elevatur: unde omnino cursus secundus Maculæ hujus, in ortu magis deprimitur, & in occasu plus plusque elevatur. 2. Macula hæc quoque, alterâ vice patens Solis hemisphærium, die 6. Julij intravit: ut hinc clarè fiat manifestum quòd 14. circiter dies, in latente hemisphærio consumserit; quale temporis intervallum, ad hoe iter faciendum, planè utique requiritur. Ad hæc Maculam istam tanto tempore perdurare potuisse, facillè credibile est; cum augescendo priùs exiverit Solem, & postea decrescendo iterum eum intraverit. 3. Argumento nobis etiam potest esse, eandem denuo rediisse: eò quòd se iterum in debitâ formâ magnitudinèque, cum parvulâ quâdam comite, uti in priori exitu factum, exhibuerit.

Macula totum Solem circumcircundo dies consumsit 27.

8. Cursum ejus quod attinet, iste fuit curvilineus, & quidem convexus. Austrum orientalem versus, uti in mensibus Junio, Julio, & Augusto semper animadvertimus. Commorata est insuper hæc Macula alterâ vice in patente Solis hemisphærio, dies ultra 17; in latente verò, sicut jam diximus 14; ad eò ut totum Solem circumcircundo 27. d. absumserit. Ex quibus rationibus plus quam satis elucet, quòd Macula a, quam in præfente schemate O O delineatam dedimus, omnino redux fuerit: id quòd & de Maculâ d, in imagine sequente, ferè affirmari poterit,

Animadversiones super VII Macularum Solarium periodo.

1. **D**ie 17. Julij mane, unica tantummodo Macula d apparuit; circa vesperam verò adhuc alia minor debiliorque, Eclipticam versùs, cum umbrarum Facularumq; ingente tractu, deprehendebatur.

2. Die 18. tres in Sole conspectæ sunt, d scilicet f & e, inq; eadem rectâ lineâ incedentes; quarum Australior e in Solis disco primùm erat nata: nam die antecedente nihil quicquam de illâ fuit animadversum, & tamen omnium trium maxima nunc videbatur.

3. Die 20. Maculæ d & e, mole erant auctæ, magisq; disjunctæ, quàm die 18; f verò adhuc duas minores Maculas pepererat; itemque simul debilissima aliqua nova h cernebatur, ex quâ die 21. sequente, duæ multò densiores sunt procreatæ.

Facula admodum spectabilis.

Amplius Facula.

Quæ quidem sex Maculæ, hâc ipsâ 20. scilicet die, comitatum mirificum Facularum umbrarumque post se trahebant, dum ille tertiam Solaris diametri partem longitudine, latitudine autem nonam dictæ diametri partem æquabat; quod certè notatu dignissimum, inprimis, quòd, die subsequente, ad unam omnes illæ iterum planè in nihilum abiverint.

Macula e ad medium crevit, deinde iterum immixta.

4. Macula d indies decrevit, usque dum die 25. planè evanesceret. e Macula contra ad medium circiter crevit, postmodum sensim iterum est attenuata; prout in schemate assignatum habes. Maculæ f die 24. ultimùm in Sole visæ sunt.

5. Die 22. ex tribus Maculis h, tantùm duæ, sed tamen majores densioresque spectabantur, quæ iterum die 25. in quatuor minores fuerunt distractæ: deinceps, die scilicet 26. & 27. duæ solummodo se se offerebant umbris undique cinctæ: at die 28. hæ Maculæ & umbræ prorsus profligatæ videbantur.


6. Die 26. denuo Faculæ fulgentes, circa Maculam e exortæ sunt, quæ die subsequente multò ampliores luculentioresq; factæ sunt (quippe quod id plerumq; prope horizontem fieri soleat) rariores verò & magis dispersæ, quò centro viciniore existunt, apparent.

7. Maculas d & f pariter fuisse reduces, parùm abest, quin ex tempore & motu affirmem. Quoniam tamen circumstantiæ omnes, id nondù satis confirmant; rem hanc tibi, Benev. Lector, dijudicandâ relinquo. Ani-

VII.

GEDANI.

Anno era Christiana, 1643.
 Corpus Macularum, à 17 Julii, ad 27 eiusdem



IVLII.

D. M. s.	Ang.
17. 7	26. m. 41. 6.
17. 8	15. u. 61. 55.
18. 7	18. m. 40. 42.
20. 7	47. m. 40. 60.
21. 6	30. m. 40. 16.
22. 6	29. m. 39. 47.
24. 7	4. m. 39. 7.
25. 6	48. m. 38. 55.
26. 7	5. m. 38. 33.
27. 7	16. m. 38. 22.

A. Oriens.

B. Occidens.

fig. 00.

As S.

VIII.

GEDANI.

Anno aere Christiane, 1643.
 Corpus Macularum, à 30 Julii, ad 31 Augusti.

JULII.

D. Hr. r. Aug.
 28. 7 31. m. 37 48.
 31. 7 33. m. 37 55.

AVGVSTI.

3. 7 31. m. 37 21.
 2. 5 49. m. 46 23.
 3. 7 59. m. 37 48.
 4. 7 43. m. 37 0.
 5. 7 45. m. 37 3.

AVGVSTI.

D. Hr. r. Aug.
 6. 7 45. m. 26 44.
 7. 7 44. m. 26 51.
 8. 6 30. m. 35 38.
 9. 6 59. m. 35 22.
 10. 7 10. m. 35 29.
 12. 6 38. m. 34 46.
 13. 7 31. m. 34 0.




Fig. PP.

Aut. Scler.

Animadversiones super VIII. Macula-

rum Solarium periodo.

1. **D**IE 28. & 29. Julij, nulla sanè Macula in Sole
 confecta. Die verò 30. unica Macula a in parte Au-
 strali Solis observata est, quæ ad medium quidem crevit, sed
 deinceps iterum paulatim decrevit.

2. Die 3. Julij adhuc alia valde parvula, debilis recensque na-
 ta Maculam a sequebatur, quæ cum majore, nimbo coronaba-
 tur, ut & die subsequente; neque ulla alia id temporis depre-
 hendebatur differentia, quàm quòd tres minores majorem a
 concomitabantur, quæ omnes ad diem 8. scilicet Julij nun-
 quam non erant conspicuæ.

3. Die 8. tres illæ modò dictæ minimæ, in unam iterum coa-
 luerunt; Macula verò a, multum etiam quâ magnitudinem
 splendoremque se immutaverat.

4. Die 9. Julij omnes minores defecerant in Faculas, præter
 illam majorem a, quæ ad occasum usque perquam satis persti-
 tit spectabilis. Simul verò, tum supra Eclipticam Boream ver-
 sus novam b, quamvis exiguam circa horizontem ortivum,
 inter fulgentes Faculas, deprehendi.

*Macula in
 Faculas ac-
 censa.*

5. Die 10. Faculæ b aliquantò debiliores extiterunt; Ma-
 cula verò a ultimùm fuit animadversa.

6. Die 12. denuo nova Macula c Solem intravit, cujus cur-
 sum sequens exhibebit schema: quâ autem ipsa die, Macula b
 borealis multum decreverat.

7. Die 13. exiguam quandam, debilemque d in Sole genera-
 tam circa partem occidentalem conspeximus, quæ utique in Solis
 disco antea nunquam fuit visa. Sed cum bidui spatium durasset,
 die 14. jam ita erat attenuata, ut visum ferè eluderet, Faculæ ta-
 men, quæ illam cingebant, sic satis erant conspicuæ. Die 15.
 nil nisi Facula luculentissima d confecta. Itemque b, in ni-
 hilum omnino erat redacta.

8. Circa hanc Macularum periodum, in primis notanda habes, quòd Ma-
 cula a, dies 13 circiter, sub Sole incefferit; præterea quòd maximè regu-
 larem cursum obrinuerit: motus enim diurnus, in eadem distantia à cen-

*Macula per-
 stitit in Sole
 dies 13. cir-
 citer.*

tro, vel peripheria semper sibi similis & æqualis existit. Deniq; motus annuus hujus Maculæ, sensim ad Eclipticam accedit, curvitas augetur, & Polus arcticus ascendit.

Animadversiones super IX. Macularum Solarium periodo.

Die 12. Augusti, iterum nova Macula c absq; Faculis, in latitudine Australi orta est, quam scilicet Maculam c diebus sequentibus, 13. nimirum & 14. Faculæ haud vulgares concomitabantur.

Ex Faculis lucidissimis, spatio aliquot horarum lapsis, diverse Maculae sunt generatae. Mira Macularum mutatio.

2. Die 14. in plagâ quoq; Bor. novæ spectabiles Faculæ e emerferunt, de quibus die sequente illustris & oblonga quædam Facula, cum aliis debilibus, sex novas debiles Maculas ex illis procreatas, cingentibus, spectabatur.

Dua Macula, cum centro Soli, in eadem rectâ lineâ, constituta.

3. Die 16. parùm notatu dignum, de Faculis pridie visis erat residuum: Maculæ verò in monstruosam vastitatem atq; multitudinem, & stupendum quidem in modum excreverant. Eæq; in progressu, & numerum & figuram & habitum, itemq; nigredinem & densitatem, atq; magnitudinem quoq; vehementer admodum variarunt; quod clarè ex apposito patet schemate. Australem c quod attinet, sensim ad medium crevit, deinde similiter, tum quoad magnitudinem, quàm splendorem, decrevit.

Rarò Faculae Maculas praecedunt.

4. Die 17. Maculæ e Septentrionales magis magisque ab invicem recedebant; quas tum & multò sanè majores ac densiores, quàm pridie deprehendimus.

Macula recens exorta, in Faculas resumpta.

5. Die 18. denuo formas situmq; mutaverant. Ubi insuper notandum, quòd hoc ipso tempore, Maculæ e & c cum centro Solis, lineam planè rectam constituerint.

6. Die 21. Macula major e decrescens, inter latè patentes umbras & Faculas visa est. Tres verò minores subsequentes, ad eò erant debiles, ut vix cernerentur. Hicq; iterum observandum occurrit, quòd Faculæ Maculas antecesserint, umbræ autem solum illas subsequutæ fuerint; id quod certè rarò contingit.

Quamvis Macula simul generatur, non sinit tamen ejusdem durationis.

7. Die 22. Faculæ pridie animadversæ, minimè iterum conspici poterant, propter nubeculas scilicet Solem continuè obvelantes. Duæ autem novæ Maculæ f & g, interea observatæ sunt, noviter in Sole exortæ, & antea nunquam deprehensæ, eæq; fatis densæ & conspicuæ; quæq; quâ magnitudinem Maculis c erant æquales. Macula f die 23. statim decresebat, ita ut die 24. in Faculas abiisse videretur; quo etiam die penitissimè evanuit, priusquam ad horizontem pervenisset: confectiq; tres tantùm in Sole dies.

Cursus dierum 12.

8. Die 23. ex pridianis recensentis, tantummodo adhuc una f erat superstes, altera g omnino iterum extincta, sic ut nec tenuè sui indicium reliquerit. Quæritur ergo hic meritò: cur hæc dispersa Macula. ut & altera f, non tam diu in Sole duraverit, quàm illa c, cum tamen æque magna densa ac spissa, quâ materiam, pridie sit observata; c tamen durante, & alterâ g in nihilum planè redactâ? quæ res profectò admiratione digna est!

9. Consideres autem velim, Faculas e, de die in diem notabiliter fuisse variatas. Deinde, quòd cursus apparens Maculæ c, dierum plus minùs 12½ fuerit: at Maculæ e, tantùm dies 10. in patente hemisphærio Solis consumserunt.

Nihil Macularum, nec Facularum, in Sole deprehensum.


10. Die 25. nihil quicquam amplius de Maculâ e fuit visum; sed solummodo debilis Facula circâ occasum erat residua. Die verò 26. iterum nova dilutissima, & debilissima Facula circa ortum apparuit, quæ etiam die 27. & 28. adhuc resplendebat. Verùm die 29. 30. & 31. August. ut & 1. Septemb. Sol ab omni Maculâ Faculâq; purus omnino lustratus fuit; sic ut primùm die 2. Septembr. circa horizontem ortivum, Faculam quandam iterum conspexerimus, cujus totum cursum in subsequente imagine delineavimus

Ani-

IX.

GEDANI.

Anno *era Christiana*, 1673.
Carfus Macularum à 32 Augusti, ad 24 eiusdem.



AVGVSTI.

D. H. .	Aug.	D. H. .	Aug.
32.	6 38.m.3+ ²⁰ +6.	19.	7 21.m.3+ 8.
33.	7 31.m.3+ 8.	20.	7 +5.m.3+ ++.
34.	7 +6.m.38 34.	21.	6 51.m.33 19.
35.	7 56.m.38 30.	22.	+ 36.m.78 0.
36.	7 30.m.3+ +0.	23.	7 18.m.33 30.
37.	7 26.m.3+ 27.	24.	+ 15.m.76 0.
38.	7 14.m.3+ +.	25.	7 36.m.38 80.

fig. 88.

Aut. Sulpis.

X.

GEDANI.

Annus aere Christianae, 1643.
 Curfus Macularum, à 2 Septembris, ad 26 eisdem.

SEPTEMBRIS.

D. M.	h.	Ag.	D. M.	h.	Ag.
1.	4	30. u. 78' 19.	17.	2	30. u. 89' 5.
3.	7	38. m. 34' 16.	18.	5	30. u. 84' 17.
4.	8	38. m. 35' 32.	19.	12	41. u. 74' 29.
5.	8	23. m. 35' 45.	19.	9	16. m. 40' 23.
7.	9	16. m. 41' 13.	15.	8	12. m. 35' 16.
10.	8	9. m. 14' 14.	16.	7	27. m. 34' 12.




fig. R R.

Aut, Souto.

Animadversiones super X. Macularum Solarium Periodo.

1. Die 2. Septemb: nova Facula a circa ortum exiliit; sed hanc præter nihil planè animadversum. Die autem 3. duæ planè exiguæ Maculæ b, circa horizontem occiduum, umbrâ quâdam dilutissimâ stipatæ, emerferunt, quæ die 4. vix aliquod vestigium post se reliquerant.

Macula circa occasum orta.

2. Die 5. inter Faculas umbrasque a, duæ recens natæ Maculæ observatæ sunt, de quibus die antegresso, vix una debilissima cernebatur. At die 7. iterum tantum unam Maculam, Faculæ a cingebant.

Umbra Macularum semen.

3. Die 6. 8. & 9. Septemb. non favit Cœli serenitas.

4. Die 10. non solum denuo geminæ inter ampliores Faculas; sed & nova haud vulgaris Macula c, cum Faculis satis fulgentibus, supra Eclipticam, & Boream versus, apparuit, quam die 8. Cœlum cum esset nubilum, Solem ingressam esse, planè existimo.

5. Die 11. Septem. Maculæ a funditus erant dispulsæ; Faculæ autem, ad diem 14. usque duraverunt, quo simul Solem egressæ sunt. Hic autem in primis probè notetur, Faculas hæc totum Solis discum motu perquam regulari peragrassæ, quod alias rarò contingit. Nam plerumque circa medium, aut evanescent, aut minimùm visui se subtrahunt. Sed ex observationibus hæc planè fit manifestum, Faculas istas a, plus minùs dies 13. in Sole fuisse moratas. Ad hæc verò Polum arcticum quasi culminasse, Faculasque motum descripsisse ad æquilibrium autumnale, quia in ortu atque occasu, æqualiter ab Eclipticâ remotas fuisse, abundè ex adjuncto diagrammate liquet.

Et Facula interdum in patente Solis hemisphario totum absolvynt cursum.

Facularum mora sub Sole, fuit dierum circiter 13.

6. Macula c in vigore ad medium usque permansit: circa centrum quidem oblonga duobus nucleis prædita apparuit; quæ autem postmodum sensim iterum attenuata, ita ut post 18. Septemb. amplius non fuerit animadversa: hincque dies 10. circiter tantum in Sole moram fecisse, certum est. Motus insuper ejus, respectu Eclipticæ, rursus fuit inclinatus: Polus namque Arcticus à puncto Zenith hic ortum versus descendere incepit.

Polus Arcticus descendit.

7. Die 12. denuò nova exigua Macula d, plusquam satis tamen conspicua, in medio penè Solis disco genita est, atque infra quidem Eclipticam Austrum versus apparuit, quæ die 15. penitissimè evanuit. De quâ illud in primis verissimè affirmare habeo: quòd Solem nec intraverit, nec exiit; sed in gremio quasi ejus progenita, rursusque denata fit.

Macula d in gremio Solis nata, ibidè; exspiravit.

8. Die 14. recens Macula e in ortu prodiit, cujus totum curriculum, augmentum atque decrementum sequenti imagine adumbrare decrevimus.

Animadversiones super XI. Macularum Solarium periodo.

1. **M**acula e, quæ nobis d. 14. in conspectum venit, in plures, successu temporis, fuit divisa; quæ die 19. in unam iterum coaluere: deinceps autem indies paulatim decrescendo in Faculas, die videlicet 23. Septemb. degeneravit. Die 25. nonnisi Faculæ, cum notabili quâdam umbrâ fuere deprehensæ.

Umbra admodum notabilis.

Macula funicum tantum vixit diem.

2. Die 26. non solum adhuc vestigium umbrarum illarum erat residuum; sed & nova Maculâ f, in medio ferme Solis disco generata est, quæ rursus die 27. penitus fuit dissipata.

3. Maculæ e iter quod spectat, id priori c planè videtur esse parallelum.

Sol Macularum experit.

4. Die 28. adversa fuit observationi Cœli inclementia. Die verò 29. 30. Sept. ut & 1. 2. & 3. Octob. nil Macularum in Sole apparuit. Die iterum 4. Octob. ob aëris turbulentiam, nihil observare licuit.

5. Die 5. & 6. splendidissimam, supra Eclipticam, animadverti Faculam g. Die 7. Octob. aliæ itemq; Faculæ h, quamvis debiliores, observatæ sunt. At die 8. 9. & 10. nihil penitus in Sole, propter Cœli intemperiem, vidimus.

6. Die 11. Octob. duæ denuo Maculæ tenues atque exiguæ i, circa centrum Solis natæ sunt: simul quoque circa horizontem occiduum nova quoque Facula a affulsit.

7. Die 12. 13. & 14. Cœlum erat nubilosum.

8. Die 15. Octob. iterum duæ Maculæ l, in plagâ Solis occidentali, visæ sunt, quæ die 11. non amplius spectabantur. Quantum verò conijcere possum, hæ Maculæ l, ex Faculâ g, originem duxerunt.

9. Die 16. modò dictæ Maculæ, mole erant auctæ, debilissimamque aliam minorem Maculam procreant.

10. Die 17. & 18. Cœlum turbidum observationi fuit obstaculo.

Ani-


XI.

GEDANI.

Anno era Christiana 1643.
 Caeles Macularum à 14 Septemb. ad 11 Octob.

SEPTEMBRIS.

D. Hor. i.	Hor. i.	D. Hor. i.	Hor. i.
14. 9	16. m. 40. 23.	21. 9	24. m. 41. 31.
15. 6	18. m. 35. 15.	22. 7	44. m. 33. 41.
16. 7	17. m. 34. 13.	23. 11	29. m. 61. 0.
17. 10	20. m. 49. 23.	24. 10	4. m. 51. 5.
18. 9	30. m. 43. 23.	25. 11	18. m. 59. 5.
19. 3	31. u. 81. 49.	26. 8	4. m. 36. 12.
20. 5	35. m. 46. 29.		



OCTOBRIS.

D. Hor. i.	Hor. i.
5. 9	16. m. 42. 49.
7. 10	40. m. 54. 9.
11. 10	4. m. 49. 50.
16. 8	27. m. 42. 12.
16. 11	27. m. 67. 27.

fig. S S.

Aut. Sc.

XII.

GEDANI.

Anno dno Christiano, 1643.

Curvas Macularum, à 19 Octob. ad 31 eiusdem.

OCTOBRIS.

D. No. i.	Ang.	D. No. i.	Ang.
19.	30. m. 57. 16.	26.	1. g. u. 80. 5.
20.	8. 28. m. 45. 24.	28.	10. 15. m. 60. 21.
21.	31. 54. m. 64. 57.	29.	9. 15. m. 47. 24.
22.	32. 10. u. 77. 5.	30.	10. 22. m. 56. 15.
23.	30. 14. m. 14. 43.	31.	9. 1. m. 46. 21.
25.	32. 23. u. 72. 48.		




fig. TT.

Autore Scalpe.

Animadversiones super XII. Macularum Solarium periodo.

1. **P**ostquam igitur die 19. Octobr. sudum affulserat Cœlum, duæ de novo Maculæ a conspectæ sunt, quæ die 20. magis sunt dilatatæ; vigesimo deinde primo, in tres propagines diductæ. Sic verò paulatim postea decreverunt; tandemque 25. penitus sunt sublatae. *Macula inconstans.*

2. Die 21. rursus duæ Maculæ b, recens, circa centrum Solis, natæ extiterunt, quæ postmodum die 23. in unam debilissimam umbramque tenuissimam fuerunt redactæ & tandem die 25. planè obiere. Quales, & his similes permultæ aliæ Maculæ, infallibile nobis subministrant argumentum, Maculas prope Solem generari, iterumque corrumpi.

3. Eo ipso die, nimirum 25. cum Maculæ a atq; b nusquam apparerent, tres aliæ pulcherrimæ densæ maximeq; conspicuæ c in lineâ eâdem rectâ, inq; plagâ orientali, suprâ Eclipticam, visæ sunt; quas certè pridie minimè conspexeram. Num autem vel in Sole fuerint genitæ, vel illum se se intulerint, dubium est.

4. Die 26. tres pridie conspectæ c magnitudine æquales, mole distantiaque quidem creverant; contra verò intermedia multum densitate decreverat. Omnium intensior deprehendebatur antecedens.

5. Die 27. Cœlum nubibus erat obductum.

6. Die 28. intermediam c penitus deprehendimus deletam, duæ autem reliquæ majori adhuc intervallo separabantur. Prior erat densior, posterior verò admodum existerat debilis, ita ut die 29. vix indicium aliquod superesset: rursus umbræ latè patentem, eo tempore cum altera c, deprehendebantur. *Macule quævis sint ejusdem opacitatis, non tamen æq; diu persistunt.*

7. Die 30. diffusa illa pridie umbra, valde se coarctarat: minor enim, quàm Macula ipsa, videbatur.

8. Die 31. Macula c Facularum quasi satellitium post se duccens, ultimùm visâ est, splendore verò & mole admodum diminuta. Motus hujus Maculæ c ut & reliquarum a, deprehenditur curvilineus, convexus scilicet Eclipticam versùs, concavus autem ad Zenith: itemq; Polus Arcticus in quadrante orientali descendit. *Polus arcticus descendit.*

Ani-

Animadversiones super XIII. Macularum Solarium periodo.

1. Die 5. 9. & 20. Novembr. quamvis Cœlum admodum extiterit serenum, Sol tamen purus ab omni Maculâ fuit conspectus.

2. Nova tandem Mac. k, d. 10. in medio Solis disco orta (de quâ nec vestigium d. præcedente apparuerat) prodit, quæ autem propter diæ. sequentiû obscuritatem, deinceps minime est observata.

Diversa Macula, in ipso Solis patente hemisphærio nata, ac ibidem dissipata.

3. Die 24. Novemb. iterum quinque Maculæ recentes d, e, g, penè rectam constituentibus lineam, prope horizontem ortivum, conspectæ sunt; quarum australiores g, satis erant debiles; intermedia verò trium majorum e, omnium deprehendebatur densissima & maximè opaca.

4. Die 25. Maculæ illæ universæ satis superque creverant, d & e, tamen reliquis erant intensiores. Præterea quoque alia nova f, cum adhærentibus umbris, in ipso Solis meditullio fuit animadversa, de quibus die præcedente, nequicquam sanè visum. Quæ item evidenti sunt argumento, (id quod jam sæpiùs dictum) non omnes Maculas Solem intrare; sed & nonnullas statò tempore ibidem procreari.

5. Die 26. nihil observatum: die verò 27. Maculæ d & c mirum in modum, mole, densitate, nucleisque auctæ, atq; halone splendido coronatæ, spectabantur. Ex quatuor autem illis g debilioribus, jam 7. erant natæ. Insuper & duæ Maculæ exiles h, se se offerebant videndæ.

Insignis Macula balone cincta.

6. Die 28. nihil ampliùs de pridie notatis h fuit animadversum. At reliquæ d, e, g adhuc paulatim crescere videbantur. Sequentibus diebus ob continuam Cœli intemperiem nihil profusus, ad diem 3. Decemb. usque fuit observatum, quâ scilicet die, unica tantùm adhuc illarum d, cum quâdam debilissimâ Maculâ Faculâque erat superstes; reliquæ verò omnes, aut jam exiverant, aut penitus expiraverant.

7. Ex fragmento itineris Macularum d, e, & g, luculenter videre est, motum earum fuisse initiò quadantenus curvilineum, concavumque, Austrum versus; verùm circa exitum omnino rectilineum; Maculâ d id præsertim comprobante. Qualis equidem cursus, nullo alio quàm hoc tempore, Mensæque Junio, deprehenditur. Ani-

XIII.

GEDANI.

Annus ere Christiane, 1643.
 Curfus Macularum, à 24 Nov. ad 3 Dec.

NOVEMBRIS.

D. Hor. i. Ang.

20. 11 o. m. 61 13.

25. 10 36. m. 60 60.

27. 11 21. m. 74 1.

28. 9 55. m. 63 60.

DECEMBRIS.

3. 11 25 m. 67 49.




Fig. VV.

Antes Svedger.

XIV.

GEDANI.

Anno erae Christianae, 1643.
 Curfus Macularum, à 25 Dec. ad 25 Jan. An. 1644.

DECEMBRIS.

D.	Ho.	h.	Ag.
25.	11	35	m. 88 ^o 1.
26.	10	0	m. 75 ^o +.
29.	9	56	m. 75 ^o +.
30.	11	26	m. 88 ^o 21.
31.	9	43	m. 76 ^o 19.

IANVARIJ.

22.	9	43	m. 83 ^o 53.
23.	9	10	m. 81 ^o 27.
24.	10	0	m. 86 ^o 41.
25.	10	21	m. 89 ^o 16.




fig. WW.

Res. V. S. S.

Animadversiones super XIV. Macularum Solarium Periodo.

1. **I**Nquietudo aëris obstitit, quò minùs maculam hanc egregiam, magnam intensamq; c. quam in imagine VV VV adumbratam vides, ante diem 25. Dec. observare potuerimus. Quæ quidem formam figuramq; ad exitum usq; cōstanter conservabat, nisi quòd circa occas. paululùm oblongior esse videretur; id autem à minori visionis angulo proficiscitur.

Macula admodum constans.

2. An. 1644. d. 1. 11. & 13. Jan. Sol ab omni Maculâ omnino nudatus apparuit. Verùm d. 22. duæ iterum Maculæ b, sed debiles, emergere: de quibus inferior, die sequente visum ferè fallebat:

Macula minimè stabiles

3. Die 24. duæ pridie observatæ b, planè disparuerant, ita ut nihil quicquam reliquum esset: contrà verò aliæ tres in quadrante orientali, antea nunquam visæ substitutæ sunt, eâ primùm nocte genitæ; quarum duæ & die subsequente observatæ sunt.

4. Vestigium Maculæ b fuit iterum curvilineum, Austrum versùs concavum, & ad Septentrionem convexum, ut in schemate assignatum habes.

Cursus curvilineus.

Animadversiones super XV. Macularum Solarium periodo.

1. **D**ie 16. Febr. mihi denuo observationes instituenti, duæ Maculæ apparuerunt; b illa oblonga, horizonti adhuc inhærebat, sic ut primùm in conspectum veniret; alteram autem a, jam aliquot dies perdurasse certum erat.

Macula in ipso horizontè visa.

2. D. 17. pridie visâ b, cum umbrâ suâ satis notabili, in duas Maculas erat transformata: a verò penè eandem, ad 20. usq; retinebat faciem.

3. Die 18. b Mac. crescens, duas novas recenter procreatas secum ducebat. Simul verò quoq; novæ Bor. e & d densitate insignes, nobis obviam veniebant, quæ tamen die præcedente nusquã adhuc conspiciabantur: hincq; fit manifestum, hæc Maculas in hemisphærio Solis patente fuisse primùm condensatas.

Admiranda Macularum mutatio.

4. Die 19. Cælum non favit. At die 20. b mirificè creverat,

T t t

ob-

obscuriorq; , ob duos nucleos spiffè admodum compactos, videbatur. Itemq; d unico præclaro nucleo insignis haud parùm ratione magnitudinis, intensiq; coloris transmutata. Duæ verò e, in tenuissimam umbram, quatuorq; Maculas commigraverunt. Porro c in tres divisas reperi, non minùs verò & a, quanquam hoc discrimine, quòd hæ ultimæ, magno interstitio ab invicem dimoverentur.

Multi, & quidem haud ignobiles Maculae, simul in Sotu disco observatae.

5. Die 21. ex pridie observatis tribus Maculis a, unica duntaxat adhuc erat residua, eaq; dilutissima : deinde verò omnes illæ tres Maculae, comites scilicet b, planè penitusq; abierant in nihilum : nisi quòd dicta b, eandem prorsus præ se adhuc ferret magnitudinem, splendoremq; Macula d, nihil omnino diminuta, sed ex parte debilior fuit deprehensa. Cujus certè generis Maculas, & magnas & valdè observabiles, quales b, d, atq; e fuère, perraro utiq; in Solis disco observare simul licet ; ut de iisdem hac die visis, oppido valde mihi sim gratulatus.

6. Die 22. Februarij Cælum exitebat undiq; nubilum.

7. Die verò 23: Maculae d & b non solum situm ; sed & formam, magnitudinemq; , sicuti videre est, mutaverunt ; e verò planè in umbras abiit.

8. Die 26. Maculas d & b horizonti occiduo appropinquantes, ultimùm observandi data nobis est occasio ; quo tempore tamen adhuc perquam densæ, & spectabiles, ratione nucleorum, fuerunt deprehensæ.

9. Die 4. & 5. Martij, nulla omnino Macula in Sole inspecta : at verò 24. ejusdem, tres iterum haud vulgares, circa limbum occidentalem (quæ tamen in præsentì figurâ XV. confusionis scilicet evitandæ gratiâ, lubenter omissæ) animadvertimus.

Chordarum nulla ad Eclipticam inclinatio.

10. Annotabis hîc ; Maculam b, eclipticam bis hac viâ transiisse ; cursumq; Macularum harumce adhuc Austrum versùs fuisse concavum, itemq; Polum ejus ferè culminasse : hincq; chordæ, sicuti in æquilibrio, fieri nunquam non solet, ab Eclipticâ fermè æquidistant.

Ani-

XV.

GEDANI.

Anno a^o Christiano, 1644.
 Curae Acadelarum, à 16 Febr. ad 26 eiusdem.





fig. XX.

Aut. Sc.

XVI.

GEDANI.

Anno 202, Christianæ 1644.
Circus Macularum, à 25 Mart. ad 4 Aprilis.



Ecliptica.

A Oriens.

B Occidens.

MARTII.

D. Per. 1. Aug.
 11. 10 11. m. 9. 12.
 15. 9 0. m. 06 1.
 20. 9 46. m. 30 60.
 24. 7 32. m. 79 14.
 28. 0 16. m. 01 20.

APRILIS.

1. 11 32. m. 17 46.
 2. 8 28. m. 01 46.
 3. 10 2. m. 51 57.
 4. 7 49. m. 79 10.

fy. YY.

Aut. S.

Animadversiones super XVI. Macularum Solarium periodo.

1. **D**ie 25. Martij hor. 7. min. 30 Facula lucidissima a, penes horizontem orientalem affulsit; quæ iterum hor. 10. min. 11. aliquantulum quâ magnitudinem quâ claritatem quasi diminuta apparuit: contra verò in ejus medio parvula quædam Macula, duarum vel trium horarum spatio exorta (quod bene notetur) conspecta est.

Ex Faculâ, trium horarum spatio, Macula procreata.

2. Die 26. ex Faculâ pridianâ atque unicâ illâ tenui Maculâ, quinque aliæ, non minùs tenuissimæ, quàm minutissimæ, nullis planè Faculis adhærentibus, visæ sunt.

3. Die 28. Maculæ a admodum creverunt; simul verò & duæ novæ b, valdè fluidæ & debiles, circa Solis centrum, noviter procreatæ, apparuerunt: de quibus pridie nihil quicquam certè, quanquam Cœlum undique sudum existebat, deprehensum; nec diutiùs, unâ die, in Sole moram fecere: siquidem die subsequente, iterum planè in nihilum erant redactæ.

4. Die 29. ut & ad exitum usque, paulatim decresebant.

5. Die 3. Ap. unicam tantùm tenuissimam Maculam, Faculis umbrisque stipatam, (quæ tamen maximam partem Maculam præibant) conspeximus. Die verò 4. ultimùm in Sole animadversa: hincque certum, Maculam hancce a, horizontem occiduum non attigisse: sed in henisphærio Solis patente, omnino exspirasse.

6. Pol. Aust. viæ transolaris hujus Maculæ, ortum versùs magis magisque ascendit; alter verò oppositus occas. versùs descendit.

Polus Austri-nus ascendit.

Animadversiones super XVII. Macularum Solarium Periodo.

1. **D**ie 3. Aprilis, priusquam Macula a Figuræ antecedentis, Solem prorsus excederet, iterum alia nova densissima c, circa horizontem ortivum, cum Faculis atque umbris haud vulgaribus, in scenam se attulit.

2. Die 4. Macula c inter fulgentes illas Faculas satis superque emicuit: quæ postmodum sensim ad Solis circiter centrum, mole crevit; deinde verò, rursus decrevit.

T t t 2

3. Die

Quando Macula à Faculis umbræ, cingitur circa ortum plerumq; id etiam circa occasum contingit.
Cursus 13. dierum.

3. Die 13. & 14. ea ipsa Macula admodum imminuta videbatur: præterea Faculæ, quæ die secundâ post ejus exortum, Maculam deseruerant, iterum die secundâ, ante ejus excessum, eam concomitabantur: hoc tamen discrimine à me attentò, quòd Faculæ umbræque, in occasu nonnihil dilutiores apparuerint.

4. Macula verò hæc, 13. circiter d. in Sole commorata, si verù ejus ortum, occasumq; accuratè consideres. Cujus quidem iter, ut ex schemate satis luculenter patet, adhuc convexum Septentrionem vers. & concavũ, Aust. vers. deprehenditur: nisi quòd in hoc solummodo, à prioribus Macularum cursibus, discrepet, quòd videlicet in occidente plus plusq; deorsum, in oriente verò sursum, tendat: ob quam etiam causam, inferior Polus magis magisq; ad ortum inclinat. Ex quibus autem omnibus, Macularum motum planè esse regularem, atq; omni tempore constantissimum, nimis quàm aperte innotescit. Quamvis verò Maculæ hæc neutiquam perennent, motus tamen ejus est uniformis, sic ut in iisdem similibus Mensibus, semper eadem motuum curvitas, atq; chordarum ad Eclipticam inclinatio, notetur. Ne autem Peripatetici sibi pervadeant, nos ipsis fumum & fucum vendere, rogamus, ne graventur, observationes Celeberrimi Christophori Scheineri, summâ certè diligentia, ex ipso Cœli vultu de promptas, tum Romæ, tum alibi, ut & ab aliis, hoc in negotio bene exercitaris, peractas pervolvere: non dubito profectò, quia motuum Macularum miram constantiam, atq; summam omnium annorum similitudinem, tandem aliquando agnoscant; earumq; Macularum & ortus & occasus, & generationes & corruptiones sanè admirabiles, quæ & sæpissimè in ipso Solis meditullio existunt, percipiant. Quod si verò quispiam adhuc de fide nostrâ (quod tamen vix speramus) in exhibendis observationibus, vel tantillum dubitet, illi pollicemur nos & ipsa autographa, quæ in omnem eventum reservamus, monstraturos. Cæterum sanctè affirmare possumus, nos in delineandis, atq; æri incidendis observationibus nostris, omnem quam potuimus adhibuisse operam, ne in re minimâ, vel ab ipsis autographis alieni quicquam exhiberemus: quâ etiam de causâ, omnes & singulas ipsa manu nostrâ, non jactantiæ, sed fidei causâ, nos in areas translatisse tabulas publicè profiteamur. Ani-

Motus Macularum est constantissimus.

XVII.

GEDANI.

Anno MDCLXXXIV.
 Causae Macularum à 3 April. ad 14 eiusd.

APRILIS.

D. Her.	r.	Ang.
3.	30	5 m 57.
4.	7	49 m 79 18.
5.	11	19 m. 343 22.
6.	7	15 m. 77 26.
7.	4	12 m. 33 41.
10.	4	10 m. 24 7.
11.	10	28 m. 34 55.
12.	8	25 m. 79 46.
13.	8	18 m. 79 15.
14.	7	44 m. 77 2.




fig ZZ.

Aut. Sculp.

XVIII.

GEDANI.

Annus æræ Christianæ, 1644.
 Cunctæ Macularum, ab 8 April. ad 30 eiusdem.




fig AAA.

Animadversiones super XVIII. Macularum Solarium periodo.

1. Die 6. & 7. Aprilis Cœli intemperies mihi observanti fuit obstaculo.

2. Die autem 8. duæ novæ Maculæ d & e apparuerunt, quarum superior d, ut densior, ita nimbo seu halone cincta fuit.

3. Die 9. pridie conspecta e, inferior ac debilior Macula, in tres erat diffusa; die verò 10. in quatuor.

4. Die 11. April. Maculæ mirabiliter se variaverant omnes; quandoquidem die 10. vesperi tantùm sex conspexeramus; tum ipsæ quatuordecim videbantur. Ex Maculâ enim d, duæ novæ; itemq; sub Eclipticâ quinque minores g; nec non supra Eclipticam, duæ longiusculæ f, erant procreatæ. Adhæc Facularum umbrarumque (quas tamen universas & singulas in hanc imaginem A A A referre, confusionis evitandæ causâ, noluimus; sed rejecimus in sequentem) tam circa ortum, quàm occasum, ingens cohors deprehendebatur; adeò ut Solem ferè nunquam ita Maculis, Faculis umbrisque persusum, ac pene obrutum conspexerimus.

*Sol multi
sane Maculis,
Faculis atq;
umbris refer-
tus.*

5. Die 12. 13. 14. & 15. Macula d paucillum creverat: quatuor autem inferiores e, in unam coaluerant; reliquæ Maculæ g, non numero quidem, sed mole erant auctæ: quemadmodum ex subsequente schemate B B B, cui eas reservavimus, est in propatulo. At Maculæ f, indies diminuebantur, sic ut die 15. in unam tenuissimam abiverint.

6. Die 17. Maculæ d & e, Faculis umbrisque varii generis cingebantur.

7. Die 18. Faculæ luculentiores, Maculæ autem paulò minores videbantur. Cæterùm, non procul à Solis centro, in quadrante occidentali, vestigium aliquod novæ cujusdam Maculæ, clarè satis apparuit, quod nec die præcedente, nec subsequente, amplius conspectum.

8. Curvitas horum itinerum quasi decrescit: rectiùs enim paululùm procedit, quàm in fig. antecedentibus. Moram verò quod attinet Macularum d & e; illa extitit dierum circiter 13.

*Curvitas iti-
neris decre-
scit.
Cursus fuit
dierum tre-
decim.*

Animadversiones super XIX Macula-

rum Solarium periodo.

1. **M**Aculæ g, cum Facularum umbrarumq; comitatu, die 11. Solem sunt ingressæ; verùm, die 12. omni planè comitatu fuère destitutæ.

Macula angentur, & à se mutuo distcedunt.

2. Die 12. 13. & 14. Maculæ istæ non solum magnitudine, sed & numero atq; distantiâ creverunt; postmodum verò decrefcere sunt visæ, non tamen quâ splendorem vel densitatem.

3. Die 18. tres duntaxat adhuc erant residuæ, reliquæ aut coaluerant, aut planè evanuerant, vel, quod magis credibile, in Faculas luculentissimas abierant; quas autem, ob loci penuriam, hîc apponere nolimus.

4. Die 19. propemodum adhuc eundem situm pridianæ Maculæ obtinuerunt; die verò 20. sub eâdem rectâ perpendiculari, in ipsâ fermè peripheriâ, se se obtulerunt, sed ita diminutæ extitère, ut vix ac ne vix conspici possent.

Notam digna.

5. Animadvertendum in præfens, quòd hæ Maculæ quasi in parte Boreali quidem supra Eclipticam exortæ fuerint, sed infra Eclipticam in parte Solis Australi iterum occiderint. Curvitas insuper, atq; inclinatio harum Macularum, accedit omnino ad antecedentium curvitatem: idq; eò, quia uno eodemq; tempore, cursum in Sole perfecerunt.

Macula secundaria.

6. Die 21, & 22. nihil profus Macularum, præter secundarias aliquas, per totum Solis discum diffusasprehendimus.

7. Die 24. 25. 26. & 27. Sol adhuc penitus ab omni Maculâ purus fuit lustratus. Die verò 28. admodum obscura Macula circa ortum animadversa.

Undecim dierum spatium nequicquam in Sole extitit.

8. Die 29. 30. & 31. Aprilis ut & 1. Maij, nullæ profectò adhuc Maculæ, vel Faculæ in conspectum venerunt: idq; annotari meretur, quòd intra ipsarum undecim dierum spatium, ut ut aura extiterit valde defæcata, nihil notabile in Sole obviam venerit.

Ani-


XIX.

GEDANI.

Anno aere Christianae 1677.
Curfus Solarium, à 11 April. ad 20 eiusd.

APRILIS.

Di.	Hor.	Ang.
11.	10	23 m 59° 6
12.	8	21 m 59° 46
13.	8	18 m 59° 19.
14.	7	16 m 57° 1.
15.	8	7 m 56° 7.
17.	7	16 m 55° 34.
18.	7	7 m 55° 1.
19.	7	16 m 55° 45.
20.	8	14 m 57° 40.




fy BBB.

Det. Sc.

XX.

GEDANI.

Anno erae Christianae 1544.
 Curfus Macularum à 3 Maii ad 18 eiusdem.



MAII.

D. N.	h.	Ag.
3.	7	21. m. 74. 47.
4.	6	61. m. 70. 8.
6.	9	24. m. 77. 21.
7.	8	14. m. 71. 17.
8.	7	23. m. 69. 0.
10.	8	26. m. 70. 28.
11.	8	09. m. 71. 28.
12.	9	25. m. 78. 09.
13.	7	04. m. 67. 00.
14.	7	04. m. 67. 24.
15.	7	04. m. 66. 27.
16.	6	04. m. 66. 00.

A Oriens.

B Occidens.

fig. CCC.

Walter Dillman

Animadversiones super XX: Macularum Solarium periodo.

1. **N**unc tandem, 3. videlicet Maij, mane Facula nova a, juxta horizontem ortivum, Boream versus, se se detexit, quæ, tempore pomeridiano, faciem penè eandem retulit, nisi quòd materia etiam quædam Macularum fuerit animadverfa.

2. Die 4. ex Faculis a, pridie visis, 5. Maculæ erant natæ, quæ die antecedente, vix aliquid sui vestigium præbebant. Præter has verò adhuc aliæ duz oblongiusculæ nigerrimæ, densissimæq; Maculæ d & e, Austrum versus, primùm Solis discum ingressæ, spectabantur. Ex quibus utiq; luculenter videre est, quòd in multò brevissimo temporis, 13 scilicet vel 14. horarum, intervallo, mira sanè possit dari Macularum generatio, atque corruptio.

3. Die 5. nullus omnino Sol affulsit; die verò 6. omnes Maculæ, præsertim superiores, ex Faculis ortæ, mirum in modum creverant.

4. Die 7. magis magisq; tum quâ magnitudinem, tum quâ nucleos, erant auctæ: interquæ Maculas b & a, dilutissimam umbram notavimus; itemque verò & novam lucidissimam Faculam, ad ortum, Aquilonem versus, conspeximus.

5. Die 8. Maij, formam figuramve omnes denuò mutaverant.

6. Die 9. Cœli serenitas observationibus minimè annebat. Die autem 10. magnam omnino macularum metamorphosin oculis animadvertere licuit, tam ratione magnitudinis, quàm figuræ; d inprimis enim non solum multò major, haloneq; splendidissimo coronata deprehensa, sed & nucleum in ejus meditullio densissimum, nigerrimumque nec non duas maculas, ex superiori umbrâ recenter procreatas, exhibuit: quæ certè ampliore, atque magis egregiam Maculâ videlicet d, vix memini, me, longo elapso temporis spatio, observasse.

7. Die 11. 12. & 13. Maij, macula Australis d, constanter suo in statu permanfit, sic ut, cum cæteris affectis suis eandem semper formam, splendorem, densitatemque præ se ferret. At maculæ a, die 13. multò compressiores videbantur, præsertim cum illo ipso tempore in ipso horizonte. versarentur: contrâ latè parentes Faculas umbrasq; secû ducebant; de quibus die seq. nullæ (tenuissimis quibusdam exceptis) erant superstites.

8. Die 14. & 15. nulla utiq; apparuit, præter istam d insignem maculam, quæ tamen Faculis umbrisque stipata sensim gracilescebat.

9. Quæ die 16. videbatur macula oblonga, quam vis horizonti valdè extiterit vicina, nihilo tamen minùs densissima, & maximè conspicua erat.

10. Notabis, inprimis maculam hancce d, in quadrante orientali indies crevisse, variabilemq; extitisse; in quadrante verò occidentali, quoad figuram, magnitudinem, densitatemq; fuisse constantissimam; sic ut Solem crescendo subingressa atq; egressa fuerit: unde mihi quasi certò colligere dabatur, illam ipsam maculam, omni dubio procul, fore reducem: cum id utiq; ob materiæ densitatem, ejusque magnitudinem, atq; vastitatem fieri bene posset. Num autem, iusto tempore, redierit, nec ne, sequentes restabantur observationes. Interim te quoq; mi Lector, accipere hic velim, maculam d, horâ 10. eadem die, horizonti planè infixam fuisse, ut & horâ secundâ pomeridianâ, ita tamen ut visum penè falleret. Certum itaque est, modò dictam Maculam, 8. hor. & amplius, horizonti inhærendo consumfisse: totum verò Solis patens hemisphærium percurrendo, si rectè calculum ineam, minimùm dies 12. & 20. hor. Insuper autem cursus ejus, in quadrante orientali, fuit adhuc quidem curvilineus; in occidentali verò quadrante, rectam omnino constituit lineam.

11. Alterius Maculæ iter a quod spectat, fermè similiter ad Eclipticam inclinatum animadvertisimus. At motus ejus in quadrante orientali, multò certè fuit concitator, quàm Maculæ d, ipso atrestante schemate. Tribus enim prioribus dieb. ferè tantum in Sole peregit spatium, quantum altera d, in 4. circiter dieb; id quod annotari probè meretur. Hincque etiam in Sole minimè tam diu substitit, quàm illa altera major d, : cum vix 12. dies sit totum confideres curriculum, in Solis disco, commorata fuerit.

Ani-

*Ex Faculis.
Macula densissima
prodiere.*

*Macula quotidie
se se variantes.*

*Notabili admodum
Macularum
metamorphosif.*

*Macula valde
insigna.*

Notanda.

*Unde conjec-
tare liceret
Maculam d
fore reducè.*

*Macula in
ipso horizo-
nte visa.*

*Macula 8. h.
& amplius
horizonti in-
hærendo, con-
stitit.*

*Borealius
Macularum
cursus, fuit
multò concitator,
quam
Australium.*

Animadversiones super XXI. Macularum Solarium periodo.

1. **D**IE 14 Maij Sol fuit macularum vacuus.

*Admirabilis
Macularum
generatio
atq; augmē-
tatio.*

2. Die 15. præter Faculam, nihil quicquam in Solis discoprehendimus. At die 16. ex pridianâ Faculâ, jam aliquot Maculæ a & b haud vulgares procreatæ sunt.

4. Aëris inquietudo obstitit, quò minùs, ante 22. Maij, Maculas illas priores observare potuerim; quo etiam demum tempore, non solùm mole auctæ, sed & inprimis antecedens b, ob densitatem, nucleum, halonemque insignem, quo cingebatur, valdè erat notabilis; itemq; propemodum similem, atq; Macula ista major d, in præcedente Figurâ, exhibebat faciem.

5. Die 23. Macula b, eâdem fermè magnitudine, ac formâ inspecta: reliquæ verò intermediæ a admodum raræ fuerunt deprehensæ; interim tamen positum indies mirificè mutaverunt.

6. Die 24. Maculæ illæ modò dictæ a, rariores adhuc spectabantur, atq; b aliquantulum etiam decreverat.

7. Die 25. & 26. subsequentes minores adeò erant attenuatæ, ut visum ferè effugerent.

*Macula quæ-
dam in Facu-
las degenera-
vere.*

8. Die 27. jam prorsus evanuerant, in ejuisque autem locum, Faculæ quamplurimæ umbris intermixtæ erant substitutæ.

*Macula in
ipso horizonte
occiduo ani-
madversa.*

9. Die 28. Macula b, admodum gracilis circa occasum, ut fieri ob angulum visionis obliquiorem solet, itidemque umbris Faculisque stipata comparuit. At horâ 4. pomerid. in ipso Lunæ limbo visa; unde 12. circiter horas in horizonte occiduo consumsisse, certum est.

*Curfus pro-
pmodum re-
ctilineus.*


Duratio autem ejus, à tempore generationis, fuit dierum 13. circiter. Atque Curfus, quantum colligere licet, penè rectilineus extitit; qualis certè nullo non tempore circa Junij initium observatus. Postremò, nova Macula f circa horizontem ortivum Boream versùs, Faculis umbrisq; cinctâ, denuò oculis nostris se objecit, cujus periodum in subsequente habebis iconismo.

Ani-

XXI.

GEDANI.

Anno 1644 Christiana 1644.
Corpus Macularum, à 16 Maii, ad 28 eiusdem.



A. Oriens.

B. Occidens.

MAII.

Di. Hor. e. Mag.

16.	8	37 m. 6	23
22.	7	13 m. 65	10
23.	7	2 m. 61	40
24.	7	24 m. 62	21
25.	8	26 m. 64	31.
26.	6	28 m. 61	40.
27.	6	19 m. 61	19.
28.	6	14 m. 61	3.

fig DDD.

J. A. Suter.


XXII.

GEDANI.

Anno aere Christianae 1644.
Curae Macularum, à 20 Martii, ad 7 Junii.

MAIL.

D. H.	h.	g.
28.	6	37 m. 61 s.
30.	6	74 m. 61 s.
31.	6	36 m. 19 s.



fy EEE.

J. V. S. 1644.

Animadversiones super XXII. Macularum Solarium periodo.

1. **M**aculam f die 28. recens exortam, adhuc major Facularum umbrarumq; comitatus, die videlicet 30 Maij, subsequuta est. Ipsumque corpus istius Maculæ satis quidem densum, conspicuumque, expers tamen omnino nucleorum, deprehensum.

Macula absq; nucleo

2. D. 31. Maij ad 1 Jun. Macula f quotidie attenuata, usq; dum die 3 & 4 in quatuor fuerit distincta; die verò 5 cum ultimùm viderentur, iterum in unam tenuissimam caluerunt. Eodemq; simul tempore, ad ortum, sub ipsâ fermè Eclipticâ, nova Macula e, Faculis concomitata, denuò in obtutum venit; quam in numerum reducum referendam, ac illam ipsam magnam egregiamq; Maculam d, in imagine XX expressam, esse, evidentissimè ex sequentibus colligo rationibus. Primò, quòd Solem, alterâ vice, elapsis scilicet 27. diebus, & quidem circa eandem ferè peripheriæ partem, denuò subingressa fuerit. Secundò, quòd formâ in super planè eâdem, putâ, rotundatâ, haloneque pariter circumdatâ, sicut in priori cursu, in imagine videlicet XX. apparuerit.

Macula, qua modò in pluribus se dilataverat, in unam iterum coaluit.

Macula. Solis hemispheriû patens secundâ vice subingressa.

3. Macula hæc redux e, tum mole, tum densitate ad 5 usque diem Maij crevit, postmodum verò iterum sensim decrevit. Sed notes, velim, magnitudinem priorem in hoc casu non acquisivisse.

4. Die 6 & 7 non vestigium quidem, de tenuissimâ Maculâ, die 5 visâ, animadversum; sic ut penitus fuerit extincta, priusquam ad horizontem occiduum pervenerit: e verò satis adhuc extitit conspicua. At in diebus subsequens, ob tristem Cœli faciem, hujus Maculæ e, ulteriorem progressum, atq; mutationem, minimè annotare potuimus. Atq; hæc quidem Macula, inde in primis admodum fuit notabilis; primò, quòd Solem, formâ valdè conspicuâ præditâ, bis pertransiverit; primâ videlicet vice, crescendo, altera, autem decrescendo. Secundò, quòd iter ejus in utroque cursu propemodum rectilineum, ipsa omniq; tempore insigni halone cincta fuerit; id quod certè rarissimè conspicitur.

Animadversenda.

Animadversiones super XXIII. Macularum Solarium periodo.

Die 13. Junij, cùm iterum Sol clarè nobis affulsisset, Maculam a conspeximus; quam sanè non minùs reducem esse, ac illam antecedentem e, penitus nobis persvademus: eamque nominatenus esse Maculam b, in schemate XXI. adumbratam, & die 28 circa occasum animadversam, ex omnibus profectò circumstantiis, cùm situ, tum reversionis tempore, certò conjicere datur. Decrevit autem hac alterà vice quotidie, sic ut, die 22 Junij, ultimò in Sole sit deprehensa. Curfus autem ejus, quemadmodum ex tribus illis observationibus clarè elucet, jam ex parte iterum curvilineus extitit, concavus scilicet Aquilonem versus.

*Macula re-
dux.*

*Profus curvi-
lineus.*

2. Die 24 nil nisi Faculæ debiles, tam in ortu, quàm in occasu, conspexitæ; quæ verò in hanc imaginem, ob chartæ angustiam, minimè sunt insertæ.

3. Die 25, 26, & 27, Cœlum continuè fuit nubilum: at die 28, rursum serenitas Cœli annuit, quo tempore novam procreatam c, quam Faculæ lucidissimæ concomitabantur, vidimus; quæ ad 4 usque, ut mole aucta, ita deinceps paulatim diminuta fuit; 9 autem Julij ultimùm in Sole animadversa: ita ut dies 13 circiter ibidem commorata fuerit.

*Macula in-
cessit sub So-
le, dies quasi
15.*

4. Die 30. Junij, denuò recentes Maculæ d & b prodierunt; quibus ut simul Facularum ingens tractus adstabat, illum tamen adumbrare, hac vice minimè duximus prerium operæ. Cæterùm non nescire te velim, mi Lector, Maculam b, ratione nuclei atque materiæ densitatis, valdè fuisse spectabilem, itemque crevisse, ad 5. usque Julij, quod die & minor quædam Macula, noviter primùm conflata, majori adhæsit; verùm non ampliùs unà die illam animadvertere nobis contigit: contrà major b, decrevit quidem de die in diem, nihilo tamen minùs satis clarè omni tempore se conspiciendam dedit. At enim verò Macula d, horizontem occiduum haud attigit, sed in disco Solis, die videlicet 8. Jul. planè fuit dissipata.

5. Die 3. Julij, tres de novo tenuissimæ Maculæ e, valdeque exiles, circa Solis propemodum medium, natæ sunt; quæ postmodum, successu temporis & quâ formam, & quâ numerum, perquam sunt variatæ; id quod ex diagrammate adjuncto satis superque palàm est: in quadrante verò occidentali, numero iterum, mole, atque densitate paulatim diminutæ sunt; adèd ut, circa exitum, unica tantùm, Faculis tamen nimis quàm fulgentissimis coronata, visu perciperetur.

Ani-

XXIII.

GEDANI

Anno a^o Christiane 1644.
 Caeles Macularum à 13 Junii, ad 30 Julii.

IVNII.

D.	H.	h.	m.	s.
13.	8.	17.	m.	51.
17.	6.	6.	m.	17.
21.	6.	18.	m.	57.
24.	6.	46.	m.	30.
28.	6.	25.	m.	19.
29.	6.	16.	m.	07.
30.	7.	40.	m.	07.

IVLII.

D.	H.	h.	m.	s.
1.	6.	46.	m.	46.
1.	7.	38.	m.	46.
4.	7.	12.	m.	46.
5.	7.	46.	m.	46.
7.	6.	43.	m.	44.
8.	6.	39.	m.	44.
9.	7.	30.	m.	41.
10.	6.	55.	m.	40.

A. Oriens.

B. Occidens.

Æcliptica.

fig. FFF.

Aut. Scaer.

YXIV

GEDANI.

Anno rre Christiane, 1644.
Cursus Macularum, à 7 ad 12 Julii.

IVLII.

- D. An. r. Ag;
- 7. 6 43 m 44 22.
 - 8. 6 39 m 44 22.
 - 9. 7 10. m 42 44.
 - 10. 6 21 m 49 24.
 - 11. 6 42. m. 49 2.
 - 12. 7 53. m. 49 11.




fig GGG.

Aut. Sc.

Animadversiones super XXIV Macularum Solarium periodo.

1. **D**ie 7. Julij, circa Solis centrum, Austrum versùs, tenues aliquot Maculæ f, generatæ sunt: id quod certò inde constat, quòd pridie nimirum, nihil omnino in Sole, ut ut sedulò eum perlustrarem, conspectum fuerit. Quæ quidem omnes Maculæ quotidie paulatim creverunt, schemate id attestante. Præterea verò nihil notatu dignum, circa hanc Macularum periodum, occurrit, nisi, quòd cursus earum, simili planè modo, ut antecedentium, fuerit inclinatus, curvatusque.

In Solis medio Maculæ aliquot exorta.

2. A Die 14. ad 21. Julii, nihil planè Macularum, Facularumque in Sole fuit animadversum. Die verò 22. Facula horizonti ortivo insidebat.

3. Die 23. & 24. præter Faculas, atque umbras secundarias, in patente Solis hemisphærio nihil, crede, deprehendimus. Die autem 25. unica tantùm Facula affulsit.

Maculæ secundaria.

Animadversiones super XXV. Macularum Solarium Periodo.

1. **J**am verò tandem, die 26. Julij, duæ Maculæ g, nimirum & h oriebantur: superior minor h diminuebatur quotidie ad medium usque itineris, ubi penitus in nihilum redacta, sic ut nec indicium aliquod sui reliquum esset. Altera verò inferior g, ad medium crevit; postmodum autem sensim decrescendo, cum Faculis perquam lucidis in Sole esse desit.

Maculæ circa Solis centrum, omnino desecit.

2. Die 3. Augusti Maculam g, Faculæ insignes præibant, quod certè valde rarum est contingens. Nam hæ plerumque Maculas sequuntur. Quo ipso tempore, circa ortum, nova Facula i conspecta, quæ, die subsequente, in duas valde tenuissimas Maculas abiit,

3. *Cursus Maculæ g*, adhuc extitit curvilineus, & quidem concavus, Boream versûs : quia Polus ejus Septentrionalis in quadrante occidentali, commorabatur.

*Cursus appa-
rens fuit die-
rum plus mi-
nus 12.*

4. Tempus itinerarium *Maculæ g*, si benè expendatur, non multùm ultra dies 12. excessit.

*Quanto tem-
poris spatio
Sol Macula-
rum planè
vacuus exti-
terit?*

5. Die 5. & 6. Aug. pluvix continuæ, Solis aspectum nobis negarunt. Die verò 7. rursum quidem observationi vacavimus; sed nec minima quidem, sive *Macula*, sive *Facula*, obviam nobis venit. Itemque verò die 8. 9. & 10. nihil penitus *Macularum* apparuit. Die iterum 11. & 12. aër fuit turbidus!

6. Die 14. 15. 16. 18. 19. & 20. Sol adhuc faciem exhibuit omni ex parte mundam. Quid autem sequentibus 5. dieb. factum fuerit, ob Cœli inclementiam, minimè observare concessum est.

7. Die 26. denuo quidem *Maculæ*, à nobis animadvertæ; sed, ratione nubecularum Solem occupantium, nihil omnino annotare nobis licuit.

Animadversiones super XXVI. *Macularum Solarium* periodo.

1. **D**ie 27. Aug: unicam *Maculam a*, in medio propemodum Solis discoprehendimus; utrùm verò Solem fuerit ingressa, vel primùm in ejusgremio nata sit, certò affirmare sanè nequeo: cùm dies antecedentes nubilosi extiterint. Eandem quoque ob causam, non nisi bis tantùm hanc *Maculam a* videre nobis obtigit.

2. Die 2. Sept. iterum duæ novæ *Maculæ b*, in conspectum venerunt; quæ, cùm ad occasum vergerent, tum, quâ formam, tum quâ numerum, indies sunt mutatae; sic ut circa egressum, solùm duæ exiguæ, umbris *Faculisque* lucidissimis circumvalatæ se obtulerint.

3. Die 10. & 11. Sept. *Faculæ* latè patentès *c*, ortum versûs, infra *Eclipticam* spectabantur; quæ die 12. rursum penitus erant dissipata, neque, ante 18. vestigium aliquod *Macularum Facularumque* comparuit. Posthac, ad 25. usque, Sol denuo purus omnino fuit observatus.


4. Die

GEDANI.

Anno ere Christiane 1644.
Curfus Macularum à 26 Julii, ad 4 Augusti.

IVLII.

D. H. i. Aug.
 26. 7 18. m. 30 32.
 27. 7 18. m. 38 6.
 28. 6 +. m. 37 49.
 29. 7 10. m. 37 83.
 30. 7 7. m. 37 18.



AUGVSTI.

D. For. i. Aug.
 1. 7 36. m. 37 18.
 3. 6 31. m. 36 30.
 4. 6 +. m. 36 16.

A. Oriens.

B. Occidens.

fig. HHH.

Astor Scalposit.

4. Die 30. Sept. demum insignis Macula d, tribus densissimis nucleis maximè conspicua apparuit; decrevit tamen mirum in modum, die 2. videlicet Octob. adeò ut ex illâ magnâ densissimâ, parvula tantùm, atque multùm tenuissima id temporis fuerit residua; prout id in subjectâ designatione, velut in speculo videtur. Adhæc autem, & Austrum versus, Maculam admodum tenuem e, recenter exortam vidimus, quæ, die subsequente, iterum denata, inque Faculas fulgentissimas accensa.


5. Die 6. de Maculâ d, nihil quicquam spectabatur.

6. Die 8. Octobr: rursus debilissimam aliquam, atque exiguam f, recens in Solis sinu procreatam, deprehendimus; de quâ hoc præsertim asseverare habeo, quòd se se, circa ortum, in Solis discum non intulerit, & quòd die statim subsequente, iterum fuit in nihilum redacta.

7. Ad diem usq; 5 Nov. ob aërem nimis turbulentum, nihil annotatum, neq; animadversum: sic & die 14, 25, 28, 29, 30, 2 Decemb. 3, 4, 5, 6, 11, 16, 21, ut & 5 Januar. An. 1645, 6, 13, & 24, Sol planè ab omnibus Maculis defæcatus extitit. Estq; sanè res admirabilis, quòd in tam longo temporis intervallo ne quicquam prodierit: utrùm verò in diebus intermediis, in quibus, ob tristem Coeli vultum, nobis observare minimè obtigit, aliquid in Sole emerferit nec ne, profectò me clam est: interim tamen id scire magnopere interest. Quamobrem contemplatores phænomenorum cœlestium quoscunq; etiam atq; etiam rogatos velim, si quidem tum temporis vigiles in Solem direxerint oculos, ut nos de his certiores reddant. Etenim, si illis item suprâ dictis intermediis diebus, quicquam oculis animadvertere negatum; tunc certè, absq; hæsitatione, pronunciare licebit, Solem per tres integros menses, mundum purumq; , ab omni Maculâ Faculâq; esse spectatum; id quòd observari maximè omnino meretur: eò præsertim, cum id ipsum, quantum sciam, nunquam adhuc à quopiam fuerit deprehensum. Quibus hæc etiam Macularum concludemus observationes, cum de iis satis prolixè, ut arbitror, superioribus quibusdam capitibus dixerimus; conferemus autem nos ad Jovialium contemplationes, ut non minus ea, quæ ibidem probè animadvertenda occurrunt, tibi, Lector candide, plana faciamus omnia. V u 3 Ob-

OBSERVATIONES QUÆDAM
Circulatorum Jovis, quæ eorundem, cùm cir-
cumcursationes, tum mutationes, & ad se invicem, tum ad
Jovem consideratorum, accuratè exhibent; institutæ,
Anno Salutis 1642: 1643. 1644.

G E D A N I.

1.  Nno à Christo nato, 1642. die 13: Augusti horâ 11. stylo Gregoriano, tres Satellites circa Jovem, ope cujusdam exactissimi Telescopii, deprehendi. Orientalior Boream versùs tendens, omnium erat maximus; alter verò reliquorum minimus, cum Jove & orientiori, rectam constituebat lineam; quorum inter se, ut & ad Jovem, talis erat constitutio: a b, 14 min. a c, 5 min. & c d, 30 sec:

2: Die 14. Augusti, horâ 10 min. 30 iterum tres stellulæ apparebant. Orientalis major à rectâ lineâ, per reliquas protractâ, modicùm in Aquilonem deflectebat: occidentaliores exiguæ erant magnitudinis; elongabantur à se invicem, ut & à Jove, hunc in modum: a b, 5 min. b c, 6 min. & a d, 11 min.

3. Horâ 11 min. 15 situm locumque satis notabiliter mutaverant, omnesque majores atque splendidiores deprehendebantur; quarum dispositio talis erat, a b, 7 minut. b c, 7 min. & a d, 14 minut.

4. Die 15 Augusti, horâ 10 min. 25 denuo tres duntaxat stellulas Jovem cingentes conspeximus; duas quidem magnitudine æquales, in occasu, tertiam reliquarum maximam in ortu, & quidem in hoc ordine, atque distantia: a b, 3 min. b c, 3 minut. a d, 11 minut.

5. Eadem die, horâ 10 min. 35 earundem stellarum interpedines variatas, isthoc pacto deprehendimus: a b, 2 minut. 20 sec. b c, 2 min. 20 sec. a d, 11 min.

6. Horâ 1 post med. noct. die nimirum 16 Augusti, occidentaliores multùm, tum quâ magnitudinem, tum quâ splendorem, erant attenuatæ; situmque itidem haud parùm mutaverant; ut vides: a b, 2 min. b c, 1 min. 30 sec. & a d 10 min.

7 Ho-

Jovis comites modò majores, modò etiam splendidiores, apparent.

Circumlocionalium

Observatio

Observatio

d
*

1.
a
c

b
*

c
*

d
*

15.
a
c

b
*

2. b c

16. d c b

3. b c

17. d c b

4. b c

18. d c b

5. b c

19. d c b

6. b c

20. d c b

7. b c

21. c b

8. b c

22. d c b

9. b c

23. d c b

10. b c

24. e b c d

11. b c

25. d b c

12. b c

26. d c b

13. b c

27. d c b

14. b c

28. c b d

Aut Solus

fig. KKK

7. Horâ 1 min. 11 post med. noct. illæ ad dextram incedentes, adeò erant imminutæ, ut vix ac ne vix cernerentur.

8. Horâ 1. 30 min. duæ illæ exiguæ magis magisque sibi invicem appropinquabant, sic ut b c tantùm 40 secund. removerentur; alter verò d, à Jove circiter 9 min.

9. Die 16 Augusti, horâ 10 min. 45 duo tantummodo circumjoviales, Eoum versùs, erant conspicui, reliqui nusquam apparebant; longinquior à Jove erat maximus; qui ab altero minori b, planè ut hic à Jove tribus minutis removebatur. Horâ 11, min. 15 utramque distantiam, quantum animadvertere licuit, nihil profus immutaverant.

10. Die 17 Augusti horâ 10 min. 45 orientalem stellulam d, reliquarum minimam, Boream versùs inclinantem, hac vice deprehendimus; contrà verò longiùs à Jove, 9 videlicet minut. distabat: occidentales b c, 4 tantùm min. à se invicem, tanto nempe interstitio, quanto viciniore à Jove. dirimebantur.

11. Die 18 Augusti, horâ 10 min. 25 demum omnes quatuor, quod hucusque nondum est concessum, splendidissimas lucidissimasque, summâ cum delectatione conspeximus: occidentalium stellula extrema erat maxima, viciniore verò minima: per omnes, ut & centrum Jovis, rectâ incedebat lineâ. Præterea in remotione hunc servabant ordinem, atque proportionem: a b, erat 4 min; b c, 2 min. 30 sec; nec major deprehendebatur distantia a d; d e verò 9 min.

12. Horâ 11, min. 10 eadem die, orientalis viciniore, situm neutiquam mutaverat; sed reliquæ magis magisque à Jove, ut & à se invicem, recedebant; distantia orientalium detegebatur tum temporis 11 min. b & Jovis, 6 min; b & c verò 3 minut. Horâ 11 min. 30 omnes ferè ejusdem magnitudinis, præter illam Jovi viciniorem d; priùs reliquarum minimam, quæ jam maxima spectabatur.

13. Die 19 Augusti, horâ 10 min. 25 denuo mihi observanti, quatuor stellæ apparuerunt, non autem omnes in unâ eademque rectâ: proxima namque d, à Jove 1 min. 30 sec. distans, Aquilonem versùs tendebat: orientalis longinquior, reliquarum erat maxima: elongabatur à Jove circiter 14 minut:

Joviales etiam suas habent latitudines.

nut : at occidentalis b, tantùm 3 minut. & ab alterâ c, 1 min. 30 secund.

14. Eadem die, horâ 10 min. 45, tres viciniore non modicum mutatz videbantur, plus plusque iter Jovem versùs faciebant : d à Jove 2 min. b ab ipso 2 min. 30 sec; c autem à b, unico tantummodo minuto distabat.

15. Hor. 11 min. 15 occidentaliore b c, vix 50 sec. à se invicem aberant; d verò paulatim à Jove discedebat, schemate attestante.

Omnes in Oriente conjuncti.

16. Die 20. Augusti, horâ 10. min. 20, omnes quatuor in Oriente micabant; quorum extremus erat maximus; reliquorum trium minorum intermedius, paululùm Aquilam versùs elevabatur : vicinior b, omnium minimus deprehendebatur, qui à Jove, tum & reliqui, à se invicem, non ampliùs unico minuto & dimidio dirimebantur; e verò à d, 12 min.

17. Horâ 10. min. 40, viciniore situm ex parte mutaverant, sic ut superior c ad d, b verò ad Jovem sensim tenderet; quem admodum ex distantii luculenter apparet. a b, 1 min. b c, 1 min. 30. sec. c d, 1 min.

18. Horâ 10, min. 55 extrema, quantum dijudicare potuimus, locum retinebat fermè eundem : at reliquæ hunc ordinem constituebant : a b, 50 sec. b c, 1 min. 30 sec. c d, 50 sec.

19. Horâ 11, min. 6 tres propinquiore, multùm quoad magnitudinem decreverant, inprimis b visum penè eludebat. c & b motu ferebantur contrario; id quod hinc manifestè colligere datur, quòd tam c & d, quàm b & a, in hac observatione, adhuc viciniore extiterint. Nam distantia a b tantùm deprehendebatur 40 sec. b c, 1 min. 30 sec, & c d pariter 40 sec.

20. Horâ 11, min. 30, minima illa b, magnâ cum velocitate ad Jovem tendebat, ejusque limbo quasi jam adhærebat. Duæ reliquæ c & d ad conjunctionem se accingebant, interstitio 30 tantùm minorum aberant, & b à Jove adhuc minori spatio 20 scilicet secund. hinc distantia c b, ad duo integra minuta extendebatur.

Conjunctio notatu digna

21. Horâ 11, minut. 40, exigua illa b, planè à Jove tegebatur, quæ horâ 10, min. 20, satis longè ab eo aberat, quod quidem spe-

spectaculum, ut visu erat jucundissimum, ita observatu pariter dignissimum. Reliquæ duæ c & b, 20 sec. duntaxat distabant, ita ut ferè altera alteram tangeret.

22. Die 21 Augusti, horâ 10 min. 10 tres stellulas cum jove in rectâ lineâ, secundùm Zodiaci ductum, ut fieri solet, sitasprehendimus: occidentalis minima à jove 3 min. erat remota, c verò à jove 7 min. & ab alterâ d 5 min. Horâ 10, min. 35 coordinatio stellarum fermè nihil à priori differebat.

23. Die 22 Augusti, horâ 9 min. 40, eandem propemodum faciem tres illi circumjoviales, ac pridie, referebant, id quod ex servato ordine luculenter patet. a b, 3 min. a c, 8 minut. & c d, 4 minut.

Die 23, & sequentibus, ob Cœlum continuè nubilosum, nihil profus observavimus.

24. Die 29 Augusti horâ 10 min. 57, quatuor quidem iterum stellæ, circa jovem aderant, sed duæ, c nempe & d (sicuti ex subsequens observationibus videre licuit) ex numero erant fixarum. Vicinior jovi b, visum penè effugiebat.

Die 31 Augusti, ut & 1 Septemb. nubilosa fuit tempestas.

25. Die 2 Septemb. horâ 10 minut. 0 in ortu fixam iterum, cum jove & suis affeclis, ferè in eâdem rectâ constitutam deprehendimus. Reliquarum trium orientalior, latitudinem satis notabilem Borealem possidebat; occidentales verò nullam. Dist. a b erat 1 min. 30 sec. ut & b c, & a d tanta. Horâ 10 min. 48 ordinem nihil adhuc mutaverant.

26. Die 3 Septembris, horâ 8 minut. 45 omnes in ortu conspectæ; extremam fixam illam e, adhuc majori intervallo à jove elongatam esse, nimirum 19 minut. deprehendimus: Jupiter enim cursum suum retrogradum persequebatur. Jovialium d, Boream versùs deflectebat; interstitia omnium trium fermè erant æqualia, 2 scilicet min. Horâ 10 minut. 24 in eâdem adhuc erant constitutione, nisi quòd d paulò longius à jove discessisset.

27. Die 4 Septembr. horâ 9 minut. 50 omnes quatuor apparentes, eandem servabant rectam; nihilominus tamen finiterrima e, non ex numero jovialium, sed fixarum existit; id

X x x

quod

quod ex ejus à jove nimia distantia, tum quod perpetuo eandem servaret situm, satis superque deprehendimus. Reliquarum ordo erat ejusmodi: a b distantiam æstimavimus 1 minut. a c, 5 minut. c d 3 minut. & a e circiter 30 minut.

28. Die 6 Septemb. horâ 10 min. 40, tres in ortu ejusdem ferè magnitudinis apparebant: longinquior d à c 7 min. elongabatur, c verò à b, 1 min. & b à jove 2 minut.

29. Die 7 Sept. horâ 9 min. 52, quatuor, cum centro jovis rectam constituentes lineam, inspectæ sunt. Occidentalis b, visum penè effugiebat, propter corporis parvitatem: constitutionem erga se invicem, ut & ad jovem, hanc tenebant. a b, 30 secund; b c, 2 min. 30 secund; a d, 2 min. 30 sec. d e, 6 minut.

30. Die 8 Septem. horâ 8 min. 43 iterum binæ ab ortu, binæ pariter ab occasu, jovi adstabant; quarum orientior Austrum versus vergebat. Ordo atque distantie illarum, tum ex iconismo, quàm ex appositis numeris, rectè percipiuntur. a b, 4 min. 30 sec; b c, 4 min. 0 sec; a d, 1 min. 30 sec; d e, 5 min. 30 sec.

31. Horâ 9 min. 43 hoc modo distantie erant mutatae; a b, 4 min; d c, 3 min; a d, 2 min; & d e, 5 minut.

32. Die 9 Septemb. horâ 8 min. 33 tres tantummodo magnitudine æquales, in eadem rectâ ad ungvem dispositas deprehendimus; itemq; & fixam e Corum versus 26 min. existentem. Duarum vicinior b à jove 2 min. 30 sec. & à c iterum 3 min. 30 sec. d verò à Jove 3 min. elongabatur.

33. Die 10 Septemb. hor. 8 min. 30 talis fuit Astrorum positus; b à Jove 1 min. c verò 2 min. 30 secund. distitit, ab alterâ orientali d tantum 2 min.

34. Die 11 Septem. hor. 8 min. 50, præter illam fixam 24 min. à Jove remotam, tres conspectæ, hac in dispositione: b aberat à c, 3 min. 30 secund. à Jove 2 min. 30 secund. & d ab illo 4 min. 30 secund.

35. Horâ 10 minut. 18, & quartam, valde tamen exigam, ex umbrâ Jovis primùm emergentem, in plagâ occidentali observavimus; altera sequens c, Aquilonem versus deflectebat.

36. Horâ 10 min. 58 recens orta b, tanto interstitio à Jove, quanto ab alterâ c, unius circiter minuti, aberat, magis magisque ad occasum, stellulam d scilicet versûs tendebat. Orientalis e, à Jove 5 min. distabat.

37. Die 12. Septemb. horâ 8 min. 29, Jupiter retrogradus, ad conjunctionem Stellæ sequentis in primo fluxu aquæ venerat; ubi tum temporis in utroque latere duos habebat satellites, omnes omninò rectam constituentibus lineam, erantque magnitudine ferè pares. Quorum intercapedines hîc habes : a b, 3 min. ; d c, 4 min. ; a d, 1 min. 30 sec. d e, 3 min.

38. Horâ 9, min. 56, ordo stellarum hîc erat : a b, 3 minut. 30 sec. b c, 5 min. a d, 1 min. 30 sec. & d e, 5 minut.

Die 13 Septemb. ob nubium interpositionem, nihil quicquam animadvertimus.

39. Die 14 Septembr. horâ 8, minut. 41, conjunctio Jovis, & supra dictæ stellæ, jam erat præterita; infra quam fixam adhuc aliam incognitam, sed multò minorem, eximii perspicilli ope, notavimus. Circa Jovem quidem tres comites tantùm erant præsentis, (quarta fortassis adhuc in umbrâ delitescerat) hac in configuratione. Distantia a b erat 2 minut. 30 sec. b c, 9 min. a d, 3 min.

40. Die 15 Septemb. horâ 8 minut. 15 denuo tres tantùm ab occasu, quarum intermedia erat Australior, spectabantur, & quidem in tali ab invicem elongatione. a b, 2 min. 30 sec. b c, item tot min. & c d, 4 minut.

41. Die 16 Sep. horâ 8 minut. 5, tres quidem iterum in occidente cernebantur, sed prorsus aliam tenentes figuram, quemadmodum ex illarum distantis hîc annotatis clarè patet : a b, 1 min. 30 sec. b c, 4 min. c d, 2 min. 30 sec.

42. Horâ 8 minut. 45 eâdem die, circumjovialibus probè consideratis, mutationem circa illos haud exiguam animadvertimus. Cùm enim in priore observatione tantummodo tres Jovi adstarent, jam quatuor distinctè admodum conspeximus; sic ut certum sit, b viciniorem illam minimam stellam, prius sub alterâ c planè latuisse; à quâ illa noviter conspecta non amplius 20 sec. removebatur : reliquæ situm ferè priorem, ut apparet, observantes.

X x x 2

43 Ho-

43. Horâ 9 min. 30 viciniores b c, plus plusque ab invicem discedebant; adeò ut b minima, festinante gradu, ad Jovem pergeret. In hac observatione deprehendimus illarum distantiam 30 secund.

44. Horâ 10 minut. 5, adeò erat attenuata, ut vix ac ne vix cerneretur; à Jove non amplius 20 secund. distabat, ab alterâ verò c, 50 secund.

*Jovialis ab
ipso Jove re-
vultu.*

45. Horâ 10 min. 40, minima illa b, à Jove planè abscondebatur; reliquæ parùm admodum situm inmutaverant.

46. Die 17 Septemb. hor. 8 min. 43 omnes quatuor in rectâ lineâ incedebant. b, quæ tantùm 30 sec. à Jove aberat, reliquarum erat minima. c occidentalior, distans à b, 4 minut. satis erat conspicua, ut & reliquæ orientales, quæ à se invicem 2 min elongabantur, d verò à Jove 2 min. 30 secund.

*Eclipsis Jo-
vialis.*

47. Horâ 9 min. 28 b à jove distabat tantùm 15 sec. b à c, 4 min. d à jove 2 min. 30 sec. d verò à e, 2 min. Horâ 9 minut. 46, minima illa b, jam amplius non animadversa, non tam propter corporis parvitatem, quàm quòd à jove penitus esset tenebris obvelata.

48. Die 18 Septembr. horâ 8 min. 48, duas tantùm observavimus stellas, lucidiorem in oriente, alteram in occidentes; illa à jove 5 min. hæc verò 2 min. 30 sec. removebatur.

49. Die 19 Sept. horâ 8 min 24, omnes quatuor, eandem præ se ferebant magnitudinem. Media orientalium, Boream paululùm versùs attollebatur, alioqui paribus ferè interstitiis mutuo separabantur, 2 scilicet minut. At occidentalis 4 min. 30 sec. à jove distabat.

50. Horâ 9 min. 20, situs comitum jovis haud multùm erat à priori diversus; nisi quòd d e, & a d paululùm sibi invicem appropinquaverint.

51. Die 20 Septemb. horâ 9 minut. 11 omnes numero quatuor erant splendidissimæ; secunda à jove d, Austrum versùs deflectebat, reliquæ lineam accuratè rectam cum jove describebant: tum ad jovem, tum ad se consideratæ hunc servabant ordinem, a b elongabatur id temporis 1 minut. a c 1 min. 30 sec. c d, 1 min. 30 sec. & d e, 3 min. 30 sec.

52. Horâ 10 min. 10, b minimam multò jovi viciniorem deprehendimus, sic ut 30 sec. duntaxat distaret.

53. Horâ 10 min. 25, occidentalis illa b, jam limbo jovis arcetè adhærebat; vix enim 20 sec. ab eo erat remota. Reliquarum interstitia d c, & c a, 2 min. e & d verò 4 min. notavimus.

54. Horâ 10 min. 44, occidentalis illa exigua, umbram jovis incurrens, planè evanescebat, ita ut postmodum nullibi reperiretur.

Jupiter Jovianem texit.

55. Die 21 Septemb. horâ 8 min. 25 trium in eâdem rectâ constitutarum, occidentalis b videbatur minima; aberat à jove 1 min. 30 sec; c verò 3 min. 30 sec. & ab alterâ d, 6 min. 30 sec. Eo ipso tempore, simul duæ fixæ huc usque nondum visæ Notozephyrum versûs, in conspectum venerunt; quarum superior visum penè eludebat.

Stella fixa hæcenus incognita.

56. Horâ 9 min. 43 stella illa occidentalis jam unico minuto à jove longius discesserat.

57. Die 22. Septemb. horâ 8 min. 15 tres satellites hunc servantes ordinem, jovem circumdederant : b à jove removebatur 3 min. d 11 min. b verò à c 3 min. 30 secund.

58. Die 23 Septemb. horâ 8 min. 20, de quatuor satellitibus, tres spectabantur in occasu, quorum viciniore admodum erant exigui, reliqui autem satis magni atque lucidissimi. e orientalis ad extremum tendens terminum, elongabatur à rege 12 circiter min. alter d 7 min. minores verò b & c pari intervallo tam à se invicem, quàm à jove, 1 scilicet minut. dirimebantur. Fixæ videbantur paululum jovi appropinquari.

59. Horâ 9 min. 4. duos illos minores b & c multò viciniore, sic ut non amplius 30 sec. distarent, conspeximus.

60. Horâ 9 min. 17, c aliqualem obtinens latitudinem borealem, veloci cursu, tum alteram stellam b, tum jovem versûs, pergebat.

61. Horâ 9 min. 30 ex interstitio b & c, 10 scilicet secund, manifestè deprehenditur, illas se se ferè attigisse.

Dna Joviales se mutuo tangunt.

62. Horâ 9 min. 41 altera alteram stringebat.

63. Horâ 9 min. 56 hæc duæ b & c ad ipsam conjunctionem venerant, unamque quasi stellulam omnino constituebant;

Alteram alteram omnino texti.

X x x 3

spe-

ſpectaculo certè jucundiffimo, quale hæctenus mihi obſervari, nunquam obtigerat.

64. Die 24 Septemb. horâ 8 min. 5, iterum quatuor ſtellulæ jovem concomitabantur, hoc in ordine : b à jove 2 minut. 30 ſec. diſtabat; c 2 min; d verò à c, 2 min. 30 ſec. & ab e, 5 min. 30 ſecund.

65. Horâ 9 min. 2, b à jove removebatur 1 min. 50 ſec. c verò erat quaſi ſtationaria. d a c elongabatur 2 min. & ab extimo e, 5 min. Horâ 9 min. 34. occidentalis adhuc propiùs ad jovem venerat, ita ut tantummodo 1½ min. diſtaret.

66. Die 25 Septemb. horâ circiter 10, ob Cœlum nubiloſum, non niſi hanc unicam ſtellulam, ortum verſus 5 minutis à jove diſtantiem obſervare potuimus.

76. Die 26 Septemb. horâ 8 min. 19, tres comites circa jovem conſpecti ſunt in eâdem rectâ, & quidem in tali diſtantiâ : d à jove 7½ min; c, 2½ min; b, 5 min. diſtabat. Præter has verò ſtellas, ſimul etiã 7 fixæ in eo planè ordine, ut in adjecto ſchemate vides, nobis offerebantur.

68 Die 27 Septembris horâ 8 min. 9, duæ exiguæ b & c in occidente, unico tantum minuto diſtantes, quarum remotior Auſtrum verſus deſſectebat, animadvertimus. Orientalis d à jove 6 circiter minutis remota omnium erat, ut die præcedente, maxima.

69. Horâ 9 min. 37, jam quatuor micabant, e nunc primùm ex umbrâ jovis ſe ſe extricaverat; eratque adeò exilis, ut vix ac ne vix cerneretur; diſtantiã ejus animadvertebatur circiter 30 ſec. b & c duplo remotiores ſpectabantur, quàm in obſervatione priori: Auſtraliior videbatur eſſe retrograda, contra ſ, ſ altera verò b directa ſ, ſ, ſ, jovem verſus.

70. Die 28 Septembris horâ 7 vespert. ordo ſtellarum jovialium, ut & fixarum fuit talis: b à jove diſtitit 8 min. c 1 min. 30 ſecund. d à c 3 min. Fixa verò e propemodum 20 minut; & f 30 minut.

71. Horâ 8 min. 43, reliquarum minima magis magisque ad jovem properabat, vix 40 ſecundis ab eo elongabatur.

*Jovialis à
conjunctione
veniens.*

Circumlocionalium

Obscuratus

Obscuratus

d	c	55 a	b	
*	*	(7)	*	
				<i>fina</i> *
d	c	56 a	b	
*	*	(8)	*	
d		57 a	b c	
*		(9)	* *	
				<i>fina</i> *
c		58 a	b c	d
*		(10)	* *	*
e		59 a	b c	d
*		(11)	* *	*
c		60 a	b c	d
*		(12)	* *	*
e		61 a	b c	d
*		(13)	* *	*
e		62 a	b c	d
*		(14)	* *	*
e		63 a	b c	d
*		(15)	* *	*
e	d	64 a	b	
*	*	(16)	*	
e	d	65 a	b	
*	*	(17)	*	
b		66 a		
*		(18)		

d	c	67 a	b	*
*	*	(19)	*	*
		<i>fina</i>	<i>fina</i>	*
d		68 a	b c	
*		(20)	* *	
				e <i>f</i> *
d	e	69 a	b c	
*	*	(21)	* *	
				*
d	c	70 a	b	
*	*	(22)	*	
				e * *
d	c	71 a	b	
*	*	(23)	*	
				*
d		72 a	b c d	
*		(24)	* * *	
				e <i>f</i> * *
				*
d	b	73 a	c d	
*	*	(25)	* * *	
d	b	74 a	c d	
*	*	(26)	* * *	

fig MMM.

Aut. Sculp.

72. Die 29 Septemb. hor. 10 min. 25, tres in eadem omnino rectâ apparuerunt, quarum duę remotiores admodum erant splendidæ; tertia verò non item. b & c, pari distantia 2½ scilicet minorum à se invicem, ut & à Jove removebantur: at d à c, 3½ min. distabat.

73. Die 30 Septemb. hor. 7 min. 49 vesper. tres iterum, in eadem lineâ rectâ, secundum Zodiaci ductum, spectabantur: vicinior omnium videbatur minima. Distantiam d c deprehendimus 4 min. b c, 3 min. & a b 2½ minut.

74. Horâ 9 min. 7 constitutio jovialium fuit ferè eadem, nisi quòd b paululum vicinior animadverteretur.

Die 1 Octobris, ob nubium interpositionem nihil observare licuit.

75. Die 2 Octob. horâ 7 min. 27, quatuor Jovi aderant. Orientalis e ab alterâ d, 1 minuto distans, Aquilonem versùs inclinabat; d verò, à Jove 2 min. remota, cum reliquis occidentalibus, lineam planè constituebat rectam. Distantia b & Jovis erat 2½ min. c autem 11 min. Fixas quod attinet, illæ configurationem, tam cum Jove quàm ejus comitibus, omnino eam in diagrammate delineatam, tenebant. F trium fixarum major, aliàs nominatur duarum antecedens in primo fluxu aquæ, sextæ magnitudinis in Aquario; reliquæ erant planè novæ hæctenus incognitæ.

76. Hor. 8 min. 37 orientalis e veloci cursu ortum versùs properabat, sic, ut tum temporis à d 2½ min. distaret: reliquæ penè eandem adhuc distantiam inter se observabant.

77. Die 8 Octobr. horâ 7 min. 50, omnes iterum eodem in positu deprehensæ. b à Jove erat 4 min. elongata; c, 7 min. d, 2½ minut. e verò 6½ minut.

78. Horâ 9 min. 8 orientalem d, omnium minimam spectavimus. Situm quod attinet, ferè eundem omnes adhuc tenebant, nisi quòd b c paululum facta erat b propinquior.

79. Die 4 Octob. hor. 9 min. 25 in occidente duę adeò animadvertebantur vicinæ, ut se mutuò fermè tangerent; non enim ultra 15 sec. à se ipsis videbantur remotæ; à jove 2 min. diremptæ erant, altera verò d 5 minut. Fixæ quotidie Jovi plus plusq;

*Dna stellula
admodum ar-
tè jungebatur.*

plusq; appropinquabant; cujus rei ratio hæc est, quòd jupiter id temporis retrogradus extitit.

Die 5, 6, 7, ob Cœli intemperiem, nihil annotare potuimus.

80. Die 8 Octobr. hor. 7 min. 45 tres videbantur: orientior non quidem adeò magna, sed tamen satis erat conspicua; distabat à Jove 12 min. circiter. Occidentalis deprehendebatur maxima, distantia 4 minutorum, c erat à Jove remota 3 min. Fixæ verò ortum versùs 11 min.

Die 9, 10, & 11 Octobr. Cœlum iterum non favit.

81. Die 12 Octob. hor. 6 min. 41 tres ejusdem magnitudinis in oriente se offerebant; duæ proximæ paribus interstitiis à se invicem, ut & à Jove unico nimirum minuto dirimebantur; at d, 20 secundis apparebat remotior.

Die 13 Octob. ut & 14, ob nubium interpositionem nihil observare licuit.

82. Die 15 Octob. horâ 7 min. 45, omnes, quæ Jovi adstant satis superque erant conspicuæ; nihilominus tamen media b occasum versùs distans 4 min. omnium erat maxima; orientalis d, 2½ min. à Jove remota, minima deprehendebatur.

Die 16 & 17 Octob. aër admodum fuit turbulentus.

83. Die 18 Octob. horâ 7 minut. 43 duæ satis videbantur splendidæ; tertia autem vix visum incurrebat. b à Jove distitit 2 min. c, 11 min. & d, 7 min.

84. Horâ 8 min. 3, eâdem die, jam quatuor secundùm Eclipticæ ductum apparebant: vicinior b, primùm tum temporis ex radiis Jovis emerferat, elongabatur duntaxat 30 secundis,

Die 19 Octobris, ad observandum minimè idonea erat tempestas.

85. Die 20 Octob. horâ 9 min. 41, tres exiguæ, hac ratione dispositæ occasum versùs visæ sunt. Prior b removebatur à Principe 1½ min. c, 3½ min. & d, 5 minutis. Stellæ verò fixæ 30 circiter minut.


86. Die 21 Oct. horâ 7 min. 48, stellulæ situm, ut ex appositione figurâ palàm est, mutaverant, b à Jove remota erat 4½ min. c 8 min. & d 1½ min. Cæterùm in hac observatione, tres novæ fixæ incognitæ boream versùs, inspectæ sunt.

*Nova Fixæ
observate.*

87 Die

Circumossialium

Obcorvatus



Obcorvatus



76. $\begin{matrix} e & d & a & b & c \\ * & * & \textcircled{a} & * & * \end{matrix}$
77. $\begin{matrix} e & d & a & b & c \\ * & * & \textcircled{a} & * & * \end{matrix}$
78. $\begin{matrix} e & d & a & b & c \\ * & * & \textcircled{a} & * & * \end{matrix}$
79. $\begin{matrix} d & a & b \\ * & \textcircled{a} & * \\ & & c \end{matrix}$
80. $\begin{matrix} d & c & a & b \\ * & * & \textcircled{a} & * \\ & e & & \\ & * & & \\ & . & & \end{matrix}$
81. $\begin{matrix} d & c & b & a \\ * & * & * & \textcircled{a} \end{matrix}$
82. $\begin{matrix} d & a & b & c \\ * & \textcircled{a} & * & * \end{matrix}$
83. $\begin{matrix} d & a & b & c \\ * & \textcircled{a} & * & * \end{matrix}$
84. $\begin{matrix} e & a & b & c & d \\ * & \textcircled{a} & * & * & * \end{matrix}$

86. <i>Jun.</i>
87. $\begin{matrix} d & a & b & c \\ * & \textcircled{a} & * & * \end{matrix}$
88. $\begin{matrix} c & b & a \\ * & * & \textcircled{a} \end{matrix}$
89. $\begin{matrix} d & c & a & b \\ * & * & \textcircled{a} & * \end{matrix}$
90. $\begin{matrix} d & c & a & b \\ * & * & \textcircled{a} & * \end{matrix}$
91. $\begin{matrix} e & d & c & b & a \\ * & * & * & * & \textcircled{a} \end{matrix}$
92. $\begin{matrix} e & d & c & b & a \\ * & * & * & * & \textcircled{a} \end{matrix}$
93. $\begin{matrix} e & d & c & b & a \\ * & * & * & * & \textcircled{a} \end{matrix}$
94. $\begin{matrix} e & d & b & a \\ * & * & * & \textcircled{a} \end{matrix}$
95. $\begin{matrix} e & a & b \\ * & \textcircled{a} & * \\ & & c \end{matrix}$
96. $\begin{matrix} d & a & b & c \\ * & \textcircled{a} & * & * \end{matrix}$

fig NNN.

Ann. St.

87. Die 22 Octobr. horâ 8 minut. 32 duæ tantùm per nubeculas apparebant; orientalis à Love 2 minut. occidentalis verò 6 min. distabat: num plures eo tempore adfuerint nec ne, certò affirmare nequeo.

88. Die 23 Octobr. horâ 7 minut. 24, iterum duæ stellulæ solùm, & quidem ab oriente, ejusdem ferè magnitudinis cernebantur; b cum à Love, tum ab alterâ c, pari distantiâ, nempe 4 min. elongabatur.

89. Die 24 Octobr. horâ 7 min. 46, tres, in eâdem omnino rectâ, secundùm Eclipticæ ductum, deprehendimus; quarum longinquior 6½ min. remota omnium maxima, vicinior verò 1½ min. à Love distans, minima apparuit. Occidentalis b distatit 3½ minut.

90. Die 25 Octobris horâ 7 minut. 55, duæ orientales, satis amplo interstitio ab invicem removebantur; occidentales verò adeò erant vicinæ, ut vix ullum, inter utramque animadverteretur spatium, nisi quòd superior, paululùm remotiùs, à Love distare videretur. Extremus d 11 min. circiter aberat; c, 6 min. & duæ illæ occidentales 2 tantùm min.

91. Die 26 Octobris horâ 5 minut. 40, omnes quatuor in ortu erant constitutæ: e à Love elongabatur 13 min, d, 5 min. 40 sec. c, 5 min. b, 3 min.

92. Eâdem die, hor. 6 min. 26, tres viciniore paribus interstitiis ab invicem; unico scilicet minuto, divulsæ erant.

93. Horâ 7 minut. 48, omnes tres d, c, b, conjunctim Iovem versùs properabant, sic ut tum temporis b ab a, 2½ minut; c à b, 30 sec; d à c, 1 min. distaret.

94. Horâ 8 minut. 45, duæ viciniore, omnino ad conjunctionem propensæ, non quidem se mutuò tegebant, sed ferè tangebant. Interstitium illarum, quantum colligere licebat, erat duntaxat 10 secundorum. Cujus generis spectaculum, quo nihil pulchrius, admodum certè rarò observatur.

95. Die 27 Oct. horâ 7 min. 50, Saturnus jovialis omnium extimus, non quidem vicinior Iovi, sed minor, quàm pridie spectabatur. Ab occidente, iterum duæ 3 min. à Love remotæ adeò arctè copulabantur, ac si planè unam eandemque constituerent oblongam stellulam.

*Jucundum
admodum spec-
taculum.*

*Arctissima
Jovialium
conjunctio.*

Y y y

96. Ho-

96. Horâ 8 minut. 55 eâdem die, jam b & c 30 sec. ab invicem distiterunt.

Die 28 Octob. aëris inclementia observationi obstiruit.

97. Die 29 Octob. horâ 7 min. 32, distantia a b observabatur 1½ min. b c, 6¼ min. a d, 3 min.

98. Die 30 Octob. horâ 9, præter duas exiguas, ob nubecularum interpositionem, nullæ apparebant.

99. Die 31 Octob. horâ 7 min. 32, tres lineam rectam constituentes, circa Jovem, hoc ordine conspeximus: b à Jove 3 min; c, 8 min; & d, 7 min. removebatur.

Die 1 & 2 Novemb. Cœlum pluviosum, observationibus operam dare, prohibuit.

100. Die 3 Novembris horâ 7 min. 10, omnes quatuor eandem penè præ se ferebant magnitudinem; tres Jovi propinquiores æqualiter etiam propemodum ab invicem, scilicet minutis, ut & à Jove removebantur, nisi quòd b, 30 sec. c esset propior. Extimus 13 min. distare videbatur.

Die 4, 5, 6, 7, Novemb. aura minimè fuit defæcata.

101. Die 8 Novembris horâ 5 minut. 30, intermedia c omnium minima, paucillùm aquilonem versùs attollebatur, distabatque à Jove tanto intervallo, quanto b, 4 videlicet minutis: at d à c tantummodo 3 min. erat sejuncta.

*Omnes stel-
lula in orien-
te conspecta.*

102. Die 9 Novembr. horâ 6 vesper. omnes orientales existebant; altera ab extremâ latitudinem possidebat Australem; duæ viciniores mirum in modum erant attenuatæ; à se invicem, ut & à Jove æquali interstitio videbantur remotæ: d verò à c, 2½ min. & d ab e, 4 min. elongabantur.

Die 10 & 11 Novembris Jupiter sui aspectum nobis prorsus denegavit.

103. Die 12 Novembris horâ 5 minut. 30, tres satis splendidas deprehendimus; quarta autem visum penè fallebat. Ordo verò illarum hic erat: e à Jove 12 minimum minut. aberat; d, 8 min. c, 3 min. at b aliquot tantùm secund.

104. Die 13 Novemb. horâ 6 min. 45, in lineâ rectâ omnes Jovem stipabant, & quidem in remotione hunc tenebant

fitum:

fitum : b à Jove 3 min. discessisse videbatur ; c, 2 min. d, 5 min. & e, 11 minut.

105. Die 14 Novemb. horâ 5 min. 26, tres Iupiter habebat satellites. Orientalis remotior, tanto intervallo à c, quanto c à Iove, nempe 4 min. distabat, Austrumque versus paululum vergebat. Occidentalis verò illa minimus tantum 1½ min. erat remotus.

106. Die 15 Novemb. horâ 5 min. 20, duæ solummodo apparebant, c in distantia 6 min. & b, 5 min.

107. Die 16 Novembr. hor. 6 min. 22 Iupiter deprehendebatur cum duabus fixis (quæ tamen in schemate non sunt delineatæ) in conjunctione. Iovialium coordinatio erat talis. c à Iove distatit 3 min, ab alterâ verò 4 min. b iterum à Iove etiam tanto interstitio.

108. Die 17 Novemb. horâ 7 min. 10, b à Iove removebatur 2 min. c, 9 min & d, 4 minut.

109. Anno C. 1643, die 2 Octobr. horâ 10 tres joviales circa Iovem, ut & quatuor fixæ, eò planè ordine, quemadmodum in schemate videre est, conspectæ sunt. Occidentalis d à Iove 3 min. distabat; b omnium minimus 1 min; & c, 9 min.

Anno à nato
Chr. 1643.

110. Die 3 Octobr. hor. 10 min. 5 à latere Iovis dextro duæ stellulæ, à sinistro verò unica duntaxat deprehensa, & quidem tali distantia : a b erat 8 minut. a c, 2½ min. c d, 3 minut. d e, 8 minut.

Die 4 Octobr. nulla aura affulsit opportuna.

111. Die 5 Octobr. horâ 9 min. 25, jam duæ iterum ab occasu, & unica ab ortu, Iovem concomitabantur; quarta enim e, ex numero erat fixarum, quod & sequentes observationes aperte comprobant. Occidentior, quæ die præcedente tantum 8 min. jam 10 min. removebatur; b verò 1 min. d, 5 & e fixa illa 16 min. distabat.

112. Die 6 Octobr. hor. 9 min. 15, quatuor clarè affulgebant circumjoviales, & quidem ab utroq; latere duo; itemque & octo fixæ planè hæcenus incognitæ, quatuor scilicet à dextrâ, & tot à sinistra, quas tamen in diagrammate, ob chartæ angustiam, non apposuimus. Comitum Iovis distantia hæc deprehen-

Y y 2

de-

debaturs; a b, 2 minut; b c 11 minut; a d, 21 minut. & d e toridem.

113. Die 7 Octobr. hor. 9 min. 15 tres joviales occasum versus conspeximus; prior d borealior, distitit à mediâ c, unico duntaxat minuto; mediâ c à b, 5 min. & b à Jove 3 min.

114. Die 8 Octobr. horâ 9 min. 33, quatuor stellulæ erant conspicuæ; b omnium minima Aquilam versus deflectebat; reliquæ eandem constituebant lineam rectam. d à Jove elongabatur 8½ min. c, 5 min. b 4½ min. & e orientalis 3½ minut.

Die 9 Octobr. nihil observatum.

*Conjunctio
Jovis & aliorum
fixarum.*

115. Die 10 Octobr. horâ 9 min. 14 tres in oriente deprehendebanturs; b vicinior habens latitudinem Australem à Jove erat remota 4½ min., altera c 6½ min. d verò 8½ min. Præter has item, sex fixæ se se offerebant; major, quarti vel quinti honoris, cum Jove in conjunctione observabatur.

116 Die 11 Octob. horâ 10 min 22 omnes conspicuæ eandem præ se ferebant splendorem, atq; magnitudinem. b, aberat a Jove 4 min. c 8 min. & d 10½ min.

Die 12, 13 & 14 cùm Cælum undique nubibus esset obvelatum, nullas suscipere licuit observationes.

117. Die 15 Octobr. horâ 9 min. 10, quatuor in ejusmodi à Jove positu vidimus; b à Jove 5 min. removebatur; b à c 3 min. tanto scilicet spatio, quanto d à Jove deprehendebatur; orientior e distabat 7 min. Cæterùm & fixas aliquod circa Jovem, tum supra, tum infra eum conspeximus, prout quoque in apposito schemate illorum ordinem delineatum dedimus.

118. Die 16 Octobr. horâ 6 min. 30 duarum occidentalium remotior, ad Boream inclinabat, distans ab alterâ b 50 tantùm sec; hæc iterum à Jove 4 min; d verò 5 min.

119. Eâdem die, horâ 7 min. 30, orientalis videbatur unico minuto remotior; at occidentales, magis magisque sibi appropinquabant.

120. Horâ iterum 10, duæ illæ vicinissimæ, quæ sub lineâ perpendiculari spectabantur, mutuò se penè tangebant. Ab alterâ parte orientali, jam quarta sed adeò exilis ut vix cerne retur, prodierat: omnes autem reliquæ à se invicem, ut illa à Jo-

à Jove, æqualibus interstitiis, 3 scilicet minut. removebantur.

121. Die 20 Octobr. horâ 8 min. 36, duæ solummodo stellularæ, Jovem intercipientes, apparuerunt. Occidentalis major distitit 12 min; altera verò 7 min.

122. Die 22 Octobr. horâ 8, omnes quatuor in lineâ rectâ, secundùm Zodiaci ductum, erant extensæ: remotior d 13 min. à Jove aberat; c 7½ min. b, 4½ min. & e, 2½ min. Præterea & tres fixæ fatis ab invicem elongatæ, ut vides, spectabantur.

123. Die 24 Octob. horâ 10, tres tantummodo lineam constituebant rectam; alter enim à Jove ortum versus, ad Boream vergebat. Ordo præterea, quem inter se servabant, hic erat: occidentalis maximus b remotus à Jove spectabatur 7 min. c 3 min, d 4½ min. & e 6½ min.

124. 29 Octobr. horâ 8 min 2, orientalis stella minima distans à Jove 2½ min. paululum in Aquilonem elevabatur, reliquæ cum centro Jovis rectâ incedebant. e remotissima, distabat 14 circiter min. b, 4½ min. & c, 3½ min.

125. Die 31 Octobr. horâ 8 min. 24, omnes 4 Mediceæ eandem præ se ferentes magnitudinem, in plagâ orientali, hunc in modum se se aspiciendas præbebant. Vicinior borealis à Jove elongabatur 1½ min. tanto scilicet intervallo, quanto c iterum ab illâ; d 5 min. & extrema 10 min. Adhæc quoque diversæ stellæ fixæ Jovem tum circumdabant: id quod ex delineatione clarè patet.

126. Die 1 Novemb. horâ 7 min. 20 vesp. tres observatæ hoc in situ: b distitit 2½; d, 6 min. & e à c unico minuto.

127. Eâdem die hor. 9 min. 45, ingens deprehendebatur Medicearum mutatio. Non solum enim numero erant auctæ, sed & quoad situm, maximè spectabantur diversæ. In utroq; quidem latere arcuissima conjunctio duarum se se offerebat. Occidentales distantes à Jove 2. min. ferè se mutuò tangebant; vix namq; 10 sec. quantum accuratâ inspectione colligere licebat, removebantur. Orientales verò 6 min. à Jove remotæ, à se invicem autem tantum 30 sec. distabant. Id quod ut mihi valde jucundum fuit spectare: ita haud frequenter sic oculos pascere datur. Num verò altera occidentalium sub tempus prioris observationis, ab

Notabilis observatio.

Y y 3

alte-

alterâ fuerit obteâta, vel modò primùm ex umbrâ Iovis emerferit, pro certo affirmare nequeo.

128. Die 2 Novemb. horâ 9 min 30, jam longè alium referebant situm; siquidem tres utique in oriente, & unica duntaxat in occidente erant conspicua. Præterea verò occidentalis b à Jove 4 min. aberat; e 10 min, c & d verò, cùm à se invicem, tum à Jove pari interstitio, unius scilicet minuti, disjungebantur. Cæterum notandum, quòd, hoc ipso tempore, circa Jovem, sex fixæ diversæ magnitudinis observatæ sint; quas tamen in præfens diagramma referre supervacaneum esse duxi, cùm illas ipsas jam cap. IV. pag. 64 delineatas dederim.

129. Die 3 Novemb. horâ 9, tantùm tres jovi adstabant, media distans à Jove 1½ min. in Auftrum deflectebat; duæ autem extremæ, in rectâ lineâ principi apparituram faciebant: d distabat 4 min. & b 2½ min.

130. Die 7 Novemb. horâ 7 occidentalis b in longissimâ distantia à Jove 14 circiter minorum reperiebatur; c verò 3 min. & d 5½ min.

131. Die 9 Novembr. horâ 10 min. 5, stellulæ in occidente, quanto b à Jove, tanto etiam interstitio, 5 scilicet minorum ab invicem dirimebatur: orientalis verò propinquior, tantùm 2 min. & longinquior 11, abesse videbatur.

132. Die 10 Novembr. horâ 9 min. 15, b minimus Iovi ad sinistram arcetè admodum adhærebat, sic ut non ampliùs 30 sec. ab eo distaret; maxima autem c, 5½ min. remota spectabatur. In altero latere, duæ 1 minut. elongatæ 1½ minut. à Jove discesserant.

133. Die 11 Novemb. horâ 6 min. 15 vesp. ab utroque latere, unica duntaxat stella Iovem sequebatur, b distabat 3½ minut. & c 5 minut.

134. Die 3 Decemb. horâ 7½ vesp. tantæ jovialium animadvertentur distantia: a c, 14 min; a b, 1 min. b c, 40 secund. & c d, 7 minut.

135. Die 4 Decemb. horâ 7 min. 20, occidentales pari intervallo, tum à se invicem, tum à Jove remotæ 4½ min, videlicet conspiciantur: at orientalis paululùm propinquior, quàm die præcedente, 2 scilicet min. Iovi erat facta.

136. Die

136. Die 11 Decem. horâ 7 min. 18, Jovis margini orientali minutissima quædam arcetè inhærebat : in occasu tres Iovem concomitabantur, quarum d $13\frac{1}{2}$ min. elongabatur; sequens c 8 min. & b 4 min.

*Jupiter stel-
lam marginis
stringebat.*

137. Die 13 Decembr. horâ 7 min. 15 denuo Jovis limbo occidentali parvula quædam ferè erat contigua; c verò satis longè 10 nimirum min. removebatur : in oriente d à Jove 3 min. & e, 5 distabat.

138. Die 25 Decemb. horâ 6 vesp. omnes quatuor ejusdem penè magnitudinis, in eâdem omnino rectâ, observabantur : b à Jove 5 min. c, 8 min. d, 12 min. & e, 4 min. aberat.

139. Die 30 Decembr. horâ 4 min. 45 pomerid. omnes quidem iterum aderant, sed quoad splendorem, atque magnitudinem valde erant attenuatæ. Ordo, quem tenebant, hic erat : b à Jove 6 min. c, 2 min. e, $4\frac{1}{2}$ & e ab alterâ d, 20 sec. incedebat.

140. Anno 1644. die 2 Novemb. horâ 10 coordinatio stellarum hæc erat: occidentalis distabat à Jove 6 min. c, $3\frac{1}{2}$ minut. d, 7 min. e verò 16 minut.

*Anno à natu
Chr. 1644.*

141. Die 13 Novemb. horâ 9, min. 25, e orientalis à Jove removebatur $1\frac{1}{2}$ min; b, $3\frac{1}{2}$ min. c verò & d, 6 min. distantes, adeò sibi invicem erant vicinæ, ut ferè nullum daretur interstitium.

142. Die 14 Novembr. horâ 11, tres in oriente deprehendebantur, quarum vicinior minima, boream versùs deflectebat, elongabaturque tantùm 30 sec. à Jove; sequens à b, ut & à remotiori $3\frac{1}{2}$ min. aberat.

143. Die 19 Novembr. horâ 9 min. 45, tardissimus jovialium, penè in remotissimâ elongatione à Jove spectabatur; siquidem ab eo 14 min. removebatur. In occidente b c, 4 min. remotè à Jove, erant vicinissimæ. d iterum ab his distare videbatur 6 min.

*Saturnus Jovia-
lium in
distantiâ pe-
ne longissimâ
observatus.*

144. Die 22 Novembr. horâ 9 min. 45, duæ tantùm in orientali plagâ, in conspectum veniebant : exterior c distabat 10 $\frac{1}{2}$ min. b adeò erat exigua, ut ferè visum fugeret, à Jove non ampliùs $1\frac{1}{2}$ min. aberat.

145. Die 23 Novembr. horâ 10, ab utroque latere duæ obser-

fer.

servatæ: occidentales quidem, sub lineâ perpendiculari sunt deprehensæ, non ultra 15 vel 20 secund. distantes; reliquæ duæ orientales satis spatiose ab invicem elongabantur, nimirum 9 min. Vicinior admodum erat exilis.

146. Die 26 Novemb. horâ 8, eâdem rectâ lineâ, omnes quatuor incedebant: duæ viciniores, tum à se invicem, tum à Iove, pari intervallo, 2 scilicet min. separabantur; at d, 10 min. & e, 16 circ. min. à principe removebantur.

147. Die 30 Novemb. horâ 10, tres duntaxat animadvertimus; hac scilicet in statione, atque distantia: a d, erat 11 min. a b, 3 min. & b c, 4 min.

148. Die 3 Decemb. horâ 7½, tres, quoad splendorem, atque magnitudinem maximè erant conspicuæ. Orientalis in maxima remotione 17 ferè min. spectabatur. Occidentalis verò propinquior 4½ minut. remotior 12 min. abesse à Iove spectabatur.

149. Horâ 9 min. 45, eâdem die quatuor cernebantur; sed b primum ex umbrâ Iovis se evolverat.

150. Die 12 Decembr. horâ 8, quatuor Jovem sequebantur. hoc videlicet ordine; e à Jove erat remota 3 min. b borealis 2½ min. c, 5 min. & d, 15 minut.

151. Die 20 Decembr. horâ 10 min. 15, denuo omnes quatuor in oriente se se offerebant, d Aquilonem versus inclinabat; reliquæ verò rectam constituebant. b à Jove elongabatur tum temporis 2½ minut. atque c, 5 minut. d autem, 9 minut. & e, 16 circiter minut.

Tandem igitur cum Solarium Macularum, tum Jovialium observationibus nostris, sub omnium aspectum positis, ne verbulum quidem superaddere; sed Selenographiæ hujus appendici quoque terminum figere penitus decreveramus. Verum, cum pronuper exinsperatò, exemplum aliquod arctiorum jovialium conjunctionum (quale, hisce in oris, nonnisi post multas certè annorum periodos reverfurum est spectaculum, adeoque vix ulli mortalium, qui nunc vitâ fruimur, contemplari dabitur) animadvertere atque necessariâ diligentia annotare nobis licuerit; pretium operæ esse duximus, ut ejus contemplationis Lectorem scientiæ fideriæ cupidum, imprimis vero Mathematicos,

ricos, Astronomiæ penitiùs gnaros (quibus maximè rei hùjus dignitas, atque utilitas perspecta est) coronidis summæ loco, participes faceremus. Maximè verò inde ad eam operam sumus impulsì, quòd isthæc observatio, methodo illi, quam circa stellarum occultationes, & transitus tenendam esse, suprà docuimus, multum luminis sit allatura, eaque omnia, quæ fortè alicui adhuc aliquantò obscuriora ibidem videntur, vel à me dicta sunt, præter opinionem, minùs perspicuè, multò planiora reddet.

Sed ut paucis tamen nos expediamus, ecce tibi illicò ipsam observationem conjunctionis Iovis & Lunæ : quæ certè tantò magis annotari meretur, quantò rariùs unquam eo modo obvia est : cùm tempore veræ primæ quadraturæ, sive circa phasin Lunæ bisectæ, contigerit : nec non verò etiam rationem universam, in observationis opere à nobis sedulò adhibitam. Primò quidem, non solùm altitudines quarundam stellarum, genuini scilicet temporis eliciendi causâ, investigavimus; sed & diversas Iovis à cuspide Lunæ superiori, vel ejus à limbo elongationes, secundùm normam infallibilem, Macularum, puta, quarundam Lunarium distantias, accuratè annotavimus. Quasq; elongationes omnes & singulas, etiam in ipsis minutis (utpote quod, cognitâ tantùm Lunari diametro, nimis quàm facile præstare in proclivi est) determinavimus; minimè neglectis quoq; illis, sive Maculis Lunaribus, cum quibus Iupiter, quovis observationis momento, rectam omnino constituebat lineam, sive istis etiam Maculis, quæ tum sub eâdem lineâ perpendiculari se se offerebant; quarum videlicet ope, gradus Lunæ verticalis, atque cuspidum inclinatio rectè semper innotescit. Idque in universum non nescire maximè utiq; nostrùm refert. Nam hinc totum planè hujus negotii fundamentum, ac certitudo unicè dependet : dum his probè animadversis, errores, qui hætenus circa ejusmodi observationes nonnunquam fuère commissi, nullo sanè labore cognoscuntur ac deteguntur. Atque ita demum omnia, quæ oportuit curâ, annotata, ordine in tabellam, more nostro, conjecimus; superaddito ipsius transitus, sive conjunctionis typo.

*Observatio
conjunctionis
Jovis & Lu-
næ.*

*Typus transi-
tus Jovialis.*

Z z z

Eo que

APPENDIX TRANSITUS JOVIS, GEDANI,

Anno Æra Christiane 1647. Die 12. April. st. n. vesp.
observatus.

O scilla quatio.	Altitudo	Tempus	Quanam Macula	Distantia Jovis à cuspide Cum quibus Maculis
	dines Arcu- ri Quad. av- tecepta.	supputatum.	sub eadem line à perpendi- culari fuerit observata quinam gradus veritatis, et quanta inclinato cuspidum existerit?	Luna superiori cum per Macularum Lunaribus, Jupiter, quorum tempo- distancia, tum quod in ipsi minutis, ac- curate determinata.
	o /	Hor. /		
1.	39 40	9 15 40		
2.	40 5	9 19 16	Byzantium & M. Æmon.	Distantia 45. circiter minut. deprehen- debatur.
3.	41 5	9 26 11	Unde elucec 40. Luna gr. fuisse verticalis: sic ut 8 gr. cuspidi scilicet superior disti- terit, occasum versus.	
4.		9 38 10		Distantia 40. circiter erat minut.
5.		9 59 0	Mons Ligustinus & I. Be- sbica quo tempore 47. gr. existit verticalis: cuspidi ve- ro superior elongabatur à puncto Zenith 15 gradibus.	Distantia 36. circiter minut. animad- versa.
6.	45 58	10 4 15		Distant. aquabatur diametro Cebocæ, secundum Keplerum 32. min. 42. sec.
7.	48 5	10 22 23		Jupiter tanto intervallo à cuspide Luna superiori, quanto dista cuspidi ab Insula Cypro removebatur. hoc est 22. minut.
8.	49 40.	10 37 7		Distant. erat aequalis distantia inter cu- spidem sup. & M. Sippium, h. e. 18. min.
9.	51 0.	10 50 20		Distant. jam minor diametro Lunari, ut Besbica scilicet à cuspide super, hoc est, 13 minut. estimabatur.
10.	51 3	11 1 24	M. Serrorum & I. Apollo- nia major culminabat itaq; 53. gr. Luna: ac cuspidi 21. gr. à puncto Zenith distabat	Distant. non excedebat intervallo inter Ins. Besbicam & Montem Serrorum, hoc est 12 min. 30. sec.
11.	52 20	11 4 49		Jupit. non ampliori intervallo elonga- batur à cusp. sup. quam hac dist. ab- esse videbatur à Ne. o. gent. h. e. 8. m. 30. sec
12.	52 43	11 9 19		Distant. inter M. Æmonem & cusp. sup. plane aquabatur distantia Jovis inter & eandem cuspidem. h. e. 8. circiter minut.
13.		11 11 5		Dist. Jovis à cusp. erat similis distant. M. Carpatis & I. Besb. h. e. 6. min. 30. sec.
14.	53 10	11 14 50		Tempore scilicet vera conj. Jupit. tanto certe intervallo distetit à cusp. sup. quā- to M. Serr. abest à M. Argent. h. e. 6. min.
15.		11 21 30		Dist. J. à cusp. sup. retrū accedebat ad dist. inter Ins. Besb. & M. Carp. h. e. 7 m.
16.	Altitudo Lyx.	11 23 30		Dist. J. à cusp. sup. non deprehende- batur major dist. inter I. Besb. & M. Ser- rorum, h. e. 8. min. vel parum amplius.
17.	34 25	11 30 9		Jupit. tanto removebatur spatio à limbo J. quanto abesse videtur Insula Apollonia à M. Serrorum, hoc est. 9. minut.
18.	30 0	11 41 39		Jupit. non majori intervallo elonga- batur à limbo, quam I. Besb. à cusp. sup. distare deprehenditur, h. e. 13. minut.
19.	35 33	11 59 55	I. Apoll. major & M. Carp. sub eadem perpendiculari li- nea reperiebantur: sic ut ce- tum sit 54. gr. existisse verti- cales, & cusp. 23. gr. abfuisse à puncto Zenith.	Distant. inter Jovem Lunæ limbum, erat denud aequalis distantia, inter cuspi- dem ejus sup. & Montem Sippium, hoc est 18. minut.

*Transitus Iovis,
GEMAS,
Anno à nato Christo, 1647, Die 32 April.
observatus.*



fig. 222.

Autor Scaliger.

Eoque sine præterea planè novam, eamque minorem Lunæ effigiem, nec hucusque à nobis exhibitam, nec à quopiam tentatam, profectò haud sine (si fas est dicere) insigni labore delineatum ivimus: quippe quòd sic omnes Jovis à Lunâ distantias, unicâ complecti pagellâ commodum fuerit, quòd alioquin, usurpatâ majori Lunæ facie, fuisset prorsus impossibile. Adhæc tamen Maculæ, earumque proportionés, in hæc figurâ, eâdem omnino diligentia, ac in reliquis quibuscunque factum est majoribus, sunt adumbratæ; ita ut nullam planè Maculam, quantumlibet minimam, (de difficultate operis, tu, me tacente, Lector, judicabis) reliquam fecerimus. Advertas autem velim, quòd lineæ punctim à Lunæ limbo, ad quemvis Jovis situm se se vertentes, commonstrant, cum quibus Maculis, quâvis statione, Jupiter in eâdem visus fuerit lineâ: numeri verò, iisdem lineis appositi, observationis ordinem significant; ne non sic ipsa tabula, cum schemate adjecto, conferri negotio nullo queat.

Autor, quare novam planè effigiem Lunarem adumbraverit?

Sed & hoc animadvertendum hîc habes, quòd is ipse typus, eam prorsus inclinationem præ se ferat, quam, tempore veræ conjunctionis, ipsa Luna (dum scilicet eandem rectam lineam, cum confinio luminis & umbræ constituebat, nec ultra 6 minutis à cuspide elongabatur) revera exhibuit; neglecto, quòd inclinatio, sub observationis principium, minor, & circa ejus finem, major fuerit deprehensa: at verò tamen hac vice lentè admodum Lunæ inclinatio se variabat, idque eapropter, quia angulus occidentis parùm variabilis extitit.

Inclinatio typi.

Cæterùm, denuò iterum in majorem fidem eorum, quæ capite 55. fol. 439. & capite 56. fol. 477. de Planetarum diametris dicta sunt, Jovis dimetientem, Macularum ope, quàm accuratissimè fieri potuit, observavimus. Deprehendimus itaque illam, haud majorem Monte Crago, in Asiâ minori, non procul à Montibus Sipylo Didymoque sito: cujus quidem Montis Cragi diameter, vix $\frac{1}{14}$ partem, accuratâ expensione, totius Lunæ dimetientis, æquat. Hincque datâ Lunæ diametro, secundùm Severinum Longomontanum 33. minut. 58. secund. diameter Jovis vix unico constat minuto: secundùm verò Keplerum, datâ diametro 32 min. 42. secund. tantùm $57\frac{1}{2}$ secund. At secundùm Gassendi proportionem, diametri Lunaris 31. mi-

Autor denuò Jovis diametrum visibilem metitur.

Quantâ fuerit deprehensa?

*Diameter
Jovis longè
minor, quam
unquam pu-
tarunt.*

*Joviales, tẽ-
pore transi-
tus, clarè af-
fulgebant.*

*Jovialium
ordo.*

nut. 6. sec. tantum 55. sec. Iove scilicet circa Apogæum versante, ejus diuinentem constare dicendum. Unde jam satis superq; fit manifestum, diametrum Iovis visibilem longè sanè minorem, quàm hætenus omnes antecessores nostri putarunt, reperiri.

Et jam ultimò autem notandum occurrit, quòd, licet Luna lumine satis aucta, Jovique admodum vicina modò extiterit; nihilominus joviales perquam clarè se se conspiciendos præbuerint. Initiò quidem non nisi duo oculos feriebant; circa medium verò observationis, tertius quoque, reliquorum minimus, ex umbrâ Jovis primùm emergens, non minùs occurrebat: at omnes illi tres occidentem versùs micabant: extremo ad sex diametros Jovis à Principe suo remoto, intermedio ad unam diametrum, & vicinissimo, ad semidiametrum vel aliquantò magis: quemadmodum omnia ista modò dicta, in adjuncto schemate, circa Jovem (qui iridem suam veram secundùm Maculas hîc refert magnitudinem) sunt in præpatulo. Hæc itaque fuere, quæ quàm brevissimè hoc loco adhuc proferre, & de paulò minùs solito isto Jovis occurfu publicare voluimus. Cum autem, mi Lector, jam nihil omnino restare videatur, quod ad præsens faciat institutum, de observationum harumce nostrarum, cum Selenographicarum, tum reliquarum omnium, tabulâ manum tollimus; hoc nobis de benevolentia & bonæ mentis tuæ indole certò polliciti, futurum, ut æque intentos admoturus sis operi nostro oculos, atq; nos in Cœlum nunquam non defixos hætenus habuimus, ut hæc nobis innotescerent, quæ tecum ingenuè communicavimus: quo cognito, animi nobis profectò addentur, ut, cum DEO & die, plura hujus generis, maximo studio, privatim venemur, & optimo animo publici faciamus juris.

F I N I S.

NON NOBIS, SED NOMINI TUO,
DOMINE, GLORIA.

TU NOS CREAMI, TU OMNIA.

INDEX RERUM

549

HOC OPERE COMPRE- HENSARUM.

A.	pag.	A.	pag.
A ër quò remotior, eò purior.	<u>196</u>	Aspectuum divisio.	<u>184</u>
A ër modò crassior, modò tenuior evadit.	<u>196</u>	Asperitas quomodo cognoscatur?	<u>138</u>
A ëris tres sunt regiones.	<u>196</u>	Altra, sensitivà animà esse prædita.	<u>155</u>
A tas posterior sæper aliquid novi apportat.	<u>41</u>	Astronomia nondum ad perfectionis cul- men pervenit.	<u>441</u>
A tatem Lunæ num ex phasium quantita- te conjicere liceat?	<u>444</u>	Aura ætherea quid sit?	<u>156</u>
A tatem phasium explorandi modus.	<u>445</u>	Autor stellas quamplurimas Telescopio derexit.	<u>34</u>
Alani montes Lunares admodum sunt excelsi.	<u>83</u>	Autor stellas fixas rotundas deprehendit.	<u>36</u>
Alhafen & Vitellio doctrinam de refractioni- bus tradiderunt.	<u>2</u>	Autor censuram Lobkowitzii, judicio Gas- sendi oppositam, examinavit.	<u>55</u>
Alphonfina terram in centro immobilem statuunt.	<u>160</u>	Autor Martem dimidiatum observavit.	<u>67</u>
Alteratio in Sole major, quàm in terrâ.	<u>92</u>	Autor Macularum Solarium observationes instituit.	<u>83</u>
Alterationis & corruptionis vestigia in So- le deprehenduntur.	<u>77</u>	Autor negat, superficiem Lunæ esse specu- lum planum.	<u>127</u>
Angulus Eclipticæ & verticalis, quomodo investigandus?	<u>103</u>	Autor certis conditionibus promittit se sestæ peripateticæ additum fore.	<u>142</u>
Angulum orbitæ Lunæ & Eclipticæ ex ob- servatione determinare.	<u>471</u>	Autor, cur motum Lunæ non per orbitam Ellipticam explicaverit?	<u>169</u>
Annus Lunaris determinatur.	<u>295</u>	Autor, quibus nominibus phases suas ap- pellaverit?	<u>181</u>
Antiqui varias de Lunâ foverunt opiniones	<u>110</u>	Autor, quibus rationibus ad delineandas Lunæ phases sit commotus?	<u>206</u>
Antonii de Rheità s. superadditi joviales, num fuerint erronei?	<u>49</u>	Autor, quibus sit incitatus ad opus Seleno- graphicum suscipiendum?	<u>207</u>
Antonii de Rheità pseudojoviales.	<u>52</u>	Autor in principio de feliciori observatio- num progressu admodum dubitavit.	<u>211</u>
Apenninus mons in Lunâ penè altissimus.	<u>394</u>	Autor motum librationis explorandum statuit.	<u>213</u>
Apogæi motus.	<u>171</u>	Autor qualem elegerit modum celandi?	<u>219</u>
Apides quid sint?	<u>170</u>	Autor, priusquam incuriæ accusetur, neces- se est ut prius omnia probè examinètur.	<u>229</u>
Areolæ quædam clariores, in obscuratâ Lunæ parte.	<u>135</u>	Autori primò visum præclarissimorum Ma- thematicorum nomina Maculis Lunæ imponere.	<u>224</u>
Areolæ lucidiores quid sint?	<u>135</u>	Autor, cur sententiam mutaverit?	<u>224</u>
Aristoteles unde Cœli incorruptibilitatem collegerit?	<u>93</u>	Autor Maculis Lunaribus nomina Geogra- phica indidit.	<u>225</u>
Aristoteles galaxiam haud cognovit.	<u>120</u>	Autor, quænam nomina locorum elegerit?	<u>226</u>
Aristoteles fingit in Cœlo sphaeras reales.	<u>155</u>	Autor omnes phases manu suâ æri incidit.	<u>213</u>
Aristotelis autoritatem, Peripatetici ni- mum attendunt.	<u>139</u>	Autor totas observavit Lunationes.	<u>250</u>
Aristotelici, Lunam constare ex materia clariori ac incorruptibili, ajunt.	<u>114</u>	Autor, qualem figuram generalem iniriò construxerit?	<u>125</u>
Aristotelici Lunam quintam esse essentiam statuunt.	<u>114</u>	Autor, quare novam planè effigiem Luna- rem adumbraverit?	<u>547</u>
Aristotelici quomodo incorruptibilita- tem probent?	<u>118</u>	Autor Jovis diametrum visibilem metitur.	<u>547</u>
Aspectus quid sit?	<u>183</u>	Z z z 3	Betti-
Aspectuum genera quoruplicia sint?	<u>183</u>		
Aspectuum distinctiõnes.	<u>183</u>		

B.		Pag.	Pag.
Bertinus nunquam montes in peripheriâ conspexit.	142	Cornuum in Lunâ unde diversa existat inclinatio?	309
Bettini & Agvilonii opinio, de montibus Lunaribus.	139	Corniculata Luna, præfente Sole, visa.	282
Bettini argumeta contra montes Lunares.	139	Corniculata Luna, citius de die, quàm de nocte spectatur.	282
Bettini argumenta refutantur.	140	Corpus opacum lumini resistit.	113
Bettini argumentum invertitur.	144	Corpus opacum umbram projicit.	113
Bisecta Luna crefcens.	336	Corpus asperum, à lævi, quâ ratione cognoscatur?	133
Bisecta Luna decrefcens.	388	Corpora phærica, quò asperiora, eò universalius de se spargunt lumen.	133
Bisectæ Lunæ pars obscura, minor parte illuminatâ.	391	Corpora quò altiora, eò minor existit parallaxis.	186
Biquintilis.	184	Creaturæ si dantur viventes in Lunâ, melior est ratio earum quæ colunt inferius Lung hemisphæriû, quàm quæ superius.	294
Bullialdi observationibus libratio confirmatur.	436	Crystalus montana, in Tubospicillis quid præstet?	9
C.		Cujus phæcos momentum facilius cognoscatur?	391
Catalogus nominum, Lunæ locis indicatorum.	228	Cum tempore multa detegentur.	121
Catoptrices principia.	30	Curvarum linearum variz species.	312
Chordarum nulla ad Eclipticâ inclinatio.	514	Curfus macularum, dierum 13. 505. 516.	517
Circumjovialium distantiam, ab ipso Jove, capiendi modus.	66	Curfus macularû ex parte <i>rectilineus</i> . 502.	520
CircumSaturnales & circumMartiales fuerunt fixæ.	65	Curvitas & inclinatio itineris macularum.	503
Circulus ut Ellipsis interdum apparet.	126	Curfus macularum dierum 14.	505
Claramontii opinio, de maculis Lunaribus.	122	Curfus macularum Solarium dierum 12½.	508
Claramontii opinio, de Lunæ lumine.	115	Curfus macularum curvilineus.	513; 522
Clarus ille in Lunâ circulus, an sit reale ali-quod phænomenon?	305	Curvitas itineris macularum decrefcit.	517
Cælum esse corruptibile unde probetur?	91	Cuspides luminosæ quid sint?	265
Cælum an sit corruptibile?	153	Cuspidum illuminatarum maxima distantia, à lucis termino.	266
Cælum esse igneum.	154	Cuspidum variatio Lunæ unde oritur?	332
Cælum, an sit mobile?	155	Cuspidum variationem rectè determinare, artificiosum est.	332
Cælum si sit durum, quid sequatur?	157	Cuspidum variatio quanta?	333
Cæli datâ fluiditate, omnia phænomena fervantur.	157	Cuspidû variatio habet suas inæqualitates.	341
Cæli motus triplex.	161	Curfus macularum plus minus dierum 12.	524
Cælum unicum, idque liquidum.	157	D.	
Cælestia corpora, harmonicè disposita.	109	DEI opera immensa & admiranda.	76
Color certum est argumentum opacitatis.	118	Decilis.	184
Cometarum situs, ex parallaxi, cognoscitur.	188	Demonstrationes Tuborum, quinam Auctores tradiderint?	14
Concavi & convexi speculi differentia.	128	Denfiores & rariores partes quid sint?	141
Confinium Lunaribus lucis anfractuofum.	135	Denfiores & rariores partes, non variant luminis aspectum.	141
Conjunctio quid sit?	183	Diameter Lunæ visibilis variatur.	202
Continens Lunæ, colorem minimè mutat.	258	Diameter Lunæ quanta?	203
Constans Solis macula.	513	Diameter Lunæ in milliaribus <i>determinata</i> .	203
Copernicus instaurator Pythagoricæ hypotheseos.	163	Diameter phasium, quantæ magnitudinis assumpta.	214
Cornua Lunæ, tum ortum, tum occasum respiciunt.	180	Dia-	
Cornua Lunæ, modò acutiora, modò obtusiora.	390		

	<i>pag.</i>		<i>pag.</i>
Diameter Lunæ apparens.	<u>383</u>	Ellipses quantitatem, rarò observatores rectè determinant.	<u>452</u>
Diametri fixarum, quomodo possint observari?	<u>28</u>	Eclipses Solares, per machinam observare Heliofopicam.	<u>105</u>
Diameter Lunæ visibilis, num satis sit cognita?	<u>448</u>	Eclipses Solares, sæpissimè densissimas invexerunt tenebras.	<u>115</u>
Diametri stellarum minores, quàm veteres putarunt.	<u>447</u>	Eclipses Solis, in camera obscuratà, nudis oculis inspiciunt, apparent minores quàm revera sunt.	<u>286</u>
Diametri stellarum accuratius armato, quàm nudo oculo investigantur.	<u>447</u>	Eclipses rectè annotari, Astronomiz multum interest.	<u>453</u>
Diametri stellarum optimè per maculas Lunares definiuntur.	<u>448</u>	Eclipses accuratè observare absq; peripicillo impossibile.	<u>453</u>
Diametros stellarum nova dimetiendi ratio.	<u>447. 449</u>	Eclipses Lunares observandi ratio.	<u>454</u>
Diaphanum omnium colorum est experts.	<u>118</u>	Eclipses rectè observare, est res magni momenti.	<u>468</u>
Dies certi ad observationes longitudinum constituendi.	<u>485</u>	Eclipsium Lunarium varius color.	<u>116</u>
Dierum & noctium, vicissitudinumque in Lunà ratio.	<u>293</u>	Eclipsium Lunarium color unde?	<u>116</u>
Differentia inter maximam & minimam librationem.	<u>279</u>	Eclipsium observationes minis emendatè veteres administravere.	<u>451</u>
Differentia evidens, inter duas phases, æq; distantes ferè à Sole.	<u>308</u>	Eclipsium initia & fines rectè annotare, valdè est lubricum.	<u>456</u>
Differentia notabilis, inter phases hæcenus in ☉ & ☿ observatas.	<u>315</u>	Eclipsium Lunarium quantitatem rectè investigare.	<u>461</u>
Dilatatio & compressio macularum, diversis temporibus diversa.	<u>323</u>	Eclipsium phases alius dijudicandi modus.	<u>467</u>
Dimidiatà Luna.	<u>340</u>	Eclipticæ, & Æquatoris variatio, si uterq; circulus ex Lunà conspiceretur.	<u>295</u>
Dimetiendi locorum Lunarium distantias ratio.	<u>254</u>	Eclipticam macularum Solarium inveniendi ratio.	<u>104</u>
Disciplinæ, artesque mechanicæ, hoc nostro seculo maximè crevere.	<u>1</u>	Elliptica phasium linea, quomodo intelligi debeat?	<u>314</u>
Distantiam Lunæ à Sole ex phasibus inquirere.	<u>444</u>	Eminentiz ex umbris cognoscuntur.	<u>138</u>
Diurnus motus apparens, in Lunà nullus deprehenditur.	<u>301</u>	Epicycli Lunares.	<u>173</u>
Diurna spatia, circa quadraturas, velociter crescunt & decrescunt.	<u>320</u>	Epicyclorum & Eccentrici Lunæ portio.	<u>175</u>
		Epicyclorum centrorum motus.	<u>176</u>
		Exemplarissima visæ novissimæ & primæ Lunæ, die Synodici.	<u>275</u>

E.

Eclipsis Solis observata Anno 1645.	<u>106</u>
Eclipsis terræ maxima, in Lunà quousq; se se extendat.	<u>296</u>
Eclipsis Solis, quando in Lunà fiat, & quanta?	<u>297</u>
Eclipsis Lunæ, semper nudo oculo minor, quàm est, apparet.	<u>452</u>
Eclipsis pro diversâ pupillæ dilatatione, modò major, modò minor spectatur.	<u>452</u>
Eclipsis Jovialis.	<u>532</u>
Eclipsis Lunæ observata Anno 1646.	<u>462</u>
Eclipsis Lunæ instituta Anno 1647.	<u>463</u>
Eclipses Lunarum typus	<u>466</u>
Eclipsis Palilicii Gedani observata.	<u>472</u>
Eclipsis Palilicii altera ibidem instituta.	<u>473</u>
Eclipses Solaris schema.	<u>106</u>

F.

Fabrica cujusdam instrumenti, per quod longitudines Eclipsesq;, modo haud vulgari annotantur.	<u>482</u>
Fabricam facilioris cujusdam machine Heliofopicæ, Autor proponit	<u>100</u>
Facies tabulæ generalis phasium.	<u>262</u>
Faculæ Solares quid sint?	<u>84</u>
Faculæ fulgentes.	<u>505</u>
Faculæ rarò maculas præcedunt.	<u>503</u>
Faculæ interdum in parente Solis hemisphere totum absolvunt cursum.	<u>509</u>
Facula spectabilis, illiusque amplitudo.	<u>506</u>
Facularum Solarium affectiones.	<u>82</u>
	Facu-

	Pag.		Pag.
Facularum distinctio.	87	Hypotheseos Tyconicæ adumbratio.	163
Facularum admiranda magnitudo.	87	Hypotheseos Pythagoricæ descriptio.	163
Facularum mora dierum circiter 13.	129	Hypotheseos Copernicanæ ordo orbium.	164
Figura primaria maximè notabilis.	410	Hypotheseos Copernicanæ effigies.	168
Figuræ primariæ facies.	410	Hypothesium Astronomicarum inventio, ingeniosissimum quid.	158
Firmamentum ex quonam consistet elemento?	154	Hypothesium diversæ inventiones;	158
Fixæ non omnes à Sole æqualiter remotæ.	166		
Fixæ & aliqui Planetæ, cur scintillent?	38	L	
Fixæ, quare majores, quàm sunt, appareant.	38	I Conismorum duorum primariorum differentia.	454
Fixæ hæcenus incognitæ.	533. 536	Illuminatio Lunæ.	180
Fixarum & Solis distantia.	166	Imaginatio & conceptio humana admodum debilis.	120
Fixarum diametros determinare.	450	Inæqualitas & varietas phasium unde?	317
Foramina tubi diversâ, ad fixas rectè lustrandas.	37	Inclinatio sectionum, in quonam loco sit maxima?	314
Foramine angustiiori uti ad Mercurium necesse est.	74	Inclinatio Plenilunii Æstivi.	359
Fusa dissertatio de stellis Urban-octavianis.	58	Inclinatio Lunæ in nonagesimo variatur.	359
G.		Inclinatio Typi transitus Jovialis.	545
Galilæus stellas quamplurimas detexit	33	Inclinatio Lunæ, circa horizontè maxima.	360
Galilæus nonnisi fixas semper scintillantes Tubo conspexit.	36	Inclinatio admodum varia.	364
Galilæus, quid ope perspicilli detexerit?	205	Inclinatio cornuum Lunæ Indies variatur.	405
Galilæus nondum nativam Lunæ faciem delineando affectus est.	205	Inclinatio cornuum, num ritè determinari possit?	405
Gassendi observationibus, revolutio librationis stabilitur.	435	Inclinatio cornuum, quâ viâ investigetur?	406
Geographia, absque nominibus, nemini perceptibilis.	223	Inclinationis motus cupidum, fusiùs declaratur.	327
Generaciones & corruptiones, cur in Luna nullæ deprehendantur?	118	Inclinationem invenire ad quamcunque datam horam.	364
Generationem dari in Sole, probatur.	92	Inclinationes diversæ Lunares Dantiscanæ, schemate exhibentur.	361
Globi systematis Planetarii, ad semidiametrum firmamenti proportio.	166	Inclinationes delineandi ratio.	361
Globi Lunaris fabrica.	493	Inclinationes Lunæ Dantiscanæ, in principiis signorum adumbratæ.	363
Globi Lunaris typus.	495	Inclinationes rectè determinare labor est.	364
Globi terreni certa pars, cum Lunæ hemisphærio patente, optimè convenit.	225	Inclinationes quascunque Plenilunii ope versatilis representare.	364
Globum construere Lunarem.	492	Inclinationes phasium, tempore Eclipsæ.	457
Gradus limbi Lunæ verticalis, quomodo exploretur?	459. 481	Inclinationes harum phasium quomodo hæcenus investigatæ fuerint?	457
H.		Inclinationes Eclipsium, quâ viâ acquirendæ?	457
Helioscopii usus & fabrica.	22	Inconstantes maculæ Solares.	511. 513
Helioscopium ex quovis Telescopio construere.	23	In Luna possunt esse res planè à nostris diversæ.	119
Horizonti asperitas, arguit locum esse montosum.	148	In observationis negotio, non possumus nimis esse curiosi.	460
Hyperboreus lacus variatur.	315	Instrumentum peculiare, ad Telescopia sustentanda.	40
Hyperboreum mare.	397	Instrumenti ejusdem structura.	40
Hypothesi Kepleri, reliquarum haud potestrema.	169	Insula Sicilia, modò obscurior, modò luminosior apparet.	345
Hypotheseos Ptolemaicæ ordo spherarum	160	Insula Cercinna.	355. 400
Hypotheseos Ptolemaicæ Alphonsinæ delineatio.	161	Insu-	

	<i>pag.</i>
Insula Rhodus.	<u>356</u>
Insula Macra.	<u>382</u>
Inscriptiones & tituli phasium. cui bono?	<u>319</u>
Insulæ ac valles Lunares, quare circa medium plerumque rotundæ apparent?	<u>259</u>
Interstitium inter Saturni & stellarum fixarum spheram, minimè est vacuum.	<u>166</u>
Invisibilis esset Luna, si speculum esset sphericum.	<u>130</u>
Jovis facies.	<u>44</u>
Jovis circulatorum natura, & proprietas.	<u>46</u>
Jovis diameter quanta?	<u>449-547</u>
Jovis Eclipsis.	<u>475</u>
Jovis & Lunæ conjunctio, propemodum centralis.	<u>476</u>
Jovisingressus & egressus, quam plagam versus fuerit notatus.	<u>476</u>
Jovis diameter, tempore Eclipsæ, quanta?	<u>477</u>
Jovis occultati observatio & typus.	<u>477</u>
Jovis initium occultati, Regiomonti observatum.	<u>478</u>
Jovis transitus Dantisæ animadversus.	<u>478</u>
Joviales maculæ, ab Autore detectæ.	<u>45</u>
Joviales, quanto intervallo à Jove removeantur?	<u>47</u>
Joviales se mutuo tangunt.	<u>533</u>
Jovialis joviale occultat.	<u>533</u>
Jovialis à conjunctione veniens.	<u>534</u>
Jovialis ab ipso jove tectus.	<u>532</u>
Joviales habent suas latitudines.	<u>527</u>
Jovialium conjunctio notatu digna.	<u>528</u>
Joviales tempore transitus jovis clarè affulgebant.	<u>548</u>
Jovialium ordo tempore transitus jovis.	<u>548</u>
Jovialium <u>conjunctioes & Eclipses 46.537.540</u>	<u>540</u>
Jovialium observationes.	<u>45.46</u>
Jovialium orbis, Eclipticæ sunt paralleli.	<u>47</u>
Jovialium motus periodicus est inæqualis.	<u>47</u>
Jovialium visibilis diameter variatur.	<u>48</u>
Jovialium Planetarum nunquam plures, quàm 4. conspècti.	<u>48</u>
Jupiter 4. exiguis Planetis circumdatus.	<u>45</u>
Jupiter occultatus, quâ parte emerferit?	<u>475</u>
Jupiter per quasnam transiverit maculas?	<u>476</u>
Jupiter jovialem texit.	<u>533</u>
Jupiter stellam margine stringit.	<u>543</u>
Jovis comites, modò majores, modò minores apparent.	<u>526</u>
Judei primam phasim diligenter observarunt.	<u>273</u>

K.

Kepplerus nullum unquam dari posse perfectum Plenilunium, statuit. 368

L.

L atitudo Lunæ ex lucis confinio investigatur.	<u>443</u>
Latitudinem, Plenilunii tempore, explorare.	<u>443</u>
Lens plano-convexa, quid præstet?	<u>13</u>
Lens plano-convexa brevior reddi tubum, quàm utrinque cava.	<u>13</u>
Lens utrinque concava, concavo-planâ est præstantior.	<u>14</u>
Lentes convexæ & concavæ, unde suam duxerint originem?	<u>2</u>
Lentes oculis admodum sunt utiles.	<u>2</u>
Lentes perpolire, insignis est opera.	<u>3</u>
Lentes conicæ hæctenus nondum elaboratæ.	<u>3</u>
Lentes convexæ, quid in Telescopiis, & cameris obscuratis præstent?	<u>4</u>
Lentes convexæ & atque concavæ, quomodo elaborentur?	<u>6</u>
Lentes & globuli, necesse ut exquisito consentent spheræ segmento.	<u>8</u>
Lentes quænam ad Telescopia sint eligendæ?	<u>9</u>
Lentes perfectæ sectionis, quâ ratione discernantur?	<u>9</u>
Lentes, quomodo perfectè expoliri possint?	<u>10</u>
Lentes nimis excavatæ, objecta perquam obscura reddunt.	<u>13</u>
Lentes convexæ obtusiores, præstant acutioribus, in augendis rerum speciebus.	<u>14</u>
Lentes in Poleoscopio, brevior emigunt distantiam, quàm in Telescopio.	<u>27</u>
Lentium varia forma.	<u>3</u>
Lentium differentia.	<u>3.4</u>
Lentium usus.	<u>3</u>
Lentium comburentium differentia.	<u>4</u>
Lentium variam cognoscere figuram.	<u>10</u>
Lentium notæ perfectè expoliarum.	<u>10</u>
Lentibus nimia politura est inutilis.	<u>10</u>
Lentibus convexis & concavis applicanda regula communis.	<u>13</u>
Levis est dicere quàm facere.	<u>220</u>
Libratio aliqua disci in Lunâ deprehenditur.	<u>112</u>
Libratio fit circa polos proprios.	<u>236</u>
Libratio ex motu Lunæ proprio oritur.	<u>238</u>
Libratio admodum intricata.	<u>239</u>
Libratio ratione latitudinis variatur.	<u>239</u>
Libratio varias gignit vicissitudines.	<u>240</u>
Libratio phæos corniculatæ.	<u>284</u>
Librationis periodus.	<u>239</u>
Librationis spatium, quantum?	<u>245</u>
Librationis interstitium verum, apparente majus.	<u>246</u>

	Pag.		Pag.
Librationis centra.	248	Luna an sit omnium rerum planè vacua?	119
Librationis motus stabilitur.	341	Luna nonnunquam partem fatis magnam hemisphærii latentis nobis obvertit.	122
Linea veri & visi loci differentia.	186	Luna Solis lucem, ratione opacitatis sui corporis, per reflexionem nobis communicat.	123
Linea veri & visi loci parallaxin determinat.	188	Luna cur non formam speculi plani representet?	125
Linea mare interfecans Lunare, nonnunquam aspera.	345	Luna non est speculum concavum.	127
Lineæ visionis & obscurationis in Lunâ, quomodo à Sole & terrâ fluant?	291	Luna nec speculum est convexum.	128
Loca Lunæ clariora, valles sunt.	221	Luna si esset speculum sphericum, Solis imago, instar minutissimæ stellulæ appareret.	130
Longitudinem & latitudinem ex nudo Lunæ aspectu, indagare.	441	Luna, quânam superficie sit prædita?	131
Longitudines locorum optimè per Eclipses & occultationes indagantur.	480	Luna, quomodo lucem communicet?	131
Longitudines locorum investigare Mathematici magnoperè allaborarunt.	479	Luna, unde omnibus æqualiter luminosam se exhibeat?	132
Longitudines locorum scrutandi nova ratio.	481	Luna libratur.	145
Longitudines investigandi rationem examinare.	486	Luna, quali constet materiâ?	148
Longitudines locorum ex unicâ statione, per maculas indagare Lunares.	487	Luna Apogæa cur tarda?	176
Longitudines inveniendi alius modus.	490	Luna non prorsus circumvolvitur.	237
Longitudines investigandi tertia ratio.	491	Luna, modò dilatari, modò comprimi, quâ maculas ejus videtur.	238
Longitudines locorum investigandi, quânam sit omnium optimus modus?	301	Luna, primâ die, post coitum, visâ.	273
Lumen Lunæ secundarium, unde existat?	288	Luna cur non, primâ post interlunium die, conspiciatur?	274
Lumen Lunæ secundarium, post ultimam quadraturam, iterum redit.	291	Luna, quando die coitus spectari possit?	274
Lumen secundarium in Lunâ quando valentissimum?	292	Luna nova quando primum 3. & 4. die conspiciatur?	275
Lumen secundarium Lunæ, quando evanescat?	293	Luna prima quando delineata?	276
Lumen secundarium Lunæ, quando debilissimum?	293	Luna prope Solem in Cœli medio conspici potest.	283
Lumen Lunæ secundarium, cur non undiquè sui simile?	304	Luna corpus opacum, asperum atque crassum.	288
Lumen Lunæ secundarium, cur non omni anni tempore idem appareat?	306	Luna quantò crescit, tantò lumen secundarium decrescit.	289
Lumen secundarium, in quâ phasi iterum conspiciatur?	395	Luna ex partibus constat heterogeneis.	351
Lumen secundarium, in phasibus fenescentibus clarius.	400	Luna nunquam minus, quàm cum est plena, illuminatur.	366
Luminis in Lunâ secundarii, vera causâ.	298	Luna quò minus à Sole illuminatur, eò plus de eâ cernitur.	368
Luna quomodo crescat & decrescat?	179	Luna quâ parte limbi decrescere incipiat?	374
Luna parallaxibus est involuta.	192	Luna, ratione pupillæ, modò major, modò minor, apparet.	384
Luna, ob librationis motum, non movetur loco.	236	Luna nunquam prorsus bifecatur.	388
Luna in medio obscuriori clarius clucescit.	116	Luna nunquam plus illuminatur, quàm in conjunctione.	407
Luna cœlestis disciplinæ prima magistra habita fuit.	110	Luna ultima rarè conspicitur.	407
Luna cur sit obscura, & nullo prorsus lumine proprio prædita?	114	Luna Senex.	408
Luna corpus opacissimum.	115	Luna crescens prima.	415
		Luna in quonam signo extet dijudicare?	442
		Luna citius obscurari, nudo visui videtur, contrâ tardius lumen recuperare.	451

	<i>pag.</i>		<i>pag.</i>
Luna ad longitudes locorum indagandas maximè commoda.	<u>480</u>	Lunam partibus constare heterogeneis, unde probetur?	<u>118</u>
Lunæ locum cur DEUS terræ viciniorē assignaverit?	<u>109</u>	Lunam instar speculi radios reflectere, quis statuat?	<u>124</u>
Lunæ faciem referre imaginem oceani, quinam statuerint?	<u>110</u>	Lunam primam quando iterum observandi dabitur occasio?	<u>276</u>
Lunæ Maculæ non sunt variabiles.	<u>111</u>	Lunam non primâ statim die decrefcere, alii statuunt.	<u>374</u>
Lunæ maculæ non sunt simulacra specularia.	<u>111</u>	Lunares maculæ, fixum semper obtinent locum.	<u>112</u>
Lunæ Eclipsatæ rarissima exempla.	<u>117</u>	Lunares partes, quibus rebus comparentur?	<u>134</u>
Lunæ hemisphærium exquisitè diaphanum, patens verò mediadiaphanum tantum esse quisnam statuat?	<u>121</u>	Lunares motus cognoscere, ad Selenographiam rectè intelligendam, valdè conducit.	<u>164</u>
Lunæ pars averfa iisdem constat partibus.	<u>121</u>	Lunares altitudinis parallaxes, quantæ?	<u>192</u>
Lunæ pars averfa, nequicquam proprii luminis particeps.	<u>121</u>	Lunatio crescens secunda,	<u>417</u>
Lunæ superficies planè est aspera atque scabrosa.	<u>131</u>	Lunatio crescens tertia.	<u>420</u>
Lunæ tuberosæ & lacunosæ partes, quid sint?	<u>133</u>	Lunatio decrefcens prima,	<u>422</u>
Lunæ superficies, cur non prorsus sit lævigata?	<u>135</u>	Lunatio crescens quarta.	<u>424</u>
Lunæ pars libratoria, quanta?	<u>145</u>	Lunatio decrefcens secunda:	<u>425</u>
Lunæ asperitas comparatur terræ.	<u>148</u>	Lunatio crescens quinta,	<u>428</u>
Lunæ partes obscuriores, nostris maribus comparantur.	<u>149</u>	Lunatio crescens sexta.	<u>429</u>
Lunæ maculæ majores, nostris sylvis æquiparantur.	<u>149</u>	Lunatio crescens septima.	<u>430</u>
Lunæ clarior pars atque obscurior, quid sit?	<u>151</u>	Lunatio crescens octava.	<u>432</u>
Lunæ motus omnium intricatissimus.	<u>168</u>	Lunationum observationes Selenographiæ utiles.	<u>251</u>
Lunæ motus proprius explicatur.	<u>173</u>	Lunicolæ quomodo tempus commodè distribuere possint?	<u>300</u>
Lunæ pars illustrata, crescit & decrefcit, pro majori vel minori elongatione Lunæ à Sole.	<u>180</u>	Lunicolæ, menstruas phases terræ animadvertunt.	<u>293</u>
Lunæ à terrâ distantia.	<u>202</u>	Lux & color corpora diaphana penetrant.	<u>114</u>
Lunæ soliditas, & circumferentia.	<u>203</u>		
Lunæ velocioris apparitionis tres conditiones.	<u>276</u>	M.	
Lunæ corniculatæ causæ maturioris & tardioris apparitionis.	<u>281</u>	Machina tornatilis ad lentum fabricam.	<u>6</u>
Lunæ plenæ quanta sit pars illuminata?	<u>367</u>	Machina Helioscopica Scheineriana.	<u>98</u>
Lunam, mixturam aëris caliginosi & ignis carbonosi esse, quis statuerit?	<u>111</u>	Machinamentum tornatile ab Autore inventum, quibus aliis inserviat rebus?	<u>8</u>
Lunam pumiceâ esse, Diogenes contendit.	<u>111</u>	Machinæ Helioscopicæ effigies.	<u>98</u>
Lunam corpus esse igneum, menteq; præditum.	<u>111</u>	Machinæ Helioscopicæ ejusdem fabrica.	<u>99</u>
Lunam, Diogenes mobilem circa axes statuit.	<u>112</u>	Machinam Helioscopicam tractandi ratio.	<u>101</u>
Lunam proprium lumen ab unâ parte habere, ab alterâ nullius prorsus luminis esse participem, idem Autor asserit.	<u>112</u>	Macula Solaris nimbo coronata.	<u>84. 500. 502</u>
Lunam partim esse opacam, partim luminis transitum permittere, alii sentiunt.	<u>115</u>	Macula 12. confecit in Sole dies.	<u>500</u>
Lunam Eclipsatam, interdum penitus in Cælo evanescere.	<u>116</u>	Macula biduana.	<u>502. 505. 525</u>
		Macula magna præclaro nucleo prædita.	<u>503</u>
		Macula in orbe Solis extincta.	<u>503. 512</u>
		Macula rara ac sparsa.	<u>504</u>
		Macula sub ipsâ Eclipticâ visâ.	<u>505</u>
		Macula redux.	<u>505. 519</u>
		Macula, torum Solem circumeundo, dies consumsit 27.	<u>505</u>
		Macula primùm crevit, deinde iterum decrevit.	<u>506</u>

	<i>pag.</i>		<i>pag.</i>
Macula in gremio Solis nata, ibidemque extincta.	<u>509</u>	Maculæ aliquot in unam debilem redactæ.	<u>504</u>
Macula unius diei.	<u>510</u>	Maculæ in Faculas accensæ.	<u>504.507.508.520</u>
Macula in ipso horizonte visâ.	<u>513.519.520</u>	Maculæ numero decrecentes.	<u>504</u>
Macula valdè insignis.	<u>519</u>	Maculæ quamvis simul generentur, non sunt tamen ejusdem durationis.	<u>508</u>
Maculæ Solares interdum rutilesunt.	<u>84</u>	Maculæ circa occasum ortæ.	<u>509</u>
Maculæ Solares circa limbum tenuiores.	<u>85</u>	Maculæ quamvis sint ejusdem opacitatis, non tamen æque diu persistunt.	<u>511</u>
Maculæ in Solis disco generantur & cor- rumpuntur.	<u>85.501</u>	Maculæ quamplurimæ in disco observatæ.	<u>514</u>
Maculæ reduces,	<u>86</u>	Maculæ ex Faculis, brevi temporis spa- tio exortæ.	<u>515.519</u>
Maculæ, Faculis umbrisque cinguntur.	<u>86</u>	Maculæ augentur & à se mutuò discedunt.	<u>518</u>
Maculæ, interdum ex umbris nascuntur.	<u>86</u>	Maculæ quotidie se se variantes.	<u>519</u>
Maculæ Solares, sunt corpora realia.	<u>88</u>	Maculæ duæ ex unâ fuerunt procreatæ.	<u>501</u>
Maculæ Solares multò sunt majores, quàm apparent.	<u>88</u>	Macula absque nucleo.	<u>521</u>
Maculæ exortæ circa Solis medium.	<u>523</u>	Macula variabilis.	<u>521</u>
Maculæ Solis secundariæ.	<u>523</u>	Macula redux.	<u>521</u>
Maculæ in certâ Solis parte generantur.	<u>88</u>	Macularum nuclei.	<u>84</u>
Maculæ Solares an sint stellæ?	<u>95</u>	Macularum rariorum affectio.	<u>84</u>
Maculæ diversis modis possunt notari.	<u>96</u>	Macularum nulla circa Polos generatio.	<u>88</u>
Maculæ unde generentur? aliorum opi- nio.	<u>111</u>	Macularum motus triplex.	<u>89</u>
Maculæ nonnullæ Lunares in continuâ va- riatione luminis & umbræ, versantur.	<u>113</u>	Macularum motus localis triplex.	<u>89</u>
Maculæ Lunares colorem mutantes.	<u>137</u>	Macularum motus ratione ascensionis & descensionis Solis.	<u>89</u>
Maculæ Lunares, quare non sint partes ra- riores & densiores?	<u>141</u>	Macularum motus proprius.	<u>89</u>
Maculæ Lunæ majores, loca sunt compla- nata.	<u>147</u>	Macularum Solarium motus, plenior ex- plicatio.	<u>89</u>
Maculæ Lunares, in obscuratâ camerâ, non depinguntur.	<u>208</u>	Macularum motus specie inæqualis, reve- ra autem æqualis.	<u>91</u>
Maculæ Lunares quomodo adumbrentur?	<u>208</u>	Macularum Lunarium genuinam delinea- re proportionem, artis est?	<u>212</u>
Maculæ Lunares, quænam in rectâ lineâ sint sitæ?	<u>252.225.254</u>	Macularum Lunarium proportio quomo- do investigetur?	<u>252</u>
Maculæ Lunares, circa limbum quasi com- primuntur.	<u>259</u>	Macularum Lunæ dilatatio & compressio quando maxima?	<u>223</u>
Maculæ quædâ indies coarctantur, majori lu- mine replentur, atque ægrius cognoscuntur.	<u>319</u>	Macularum situm perpendicularem quo- vis tempore indagare.	<u>481</u>
Maculæ marium Lunarium secundariæ.	<u>348</u>	Macularum mira mutatio	<u>508.513</u>
Maculæ istæ unde?	<u>348</u>	Macularum motus constantissimus.	<u>516</u>
Maculæ Lunares, quare nominibus sint in- signitæ?	<u>222</u>	Macularum quarundam cursus admodum velox.	<u>519</u>
Maculæ in ipsâ superficie paludis.	<u>379</u>	Maculas & Faculas non in aërea existere regione, probatur.	<u>92</u>
Maculæ nigricantiores Ponti Euxini.	<u>386</u>	Maculas Solares observandi methodus,	<u>94</u>
Maculæ quædam colorem non mutantes.	<u>396</u>	Maculas Solares observandi præstantissima ratio.	<u>97</u>
Maculæ Lunares, quænam præ reliquis atten- dendæ, circa longitudines acquirendas?	<u>486</u>	Maculas Solares observandi omnium opti- mus modus, quis sit, per machinam Heliocopicam ab Autore inventam de- claratur.	<u>98</u>
Maculæ quatuor in Solis medietullo exortæ.	<u>503</u>	Maculas Solis observatas delineandi mo- dus.	<u>105</u>
Maculæ Solares formam figuramve indies mutantes.	<u>503</u>	Maculas Lunares, absque Tubospicillis, nullus unquam rectè cognovit.	<u>134</u>
Maculæ in disco inopinatò natæ.	<u>503</u>		<u>Macro-</u>
Maculæ non solum formam, sed & nume- rum, variant.	<u>504</u>		
Maculæ in plures distractæ.	<u>504</u>		

	<i>pag.</i>
Mæotis palus, quare abrupta quasi videatur?	<u>378</u>
Mars, in quali formâ à Fontanâ fuerit observatus?	<u>67</u>
Martis descriptio.	<u>66</u>
Martis observationibus Telescopia usitata minime inveniunt.	<u>67</u>
Martis corpus rotundum.	<u>67</u>
Mathematici hucusque stellas fixas crinitas adspexerunt.	<u>35</u>
Majoribus nostris feliciores fumus.	<u>133</u>
Marium sectiones, cur aliquando anfractuosa?	<u>149</u>
Mariâ, Paludes, montes vallesque differunt in Lunâ ratione coloris.	<u>256</u>
Mariâ, lacus & paludes, mutant aliquantum colorem.	<u>257</u>
Mensis Synodicus & Periodicus.	<u>172</u>
Mensis Synodicus undè varietur?	<u>178</u>
Mensis Synodicus quid sit?	<u>178</u>
Mensis Synodici inæqualitas undè?	<u>316</u>
Menses, à Lunâ primùm visâ, veteres inchoarunt.	<u>273</u>
Mensium Synodicorum differentia.	<u>178</u>
Mercurii observationes.	<u>74</u>
Mercurii vicissitudines, cur hæcenus observari haud potuerint?	<u>74</u>
Mercurii phasæ, majores, quàm sunt, apparent.	<u>75</u>
Mensuræ pedis Gedanensis, Rhyndandici fortificatorii, & Pariensis Regii differentia.	<u>12</u>
Microscopii structura & usus.	<u>23</u>
Mira macularum metamorphosis.	<u>519. 520</u>
Motus stellarum fixarum.	<u>33</u>
Montes Vallesque in Lunâ dari, jam pridem statuere.	<u>131</u>
Montes & Valles in Lunâ extare.	<u>137</u>
Montes in ipso Lunæ limbo extare, demonstratur.	<u>145. 146</u>
Montes Lunæ in limbo, non ita dilucidè, circa confinia, apparent.	<u>146</u>
Montes, quò sunt altiores, eò citiùs illustrantur.	<u>265</u>
Montium Lunarum altitudines dimetiendi ratio.	<u>264. 267</u>
Montium Lunarum altitudines alius supputandi modus.	<u>268</u>
Montium Lunarum maxima altitudo.	<u>269</u>
Montium Lunarum altitudines mechanice investigare.	<u>269</u>
Montium terrestrium altitudines.	<u>270</u>
Montibus terrenis mirandam alii assignant altitudinem.	<u>271</u>

	<i>pag.</i>
Montium Lunæ & terræ differentia.	<u>272</u>
Montium maximi tractus in Lunâ.	<u>272</u>
Montes Lunæ in peripheriâ siti.	<u>279</u>
Montium in peripheriâ manifesta ratio.	<u>280</u>
Montes diversi, ratione materiæ, in Lunâ existunt.	<u>353</u>
Montes quò sunt altiores, eò obscurior longiorque oritur umbra.	<u>113</u>
Motus librationis explicatur.	<u>235</u>
Mora macularum dierum 13.	<u>522</u>
Motus librationis veteribus planè incognitus.	<u>235</u>
Motus Lunarum proprii & libratorii differentia.	<u>236</u>
Motus centri disci explicatur.	<u>241</u>
Motus librationis scitu perquam utilis.	<u>441</u>
Motus librationis quomodo addiscatur?	<u>442</u>
Mundus an sit finitus?	<u>153</u>
Mundus an finitus in spatio finito, vel infinito?	<u>153</u>
Mundus quâ constet figurâ?	<u>153</u>
Mundum esse animatum quis statuerit?	<u>154</u>
Mundum animal esse diuinum, Plato asseveravit.	<u>154</u>
Mundi anima quid sit?	<u>155</u>
Murus scabrosus lumen universalis, speculo, reflectit.	<u>132</u>

N.

Navigantes loca elevatiora primùm conspicunt.	<u>150</u>
Nilus Lunarum.	<u>355</u>
Nives nullæ, nec pluvix in Lunâ.	<u>357</u>
Noctis longitudo in Lunâ.	<u>294</u>
Non omne corpus, quod per reflexionem agit, est corpus politum.	<u>131</u>
Nodi Lunæ.	<u>170</u>
Nomina varia longitudinis.	<u>172</u>
Notæ utiles, de phasi Lunæ falcate.	<u>287</u>
Notabile discrimen inter cognatas figuras undè?	<u>317</u>
Notabilia circa phasin Lunæ corniculatæ.	<u>283</u>
Notabilis observatio Medicæarum	<u>537. 541</u>
Notatu digna circa Faculas.	<u>516</u>
Notatu digna circa maculas Solares.	<u>518</u>
Novi nihil temerè in Cælo statuendum.	<u>135</u>
Novitates quasdam asseverare, unde coacti fuerimus?	<u>135</u>
Noviterrium Lunæ.	<u>290</u>
Noviterrium in Lunâ quando?	<u>293</u>
Novilunium nullum unquam perfectum invenitur.	<u>407</u>

	pag.		pag.
O.		P.	
O bjecta, sive rerum visibilium species erigendi, quinam sit optimus modus? 6		P arallaxis. 185	
Objecta, ratione anguli visionis, & majora & minora spectantur. 91		Parallaxis in remotissimis corporibus evanescit. 187	
Obliquiora debilius illustrantur. 257		Parallaxis phenomena plus justò attollit. 188	
Observatio conjunctionis Jovis & Lunæ 545		Parallaxis eò major, quò corpora decliniora. 188	
Observationes veterum, multà imperfectione, laborant. 31		Parallaxis in Perigæo minima. 188	
Observator inexercitatus facilè decipitur. 53		Parallaxis altitudinis. 188	
Observationes Jovialium, quando instituentur? 54		Parallaxis longitudinis. 189	
Observationes Saturni. 65		Parallaxis latitudinis. 189	
Observationes Jovis & Martis, 65		Parallaxis declinationis. 189	
Observationum macularum Solarium requisita. 102		Parallaxis ascensionis rectæ. 189	
Observationes Lunares nullas accuratas conficere possumus, verà Lunæ effigie destituti. 206		Parallaxis distantiz. 189	
Observator phasium Lunarium qualis esse debeat? 210		Parallaxis distantiz, in vertice est omnium maxima. 192	
Observationibus Selenographicis, singulis noctibus, invigilare oportet. 211		Parallaxis Solis. 193	
Observationes Lunationum quem usum præbeant? 413		Parallaxium differentia. 188	
Observationes Lunationum, quomodo instituantur? 409		Parallaxium Lunarium theorematà. 190	
Observationes Lunationum instituendi ratio. 411		Paradoxa, circa quasdam observationes. 484	
Observationibus longitudinum, quonam tempore vacandum? 485		Partes quasdam Lunæ livefcentes. 380	
Observationes Selenographiz, quomodo fuerint institutz? 207		Papyrus humectata se se dilatat, siccata se se constringit. 214	
Observationes notabiles Pleniluniorum. 370		Penumbra Eclipsium, veram præcedit umbram. 452	
Occultationes stellarum, quomodo observandæ? 469		Perfectum Plenilunium, quàm diu duret? 368	
Oceani Lunares habent suas Insulas. 150		Peripateticorum de Lunà opinio. 112	
Oëtilis. 174		Peripatetici observationibus Astronomicis (quod mirum) fidem non adhibent. 117	
Oculus membrum corporis haud postremum. 2		Peripatetici, ne aliis oculis invideant, rogantur. 118	
Omne spectaculum aptum est, ad reflectionem simulacri rei oppositæ. 127		Peripheria Lunæ ubi maximum librationis terminum commonstret? 118	
Opinionis inveteratæ, magna vis est. 93		Peripheria alicujus phæos ex parte scabrosà apparet. 401	
Opinionis variz, de luce lumine ac Lunæ illuminatione. 123		Phasium vicissitudines unde oriantur? 179	
Oppositio. 183		Phasium nomina. 181	
Oppositionis tempore. tam Sol, quàm Luna nonnunquam conspiciuntur. 197		Phasium magna varietas. 215	
Opus observationum Luminarium exempla, notatu digna. 198		Phases Lunares correctè delineare, est opus difficillimum. 209. 217	
Optices axiomata. 194		Phasium forma rotunda, ratione papyri constrictionis, existit ovalis. 214	
		Phasium generalis delineatio perquà utilis. 216	
		Phasium delineatio, quomodo instituenda? 216	
		Phasium tabulæ generalis centra, quid denotent? 240	
		Phases admodum variantur. 249	
		Phasis prima ac novissima. 276	
		Phasis Lunæ corniculatæ crescentis. 282	
		Phasis Lunæ recentissima, quando die conjunctionis conspici possit? 283	

	Pag.		Pag.
Phases, quò magis crescunt, eò luminis augmentum in iis magis decrefcit.	285	Phafis Lunæ cornutz decrefcntis.	400
Phafes recentiores, nudis oculis apparent ampliores.	285	Phafis Lunæ cornigeræ decrefcntis.	402
Phafis Lunæ Falcatæ crefcentis.	286	Phafis Lunæ Falcatæ decrefcntis.	404
Phafis prima omnium maximè fe fe diffundit.	286	Phafis Lunæ corniculatæ decrefcntis.	406
Phafis Lunæ in cornua curvata, quare majores folito apparent?	287	Phenomena, omnium optimè per hypothefin Pythagoricam, explicantur.	164
Phafium viciffitudo, major eft apud Selenitas, quàm apud nos.	299	Philofophos non decet, ad DE I omnipotentiam ftatim confugere.	122
Phafis Lunæ cornigenæ crefcentis.	302	Philofophari rectè de rebus mundanis, res fanè difficilis.	152
Phafis eadem in anno nunquam redit.	303	Planetæ qualem tubi foramen requirant.	37
Phafeos ejusdem anniverfaria reftitutio, unde dependeat?	303	Platonis fententia de Cœlo.	154
Phafium earundem reditus, quando expetendus?	304	Planetarum tempus revolutionis.	167
Phafis curvata crefcens.	306	Planetis fibras quasdam inefle magneticas.	169
Phafis crefcens & decrefcens, ratione temporis & luminis variat.	307	Planetæ habent fuas eccentricitates	170
Phafis Lunæ Lunatæ crefcentis.	310	Planetæ modò velociore, modò tardiores.	170
Phafes, quare non omnes, quafi in nonagesimo ficut repræfentatæ?	311	Plenilunii limbus, non femper undiq; plenus atq; levigatus.	142
Phafium lineæ funt Ellipticæ.	312	Plenilunia minimè plena.	143
Phafis Lunæ, quando exactè referat femicirculum, quando Ellipfin, & quando circulum?	313	Plenilunia, quâ parte extiterint minimè plena.	143
Phafis Lunæ plusquam Lunatæ crefcentis.	314	Pleniluniorum obfervationes, notatu dignæ.	143. 144
Phafes in Capricornu, obfervatu difficiles.	314	Plenilunii vera facies.	220
Phafes Lunæ adolefcntis.	316	Plenilunii genuina facies major.	222
Phafis Lunæ Juvenis.	320	Plenitertium Lunæ.	290
Phafis plusquam bifida.	342	Plenitertium in Lunâ, quando?	291
Phafis Gibberofa crefcens.	343	Plenilunium Aftivum.	358
Phafis Lunæ in orbem infinuata crefcens.	346	Pleniluniorum afpectus femper variatur.	358
Phafis Lunæ incurvata crefcens.	348	Plenilunium Brumale.	362
Phafis Lunæ gibberofæ crefcentis.	352	Plenilunium verftatile.	362
Phafis Lunæ adultæ.	354	Plenilunium perfectum, nullo tempore confpicitur.	369
Phafis Lunæ ad oppofitionem vergentis.	356	Plenilunii pars deficiens, num oculis deprehendi queat?	369
Phafis Lunæ decrefcntis.	376	Pleniluniorum diverfa pars limbi, ratione latitudinis, exiftit fcabrofa.	371
Phafis Lunæ gibberofæ decrefcntis.	378	Plenilunii afperitas, num in utroq; limite æque notabilis?	373
Phafis Lunæ incurvatæ decrefcntis.	380	Plenilunium non undiq; rotundum.	416
Phafis Lunæ in orbem infinuatæ decrefcntis.	382	Polemofcopium quifnam invenerit?	24
Phafis Lunæ gibberofæ decrefcntis.	384	Polemofcopii ufus.	25
Phafis Lunæ gibbæ decrefcntis.	386	Polemofcopii constructio.	26
Phafis ad Quadraturam properans.	387	Polemofcopium, absque lentibus, quid præftet?	28
Phafis Lunæ dividuæ.	392	Polemofcopium, quomodo omnia prona & erecta exhibeat?	28
Phafis Lunæ à Quadraturâ recent.	394	Polemofcopium, quâ ratione omnia fupina præfentet?	28
Phafis Lunæ plusquam Lunatæ decrefcntis.	396	Polemofcopium, omnium quoque rerum fpecies invertit.	29
Phafis Lunæ Lunatæ decrefcntis.	398	Polemofcopium virgis ambulatoriis includere.	29
Phafes decrefcntes, an crefcentibus fint claritate pares?	398	Polemofcopii demonftratio.	30
Phafes fenefcentes lumen habent debilius	399		Poli

	<i>pag.</i>		<i>pag.</i>
Poli Lunares, quam Cœli partem respiciant?	<u>237</u>	Qualitates elementorum Aristoteles ex Cœlo removet.	<u>152</u>
Poli Lunæ mobiles.	<u>237</u>	Quænam utilitas ex cornuum Lunæ inspectione ad nos redundet?	<u>310</u>
Pontus Euxinus qualis sit substantiæ?	<u>318</u>	Quid circa delineandas maculas sit observandum?	<u>102</u>
Porphyrites mons, quasi igneus apparet?	<u>353</u>	Quid inde fieret Luna si esset speculum planum?	<u>125</u>
Porphyrites, quàm constet figurâ?	<u>354</u>	Quintilis.	<u>184</u>
Porphyrites mons, mutat quidem formam, sed non colorem.	<u>402. 396</u>	Quincunx.	<u>184</u>
Polus arcticus macularum Solarium descendit.	<u>511. 519</u>	Quinam refractiones Astronomiæ applicarunt?	<u>193</u>
Polus Austrinus macularum ascendit	<u>515</u>	Quid circa ordinem phaëum Autor potissimum attenderit?	<u>317</u>
Præfagium status ærei, ex cornuum Lunæ inspectione.	<u>284</u>	Quinam montes Lunares aliis sint excelsiores?	<u>342</u>
Proprietas utrinque concavarum lentium.	<u>13</u>	Quinque maculæ in unam coaluerunt.	<u>502</u>
Prostaphæresis Epicyclica.	<u>177</u>	Quinque Solares maculæ ex tribus nascuntur.	<u>502</u>
Proportio terram inter & Lunam.	<u>203</u>	Quo quid longius à speculo convexo abest, eò magis attenuatur.	<u>129</u>
Pupilla, ratione lucis, coarctatur & comprimitur.	<u>384</u>		
Q.			
Quadraturæ variationibus obnoxia.	<u>249</u>	R.	
Quadratus.	<u>181</u>	Radii paucissimi reflexi, à speculo convexo offeruntur.	<u>130</u>
Quadraturarum confinia, stato tempore, reciprocantur.	<u>250</u>	Radii albicantes, circa Plenilunium conspiciuntur.	<u>357</u>
Quadraturarum sectiones non omni tempore per centrum transeunt.	<u>322. 324</u>	Ratiocinatio sola interdum admodum fallibilis.	<u>120</u>
Quadratura Lunæ prima.	<u>322</u>	Recentiorum opinio, de montium altitudinibus.	<u>271</u>
Quadraturarum sectiones variantur.	<u>324</u>	Reflectio è mari debilior, quàm è terrâ.	<u>150</u>
Quadraturarum sectiones, certos habent terminos.	<u>326</u>	R. flexio eò est debilior, quò superficies magis est lævigata.	<u>150</u>
Quadraturarum termini stabiliuntur.	<u>327</u>	Reflexio aque debilis.	<u>151</u>
Quadraturarum sectiones in certo interstitio suas peragunt reciprocationes	<u>328</u>	Reflectio corpora cœlestia ex vero loco removet.	<u>156. 195</u>
Quadraturarum sectiones menstruæ schemate exprimuntur.	<u>328</u>	Refractiones.	<u>193</u>
Quadraturarum sectiones, observationibus corroborantur.	<u>330</u>	Reflectio corpora plus justò elevat.	<u>194</u>
Quadraturarum sectiones, quibus de causis retardentur aut promoveantur?	<u>330</u>	Refractionis linea diversimodè refringitur.	<u>194</u>
Quadraturarum sectionum motus semestris, non perpetuò est æqualis.	<u>331</u>	Refractionis anguli non semper æquales.	<u>196</u>
Quadraturarum linearum menstruæ, non continuò moventur in lineis parallelis.	<u>332</u>	Refractionis linea, qualis sit figuræ?	<u>196</u>
Quadraturarum sectionum diversæ observationes.	<u>335</u>	Reflectio astra sub horizonte latentia attollit.	<u>197</u>
Quadraturæ notabiles.	<u>340</u>	Refractiones in vertice nullæ.	<u>198</u>
Quadraturæ sectio est recta linea.	<u>389</u>	Reflectio circa horizontem maxima.	<u>198</u>
Quadratura ultima.	<u>390</u>	Reflectio cur circa verticem evanescat?	<u>198</u>
Quadraturarum pars illustrata, num haud illuminatæ sit æqualis.	<u>390</u>	Reflectio, ut horizon, variabilis.	<u>199</u>
Quadratura notabilis.	<u>417</u>	Reflectio dies reddit longiores.	<u>199</u>
Quando termini extremi Quadraturarum conspecti sint?	<u>327</u>	Reflectio Fixarum.	<u>200</u>
Quæstiones de maculis Solaribus.	<u>96</u>	Reflectio Solis & Lunæ.	<u>200</u>
		Refractionum species.	<u>200</u>
		Regulæ de naturâ, differentis, & productione refractionis radiorum.	<u>19</u>
		Rupes in Lunâ existere præsumitur.	<u>264</u>

S.

	Pag.		Pag.
S acer mons incipit illuminari.	395	Sol ex primæva luce factus est.	76
Saturnus quibusdam ovalis apparuit.	42	Sol verus & materialis ignis est.	77
Saturnus quibusdam duobus globulis stipatus, visus.	42	Sol est sphæricus.	77
Saturni globuli adhzrentes, videntur duæ stellæ eum obeuntes.	42	Sol ex partibus heterogeneis confusus.	77
Saturnum nonnunquam planè rotundum autor conspexit.	42	Solem corpus esse compactum, quis statuat?	78
Saturnus Jovialium in distantia ferè longissimà deprehensus.	543	Solem esse aliquatenus lentum & spongiosum alii asserunt.	78
Saturni vera facies ab autore adumbrata.	43	Sol, quomodo lumen in terram spargat?	78
Saturni effigies à Fontanà observata.	43	Sol triplici modo radios ejaculatur.	79
Saturni facies describitur.	43	Sol centrum mundi.	80
Saturni facies, cur non eadem semper videatur?	44	Sol circumgyratur.	80
Saturni brachiola, qualia sint corpora?	44	Sol periodicum motum, quanto temporis spatio absolvat?	80
Scheineri labor circa delinendas maculas.	217	Solis Poli mobiles.	81
Selenographia nulla hæctenus adhuc prodit.	206	Solis Poli quomodo moveantur?	81
Selenographica tabula.	226	Solis distantia à terrâ.	81
Selenographica tabula, instar Geographicz est constructa.	227	Solis magnitudo.	81
Selenographicz tabulæ phasium generalis descriptio.	261	Solarium macularum præcipui scriptores?	82
Selenitzæ (sive sint sive non sint) habent suæ Equinoctia & Solstitia.	295	Solarium macularum observatarum utilitas.	82
Selenitzæ habent suas Eclipses terræ & Solis.	296	Solares maculæ quid sint?	83
Selenitzæ, in terrâ æq̃ maculas conspiciunt.	297	Solarium macularum genera, quotuplicia sunt?	84
Selenitzæ, unde integram revolutionem horarum colligere queant?	300	Sol oriens, montes turresque priùs illuminat.	136
Sectionum Quadraturarum menstrua spatia cur non secundum inæqualitates competentes, fuerint annotatæ?	311	Sol, centrum universi, circa axem moveretur.	164
Sectiones Quadraturarum inæqualitatibus subjectæ.	389	Sol, an totum hemisphærium Lunæ, quovis tempore illuminet?	366
Selenographia scientiarum Mathematicarum non postrema.	440	Sol plusquam hemisphærium Lunæ illustrat.	390
Selenographia ad res abstrusas, nobis pandit fores.	440	Solis lux unde interdum debilior?	399
Selenographiæ ope, Astronomiam excolimus.	440	Sol ab omni maculâ planè purus lustratus.	501, 505, 508, 510, 518, 524.
Selenographiæ beneficio, Eclipses longè accuratius observantur.	441	Specilli ope, species foris visibiles, in camera obscuratâ distinctè depinguntur.	5
Secundariæ maculæ Solares.	518	Species, admodum clarè, in camera obscuratâ, representare.	5
Semidiameterum umbræ terrenæ exquisitè determinare.	461	Species visibiles, quomodo variis modis erigantur?	5
Semen macularum, umbra.	529	Speculorum genera diversa.	124
Sensus apud quosdam vix fidem inveniunt.	117	Specula plana, in unum solummodo locum; convexa verò quaquaversum, reflexionem projiciunt.	129
Semisextus.	183	Specula sphærica oppositarum rerum simulacra referunt minora.	129
Sesquadrus.	184	Speculi convexi proprietates.	129
Sextilis.	183	Sphæræ maximè velocissimum competere motum, naturæ contrariatur?	167
Solis encomium.	76	Stellas incognitas explorandi modus.	39
		Stellæ Urban-octavianæ priùs ab autore; quàm à quopiam alio, visæ.	49
		Stellæ Urban-octavianæ, nù fuerint erroneè?	50
		Stellæ Urban-octavianæ, adhuc in pristino loco reperiuntur.	53

	Pag.		Pag.
Stellarum colores unde ?	118	Terra radios Solis in hemisphaerium Lunæ	
Stellæ quomodo moveantur ?	155	latens reflectere nequit	294
Stellæ artè admodum junctæ.	535	Terræ maculæ non sunt perpetuæ apparitionis.	298
Superficies scabrosa radios quaquaversum reflectit.	151	Terræ macularum inopinatæ mutationes, apud Selenitas.	298
Superficies aquæ lunaris, speculum representat convexum.	151	Terræ macularum primus usus.	299
Syrcticum mare.	155	Terræ macularum usus secundus, est cognitio longitudinis.	301
T.			
Tabula angulorum, verticalis, & orbitæ Lunæ, adornanda, ad longitudines invenendas.	485	Theoremata Catoptrica.	128
Tabula inclinationis disci Lunæ, ad horizontem Uraniburgicum supputanda.	482	Theoria Lunæ schemate explicatur.	174
Tabella Lunæ ætatis.	446	Trigonus.	184
Telescopia omni oculo serviunt.	11	Tridecilis.	184
Telescopiorum magna differentia, ratione claritatis.	11	Trigonorum sectiones, ordine recipiuntur.	346
Telescopii fabrica.	11	Trigonorum termini extremi.	346
Telescopia ratione longitudinis diversa construere.	12	Trigonorum termini, quibusdam inæqualitatibus implicantur.	347
Telescopii alicujus egregii fabrica.	13	Trigonorum sectionum termini.	381
Telescopium ex duplici lente convexâ, objecta invertit.	15	Tuborum opticorum genera quatuor.	11
Telescopium ex duplici lente convexâ constructum.	15	Tubi papyracei, & ex lamellis terreis parati, cur non ab autore probentur ?	15.16.
Telescopium, ex duabus convexis, & unâ concavâ paratum.	15	Tubi omnium optimi, ex ligno sicco.	16
Telescopium, ex tribus specillis convexis adornatum.	15	Tuborum foramina, quomodo debeant esse comparata ?	17
Telescopii perfectissimi notæ.	17	Tubospicillum egregium, totam Lunæ faciem, unâ vice, non capit.	298
Telescopiorum valorem, viâ infallibili explorare.	18	Tycho Brahe instaurator Astronomiz.	32
Telescopiorum inæqualitas refractionis, quibus signis dignoscenda ?	21	Tychonici Systematis descriptio.	162
Telescopiorum virtutes, vario modo explorare.	21	Typus transitus Jovialis.	146
Telescopium quomodo sit adornandum, ut fixæ radii adventitii ex utroque appareant ?	36.37	V.	
Telescopiis R.P. Antonii de Rheitâ præstantiora dari.	53	Valles quâ ratione illuminentur ?	136
Telescopii ope, quadragies Cælo propius admovemur.	134	Valles quando maximè lucidissimæ ?	136
Telescopium radios Lunæ adventitios admittit.	285	Valles Lunares crescere & decrescere videntur.	263
Terra moventur motu triplici.	164	Valles quædam, cum Lunares, tum terrestres, formâ rotundæ.	26a
Terra, motu spirali, Eclipticam percurrit.	165	Valles Lunares mensurare.	269
Terra totam Lunæ sphaeram secum circumducit.	165	Vallium circumferentia videtur crescere & decrescere.	343
Terræ montes, num Lunæ montibus sint excellentiores ?	272	Vallis Aetnæ & Sinai.	348
Terra, Solis lumen reflexum ad Lunam projicit.	290	Vallium Umbra.	376
		Venus, quando minor Jove spectata ?	39
		Veneris facies.	68
		Veneris observationes diurnæ.	69
		Venus Perigæa nudis oculis spectata admodum apparet parva.	72
		Venus quando longius à Sole discedit, tantò lumen ejus crescit.	71
		Venus quando maxima apparet ?	73
		Venus quò magis lumine crescit, eò magis magnitudine decrescit.	73
		Venus ante Solis ortum major apparet.	73
		Venus	

	<i>pag.</i>		<i>pag.</i>
Venus cum sit lumine aucta, quid circa eam observandum.	73	Vitrum quibus rebus potissimum inferviat?	2
Veneris phases vespertinz.	73	Veteres cur Lunam Antichrona crediderint?	297
Veneris diameter in mediâ elongatione quanta?	449	Vladislavianę stellulę & Urban-octavianę sunt eadem.	64
Veteres in ordine spherarum, inter se non conveniunt.	159	Umbrę Lunę.	84
Veteres spherę reales, in plures fuerunt distinctę.	159	Umbrā in Sole vallibus variabilis.	137
Veterum opinio, de montium altitudinibus.	270	Umbrę natura.	138
Veterum error, circa primum Lunę exitum.	275	Umbrā variatur, pro corporis opaci & luminosi situ.	138
Veterum opinio, de phasium figurâ.	312	Umbrosę quędam partes in Lunâ.	138
Vesputius veterem & novam Lunam, unâ die spectavit.	375	Umbrā in Sole admodum notabilis.	110
Via lactęa quid sit?	39	Vulgus, quę non percipit, inter absurda numerat.	120
Viam indagare translunarem.	471		
Vidibile centrum disci Lunę est mobile.	323		

Z.

Zodiacus macularum Solarium 88
Zodiaci latitudo. 170

AD LECTOREM.

De mendis relictis, ut benevolē tollantur.

ET continuo observationum celestium opere, & tot figurarum sculpendarum gravissimo labore, & qua hic leguntur, conscribendis, referendisq; nec non editis relegendis, atq; corrigendis (satis hoc homini nisi negotii?) occupatissimus, haud potius vitare, ut absq; mendis (sine quibus ulli astari, etsi non aequē dissentio, libris publicare vix dat?) opus hocce nostrum prodire: quę tamen menda à me demum minus negotioso fuit satis bene animadversa, bicq; ordine cum indicata in finem, ut Te humanissimi rogem, mi Lector, quō à Te emendantur, mihi nihil vitio vertente, quin excusatione potius saveat: quę ut sum, ita ero, & boni publici, & honoris Tui nunquam non cupidissimus. *3fla inquam sunt emendanda, hoc modo:*

PAG. 14.lin.12.pr.cavo.plana, leg.cavo.plano.p.17.lin.31.poli.intramur.inferre.adhibeat.p.25.lin.16.pr.quę.leg.qui.p.27.lin.8.pr.viciz, leg. variis. p.28.lin.3.pr.leg.u. p.30.lin.25.pr.d.g.leg. d. e. & lin. 26.pr.e.f.l.c.f. p.33.lin.15.pr.intricarum.l.intricarum.p.34.lin.2.pr.vifus.leg.vifas. pag.36.lin.7.pr.orbicula.azad.orbiculares.p.37.lin.14.pr.convexial.con.vezz.p.40.lin.11.dele quia.p.56.lin.2.pr.judicio.azad.judicio. p.61.lin.10.pr.aliores, leg. aliores, pag.67.lin.21. post. fpa. cio.inferre. 12.cifcer. p.64.lin.19.pr.proprietazad.progrezz. p.79.lin.13.pr.ficuti.furt. p.86.lin.19.pr.exeunte, l. orientali. p.92.lin.15.pr.azad.azad. p.100.lin.29.pr.nequies, leg. nequies. pag.125.lin.5.pr. quę.lege.que.p.129.lin.31.pr.lib.5, leg.6.p.134.lin.17.pr.infirmum.l.infirmum.p.137.lin.10.pr.calorem.l.colorem. pa.139.lin.4.pr.idicabitur, l.judicabitur; & lin.15.pr.eaz; l.eaz; pag.143.lin.2.pr.illuminatez, l.illuminate. p.145.lin.28.pr.imminet, leg. imminet. p.151.lin.29.pr.fpargetz, l.fparget. p.167.lin.20.pr.& l. ut. pag.169.lin.4.dele me. p.183.lin.28.pr. Syzigiz, l. Syzigie. p.184. l. 185.pr. quę.legi. iater. quę.& pr.obrinent, l.obunet; & lin.29.pr.ancez, l.vera. p.190.lin.10.pr.ejus.l.eorum.p.194. l. 23.pr.quod.l. quot. p.207.lin.14. post. tempore.inferre. ac ne p.217.lin.13.pr.compendiori, leg. compendiosiori. & lin. penult. post. vercor, inferre. dicere. p.218.lin.18.pr.subfedere. l. super federe. p.219.lin.3. post. operis, inferre, iu; & lin.4.pr. pocius sem generaliter, l. posse admitti. p.226.lin.9.pr.fuertim. l. fuerim. p.227.lin.8.pr.moris. l. more. p.240.in marg. pr. libens. l. leg. admissis. p.248. lin. penult. leg. variat; & variatq; pag.251.lin.28.pr.maculis. l. macula. p.254.lin.17.pr.poverim. l. pocius; & lin.25.pr.obtinencia, l.obtinencia. p.255.lin.3.pr.removebantur. l. removebantur. p.281.lin.29.pr.easfam. l. easlum. p.292.lin.4.pr. fitz. l. fitz. p.299. l. 312. pr. sit. leg. sine. pag.303.lin.15.pr.mendabuntur. l. mendabuntur. p.306.lin.12.pr.hebitare. l. hebetare. p.308.lin.11. pr. tempus. l. tempore. p.316.lin.18.pr.intazad. l. intrazad. p.317. lin. ut. pr. hęc. hor. p.319.lin.8.pr. aliquod. l. aliquot. p.333.lin.29.pr. deprehendes, leg. deprehendas. pag.341.lin.19. post. stabiliuntur. l. Quem; & lin.26. pr. tumo. l. fuerim. tumo. l. in. 31. pr. rem. pore. l. tempore. p.344.lin.17.pr. unquam. l. nunquam. p.352.lin.13.pr. hos. l. ho. p.354.lin.7.pr. informand. l. informand. p.357.lin.31.pr. niv. l. neve. p.373.lin.3.pr. eulibet. titron. l. eujuslibet. titron. p.406. lin. 32. pr. queras, l. queras; & lin. 33. pr. transferatur, leg. transferat. p.309.lin.2.pr. Utilitate. l. Utilitate. pag.411.lin.28. post. iterum. inferre. & p.437.lin.26. pr. avis. l. faver. p.441.lin.13.pr. inuratione, leg. imitatione; & lin.11.pr. tum. l. tam. pag.457.lin.13.pr. contentum. l. contentos. pa. 458.lin.30. pr. par. l. para. p.460.lin.6. pr. umbz. l. imbo. p.476.lin.2. pr. factum, l. factam. p.480.lin.20. pr. infeder. l. infederi. & lin. penult. pr. nunquam, l. nunquam. pag.481.lin.21. dele minus. p.484.lin.13.pr. relictoz, l. relicto. p.486. lin.3. pr. alter, leg. alter. p.493.lin.11. pr. utilissimum, l. accomodatissimum; l. utilissima. l. accomodatissima. & lin. 12. pr. videatur. l. videtur. p.494.lin.3. pr. fuciantur. l. fubiciantur. & lin. 28. pr. sectione. l. sectionis. p.499. lin. ut. pr. protahatur. l. l. protahatur. p.504.lin.6. pr. harum, l. harum. p.505.in marg. pr. redux est. leg. redux ex. p.521.lin.5. pr. sublequaz. leg. sublequatus; & lin. 10. pr. caluerunt, l. caluerunt. p.539.lin.6. pr. illa, l. ille. p.540.lin.24. pr. aliquod. l. aliquot. p.544.lin. ut. pr. fideret, l. fideret. p.551.lin.1. pr. Elipsoz. l. Elipsoz. p.559.lin.8. pr. phatex, l. phatex. p.560.lin.30. pr. reflectio. leg. reflexio.

Si qua adhuc sunt reliqua, corrigenda sunt, si opus: quanquam nonnulla, quę correctione forte alicui viderentur digna, vix erunt talia, dummodo mens nostra a rebus magis, quam verbis intensa attendatur. Vale.


The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be clearly documented and supported by appropriate evidence. This includes receipts, invoices, and other relevant documents that can be used to verify the accuracy of the records.

In addition, the document highlights the need for regular audits and reviews. By conducting periodic checks, any discrepancies or errors can be identified and corrected promptly. This helps to ensure the integrity and reliability of the financial data being recorded.

Furthermore, the document stresses the importance of transparency and accountability. All transactions should be recorded in a clear and concise manner, making it easy for anyone reviewing the records to understand the details of each entry. This level of transparency is essential for building trust and confidence in the financial reporting process.

Finally, the document notes that maintaining accurate records is not only a legal requirement but also a best practice for any organization. It provides a clear and reliable picture of the organization's financial health, which is crucial for making informed decisions and planning for the future.

Figura Primaria Placium et Lunationum.



*Fig. T.**

Aut. Scalpe.


Semidiameter Luna.



Digiti Eclipticæ.



Figura Pleniluniorum-Generalis.



*Fig. T.t.***

Semidiameter Line.



Aut. Scalas.

Digiti Ecliptics.

